



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines


Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



1838.



Handbuch der **Arzneiverordnungslehre.**

Von

Dr. Philipp Phorbus,

Privatdozenten an der Königl. Friedrich-Wilhelms-Universität und prakt. Ärzte zu Berlin, Mitglieder der Kaiserl. Leopold. Carol. Akademie der Naturforscher, des Vereins für Heilkunde in Preussen, der Hufelandischen Gesellschaft zu Berlin, der Gesellsch. für Natur- und Heilkunde zu Dresden, der physikalisch-medizinischen Societät zu Erlangen, der medicinisch-chirurgischen Gesellsch. zu Hamburg, der medicinischen zu Leipzig und der philosophisch-medicinischen zu Würzburg, Ehrenmitgl. des Apotheker-Vereins im nördl. Deutschland.

Als

zweite, gänzlich umgearbeitete Ausgabe
der 1831 erschienenen „Receptirkunst“ des Vfrs.


Mit Königl. Württembergischem Privilegium gegen den Nachdruck.

Zweiter Theil.
Specielle Arzneiverordnungslehre.

AZ 6587

Berlin, 1836.

Bei *August Hirschwald.*



31-51

Inhalt.

Einkleitung. S. 1-II.

Die einzelnen Arzneimittel in alphabetischer Ordnung. S. 13-535.

Anhänge. S. 536-563.

I. Kurze Anleitung zur ersten Hülfsleistung bei acuten Vergiftungen. S. 536-555.

H. Getränke. S. 555-563.

Erklärung der Zeichen und Abkürzungen.

[Es werden hier nur diejenigen erklärt, welche diesem Buche eigenthümlich sind; andere, beim Receptiren allgemein gebräuchliche, s. im 1ten Theil, §. 44. Noch andere sind so allgemein bekannt, dass sie keiner Erklärung bedürfen.]

* s. S. 7

** s. S. 7

† s. S. 6

‡ s. S. 10

U } s. S. 6
F }

(vor dem Namen eines bei einer Formel angeführten Autors: s. S. 5

(vor einer Zahl (im Register). s. S. 564

ad Grana decem!, *ad Guttas quinque!* p. p. s. S. 9-10

DISP. FULD., DISP. LIPP., p. p. *Dispensatorium Fuldense, Lippiacum* p. p.

Esol. Esölßfel

Ext. (im Register) *Externa*

Hb. rec. (bei den Extracten) *ex herba recens paratum*

I. bedeutet den 1ten Theil dieses Buchs

Int. (im Register) *Interna*

L. Libra (Medicinalpfund, vgl. I. S. 106)

Mgr. Mariengroschen (s. S. 8)

Pf. Pfund (Civilpfund, vgl. I. S. 106)

PH. BAD. *Pharmacopöa Badensis* (vgl. S. 2 sub 5)

PH. BAT., PH. BOR. p. p. *Pharmacopöa Batava, Borussia* p. p.

PH. MIL. *Pharmacopöa militaris Russica*

PH. P. *Pharmacopöa pauperum*, Armenpharmakopöe von HUFELAND

PH. SLESV. *Pharmacopöa Slesvico-Holsatica*

PH. SLESV. Anhg. bezeichnet einen hinter der S. 8 erwähnten Schleswig-Holsteinschen Taxe befindlichen Anhang zu dieser Pharmakopöe

q. v. quantum vis. — Oft von uns in der Bedeutung gebraucht, dass man ein Mittel in der in Rede stehenden Arzneiform od. Formvarietät in beliebiger Stärke, also auch pur, anwenden dürfe.

Sgr. Silbergrotschen (s. S. 8)
Shl. Schilling (s. S. 8)
Sol. s. S. 8
s. s. sensu strictiore, im engeren Sinn
St. Stunde.

Verbesserungen.

A. Im ersten Theil

(ausser den bereits dort, S. XVI, so wie in diesem Theil, S. 2, Note, angegebenen).

- 31 Z. 13-14. ist das vom Calamel entnommene Pulver sehr wichtig anzusetzen.
- 35 sub D. Z. 1. lies enthaltenden Spiritus und destil-
- 36 Z. 4. l. Säuren [Essig- u. Phosphor-Säure ausgenommen];
- — - 19. streiche man und Iodmetalle
- 37 - 17, 18. l. (z. B. die meisten verwitternden)].
- 57 - 10 v. u. l. auf fast alle Applicationsorgane [nur etwa die Schleimhaut der Luftwege ausgenommen]
- 88 - 7. statt Drogen l. Ingredientien
- 133 - 13. hinter *Opium*, *Asafoetida*, *Myrrh* - *Dioscor.* fügen
- 138 - 3, 4 v. u. streiche man die Worte [vgl. S. 387]
- 139 - 10. l. 2.] oder dieser ähnlichen Compositionen vor-
- 153 - 13 v. u. nach bestimmt beizuschicken; oder wenn man den Auszug einer stark wirkenden Substanz [z. B. *Digitalis*, *Arnica*] lieber esslöffel- als theelöffel-weise will einnehmen lassen
- 160 - 15. statt Formen l. Extractionsarten
- 162 - 23. statt diese Form l. dieses Verfahren
- 176 - 5. l. eine natürliche, echte
- — - 6. l. *Emuls. naturalis s. genuina*
- — - 7. l. eine künstliche, unechte
- — - 8. l. *Emuls. artificialis s. regenerata s. spuria*.
- 177 - 8. l. allzufalls, nachdem man die Paste in Wasser gelassen hat, das
- 188 - 4 v. u. streiche man Muchat-,
- 196 - 14. l. sind fast immer
- 210 - 10. l. freilich und bei Kindern ist
- 224 - 6 bis 8. l. Das mildeste Mittel der Art, bei kleinen Kindern oft ausreichend, ist *Semen Lycopodii*, per-

- 225 §. 127. Z. 4. l. klebende [*Amylum, Gummi*]
- 249 §. 145. Z. 4. l. nende oder [wie starke Mineralsäuren] das Papier der Schachtel angreifende Bestandtheile
- 277 Z. 19. l. Von dünneren natürlichen
- 278 - 23. streiche man allen
- 288 - 14 v. u. l. dabei gewöhnlich auf
- 325 - 21. und S. 349 Z. 18. streiche man *facticias*
- 331 - 15-20. Diese Regel wird freilich nicht streng beobachtet.
- 358 - 10. l. anwendbar; zu Tropf- und Pinsel-Wässern oft *Aq. Opii*
- 374 - 2. statt FREIBERG's l. FREYBERG's
- 376 - 8. l. Charpiebäuschchens, oder auch, wo es angeht, als Bad zu
- 388 - 10. l. Kohlen oder ein rothglühendes Eisenblech
- 387 - 13 v. u. f. gas oder Chlorgas bedarf
- 400, 2te Spalte, Z. 9. l. ; — kalte,

B. Im zweiten Theil.

- S. 2, Note, Z. 5. statt PH. l. PH.
- 13 Z. 9. streiche man *crud.*
- 14 - 11. l. bisweilen zu Sinapismen.
- — - 18 v. u. statt des \dagger sollte ein kleines \dagger stehen
- 22 - 18 v. u. streiche man (Eine Ausnahme unt. *Ol. Succini* vst.)
- 25 R_y 31. statt MUST. l. (RUST.
- 26 Z. 8 v. u. l. Pinselsäften [Dr. $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$ auf 1 Unze Saft; z. B. Dr. 1 $\frac{1}{2}$
- 35 - 1. statt in l. innerlich in
- 36, zweite Spalte, Z. 13. hinter *Ungt* fehlt ein .
- 41 R_y 83. Aus der laufenden Zahl ist 3. und aus der 1ten Zeile die Gewichtsbestimmung: Dr. 1 weggefallen.
- 57 Z. 15. statt Glas l. Glas-
- 58 - 19. — Metallvergiftun- l. Vergiftun-
- 59 R_y 116. Z. 2. hinter Unc fehlt ein .
- 70 Z. 18. und S. 186 Z. 9. statt LÖWENHARD l. LÖWENHARDT
- 74 - 12. statt -1, l. -1 (u. mehr),
- 77 - 9. l. Schleimzucker; auch Gallertsäure.
- 92, 93. Zum Cave von *Calcaria sulphurata* und *Calcar. sulphurato-stibiata* ist noch das von *Kali sulphurat. pro Balneo* hinzuzufügen.
- 93 Z. 5 v. u. l. Sehr schwerauflöslich in
- 94 - 15. statt wässeriges l. flüssiges
- 96 - 20 v. u. l. V. SÖMMERING bei Lähmung der Harnblase; CHRESTIEN, BRERA

VI

Verbesserungen.

- 104 R. 216. Z. 1. l. R. † Carbon.
- 120 Z. 13. statt 117 l. 118
- 143 - 15. — 633 l. 663
- 184 - 26. — Aus- l. Ans-
- — - 5 v. u. l. Morphin, Codein, Mekonin,
- — - 3 v. u. l. Narcotin, Narcein und
- 216 - 9 v. u. streiche man abgekochtes
- 217. In dem Artikel † *Gas hydrothionicum* fehlt das *Cave*:
Metallgefäße; selbst Metallgeräthschaften im
Zimmer.
- 242 Z. 12. l. *Herba Sabinæ. summitates s. Frondes* u.s.w.
- 269 - 10 v. u. nach Geruch. schalte ein: Färbt die Haut vorübergehend braun,
was bei der äusserlichen Anwendung, namentlich bei Damen,
oft zu beachten.
- 299 ÷ 25, 26. statt *Tinct. Castor.* l. Z. 1, 2 v. u.
- 314 - 12, 13. statt (vgl. z. B. *Terebinth.*) l. (z. B. beim *Terpenthin*)
- 318 - 12, 2te Spalte, statt auf l. auf
- 340 R. 741, 2te Spalte, Z. 3. statt 1 St. l. 2 St.
- 392 Z. 2 v. u. statt im l. in
- 395 R. 846, letzte Zeile, streiche das Komma hinter 2stündl.
- 422 Z. 13. statt Stoff.) l. Stoff).
- 447 - 15 v. u. l. *agriae s. Pedicularis.* Stafadriansa-
men. Stephans- od. Läuse- Körner.
Rattenpfeffer.
- 524 Z. 1. statt p.p. l. p.p.

Specielle Arzneiverordnungslehre.

Einleitung.

Es enthält dieser Theil des Handbuchs die in Deutschland gebräuchlichen, einfachen und zusammengesetzten, Arzneimittel in alphabetischer Ordnung, und zwar nach der Nomenclatur der Ph. Bor., welche als die am allgemeinsten bekannte angenommen werden darf, da die Ph. Bor. in den Ländern deutscher Zunge bei weitem am meisten verbreitet ist, und selbst in den nordischen Reichen hie und da nach ihr verordnet wird.

Zu entscheiden, was gebräuchlich oder doch des Gebrauches werth sey, ist nicht Sache eines Einzelnen, und es hatte deshalb der Vfr. in der früheren Ausgabe sich rücksichtlich der Auswahl der aufzunehmenden Artikel an die 5te Ausgabe der Ph. Bor., welche damals noch sehr neu war, gehalten. Seitdem sind nun aber einige andere Pharmakopöen erschienen, deren Auswahl ebenfalls zu respectiren ist, und es musste deshalb in die gegenwärtige Ausgabe eine beträchtliche Zahl neuer Artikel aufgenommen werden — nicht ohne grosses Bedauern des Vfrs., da die neu hinzugekommenen Mittel öfter Belastungen als Bereicherungen des ohnehin bereits übergrossen Arzneischatzes zu seyn schienen. — Demnach enthält die gegenwärtige Ausgabe:

- 1) sämmtliche Arzneimittel der Ph. Bor., 5te Ausg., 1829.
- 2) sämmtliche Arzneimittel der Ph. VII. (1828). Diese Pharmakopöe ist freilich nur für eine geringere Zahl von Ärzten wichtig, aber es erforderte auch ihre durchgehende Berücksichtigung, da sie nur eine compendiöse, im Ganzen sehr lobenswerthe, Auswahl einfacher und zusammengesetzter Mittel (unter den letzteren manche besonders zweckmässige Composition)

enthält, auch nur hie und da von der PH. BOR. abweicht, — nur wenig Platz.

3) sämtliche Simplicia und Präparate und fast sämtliche Composita der HUFELANDSchen Armen-Pharmakopöe, die gewissermassen ein Seitenstück zur PH. BOR. ist, und deren Wichtigkeit für Viele 8 Auflagen (neueste 1834) beweisen.

4) sämtliche Simplicia, viele Präparate und die meisten Composita der PH. SLESV. (1831), der PH. HANN. nova (1833) und der PH. AUSTR., 4te Ausg. 1834*.

5) sämtliche mit grosser Schrift gedruckten, für die PH. BAD. bestimmten Simplicia der (bis jetzt allein erschienenen) ersten Abtheilung der vortrefflichen *Pharmacop. universalis* von GEIGER;

endlich einige wichtigeren Hausmittel, — die häufig versendeten Mineralwässer (in Einem Artikel, *Aquae miner.*) — und eine Anzahl anderer Mittel, die eine besondere Aufmerksamkeit zu verdienen scheinen, deren Empfehlung aber so neu ist, dass sie als noch nicht hinlänglich geprüft von den Verfassern der gedachten Pharmakopöen nicht aufgenommen wurden.

Von den Simplicien der aufgeführten 7 Pharmakopöen sind nur diejenigen weggelassen worden, welche nicht für sich als Arzneimittel, sondern bloss zur Darstellung anderer Mittel gebraucht werden; von den Präparaten und Compositen der *sub* 3) u. 4) aufgeführten Pharmakopöen diejenigen, welche durch mehr oder weniger entsprechende Präparate der PH. BOR. vollkommen ersetzt sind, so wie auch einige wenigen Compositissima und

*) Das Daseyn der in den Leipziger Messkatalogen nicht angekündigten, neuen PH. AUSTR. erfuhr ich erst nach fast vollendetem Druck des ersten Theils. Deshalb hier folgende Zusätze zu jenem Theil:

Zu S. 28 Z. 2 v. u. Die PH. AUSTR. hatauch noch *Conserva Hederae terrestris*.

Zu S. 131 *sub e*). Die PH. AUSTR. lässt das Zinn auch granulirt vorrätig halten. Das Granuliren (*granulare*) geschieht folgendermassen: das geschmolzene Metall wird in kleinen Portionen in eine aus 2 hohlen Halbkugeln bestehende hülzerne Büchse, die mit Kreide ausgerieben ist, gegossen und hierin so lange umgeschüttelt, bis es wieder erstarrt ist. Es nimmt hierbei die Gestalt kleiner unregelmässig-kugliger Körner an; man siebt von diesen die zu grossen ab und entfernt dann von dem granulirten Metall durch Waschen die Kreide, die sich angesetzt und das Suboxyd, das sich etwa während der Arbeit gebildet hat.

Zu S. 175 §. 88. a). Die PH. AUSTR. führt von Samen, die zu echten Emulsionen dienen, auch noch die — sehr entbehrlichen — Melonen- und Kürbis-Samen auf.

einige solchen Mittel, welche bei geringer Wichtigkeit oder gar völligen Entbehrlichkeit gar zu viel Platz absorbirt hätten.

Um aber dies Handbuch nicht gar zu voluminös und theuer zu machen, sind nur die Mittel der PH. BOR. ohne Ausnahme in der alphabetischen Ordnung aufgeführt worden, die übrigen Mittel dagegen nur zum Theil ebenfalls in dieser Ordnung aufgeführt — und zwar die chemischen Präparate alsdann immer unter derjenigen Benennung, welche der Nomenclatur der PH. BOR. entspricht [also z. B. Chlornatron als *Chlorum Natri*, obwohl diese Benennung nicht die passendste seyn möchte] —, zum Theil an passenden Stellen andern Artikeln beigefügt, namentlich Präparate und Composita sehr gewöhnlich den Simplicien, zu welchen sie gehören. Sehr viele Mittel werden mithin nur mit Hülfe des Registers leicht aufzufinden seyn. (Wann wird doch endlich eine deutsche National-Pharmakopöe die Quellen unzähliger Missverständnisse zwischen deutschen und deutschen Ärzten abschneiden?!)

Bei allen nur einigermaßen wichtigen Präparaten und Compositen ist sorgfältig ihre Stärke und Composition nach der Vorschrift der betreffenden Pharmakopöe angegeben; wo nicht ausdrücklich von einer andern Pharmakopöe die Rede, ist hierbei jedesmal die preussische gemeint. Hiernach sind die von mir aufgestellten Dosen zu beurtheilen und von ausländischen Ärzten, soweit es nöthig, abzuändern [was am passendsten mit rother Tinte am Rande, vor anderweitigem Gebrauche des Buchs, geschehen und nebenbei eine lehrreiche Vergleichung gewähren wird. — Es ist leichtsinnig, wenn manche Autoren für Präparate und Composita Dosen ohne bestimmte Angabe der Pharmakopöe aufstellen]. Preussische Ärzte erhalten übrigens in jenen Angaben eine bequeme alphabetisch geordnete kurze Charakteristik der für sie officinellen Präparate und Composita, und ersparen beim Gebrauche dieses Buchs das Daneben-Aufschlagen der Pharmakopöe. —

Der erste und wichtigste beim Verordnen von Arzneien zu beobachtende Punkt ist im Allgemeinen die Dosis, nächstdem die pharmaceutische Form. Es war meine Absicht, die Dosenlehre und die specielle Formlehre möglichst vollständig und von jeder Einseitigkeit, die das Gepräge irgend einer ärztlichen Schule trüge, entfernt zu geben. Ich war deshalb oft genöthigt, hieher gehörige Angaben einzelner Ärzte, die wichtig schienen, anzuführen. Nun fand aber von einfacheren Angaben der Art zu componirten Recepten und Kurmethoden ein so

unmerklicher Übergang statt, dass sich keine natürliche Grenze wollte ziehen lassen. Überdies bedurfte ich einer Anzahl Recepte als Beispiele für Anfänger, und so war ich denn genöthigt, meinem Buche auch eine Receptsammlung beizugeben. Auch hier aber mochte ich nicht gern auf halbem Wege stehen bleiben, und es schien mir zweckmässig, diese Sammlung gleich so vollständig einzurichten, dass sie dem unbemittelten jüngeren und dem vielbeschäftigten älteren Praktiker andere Sammlungen der Art entbehrlich machte. Ich nahm deshalb alle mir bekannten und wichtig scheinenden Heilvorschriften auf, die nicht so einfach und so wenig eigenthümlich sind, dass sie durch die Vorschriften über Dosen und Verabreichungsformen und durch die Lehren der *Materia medica* und Therapie überflüssig gemacht werden. Eine solche Auswahl, eine solche Beurtheilung dessen, was wichtig sey, muss nun freilich bei dem besten Willen des Autors immer mehr oder weniger ein individuelles Gepräge tragen, doch glaube ich eher den Vorwurf, dass ich zuviel aufgenommen, als den entgegengesetzten fürchten zu müssen, und es dürfte die hier gegebene Sammlung von Recepten und Heilmethoden wohl auch in Hinsicht des Umfangs und des Inhalts mit andern Sammlungen der Art rivalisiren können. (Ursprünglich für das eigene Bedürfniss des Vfrs. noch viel kürzer entworfen, hat sie sich, bei der Beförderung zum Druck in der früheren Ausgabe merklich erweitert, ¹⁰ ich einer grösseren Zahl von Ärzten brauchbar gezeigt, und ¹⁰ wird dies — mag man ihr auch an einzelnen Stellen Unvollständigkeit vorwerfen — hoffentlich noch ferner.) Auch Denjenigen, welche auf die Formeln einzelner namhaften Heilkünstler einen besondern Werth legen, glaube ich manches interessante Neue zu bieten, das ich aus ungedruckten, aber deshalb nicht minder zuverlässigen Quellen entnahm. — Durch strenge Auswahl — indem ich nichts aufnahm, was nicht auf irgend eine Weise, entweder für Anfänger oder für geübtere Praktiker lehrreich schien, [manche halb zweckmässigen Vorschriften nahm ich auf, um sie zu kritisiren und vor häufig begangenen Fehlern zu warnen; nie aber ganz und augenscheinlich unzweckmässige], indem ich selbst beliebte Formeln übergang, die durch sehr ähnliche officinelle entbehrlich gemacht werden, u. s. w. —, durch den ökonomischen Druck, und dadurch, dass ich eine grosse Anzahl einfacherer, leichter zu überblickenden Heilvorschriften nicht in

der gewöhnlichen Receptform abdrucken liess, sondern sie in den fortlaufenden Text verwebte, wo sie weniger Platz einnehmen, — durch Benutzung aller dieser Mittel wurde es möglich, Vieles auf anscheinend äusserst geringem Raum zu geben. — Formeln, die sehr viel Zeit, mehr als 24—48 Stunden, zur Bereitung erfordern, und die sich deshalb zu magistraler Verordnung nicht gut eignen — wie z. B. Tincturen u. dgl. — habe ich nur ausnahmsweise, wenn sie besonders wichtig schienen (wie z. B. der *Roob de LAFFECTEUR*), aufgenommen; eben so Formeln, in denen als wichtigere Ingredientien Simplicia vorkommen, welche keine der oben aufgeführten Pharmakopöen aufgenommen hat. — Zur Auffindung mancher bekannten Composition, die ich — aus irgend einem Grunde — unter einem andern ihrer Ingredientien aufführe als unter welchem man sie gewöhnlich sucht, oder unter welchem sie auch wohl ihr Autor selbst aufführt, wird theils das Register am Ende des Werks dienen, theils die häufigen Citate im fortlaufenden Text, in denen ich die Zahlen anderswo abgedruckter Recepte anführe oder auf den fortlaufenden Text anderer Artikel hinweise. — Formeln von anderen Autoren, in denen ich mir eine wesentlichere Änderung erlaubte als etwa eine kleine pharmaceutische od. dgl., für welche also nun — wenn ich mich dieses Ausdrucks bedienen darf — der eigentliche Urheber nicht mehr verantwortlich ist, die vielmehr nur als Nachahmungen gelten dürfen, — habe ich durch eine (vor dem Namen des Autors bezeichnet; so z. B. R_y 48. u. v. a.

Ich habe nicht ohne einiges Bedenken meinem Buche die Beispielsammlung beigegeben, denn ich musste befürchten, dass auch sie, wie andere Sammlungen der Art, durch sinnloses Abschreiben von Formeln werde gemissbraucht werden. Schwerlich werden die Indicationen, die ich, wo es irgend nöthig schien, sorgfältig den Formeln hinzufügte, dies verhindern können*. — Indess ein solches Abschreiben wäre nicht meine Schuld, und der Missbrauch darf vom Gebrauche nicht abhalten.

*) KRAUS (i. z. W.) glaubt solches Abschreiben dadurch verhüten zu können, dass Er in seinen Formeln die Ingredientien, wenigstens das Hauptmittel, „modulirt“, d. h. statt Einer bestimmten Quantität eine Quantitäten-Progression dazuschreibt. Aber was hindert einen faulen Abschreiber, nach Belieben das erste, mittelste oder letzte Glied einer solchen Progression herauszugreifen?

Sähe man bloss auf diejenigen Formeln, die ich, jede mit einer Zahl versehen, hinter dem fortlaufenden Text der einzelnen Artikel bei gespaltener Seite habe abdrucken lassen, so würde mich der Schein einer grossen Vorliebe für recht componirte Formeln treffen. Dieser Schein wird aber verschwinden, wenn der geneigte Leser darauf achtet, dass ich — wie schon oben bemerkt — eine sehr grosse Anzahl einfacherer Formeln in den laufenden Text verflochten und noch häufiger bloss die Elemente zu ihrer Bildung durch Angabe der nöthigen Zahlenverhältnisse und anderweitigen Rücksichten geliefert habe. —

Ich werde nun die typographische Einrichtung dieses Theils einigermassen erklären und daran noch einige andere Bemerkungen anreihen.

Die Ueberschriften der Seiten enthalten auf jeder geraden Seite den ersten, auf jeder ungeraden den letzten Artikel, so dass zwischen diesen beiden Artikeln alles auf den aufgeschlagenen beiden Seiten Enthaltene eingeschlossen ist. Auf denjenigen Seiten, wo kein Recept vorkommt, weist eine ¶ oder eine ¶ nach dem nächstvorhergehenden oder dem nächstfolgenden hin.

Das, was ich bei den einzelnen Artikeln anzugeben habe, ist in der Regel, wenigstens bei den vollständigeren und wichtigeren Artikeln [vgl. z. B. *Acidum muriaticum*, *Aether sulphuricus*], in vier [selten mehr] durch den Druck gesonderte Absätze geordnet, von denen der erste die Synonymik und einzelne Bemerkungen über naturhistorische, chemisch-physikalische oder pharmaceutische Eigenschaften des Mittels, so weit sie für die Arzneiverordnungslehre wichtig sind, der zweite die Regeln für die innerliche, der dritte die für die äusserliche Anwendung, der vierte — bei gespaltener Seite — Recepte enthält.

Der mit grösserer Schrift gedruckte Anfang eines Artikels ist jedesmal die Hauptbenennung des Mittels in der Ph. Bor., — diejenigen Mittel, versteht sich, ausgenommen, welche ich zu den Arzneimitteln der Ph. Bor. noch hinzugefügt und die ich, um sie kenntlich zu machen, überall, wo sie in diesem Theil erwähnt werden (also auch mitten in den Artikeln), mit einem † bezeichnet habe. Ausser den Hauptbenennungen der Ph. Bor. habe ich auch die von derselben angeführten Synonyme (unter denen sehr häufig Eines, und zwar meist das zuletzt angeführte, die chemische Bedeutung des Mittels in der

Barzeliusschen Nomenclatur angiebt) und — so weit es zur Verständigung für ausländische Ärzte oder zum Verstehen älterer medicinischen Schriften nöthig schien — auch noch andere Benennungen, namentlich die meisten der oben erwähnten Pharmakopöen, aufgenommen. Um jene von der Ph. Bor. aufgeführten Synonyme von andern noch aufgeführten lateinischen Benennungen zu unterscheiden, sind jene mit gesperrten Lettern gesetzt. [So sieht man also z. B. unter *Acidum muriaticum*, S. 21, dass die Benennungen *Spiritus Salis acidus* und *Acidum hydrochloricum* von der Ph. Bor. aufgeführt werden, die andern lateinischen Benennungen dagegen nicht.] Bei den deutschen Benennungen schien es nicht der Mühe werth, darauf aufmerksam zu machen, ob die Ph. Bor. sie auführt oder nicht; diese sind deshalb alle gesperrt. — Es dürfen demnach ausser den Hauptbenennungen der Artikel nur noch die gesperrt gesetzten lateinischen Benennungen von preussischen Ärzten füglich in Recepten gebraucht werden. Die [mit grösserer Schrift gedruckten] Hauptbenennungen ausgenommen finden sich alle deutschen und lateinischen Benennungen in dem alphabetisch geordneten Register am Ende des Werks, an welches sich also namentlich ausländische Ärzte, denen die Benennungen der Ph. Bor. nicht genau bekannt wären, würden zu halten haben. — Die im 2ten Theil der Ph. Bor. enthaltenen Mittel („*Medicamenta, quae in officinis praesto esse non debent*“), die die preussischen Apotheker nicht verpflichtet sind, vorrätbig zu halten, sind mit einem * bezeichnet, mit Ausnahme derjenigen Präparate und Composita, welche aus immer vorrätbig gehaltenen Medicamenten ohne viele Umstände und in einer im Verhältniss zu ihrer Wichtigkeit kurzen Zeit bereitet werden können; diese, die also preussische Ärzte überall unbedenklich magistral verordnen können, sind mit ** bezeichnet (so dass also der 2te Stern gewissermassen die Bedeutung des ersten aufhebt).

Nach den Benennungen des Mittels folgen, wo es nöthig ist, Bemerkungen über naturhistorische, chemisch-physikalische oder pharmaceutische Eigenschaften desselben, die beim Verordnen in Betracht kommen; insbesondere über Auflöslichkeit in verschiedenen Menstruis, über zu vermeidende Verbindungen mit andern Arzneistoffen, und die Angabe des Preises. — Alle Mittel, welche nach der Vorschrift der Pharmakopöe gepulvert vorrätbig gehalten werden müssen, sind als solche bezeichnet (vgl. I. S. 131); nicht aber ist dies bei denjenigen ge-

schehn, welche die Apotheker nur zu ihrer Bequemlichkeit gepulvert vorrätig zu haben pflegen (wie die meisten vegetabilischen Stoffe). — Die Auflöslichkeit habe ich meist mit dem Worte *Sol.* (Solubilität) angeführt, hinter dem eine Zahl folgt, welche anzeigt, wie viele Theile von einem gewissen Menstruum das Mittel erfordert; folgt hinter einem solchen *Sol.* eine Zahl ohne weiteren Zusatz, so ist die Auflöslichkeit in Wasser gemeint. Die Angaben der Auflöslichkeit gelten immer für eine mittlere, doch mehr niedrige als hohe, Temperatur (ungefähr 12° R.) des Menstruum — falls nicht ausdrücklich durch einen Zusatz eine höhere Temperatur angegeben ist —, und sind meistens Bequemlichkeits halber in ziemlich runden Zahlen, und wo sich keine ganz bestimmte Zahl angeben liess, eher etwas zu hoch als zu niedrig gegeben worden. Die Auflöslichkeit eines Salzes od. dergl. in heissem Wasser habe ich oft angegeben, weil sie für Pillenbildung in Betracht kommt (I. §. 150). — Die Preise der Mittel sind hauptsächlich nach der neuesten „Königl. Preussischen Arznei-*Taxe*“ (1833; mit Veränderungen von 1834 u. 1835) angesetzt [in Silber Groschen (Sgr.); 1 Preuss. Thaler = 30 Sgr.]; so auch bei einigen in der Ph. Bor. nicht officinellen Mitteln [da die Preuss. Arznei-*Taxe* eine grössere Zahl von Mitteln auführt als die Preuss. Pharmakopöe]; ausserdem, wo jene *Taxe* keine Angaben enthält, nach der der HUFELANDSchen Ph. P. [ebenfalls in Sgr.], der [meines Wissens neuesten] „*Taxe* der Apothekerwaaren für die Herzogthümer Schleswig u. Holstein. Kiel 1832“ [in Schillingen, Shl., von denen man, in runder Durchschnittszahl, 40 auf 1 Preuss. Thaler rechnen kann], und der „Neuen Arznei-*Taxe* für d. Königr. Hannover, vom 1. Oct. 1835“ [in Mariengroschen (Mgr.); 1 Hannoverscher (oder Preuss.) Thaler = 36 Mgr., also 1 Mgr. = $\frac{2}{3}$ Groschen (oder 8 Pfennigen) Courant = $\frac{1}{3}$ Sgr.]. Die Arzneipreise sind freilich dem Wechsel sehr unterworfen, doch werden die Angaben immer wenigstens einen ungefähren Maassstab für die nächsten Jahre gewähren. [Es ist nicht meine Schuld, wenn bei einigen Mitteln, bei denen jene 4 *Taxen* schweigen, die Preisangabe fehlt.]

In dem zweiten, die innerliche Anwendung enthaltenden Abschnitt jedes (vollständigeren) Artikels folgt nun zuerst die Angabe der Dose. Wo bei vegetabilischen Mitteln eine Dose ohne weiteren Zusatz angegeben ist, ist immer die Dose für die Darreichung in Substanz, in Pulver und pulveraufnehmenden Formen, gemeint, wenn auch diese Darreichungsart bei dem

vorliegenden Mittel nicht die gebräuchlichere seyn sollte. Ich kann nicht umhin, es bei dieser Gelegenheit zu rügen, dass viele Schriftsteller die Dosen für die Substanz mancher vegetabilischen Mittel und für ihre ätherischen Öle zu hoch [so dass sie bei der Substanz zu voluminös, bei den äther. Ölen die Deglutitionsorgane beleidigend, in beiden Fällen auch wohl zu stark allgemein wirkend, wird], für Aufgüsse, Abkochungen und Tincturen dagegen zu niedrig angeben, während sie doch oft selber die Verhältnisse für die quantitative Wirkung dieser verschiedenen Formen weit passender und richtiger [etwa in der Art, wie I. S. 82] aufstellen. Glücklicherweise fällt es nicht leicht einem Arzt ein, sich am Krankenbett nach jenen excessiven Angaben zu richten, und z. B. 2 Drachmen eines voluminösen Pflanzenpulvers oder 6 Tropfen von einem der schärferen ätherischen Öle *pro dosi* darzureichen. Eher kommt der entgegengesetzte Fall in der Praxis vor, dass die flüssigen Auszüge zu schwach verordnet werden. — Ich glaube, dass man namentlich auch bei den Tincturen meine Dosen bei genauerer Betrachtung nicht zu hoch finden und nicht übersehen wird, dass ich auf die Stärke der verschiedenen Weingeiststufen, mit denen sie bereitet werden, die nöthige Rücksicht genommen habe. Nur wird die Beachtung der überall geltenden Regel, dass man, wenn man mehrere wirksame Mittel verbindet, die Dose jedes einzelnen verkleinern müsse, hier besonders wichtig seyn, denn sonst könnte doch einmal zu viel Weingeist in einer Partialdosis zusammenkommen. — Die Ph. Bor. giebt bei vielen heroischen Arzneimitteln die höchste Dose an, über welche der Arzt beim Verordnen nicht hinausgehn darf, wenn er nicht durch ein beigefügtes Zeichen, etwa ein !, dem Apotheker anzeigt, dass es so sein wohl überlegter Wille sey. Eben so bezeichnet die Ph. Bor. eine Anzahl Mittel, welche der Arzt überhaupt nicht oder nicht ohne gewisse Beimischungen (z. B. die stärkeren Mineralsäuren nicht ohne Wasser) zum innerlichen Gebrauch verordnen dürfe, ohne ein solches Zeichen beizufügen. Es soll durch diese Einrichtungen der Arzt keineswegs in der Anwendung der Mittel beschränkt, sondern nur Unglück, das durch Flüchtigkeitsfehler entstehen könnte, verhütet werden. Preussische Ärzte müssen jetzt diese Bestimmungen speciell kennen, um nicht einmal in einem dringenden Falle Aufenthalt zu veranlassen, indem sie den Apotheker nöthigten, erst noch einmal anzufragen. Ich habe deshalb jene höchsten Dosen der

Pharmakopöe mit einem *ad* und einem *!*, die letzteren Mittel aber (so weit es nöthig schien, soweit es sich nicht von selbst verstand, dass man sie innerlich nicht anwenden dürfe) durch ein \neq bezeichnet (vgl. z. B. *Acidum muriaticum*, wo diese beiden Zeichen neben einander vorkommen). — Die zum innerlichen Gebrauch bestimmten Arznei-Formen und Formvarietäten habe ich in der Regel so geordnet, dass ich von den trocknen durch die festweichen zu den flüssigen übergehe; die zum äußerlichen Gebrauch bestimmten gewöhnlich nach den Applicationsorganen, in der Ordnung wie I. §. 30., doch machten hier auch oft mancherlei Rücksichten eine andere Anordnung nöthig. — Species habe ich in der Regel nicht als eine eigne, selbstständige Form aufgeführt, weil sie in den meisten Fällen nur zur Bereitung flüssiger Auszüge im Hause des Kranken dienen. —

Um häufige Wiederholungen zu vermeiden, habe ich bei gewissen Gruppen von Arzneimitteln allgemeine Bemerkungen über das bei der Darreichung zu Beobachtende zusammengestellt. Solche Gruppen sind: *Aceta*, *Acida*, *Aetheres*, *Aquae destillatae Vegetabilium*, *Balsama naturalia*, *Elaeosacchara*, (*Elixiria*), *Emplustra*, *Extracta*, *Gummiresinae*, *Herbae*, (*Linimenta*), *Olea ætherea, cocta, (empyreumatica)* und *pinguia*, *Oxymella*, *Resinae*, *Sapones*, *Sera Lactis*, *Spiritus*, *Spiritus ætherei*, *Syrupi*, *Tincturae*, *Unguenta*. Ich bitte, vor jedem anderweitigen Gebrauch des Buchs zuerst diese Artikel durchzugehen, weil sonst viele anderen Artikel unvollständig scheinen könnten. — Es bilden die unter diesen Artikeln zusammengestellten Bemerkungen gewissermassen einen allgemeineren Theil der speciellen Arzneiverordnungslehre, ohne deshalb der allgemeinen A. V. L. anzugehören*. Denn wenn auch die letztere z. B. von Pflastern, Ceraten, Salben u. s. w. handelt, so geschieht dies doch aus einem anderen Gesichtspunct: sie lehrt, wie diese Formen darzustellen seyen: hier dagegen wird nur von den einzelnen, fertigen, bereits in den Apotheken vorrätth-

*) Sie vertreten in diesem Handbuche die Stelle der allgemeinen Übersichten, welche CHOULANT (i. a. W.) in seinem Abschnitt „Verschreibungslehre“ giebt. CHOULANT hat zwar dort noch mehr Artikel (34); aber man wird sich leicht überzeugen, dass nur diejenigen, welche dem CH.schen Werke und dem meinigen gemein sind, wirklich recht brauchbare und zugleich allgemeine Übersichten geben (manche der CH.schen Artikel sind ganz speciell).

gen Präparaten dieser Art gelehrt, was man bei ihrer Anwendung zu beobachten habe. —

Von den beiden Anhängen am Schlusse dieses Theils wird der erste, über Hülfsleistung bei Vergiftungen [aus der früheren Ausgabe mit Verbesserungen abgedruckt] manchen Ärzten als eine zum raschen Nachschlagen in dringenden Fällen brauchbare kurze Zusammenstellung nicht unerwünscht seyn, namentlich solchen, denen es schwer fällt, die eigentlichen, chemisch wirkenden Gegengifte im Gedächtniss zu behalten; auch konnte ich durch ihn hie und da Wiederholungen im Haupttext vermeiden. — Auf die oft nöthige längere Nachbehandlung nach Vergiftungen konnte ich mich in der Regel nicht einlassen, und die chronischen Vergiftungen habe ich ganz ausgeschlossen: für diese Fälle kann sich, wer dessen bedarf, eher schon aus andern Büchern Rathsholungen. — Ich muss übrigens diejenigen meiner Leser, die vorkommenden Falls von diesem Anhang Gebrauch machen möchten, bitten, sich doch schon im Voraus mit demselben einigermaßen bekannt zu machen, damit sie, wenn es Noth thut, sich rasch in ihm zurecht finden können, wozu der Artikel: Vergiftungen im Register allein nicht ausreichen dürfte. — Der zweite Anhang: „Getränke“ [in der gegenwärtigen Ausgabe hinzugekommen] bedarf keiner Vorbemerkung.

Zum Schlusse dieser Einleitung bitte ich, die Vorbemerkungen zum Register nicht zu übersehen.

Die einzelnen Arzneimittel in alphabetischer Ordnung.

ACETA. Essige. [*Acet. plumbicum* hier ausgeschlossen.] Sie lassen sich ohne Zersetzung mit Mineralsäuren verbinden; sie lösen — in verschiedenen Verhältnissen — Gummi, Pflanzenschleim, Gerbestoff, Zucker und, besonders die stärkeren, Campher, ätherische Öle, mehrere Harze etc. vollständig auf; Schleimharze nur unvollkommen, doch in weit stärkerem Maasse als es das Wasser thut. Auch fällt die in ihnen enthaltene Essigsäure die Auflösung des Eiweissstoffes nicht. Mit Basen und basischen Salzen (auch mit allen andern Stoffen, bei denen wir „*Cave Säuren* oder saure Säfte“ angegeben haben) darf man sie natürlich nicht verbinden, falls man nicht die dadurch erfolgende chemische Zersetzung bezweckt, wie dies bei Brausemischungen und Saturationen der Fall ist. Bei den Saturationen sind die, später unter den entsprechenden essigsauren Salzen aufzuführenden Cautelen zu beachten.

Acetum. *Acetum crudum.* *Ac. vini.* Essig. Weinessig. [Soll so stark seyn, dass 2 Unzen 1 Drachme kohlensaures Kali sättigen. Im gemeinen Leben variirt die Stärke. — 1 Unze $\frac{1}{3}$ Sgr.]

Innerlich in Saturationen [in der Regel nur ein Paar Unzen auf eine Mixtur von 6 Unzen, die esslöffelweise verbraucht werden soll, wonach man sich mit der Quantität des alkalischen Salzes zu richten hat, vgl. I. S. 138], selten in Mixturen [meist nur kleinere Gaben als Zusatz, Unc. 1-2 auf Unc. 6. — R_x 152 (*Bals. Peruv.*), 187, 188 (*Camph.*), 272 (*Cort. Angust.*)]; häufig im Getränk [in fieberhaften Krankheiten Unc. 2-4 auf 1 Quart, etwa mit Zucker oder Honig (vgl. *Oxymel simpl.*); bei passiven Blutflüssen, Vergiftungen (durch *Narcotica* od. Alkalien), Trunkenheit, Erstickungszufällen weit stärker, etwa nur mit der gleichen Menge Wassers verdünnt, oder selbst pur, esslöffelweise. Mischungen von Essig und Wasser (zum Getränk) heissen *Oxyratum*, *Oxykrat*]. Essigmolken s. I. S. 317 u. † *Ser. Lact. c. Aceto Vini*.

Ausserlich zu Mund- u. Gurgelwässern [Unc. $\frac{1}{2}$ -2 auf Unc. 6; doch zieht man hier meist *Oxymel simpl.* vor], Klystieren [Unc.

1-4, mit etwas Wasser verdünnt, oder pur, oder mit anderen wirksamen Dingen, z. B. einem Kamillenaufguss oder Gummiharzen (vgl. z. B. *Asa foet. dep.*) oder einigen Granen Campher (s. *Camph.*) oder Salzen, Ölen (vgl. z. B. *Ol. Lini*), p. p. verbunden; lau oder (häufiger) kalt. — Ry 429 (*Fol. Nicot.*) u. anderen Injectionen [bei Blutflüssen gewöhnlich verdünnt und kalt. — Ry 884 (*Rad. Betula*.)], Waschungen u. Umschlägen [verdünnt oder pur, lau oder kalt; bisweilen mit Kochsalz, Weingeist (z. B. mit $\frac{1}{2}$ *Spir. F. rft.*: *Liq. discutiens* PH. MIL., statt des THEDENschen Schusswassers), *Spir. camphorat.*, p. p. verbunden. — SCHMUCKER's Umschläge s. unt. *Kali nitr. crud.* — Ry 95 (*Ammon. muriat. crud.*), 207 (*Camph.*)]; ferner in Dampfform [Einathmen der Dämpfe von warmem Essig; oder als Räucherungsmittel, indem man den Fussboden mit erwärmtem Essig besprengt oder ein in kochenden Essig getauchtes Stück Flanell im Zimmer aufhängt oder (noch kräftiger) den Essig in einer flachen irdenen oder Blech-Schale über einer Spirituslampe in schwachem Sieden erhält; nicht zweckmässig, indem man ihn an den heissen Ofen oder auf heisse Steine, ein glühendes Blech, spritzt (denn wenn er so tropfenweise mit sehr heissen Körpern in Berührung kommt, wird er zersetzt) oder ihn über Kohlen verdampfen lässt (des Kohlendunstes wegen). — Auch wohl zu örtlichen Dampfbädern].

Acetum aromaticum. Acetum bezoardicum, prophylacticum, pestilential s. antisepticum. Gewürzessig; Bezoarod. Pest-Essig u. s. w. *Vinaigre des quatre voleurs.* [Rosmarin, Salbei, Pfeffermünze, Würznelken, *Rad. Zedoar.* u. *Angelic.*, zusammen $7\frac{1}{2}$, mit abgekochtem Essig zur Colatur von 72 macerirt. — 1 Unze $1\frac{1}{3}$ Sgr. Eine wohlfeilere Composition ist *Acetum aromatic.* PH. P.: 1 Unze $\frac{5}{8}$ Sgr.]

Innerlich zu Dr. 2-4 ($\frac{1}{2}$ -1 Essl.) öfters tägl.; pur od. in Saturationen [s. I. S. 138 Note a). — Ry 1.] oder (meist nur kleinere Gaben) in Mixturen [Unc. 1-2 auf Unc. 6].

Ausserl. wie *Acetum* [zum Räuchern wendet man jedoch wohlfeiler gewöhnlichen Essig an, in welchen man Würznelken wirft und ihn so in einer Schale über einer Lampe verdampfen lässt].

1.

Ry *Kali carbon. e Tart.* Dr. 2
Aceti aromat. q. s. ad saturat.

Aq. Cinnam. simpl. Unc. 1
Vini Gallici albi Unc. 4.

M. D. S. Stündl. 1-2 Essl. HECKER.

* *Acetum Colchici.* Zeitlosenessig. [Aus der Wurzel

durch 3tägige Maceration mit *Acet. destill.*, 1 auf 9 Colatur. — 1 Unze $1\frac{2}{3}$ Sgr.]

Innerl. zu Dr. $\frac{1}{2}$ -2, einigemal tägl., in Mixturen, auch wohl Saturationen [s. I. S. 137 u. 138 Note b). — Ry 2].

2.

Ry *Magnes. sulphur. depur.* Unc. 1-2
solve in

Aq. Menth. crisp. Unc. 10
adde

Aceti Colch. Unc. 1- $1\frac{1}{2}$

Syr. Croci Unc. 1

Magnes. ustae Scr. 8.

M. D. — Einigemal tägl., umgeschüttelt,
3 Esslöffel — so, dass 4-6 Stuhlgänge

in 24 St. erfolgen. (Bei Gichtparoxysmen. — Es bildet sich in der Mixtur [auflösliche] essigsaure Magnesia, doch bleibt nach der grösste Theil der Magnes. kaustisch, deshalb muss umgeschüttelt werden.) SCUDAMORE.

Acetum concentratum. Concentrirter Essig. [Spec. Gewicht = 1,035 — 1,045. — 1 Unze $6\frac{2}{3}$ Sgr.]

Innerl. zu Scr. $\frac{1}{2}$ - Dr. $\frac{1}{2}$ (40-30 Tropfen) öfters tägl.; pur od. in Mixturen [Dr. 2-6 auf Unc. 6, mit einem säuerlichen Syrrup. — Ry 3], zum Getränk [ohne Noth und ohne Vortheil theuer; guter Essig od. Himbeereessig thut, in verhältnissmässig grösserer Menge, dasselbe].

Ausserl. als Riechmittel [zu dem Ende auch in Stirn, Schläfe, u. s. w. einzureiben], bisweilen zur Schärfung von Sinapismen [Ry 973 (Sem. Sinap.)]. — Sonst als Rubefaciens das stärkere *Acid. acetic.*]

3.

Ry *Aetheris acetic* Dr. $\frac{1}{2}$
Aceti concentrati Dr. 2-3
Aq. Rubi Id. Unc. 5

Syr. Rubi Id. Unc. 2.

M. D. S. Alle 2-4 St. 1 Essl. (Bei erethistischen Nervenfiebern.)

SUNDEEIAN.

Acetum destillatum. *Acidum aceticum dilutum.* Destillirter Essig. [*Acetum* über Kohlen destillirt, und dadurch merklich schwächer geworden, s. I. S. 138. — 1 Unze $\frac{1}{2}$ Sgr.] Kommt selten in der Rezeptur vor [weil es nicht so erquickend schmeckt und riecht wie *Acetum*]. Will man es anwenden, so hat man es wie *Acetum* zu behandeln, nur die Gabe $1\frac{1}{2}$ mal so gross anzusetzen.

† **Acetum Digitalis** (PH. SLESV. Anhg.). *Tinctura Digitalis acetica.* Fingerhutessig. [1 mit *Acet.* 8 macerirt. — 1 Unze 2 Shl.] Innerl. zu Scr. 1-2, einigemal tägl., in Mixturen, namentlich auch wohl Saturationen. — Ausserl. gleich anderen Auszügen des Fingerhuts.

Acetum plumbicum s. saturninum s. Lithargyri. *Liquor Plumbi acetic* *basici s. Subacetatis plumbici. Loco Extracti (Balsami) Saturni.* Bleiessig. (Blei-Extract od. Balsam.) Auflösung von basischem essigsauren Bleioxyd. [Spec. Gewicht = 1,23 — 1,24. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave* wie bei *Plumb. acet. depur.*; ausserdem besonders [mit sanctionirten Ausnahmen] Sublimatlösung, *Gm. Mimps.*, Ammoniak im Überschuss. [*Aq. comm.* trübt ihn durch partielle Zersetzung, färbt ihn milchweiss, was jedoch in der Regel der Wirkung keinen Eintrag thut. Durch *Aq. destill.*, giebt man gewöhnlich an, soll er nicht getrübt werden; dass es aber doch in der Regel (durch vom Wasser absorbirte Kohlensäure) auch geschieht, erkennt die PH. BOR. (unter *Aq. plumbica*) an. Man muss also alle wässerigen Verdünnungen des *Acet. plumb.* umschütteln lassen.]

Nicht leicht innerl. [\neq . — Bei Hydrophobie 4 stündl. 40 Tropfen auf Zucker: FAYERMAN.]

Ausserl. zu Mund- u. Gurgelwässern [man warne vor dem Verschlucken. — z. B. 1 auf 32 Wasser: SOMMÉ gegen länger bestehende Mercurialsalivation. (Passend noch etwas *Syr. simpl.* dazu.)], zum Pinseln [z. B. bei Mercurialgeschwüren an Mandeln und Gaumensegel unvermischt: SOMMÉ], zu Klystieren [selten. — Scr. 1 - Dr. 1 („schon sehr stark!“) mit etwas *Spir. camphor.* und Thee: ADAIR bei Ruhren und kachektischen Durchfällen] u. a. Einspritzungen [nach der Verschiedenheit der Höhlen etc. ein Paar Tropfen bis Dr. $\frac{1}{2}$ auf jede Unze Wasser. Ry 4, 5; 387, 389 (*Extr. Opü*)], Augengewässern [Zu Augen - Waschungen u. Bähungen Scr. $\frac{1}{2}$ - Dr. 1 auf Unc. 4. — Zu Augentropfwässern Gtt. 3-6 auf Unc. $\frac{1}{2}$. — Ry 6; 318, 320 (*Cupr. alumin.*). — *Aq. ophthalm. saturn.* PH. P.: 8 Tropfen mit Quittenschleim (sehr unchemisch!) Dr. 2 auf Rosenwasser Unc. 4.], Augensalben [Gtt. 4-8 auf Dr. 2 Fett. — Ry 123 (*Argent. nitr. cryst.*), 500 (*Hydr. ammon. muriat.*), 553 (*Hydr. oxyd. rubr.*)] u. anderen Salben [z. B. Dr. $\frac{1}{2}$ mit *Ungt. Linar.* Unc. $\frac{1}{2}$: auf entzündete Hämorrhoidalknoten. — Ry 7, 8. Officinell *Ungt. plumbic.* (1 auf 12). — *Balsam. universale* PH. SLESV. (eine zum Missbrauch verleitende Benennung!) enthält Bleiessig 1, Campher $\frac{1}{2}$, Wachs 2, Rüböl $\frac{1}{2}$ (1 Unze 3 Shl.)], Linimenten [Dr. $\frac{1}{2}$ - 1, mit irgend einem Bindemittel, auf Unc. 1 Öl. — Ry 9], Waschungen u. Umschlägen [kalt oder warm — oft in den officinellen Verdünnungen, *Aq. plumbica* u. *Aq. vegeto-mineral. Goulardi.* — Ry 10-12. Unverdünnt gegen Condylome (besonders die *acuminata*).]; bisweilen als Zusatz zu Breiumschlägen [verdünnt].

4.

Ry *Extr. Opü* Gr. 1 $\frac{1}{2}$
solvo in

Aq. destill. Unc. 2

adde

Mucil. Gm. Mimos. Dr. 2

Aceti plumbici Gtt. 4.

M. D. S. Umgeschüttelt 2 mal tägl. einzuspritzen. (Die, mehr berichtigten als berühmten, GIRTANNERSchen Injectionen gegen *Gonorrhöa secundar.*, modificirt von WENDT.

Die Vorschrift ist schon insofern nicht zweckmässig, als Bleiessig und Gummischleim einen Niederschlag geben, der, wenn Bleizucker gewählt worden, vermieden wäre.

5.

Ry *Aceti plumbici* Dr. 1

Aq. destill. L. 1

Spir. camphorati Unc. 1.

M. D. S. Umgeschüttelt einzuspritzen. (Gegen *Fluor albus.* — Vgl. Ry 389, welches schwächer.) RICHTER.

6.

Ry *Aq. Sambuci* Unc. $\frac{1}{2}$

Aceti plumbici Gtt. 5

Tinct. Opü simpl. Gtt. 10.

M. D. S. Augentropfwasser, umgeschüttelt. (Beichsonischen Augenentzündungen.) RUST.

7.

Ry *Cort. Quercus gross. pulv.* Unc. 1
coque cum

Aq. comm. Unc. 8

ad Colat. Unc. 4; admisce

Acetum plumbicum,

quamdiu praeicipitatum inde oritur. Li-
quor filtratur per chartam bibulam. Prae-

capitatum in charta remanens ad consistent. Unguenti tenuioris exsicca. D.
— 2-3 mal tägl., ziemlich dick auf feine Leinwand gestrichen, auf die wunde Stelle und deren Umfang zu legen. (Bei Decubitus.) AUTENRIETH.

8.

Ry *Decocti Cort. Quercus* (Unc. 1) Unc. 6
Aceti plumbici Unc. $1\frac{1}{2}$

Misce, seponere per breve tempus. Praecipitatum inde ortum, filtro collectum, adhuc humidum misce c.

Adip. suilli Unc. 1
adde

Camphorae trit. Scr. $\frac{1}{2}$.
M. f. Ungt. D. (Bei brandig werden-dem Decubitus.) SUNDELIN.

9.

Ry *Ol. Lini rec. par.* Unc. 8

Albuq. Ovorum 6

Aceti plumbici Unc. 1.

M. f. Linim. D. S. Umgerührt und auf Leinwand gestrichen öfters frisch aufzulegen. (Bei Verbrennungen.)

SCHWARTZ.

Das Eiweiss wird durch den Bleiessig coagulirt; dies liegt aber wohl in der Absicht des Autors.

10.

Ry *Aceti plumbici* Dr. 1

Spir. camphorati Dr. 2

Infusi Flor. Samb. Unc. 8.

M. D. S. Umgeschüttelt mit Läppchen umzuschlagen (um die Vorhaut, bei lymphatischer oder zum Brande neigender Phimose). RATIER.

11.

Ry *Kali nitr. dep.* Unc. $\frac{1}{2}$

solve in

Aq. destill. L. $1\frac{1}{2}$

adde

Aceti plumbici

Ol. Terebinth. rft. ana Unc. $\frac{1}{2}$.

M. D. S. 3-4 mal tägl., umgeschüttelt u. stubenwarm, die schmerzhaften Gelenke damit zu waschen. (Bei der eigentlichen, besonders erst beginnenden Arthritis.) FEHR.

Bei Armen nehme man rohen Salpeter, *Aq. comm.* und gewöhnliches Terpen-thinöl.

12.

Ry *Aceti plumbici* Unc. 1

Infusi Flor. Chamom. vulg. L. 2

Tinct. Opii simpl. Dr. 3.

M. D. S. Lauwarm u. umgeschüttelt zum Bähén. (Bei nicht allzu activen äusseren Entzündungen.) RUST.

★★ *Acetum Rosarum.* Rosenessig. [Mit heissem Essig

bereitet, daher ein wenig stärker als das gewöhnliche *Acetum*. — 1 Unze $1\frac{1}{3}$ Sgr.]

Meist nur äusserlich, zu Mund- u. Gurgelwässern, Injectionen, Waschungen, Umschlägen — für Wohlhabende.

Acetum Rubi Idaei. Himbeeressig. [1 Unze $\frac{5}{8}$ Sgr.]

Fast nur zum Getränk [in fieberhaften Krankheiten — bei Wohlhabenden; Unc. 4-8 auf 1 Quart Zuckerwasser; doch auch zu diesem Behuf seltener aus der Apotheke als vom Conditor entnommen].

★★ *Acetum Rutae.* Rautenessig. [Bereitung u. Stärke wie bei *Acet. Rosar.* — 1 Unze $\frac{5}{8}$ Sgr.]

Innerl. zu Dr. 2-4 ($\frac{1}{2}$ -1 Essl.) öfters tägl.; pur oder in Mixturen [Ry 13].

Aüsserl. bisweilen statt gewöhnlichen Essigs zu Waschungen, Bähungen, Mund- u. Gurgelwässern [Unc. 1-2 auf Unc. 6], als schwaches Riechmittel, oder zum Sprengen in Krankenzimmern [vgl. *Acetum*].

13.

R_x *Camphor. tritae* Dr. $\frac{1}{2}$
Mucilag. Gm. Mim.
Sacch. albi ana Unc. $\frac{1}{2}$.

Terendo sensim adm.

Aceti Rutae Unc. 8.

D. S. Stündl. 1 Essl. (In typhösen Fiebern. — Vgl. R_x 187.)

VEIGTEL.

Acetum scilliticum, s. *Scillae*. Meerzwiebeleessig.

[Durch Maceration mit *Acet. destillat.* (nach der PH. MIL. mit *Acetum*), 1 auf 9 Colatur. — 1 Unze $1\frac{3}{4}$ Sgr.]

Innerl zu Dr. $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ einigemal tägl.; in Mixturen [bisweilen zur (unvollkommenen) Auflösung von Gummiharzen], namentlich auch Saturationen [s. I. S. 137 u. 138 Note b]. — R_x 14].

Aüsserl. zu Gurgelwässern [nur etwa Dr. 2-4 auf Unc. 6], Klystieren [Unc. $\frac{1}{2}$], Fomentationen [meist warm, z. B. beim äusseren Wasserkopf]; zur Bereitung von schärferen Senfteigen [viel theurer als gewöhnlicher Essig, ohne grossen Vorzug], auch wohl von Gummiharz-Pflastern.

14.

R_x *Aceti scillit.* Unc. 1
Liq. Ammon. carbon. pyro-oleosi
 (oder *Kali carbon. e Tart.*) q.s.
ad Saturat., cui adde

Aq. Petrosel. Unc. 5*Elaeosacch. Junip.* (Gtt. 6) Unc. 1.

Solve, adde

Spir. nitrico-aether. Dr. 1.

M. D. S. 2 stündl. 1 Essl.

ACIDA. Säuren. — Die zu meidenden Verbindungen s. I. 8. 31. Ausnahmen von den dort gegebenen Regeln finden statt, wo man gewisse Zersetzungen bezweckt, wie z. B. bei den Brausemischungen. Eine genauere Angabe der zu meidenden Verbindungen werden wir bei den einzelnen Säuren geben. Nur das sey hier noch bemerkt, dass man auch bei der Verbindung der Säuren mit Extracten u. a. Pflanzenstoffen im Allgemeinen vorsichtig seyn und, wenn man sich in der Chemie nicht stark fühlt, wenigstens keine neuen Verbindungen der Art versuchen möge.

Die stärkeren Mineralsäuren giebt man in der Regel in flüssiger Form. Dass man sie alsdann nur sehr verdünnt anwenden darf, wenn sie nicht die Deglutitionsorgane chemisch verletzen sollen, versteht sich von selbst. Namentlich gilt dies vom *Acid. muriatic.*, *nitric.*, und besonders vom *Acid. sulphuric.*, die leicht die Zähne angreifen, und sie dadurch entweder nur vorübergehend stumpf, wie

man es nennt, oder bei längerer Anwendung selbst cariös machen. Man lasse deshalb diese Säuren jedesmal mit vielem Schleim (z. B. Haferschleim) einnehmen, und sogleich hinterher den Mund ausspülen, am besten mit einem alkalischen Mundwasser [z. B. einer Auflösung von *Natr. carbon. dep. Dr. 2* in *Aq. comm. Unc. 6 - 8*; wozu der Kranke noch Zucker *q. l.* setzen mag. — Weniger sicher und zweckmässig ist es, wenn manche Ärzte ein Zahnpulver aus *Magnes. carbon.* od. dgl. nach dem Einnehmen der Säure anzuwenden verordnen]. Noch vorsichtiger ist es, wenn man die Arznei durch eine Röhre von Glas od. dgl. nehmen lässt, die so tief in den Mund gesteckt wird, dass nichts an die Zähne kommt, oder auch nur statt dessen den Kranken anweist, die Medicin in einem Esslöffel bei hinten über geneigtem Kopfe recht weit in den Mund zu schieben, und beim Verschlucken mit der Zunge zu verhindern, dass nichts an die Zähne kommt [nur verschlucken sich bei diesem Verfahren manche Kranken leicht]. — Vom *Acid. phosphoric.* hat man, aus einem von selbst einleuchtenden chemischen Grunde, weniger für die Zähne zu fürchten.

Nur bei zuverlässigen Leuten ist es erlaubt, die stärkere Verdünnung und Einhüllung, wo sie nöthig ist, erst unmittelbar vor dem Einnehmen vornehmen zu lassen, indem man — und es ist dies etwas ökonomischer — die Säure bloß mit einem Syrup verschreibt, so dass die Partialquantität theelöffelweise mit Haferschleim genommen wird; oder indem man — was noch mehr erspart — die Säure pur verschreibt, so dass die Einzelgabe in $\frac{1}{4}$ - 1 Tasse stark versüßten Haferschleims getropfelt wird. Sonst aber ist es rathsam, die Säure gleich in einem voluminöseren und schleimigen Vehikel zu verschreiben, so dass die Partialquantität ohne Weiteres esslöffelweise genommen werden kann.

Nicht übel ist es, in minder acuten Fällen und bei guter Verdauungskraft, die stärkeren Mineralsäuren in Pillen zu geben, wo man für die Zähne ganz unbesorgt seyn kann, und wo auch für eine allmähliche, milde Einwirkung auf den Magen schon durch die Form gesorgt ist, so dass es ausser dem um der Pillenconsistenz willen nöthigen Constituens keines besonderen einhüllenden Zusatzes bedarf. Jene Säuren erfordern zur Pillenconsistenz beiläufig 1 - 2 Theile eines schwereren Pflanzenpulvers; will man noch ein Extract [und dafür um so mehr Pulver] oder dgl. zusetzen, so wird die Masse um so schöner. Es wird zwar in den Pillen ein kleiner Theil der Säure [namentlich des *Acid. nitr.*] durch die Einwirkung auf die organische Substanz zersetzt; doch ist dies, wie die Erfahrung bereits gelehrt hat, unbedeutend [mehr dagegen ist in der Regel zu befürchten, dass die organische

Sabotanz ihre Wirkung verliere]. — Auch für die Holzsäure, wenn man sie in kleineren Dosen anwendet, ist, ihres schlechten Geschmacks wegen, die Pillenform empfehlenswerth.

Der Zähne wegen ist auch die Anwendung der stärkeren Mineralsäuren in Mundwässern beschränkt: I. S. 347, 348. —

Bei der Versüssung der Säuren durch Zucker oder Syrupe sey man mit diesen Corripienten nicht so sparsam als manche Schriftsteller über Receptirkunst; wenigstens erlaube man dem Kranken, sich selbst noch nach Belieben Zucker hinzuzuthun. Nur bei der Blausäure wäre Versüssung unzweckmässig, und bei der Boraxsäure, Bernsteinsäure und Benzoësäure ist sie kaum oder doch nur in geringem Maasse nöthig. — Gern wählt man zur Versüssung der Säuren die säuerlichen Syrupe, besonders, der schönen Farbe wegen, die rothen.

Acidum aceticum. Alcohol Aceti. Acetum concentratissimum s. radicale s. glaciale. [Auch wohl *Acid. acet. purum*, was keineswegs eine concentrirte Säure (die ist es nicht), sondern nur eine von fremdartigen Beimischungen freie, bezeichnen soll. In der PH. SLESV. *Acetum concentrat.* Ueberhaupt kommen — dies hier beiläufig bemerkt — in den verschiedenen Pharmakopöen und Autoren so viele verschiedenen Verdünnungen der reinen Essigsäure unter den mannigfaltigsten Benennungen vor, dass eine genaue Synonymik derselben zu liefern; und sie etwa alle unter die 4 in der PH. BOR. officiellen Verdünnungsstufen (*Acid. acetic.*, *Acet. concentr.*, *Acetum u. Acet. destillat.*) unterzuordnen, unmöglich ist.] Essigsäure. Essigalcohol. Eissig; Radicalessig. [Spec. Gewicht = 1,050 – 1,060. — 1 Drachme $\frac{2}{3}$ Sgr.] Man wendet sie immer gern pur an. Das Gefäss ist wohl verschlossen zu halten, da sie aus der Luft Wasser anzieht.

Innerl. (≠) zu 5–20 Tropfen öfters tägl.; auf Zucker oder in einem Julep [Dr. 1–2 mit Unc. 1–2 eines säuerlichen Syrups und Unc. 4–5 Wasser (etwa ein leicht aromatisches, z. B. *Aq. Meliss.*, *Flor. Aurant.*, *Cassia*), alle 2–1 St. 1 Essl.]. Zum Getränk (wobei es nicht so auf chemische Reinheit des Präparats ankommt) lieber Essig oder Himbeeressig.

Ausserl. als Riechmittel [bei Operationen, bei leichten Anwendungen von Ohnmacht dem zwar stärker wirkenden, aber unangenehmen *Liq. Ammon. caust.* vorzuziehen. — Bisweilen als Zusatz zu Räucherspiritus.]; auch wohl als Rubefaciens und selbst als Epispasticum [um die Haut zu röthen, kann man es einreiben oder mit Lättchen auflegen oder (wohl am zweckmässigsten) ein indifferentes Pflanzepulver aufstreuen und dasselbe mit Essigsäure betröpfeln (wirkt schneller als Senfteige); um künstliche Geschwüre zu erzeugen, applicire man (nach LASSÈRE) einen aus 20 Mehl, 7 Baumöl, 20 Essigsäure gemischten (etwa noch mit wenig Cinnobar rosenroth gefärbten) Teig mittelst einer gefensterten Spielkarte]; bisweilen als Zusatz zu Badespiritus.

★★ *Acidum aceticum aromaticum.* [8 Essigsäure mit 3 einer Mischung aus verschiedenen ätherischen Ölen. — 1 Drachme $1\frac{1}{8}$ Sgr.] und

★★ *Acidum aceticum aromatico-camphoratum* [1 Campher auf 64 Essigsäure mit etwas äther. Öl. — 1 Drachme 1 Sgr.]. Beide (≠) nur als Riechmittel [man hüte sich vor dem Aufstreichen oder Aufspritzen auf Stirn und Schläfen, weil sie die Haut röthen, stark brennen, auch ins Auge fließen könnten], oder gegen Zahnschmerz [pur oder mit Kreosot, Opiumtinctur p. p. eingebracht].

Acidum benzoicum. *Flores Benzoës.* *Sal Benzoës acidus.* Benzoësäure. Benzoëblumen. [Schmeckt nicht sauer, sondern süßlich-scharf, brennend. (Deshalb einzuhüllen.) — Ziemlich flüchtig. — 1 Drachme 7 Sgr.] *Sol.* 200; siedend Wasser $24\frac{1}{2}$. In Weingeist u. Äther leichter löslich. — *Cave* Basen, besonders Alkalien u. Erden (reine u. kohlen-saure); Eisenoxydsalze.

Innerl. zu Gr. 3-10, mehrmals tägl.; in Pulver [gern mit *Gm. Mimos.* od. *Pulv. gummos.* — R_x 15, 16; 1001 (*Sulph. dep.*)], Pillen [R_x 17], Auflösungen [jedoch, der geringen Auflöslichkeit wegen, nur kleinere Gaben, etwa mit andern Mitteln in Verbindung. — R_x 18] und Schüttelmixturen [R_x 19].

15.

R_x *Sulph. stib. aurant.*
Camphor. tritae ana Gr. 6
Acidi benzoici Dr. $\frac{1}{2}$
Elaeos. Foenic. Dr. 1.

M. f. Pulv. Div. in 6 part. aeq. D. in charta cerata. S. 2stündl. 1 Pulver mit Haferschleim. (Bei Lungenlähmung.)

BERENDS.

16.

R_x *Sulph. stib. aurant.* Gr. 3
Rad. Ipecacuanh. Gr. 6
Acidi benzoici Gr. 36
Sacch. albi Dr. 1.

M. f. Pulv. Div. in 6 part. aeq. D. in charta cerata. S. 4mal tägl. 1 Pulver mit Haferschleim. (Bei asthenischer Pneumonie.)

HORN.

17.

R_x *Acidi benz. pulv.* Dr. 1

Pulv. Rad. Helen. Dr. 2

Extr. Dulcamar. Dr. 1

— *Glycyrrhiz. q. s.*

ut f. Pilulae 150. *Consp. Pulv. Sem. Foenic. D. S.* 3 mal tägl. 10.

18.

R_x *Acidi benzoici* Scr. 2

solve in

Decocti Rad. Alth. (Unc. $\frac{1}{2}$ c. L. 2 ad) L. 1 $\frac{1}{2}$

adde

Syr. Bals. Peruv. Unc. 1.

M. D. S. 2stündl. $\frac{1}{2}$ Tasse.

19.

R_x *Acidi benz. pulv.* Dr. 1

Mucil. Gm. Mimos. Dr. 2

terendo misce c.

Syr. Bals. Peruv. Unc. 2.

D. S. Umgeschüttelt 2 stündl. 2 Theelöffel.

* *Acidum boracicum.* *Sal sedativum Homber-*

gii. *Sal volatile Vitrioli narcoticum.* Boraxsäure. [Schmeckt kaum säuerlich. — 1 Drachme $1\frac{1}{2}$ Sgr.] *Sol.* etwa 30. In Weingeist ziemlich leicht löslich. — *Cave* starke Basen; kohlen saure Alkalien u. Erden. — Innerl. zu Gr. 5-15 mehrmals tägl.; in Pulver, Pillen od. Auflösungen. (Obsolet.) — Eine Zahntinctur: R_y 117.

* *Acidum hydrocyanicum s. Borussicum s. xooticum s. xootinicum s. Coerulei Berolinensis.* [Unrichtig: *Acid. cyanicum.*] Blausäure; Wasserstoffblausäure; Berlinerblausäure; preussische od. thierische Säure. [Nach der durch SCHRADER verbesserten ITTNERschen Methode bereitet, viel schwächer als die ITTNERsche. 100 Gran mit *Liq. Kali caust.*, dann mit *Liq. Ferri muriat. oxydati*, endlich mit Salzsäure, q. s., vermischt, müssen 4 Gran blausaures Eisen geben. Demnach entspricht 1 Gran $15\frac{9}{5}$ Granen der *Aq. Amygdal. amar.* oder *Laurocer.*, 1 Tropfen jedoch nur ungefähr 8 Tropfen dieser Wässer, da sie eine doppelt so grosse Tropfenzahl bildet: man kann von ihr 140-150 Tropfen auf die Drachme rechnen. — 1 Drachme $1\frac{1}{8}$ Sgr.] *Cave*: sie wird ungemein leicht, namentlich ausser vielen Stoffen des Mineralreichs auch durch viele Vegetabilien, zersetzt, dagegen durch ätherisches Öl, Weingeist, einen geringen Zusatz einer Säure, ihre Haltbarkeit befördert [weshalb sich *Aq. Amygd. amar.* u. *Laurocer.* minder leicht zersetzen sollen]; es ist deshalb rathsam, sie immer pur, nur mit einem aromat. Wasser, oder mit etwas aromat. Wasser und Weingeist, p. p. verdünnt, zu geben; *cave* auch Luft, Licht und Wärme. [Man lasse sie also *in vitro charta nigra involuto* verabreichen, und schärfe dem Kranken ein, das Fläschchen immer rasch und fest zu verschliessen und an einem kühlen Ort aufzubewahren.] Auch verordne man nie auf längere Zeit als ein Paar Tage.

Innerl. (*ad Guttam unam!*) zu 1-4 (u. mehr) Tropfen, mehrmals tägl. [Beispiele von Verdünnungen: R_y *Acidi hydrocyan.* Scr. $\frac{1}{2}$, *Aq. Cerasor.* Unc. $1\frac{1}{2}$ (hier wird ein Theelöffel ungefähr 2 Tropfen Säure enthalten). — Oder nach HARLESS: R_y *Acidi hydrocyan.* Gtt. 10, *Aq. Rosar.*, *Spir. Vini Gall.* fort. ana Gtt. 55. *M. D.* (12 Tropfen enthalten 1 Tropfen Säure). Doch dürfte der Spirit bisweilen durch Gerbstoff-Gehalt ein wenig zersetzen und deshalb *Spir. Vini rectiss.* den Vorsatz verdienen.]

Ausserl. hat man die Blausäure theils pur [z. B. 1 Tropfen auf Baumwolle in einen cariösen Zahn gebracht: UWINS], theils mehr od. weniger verdünnt [bei allerlei Schmerzen, Geschwüren, Hautausschlägen] angewandt; doch lässt sich zu diesem Behuf [da die meisten Versuche mit nach andern, zum Theil unsicheren Methoden, namentlich der SCHEELSchen, bereiteter Blausäure angestellt worden] das Maass der Verdünnung für unsere officinelle Säure nicht genügend angeben; auch scheint das Mittel in dieser Hinsicht entbehrlich.

Acidum muriaticum. Spiritus Salis acidus s.

fumans Glauberi. Acidum Salis culinaris s. communis s. marini. Acidum hydrochloricum, Salzsäure, Chlorwasserstoffsäure. [Spec. Gewicht = 1,110 - 1,120. — 1 Unze $1\frac{5}{8}$ Sgr. — Für Arme darf man in den Formen, die auf die äussere Haut angewandt werden, oft das *Acid. muriat. crudum* (*Spiritus Salis*; rohe Salzsäure; Salzgeist — 1 Unze $\frac{3}{4}$ Sgr.) substituiren, das zwar in seiner Stärke weniger bestimmt u. immer stärker (im Durchschnitt etwa um $\frac{1}{2}$ stärker) als die gereinigte Säure ist (spec. Gewicht = 1,130 - 1,200), so dass man mit etwas kleineren Gaben anzufragen haben wird.] *Cave*: s. I. S. 31 (unter Säuren); ausserdem noch Silber-, Blei-, Quecksilberoxydul-Salze; auch [mit sanctionirten Ausnahmen, namentlich zum äusserlichen Gebrauch] Salpetersäure; Gefässe von Eisen, Zink, Zinn. — Cautelen beim Einnehmen s. unter *Acida*.

Innerl. (*ad Guttas triginta!* — *Absque aqua* ‡) zu 5 - 20 (— 30) Tropfen mehrmals tägl. (etwa Dr. $\frac{1}{2}$ - 2 tägl. zu verbrauchen); in Pillen od. Bissen [z. B. Dr. 1 mit *Pulv. Rad. Glycyrrh. q. s.* zu 40 Pillen oder 4 Bissen gemacht, in 4 Portionen tägl. zu verbrauchen. — Ry 20], Mixturen [stark verdünnt und eingehüllt, also etwa mit Schleim und einem säuerlichen Syrup; z. B. Dr. 2 mit *Syr. Cerasor. Unc. 2*, 2stündl. 1 Theelöffel in $\frac{1}{2}$ Tasse Haferschleim. Vgl. *Acid. nitr.* (KÜCHLIN's Vorschrift). — In acuten Krankheiten, bei Languor des Gefässsystems, gern mit etwas Äther (etwa $\frac{1}{4}$) oder Weingeist (1 - 2 Theilen) verbunden; z. B. Ry 21.]; zum Getränk [Der Zähne wegen (vgl. *Acida*) wähle man ein solches nicht ohne Noth. — Dr. 1 - 2 auf 1 Quant, etwa mit *Syr. Rubi Id.* oder *Syr. Cerasor. Unc. 2 - 4*].

Ausserl. theils unverdünnt als Ätzmittel [zum Aufstopfen (z. B. auf Warzen, Fleisch- und Schwamm-Auswüchse 1 - 2 mal tägl. mittelst eines spitzen Hölzchens: SCHWARTZE) oder zum Aufstreichen (z. B. auf Kopfgrind: VAN WY). Bei Milzbrandkarfunkel nach HOFFMANN auf eine absichtlich gebildete Wundfläche anfangs concentrirt, später verdünnt, überzuschlagen. Auch als Augenätzmittel.], theils verdünnt zu Mand- u. Gargelwässern [Dr. $\frac{1}{2}$ - 1 (- $1\frac{1}{2}$) auf Unc. 6; gern mit *Syr. Moror.* od. *Mel. rosat.* — Ry 22], Pinselsäften [Scr. 1 - 2 - Dr. 1 auf 1 Unze dieser süssen Säfte], Linimenten [verdünnt], Augewässern [Ry 23], Umschlägen [z. B. Dr. 1 auf Unc. 8 Wasser, einigemal tägl. überzuschlagen: OSWALD gegen Flechten.], Waschungen u. Bädern [in diesen beiden Formen gewöhnlich in Verbindung mit *Acid. nitricum*: Ry 27 - 29]. Die Anwendung der Salzsäure in Dampfgestalt s. unter *Gas Acidi muriat.*

20.

Ry *Acidi muriatici*
Extr. Colombo
Pulv. Rad. Colombo ana Dr. 1
 — — *Salep q. s.*
ut f. Pilulas 80. Consp. Pulv. Cass. cin-
nam. D. in vitro. S. 4mal tägl. 10.

21.

Ry *Acidi muriat. Dr. 2*
Aether. acet. Dr. $\frac{1}{2}$
Dissecti Rad. Alth. (Dr. 1 cum
Unc. 7 qd) Unc. 5
Syr. Rubi Id. Unc. 2.
M. D. S. 2stündl. 1 Essl.

22.

Ry *Hb. Salviae*
 — *Scordii* ana Unc. $\frac{1}{2}$.
Infunde Aq. comm. ferbid. q. s. ad Col-
at, Unc. 6, adde
Acidi muriat. Dr. 1 $\frac{1}{2}$
Syr. Moror. Unc. 2.
M.D.S. Zum Einspritzen. (Gegenasthe-
nische, brandige Bräune.) WENDT.

23.

Ry *Acidi muriat. Gtt. 20*
Mucil. Gm. Mimos. Dr. 1
Aq. Rosar. Unc. 2.
M. D. sine Signat. Cito. — (Wenn
Eisensplitter ins Auge [Cornea od. Sclero-
retica] gedrungen und mit Pincette oder

Nadel nicht zu entfernen sind, mit die-
 ser Mischung, in ein Schälchen gegos-
 sen, das Auge zu baden. Gewöhnlich
 reichen 10 Minuten hin, um selbst grö-
 sere und tief sitzende Splitter vollstän-
 dig aufzulösen. Alsdann das Auge mit
 Milch auszuwaschen; endlich mehrere
 Stunden lang Umschläge von kaltem
 Wasser.) (KRIMER.
 ANDREAE wendet zu gleichem Zweck
 12 Tropfen Salzsäure mit *Aq. destill.*
 Unc. 1, oder auch (doch wohl minder
 kräftig auflösend) 8 Tropfen verdün-
 nter Schwefelsäure mit 1 Unze Wasser,
 an. — KRIMER's Formel enthält ei-
 gentlich Quittenschleim; da aber dieser
 durch die Säure coagulirt wird, ver-
 dient der Mimosenschleim den Vorzug.

Acidum nitricum. Spiritus Nitri acidus, Sal-
 petersäure; Azotsäure. [Spec. Gewicht = 1,195-1,205. — 1 Unze
 2 $\frac{1}{2}$ Sgr. — Für Arme darf man in den Formen, die auf die äussere Haut ange-
 wandt werden, oft das *Acid. nitr. crudum (Spiritus Nitri; Aqua for-*
tis; rohe Salpetersäure; Scheidewasser — 1 Unze 1 $\frac{3}{4}$ Sgr.) substi-
 tuiren, das zwar in seiner Stärke weniger bestimmt und im Allgemeinen stärker
 (im Durchschnitt etwa um $\frac{1}{4}$ stärker) als die gereinigte Säure ist (Spec. Gewicht
 = 1,200-1,300), so dass man mit etwas kleineren Gaben anzufangen haben
 wird.] *Cave*: s. I. S. 31 (unter Säuren); ferner: Salzsäure [vgl. jedoch *Acid.*
muriat.]; ätherische Öle und ihre concentrirten Lösungen [z. B. *Mixt.*
oleoso-balsam., aromatische Spiritus. (Eine Ausnahme unt. *Ol. Succini rst.*)];
 überhaupt viele vegetabilischen und thierischen Stoffe. — Zum Ein-
 nehmen sind hölzerne, gläserne oder porcellanene Löffel, zum Wa-
 schen und Baden hölzerne oder porcellanene Wannen anzuwenden.
 Die anderweitigen Cautelen beim Einnehmen s. unter *Acida*.

Innerl. (*ad Guttas viginti!* — *Absque aqua* ‡) zu 5-20
 Tropfen mehrmals tägl. (etwa Dr. $\frac{1}{2}$ - 1 - 1 $\frac{1}{2}$ tägl. zu verbrauchen); in Pil-
 len od. Bissen, Mixturen [stark verdünnt u. durch Schleim einge-
 hält. Meist wird man wohl thun, wirksame Zusätze zu vermeiden; doch ist ein
 Zusatz von etwas Weingeist oder Opium (Extract oder Tinctur) erlaubt und be-
 liebt. — *Acid. nitr. Dr. 2, Acid. muriat. Scr. 2, 4 mal tägl. 20, allmählig 30,*
Tropfen, in versüßtem Gerstenschleim: KÜCHLIN bei mit Scorbut gepaarter Sy-
philis. — Ry 24, 25].

Ausserl. unverdünnt als Ätzmittel [aufgetupft]; verdünnt in
 Pinselsäften [Ry 26], Einspritzungen [z. B. Gtt. 2 u. allmählig
 mehr (bis gelinder Schmerz entsteht) auf *Aq. destill. Unc. 2*: zum Einspritzen
 gegen Nachtripper von russischen Ärzten empfohlen. — So stark verdünnt,
 dass es nur wie eine schwache Limonade schmeckt; FOURCROY als Einspritzung

in die Harnblase bei Steinen aus phosphorsaurem Kalk und Ammoniumtalk.], Waschungen [R₂ 27], Bädern [Unc. 1-8, bei sehr torpider Haut (wie z. B. bei der Cholera) auch noch mehr, etwa bis zu Unc. 6 (oder mit *Acid. muriat.*, ana Unc. 3). — R₂ 28, 29.], Salben [mit denen man, weil sie die Wäsche anfressen, vorsichtig seyn muss. — 1 mit 8 Schweinefett in gelinder Hitze gemischt: *Ungt. oxygenatum s. nitricum* PH. SLESV., HANN., AUSTR. (1 Unze 4 Shl.), ALYON's oxygenirte Pomade, worin zwar nicht mehr Salpetersäure, sondern ein Gemenge von Fettsäuren enthalten ist und das Fett Ceratconsistenz angenommen hat; wird als Verbandsalbe und, der steifen Consistenz ungeachtet, auch zum Einreiben angewandt.], Linimenten [z. B. mit *Aq. Cinnam. simpl.* ana, mit einem Federbart oder einem Schwämmchen 1-2mal tägl. auf torpide Frostbeulen zu streichen: R₂ 27], Verbandwässern [z. B. Dr. 1-2 auf Unc. 7 Wasser: GERSON bei Hospitalbrand. — R₂ 30], u. s. w. Die Anwendung in Dampfform s. unter *Fumigationes nitricae* Smüh.

24.

R₂ *Acidi nitrici* Dr. 1
Tinct. Opii simpl. Gtt. 20'
Syr. simpl. Unc. 1
Decocti Sem. Aven. excort. (Unc. $\frac{1}{2}$)
 Unc. 9.

M. D. S. 2stündl. $\frac{1}{2}$ Tasse. (Oder ohne den Haferschleim, bloss die Säure mit der Tinctur u. dem Syrup, dann 2stündl. 1 Theelöffel mit $\frac{1}{2}$ Tasse Haferschleim.)

25.

R₂ *Acidi nitrici* Scr. 2 - Dr. 1
Aq. Melissa. Unc. 2
Decocti Rad. Salep (Scr. 4) Unc. 6
Syr. Capit. Papav. Unc. 1.
 M. D. S. Alle 5-10 Minuten, später alle 1-2 St., 1 Essl. (Gegen Cholera. Dabei *Ol. Hyosc. coct.* in Unterleib u. Glieder einzureiben, und zum Getränk eine schwache Limonade esslöffelweise.)
 v. SPÜRER.

26.

R₂ *Acidi nitrici* Scr. 1
Mellis rosati
Syr. Morov. ana Unc. $\frac{1}{2}$.
 M. D. S. Pinselsaft. (Für hartnäckige syphilitische Mundgeschwüre.)
 OFFERT.

27.

R₂ *Acidi nitrici*
 — *muriat.* ana Unc. $\frac{1}{4}$

Aq. destill. Unc. 15.

M. D. S. 2mal tägl. damit den ganzen Körper mittelst eines Schwammes zu waschen. (Bei *Plethora venosa*, Anschwellungen u. Stockungen in der Leber, u. s. w.)
 BERNHARDT.

28.

R₂ *Acidi nitrici*
 — *muriat.* ana Unc. $1-1\frac{1}{2}$
 (für Kinder Unc. $\frac{1}{2}-1$).
 M. D. S. Zu einem Bade. (Bei denselben Krankheitszuständen wie das vorige. — Man schüttet die Säuren in die mit kaltem Wasser zur Hälfte gefüllte Badewanne, und giesst dann so viel heisses Wasser zu, dass die Temperatur des Bades = 28° R. wird. Das Bad kann 2-3 mal wieder gewärmt werden. — Kranke, die nach den ersten Bädern heisse Haut, kupfrigen Geschmack, rothes Zahnfleisch bekommen, müssen nur einen Tag um den andern baden, oder es muss weniger Säure zugesetzt werden.)
 BERNHARDT.

29.

R₂ *Acidi nitrici*
 — *muriat.* ana Unc. 1.
 M. D. S. Zu einem Fussbade. (Bei chronischer Leberentzündung, Dysmenorrhöe u. s. w. Man vermehrt allmählig die Quantität der Säuren, bis die Fussbäder ein leichtes Prickeln in der

Haut oder ein Ziehen in Schenkeln und Rücken erregen.)

SCHÖNLEIN.

Bei empfindlicheren Personen könnte man doch wohl mit einer geringeren Quantität der Säuren anfangen: ITH nehm von jeder der beiden Säuren nur 1 Kael., und danach entstand gewöhnlich schon Röthe u. Geschwulst; freilich kommt es dabei auch auf die Menge des Wassers an.

30.

Ry *Acidi nitrici* Dr. $\frac{1}{2}$ - 1

Tinct. Opii simpl. Dr. 1

Aq. Rosar. Unc. 6.

M. D. S. Verbandwasser. (Für hartnäckige syphilitische Geschwüre, bei denen Mercurialpräparate schon fruchtlos versucht sind.)

OPPERT.

Acidum phosphoricum depuratum s. ex Ossibus.

Phosphorsäure aus Knochen; Knochensäure. [Enthält Spuren von saurem phosphorsauren Kalk. — 1 Unze 58gr.] — Und

Acidum phosphoricum purum. Reine Phosphorsäure [aus Phosphor. — 1 Drachme $1\frac{1}{2}$ Sgr.] Spec. Gewicht beider = 1,125 - 1,135. — *Cave:* s. I. S. 31. (Unter den Salzen besonders Kalk-, Blei- u. Quecksilber-Salze.) — Die Phosphorsäure hat bei gewöhnlicher Temperatur minder starke Verwandtschaft zu den Basen als Schwefel-, Salpeter- u. Salz-Säure. — Sie schlägt die Auflösung des Eiweißstoffes nicht nieder.

Innerl. zu 10-30 Tropfen mehrmals tägl. (etwa Dr. 1-2 tägl. zu verbrauchen); in Pillen od. Bissen [Ry 31, 32], häufiger in Mixturen [stark verdünnt; oft, wo keine Gegenanzeige, mit gewürzhaftem Zusatz; z. B. Dr. 1 mit *Tinct. Cinnam.* Dr. 2, umgeschüttelt stündl. 30 Tropfen in Zuckerwasser: BURDACH bei Blutungen. — Ry 33; 486 (*Hb. Sabin.*)], zum Getränk [Dr. 1-2 mit *Syr. Rubi Id.* od. *Carasor.* Unc. 2-4 auf 1 Quart].

Äusserl. verdünnt [oft mit geistigen Mitteln, Myrrhentinctur p. p. verbunden] zu Mundwässern [etwa Dr. $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ auf Unc. 6], Zahntropfen [selten; etwa mit 4 Theilen Wasser], Einspritzungen [Ry 34], Verbandwässern.

31.

Ry *Asae foet. depur.*

Acidi phosphor. depur. ana Dr. 3

Pulv. Rad. Calami q. s.

ut f. *Pilulae* 180. *Consp. Pulv. Rad. Irid. Flor. D. in vitro.* S. 3mal täglich 5-10. (Bei Caries.)

RUST.

32.

Ry *Camphor. trit.* Gr. 15

Ferr. pulverati Gr. 45

Cort. Chinæ fusci pulv.

Acidi phosphor. puri ana Dr. 1

II.

Extr. Cascarill. q. s.

ut f. *Pilulae* 240. *Consp. Sem. Lycop. D. in vitro.* S. 3mal tägl. 10. (Gegen Pollutionen von grosser Schwäche und Reizbarkeit der Genitalien. — Milchspeisen dabei zu vermeiden und jeden 3ten Tag auszusetzen, um zu starke Reizung der Brustorgane zu verhüten.)

(WURZER.)

33.

Ry *Acidi phosphor. puri* Dr. 2

Syr. Rubi Id. Unc. 2

4

Decocti Rad. Alth. (Dr. 1) Unc. 5.
M. D. S. 2stündl. 1 Essl. (Oder ohne
 den Eibischabsud, bloss mit dem Syrup,
 dann 2stündl. 1 Theelöffel.)

34.

Ry *Hb. et Flor. Millefol.*
 — *Salviae ana* Unc. $\frac{1}{2}$

Aq. comm. Unc. 8
coque ad Colat. Unc. 6, *cui refriger.*
adde

Acidi phosphor. depur. Dr. 2
Tinct. Myrrhas Dr. 1.

M. D. S. Umgeschüttelt einzuspritzen.
 (Bei Caries.) WENDT.

Acidum pyro-lignosum crudum s. ligneum. Acetum ligneum. Rohe Holzsäure. Holzeßig. [Essig mit einem stets ungleichen Gehalt an Kreosot, Paraffin, Eupion, Picamar, Braudharz, Holzeßiggeist etc.; deshalb auch ein unsicheres Heilmittel. — 1 Unze $\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave*; vgl. *Aceta*. Besonders aber noch: Salzbilder, concentrirte Säuren [namentlich Salpetersäure], mehrere Metallsalze; Licht.

Innerl. (selten; meist die rectificirte Säure. — \neq) zu 10-20 Tropfen — steigend bis zu Dr. 1 — auf den Tag, in denselben Formen wie die folgende.

Ausserl., verdünnt oder pur, zu Injectionen [Ry 35], Wäsungen, Umschlägen, Kataplasmen. (Zu Pinselsäften, Mund- u. Gurgelwässern zieht man meist die rectificirte Säure vor.)

35.

Ry *Acidi pyro-lign. crud.*
Spir. sulph. aeth.
Ol. Terebinth. rst. ana Scr. 1.
M. D. in vitro charta nigra invol. S.

Abends vor Schlafengehn 2 Tropfen in den Gehörgang zu tröpfeln. (Bei Taubheit aus Mangel an Ohrschmalz. — Dazu noch innerlich jedesmal eine Dosis von *Vinum Colchici*.) BUCHANAN.

Acidum pyro-lignosum rectificatum. Rectificirte Holzsäure. [Riecht u. schmeckt minder widerlich als die vorige. In der Wirkung eben so unsicher. — 1 Unze 18gr.] *Cave*: wie bei *Acid. pyro-lign. crudum*.

Innerl. (\neq) zu Dr. $\frac{1}{2}$, allmählig bis zu Unc. $\frac{1}{2}$, auf den Tag, in Pillen [vgl. S. 19 Z. 1] oder in einem wässerigen Vehikel, versüsst [Ry 36, 37].

Ausserl. zieht man meist die stärkere rohe Säure vor, angenommen zu Pinselsäften [Dr. 1 $\frac{1}{2}$ auf 1 Unze Rosenhonig: SUNDELIUS bei Wasserkrebs], Mund- u. Gurgelwässern [Ry 38], Zahnfleischlatwergen [s. I. S. 302, Beispiele S. 303].

36.

Ry *Acidi pyro-lign. rst.* Dr. 2
Tinct. Calami Dr. 3
Aq. Menth. crisp. Unc. 4
Syr. simpl. Unc. 1 $\frac{1}{2}$.

M. D. in vitro charta nigra invol. S.
 2stündl. 1 Essl.

37.

Ry *Acidi pyro-lign. rst.* Dr. 1

*Aq. Flor. Aurant. Unc. 2**Syr. Amygdal. Unc. 1.*

M. D. in vitro charta nigra invol. S.
Bündel, umgeschüttelt, 1 grossen Thee-
löffel. (Gegen gallertartige Erweichung
des Magens und Darmkanals bei einem
halbjährigen Kinde. — Dabei zum Ge-
trink Zuckerwasser und Fenchelthee;
als Nahrungsmittel — immer nur wenig

auf einmal — Gerstens Schleim.)

PITTSCHAFT.

38.

*Rx Acid. pyro-lign. est. Unc. ½**Aq. Cinnam. simpl. Unc. 4**Syr. Moror. Unc. 2.*

M. D. in vitro charta nigra invol. S.
Mundwasser.

Acidum succinicum crudum. Sal Succini (vo-
latile). Rohe Bernsteinsäure. Bernsteinsalz. [1 Drachme
4 Sgr.] Selten äusserl. in Salben [*Rx 232 (Castor.)*], etc. (Innerl. die
folgende.)

Acidum succinicum depuratum. Sal Succini de-
puratum. Gereinigte Bernsteinsäure, etc. [1 Drachme 5½ Sgr.]
Sol. 25; auch auflöslich in Weingeist. — *Cave* Schwefel- u. Salpe-
tersäure [wegen des empyreumat. Öls, wovon auch die rectificirte Bernsteinsäure
nicht ganz frei seyn darf, da es wohl hauptsächlich die Wirkung bedingt]; Basen;
Salze schwächerer Säuren, namentlich kohlen-säure.

Innerl. zu Gr. 5-15, öfters tägl.; in Pulver [so oft mit Moschus,
Castoreum oder Campher; als Constituens etwa *Pulv. gummos.*], Pillen, wä-
ssriger oder weiniger Auflösung [etwa in einem aromatischen Wasser,
vermischt; z. B. *Rx 39*].

Äusserl. zweckmässiger die vorige.

39.

Rx Acid. succinici depur. Dr. 1-2

solbe in

Aq. Cinnam. simpl. Unc. 6 (- 6½)

adde

*(Ether. acet. Scr. 1)**Syr. Cinnam. Unc. ½.**M. D. S. 2ständl. ½ - 1½ Essl.*

Acidum sulphuricum crudum. Oleum Vitrioli.
Rohe Schwefel- od. Vitriol-Säure. Vitriolöl. [Spec. Gew.
nach der PH. BOR. = 1,840 - 1,850. Es ist dies das minder starke, im Handel
sogenannte „englische“ Vitriolöl. — 1 Unze 5 Sgr. — Die PH. SLESV. hat
auch noch das stärkere rauchende od. „Nordhäuser“ Vitriolöl; spec.
Gew. = 1,860 - 1,900; 1 Unze 1½ Sgr.]

Man setzt das (englische) Vitriolöl wohl zur Austrocknung der Luft in feuch-
ten Krankenzimmern in grossen Portionen in einem offenen Glase hin; zweckmäs-
siger indess und, besonders wo Kinder sind, weniger gefährlich bedient man sich
dazu der *Calcaria muriat.* oder *Calcar. usta* (vgl. die Artikel). — Sehr entbehrlich
scheinen die beiden Präparate der PH. SLESV., *Liq. stypticus Loeffii* (*Cupr.*
sulphur., Alaun ana 1½ in Wasser 12 gelöst, englisch. Vitriolöl 1. — 1 Unze 1 Sbl.)
und *Linim. muriatico-terebinthinatum* oder *Linim. (Liquor). an-*
tarthritic. Pottii (Kochsalz, getrocknet u. gepulvert, 2, Terpenthinöl 1½,
mit rauchendem Vitriolöl 1 macerirt, colirt. — 1 Unze 12 Sbl.).

Acidum sulphuricum dilutum. Spiritus Vitrioli (acidus). Acidum Vitrioli tenue. Verdünnte Schwefelsäure. Vitriolgeist. [1 der gereinigten concentrirten Säure mit 5 Wasser. — 1 Unze $\frac{3}{4}$ Sgr.] *Cave:* s. I. S. 31. Die Schwefels. ist bei gewöhnlicher oder wenig erhöhter Temperatur die stärkste aller Säuren, deshalb sind hier ganz besonders Basen [nur bei sehr wenigen Basen steht sie anderen Säuren nach, z. B. beim Kalk der Kielesäure und Traubensäure, beim Kali der Weinstein- und Traubensäure], die meisten Salze [besonders Baryt-, Kalk-, Blei-Salze], mehrere Metalle [besonders Eisen, Zink, Zinn], Schwefelmetalle etc. zu vermeiden. — Cautelen beim Einnehmen s. unter *Acida*.

Innerl. (*ad Guttas triginta!* — *Absque aqua* \mp) zu 5-20-30 Tropfen öfters tägl. (etwa Dr. 1-2 tägl. zu verbrauchen); in Pillen od. Bissen [wie *Acid. muriat.* — Ry 40], Mixturen [stark verdünnt u. eingehüllt, also etwa mit Schleim und einem säuerlichen Syrup. Ry 41, 42; 147 (*Bals. Copaiv.*)]; zum Getränk [Dr. 1-2 auf ein Quart, mit *Syr. Cerasor.* oder *Rubi Id.* Unc. 1-2]; zu Molken [I. S. 317].

Aüsserl., nochmals mehr oder weniger verdünnt, zu Mund- u. Gurgelwässern [Dr. $\frac{1}{2}$ -2 auf Unc. 6, gern mit *Syr. Moror.* od. *Mel roth.*], Pinselsäften [Dr. $\frac{1}{2}$ -2 auf Unc. 1 dieser süßen Säfte], Waschungen, Bähungen; auch wohl in Salben [Dr. $\frac{1}{2}$ -1 auf Unc. 1 Fett]. (Über die Anwendung zu Bädern s. *Kali sulphurat. pro Baln.*, *Calcar. sulphurata*, — zu Augewässern s. *Acid. sulph. rft.*)

40.

Ry *Acidi sulphur. diluti*
Extr. Ligni Campech. pulv. anis Dr. 2
Rad. Calami pulv. q. s.
ut f. Boli 24. Consp. Sem. Lycop. D. in vitro. S. 3 od. 4mal tägl. 3 od. 4.

41.

Ry *Acidi sulphur. diluti* Dr. 2
Syr. Cerasor. Unc. 2
Aq. Rubi Id. Unc. 5.
M. D. S. 2stündl. 1 Essl. (oder ohne das Wasser, blos mit dem Syrup, dann 2stündl. 1 Theelöffel) in Haferschleim.

42.

Ry *Acidi sulphur. diluti* Dr. 3
Tinct. Opii simpl. Dr. 1
Syr. Violar. Unc. 3.
M. D. S. 2mal tägl., besonders Abends vor Schlafengehn, $\frac{1}{2}$ Esslöffel in Haferschleim. (Gegen hektische Schweisse. — Vgl. Ry 1072.) (G. A. RICHTER.
Da der Syr. Violar. hier roth gefärbt wird, so kommt man, wo es nur um eine schön rothe Mixtur, nicht auch um den Veilchengengeruch, zu thun ist, mit Syr. Rhoados wohlfeiler weg.

Acidum sulphuricum (Acid. s. Oleum Vitrioli) rectificatum s. depuratum. Gereinigte concentrirte Schwefelsäure. [1 Unze $2\frac{3}{4}$ Sgr.] Und

Acidum sulphuricum rectificatum venale. Käufl-

ehe gereinigte concentrirte Schwefelsäure. [1 Unze $2\frac{1}{2}$ Sgr.] Spec. Gewicht beider (wie das des englischen Vitriolöls) = 1,840–1,850. Dem zuverlässigeren chemischen Reinheit wegen wird man oft dem ersteren Präparat den Vorzug geben. — *Cave* wie bei *Acid. sulph. dilutum*; ausserdem noch organische Substanzen.

Ausserl. purals Ätzmittel [oft zweckmässig nach der Formel Ry 43; wenn man aber diese Formel auch auf die Augenlieder anwenden darf, so ist es doch für den Augapfel zu stark; hier darf man zum Betupfen, z. B. eines Irisvorfalls, die Schwefelsäure nur verdünnt, etwa das officinelle *Acid. sulph. dilutum*, anwenden]; stark verdünnt zu Augentropfwässern [z. B. 3 Tropfen auf 1 Unze: RUST im 3ten Stadium der ägypt. Ophthalmie], Lini-
menten [selten — Ry 44], Bädern [vgl. *Calcar. sulphurata*, *Ferrum sulph. cryst.*].

43.

Ry *Acidi sulphur. rectificati* Dr. 1

Croc. pulv. Gr. 8.

M. f. Pasta. D. in vitro bene clauso. S. Mittelst eines an der Spitze kreuzweis eingekerbten Hölzchens den Theil damit zu betupfen. (Bei Entropien auf die äussere Augenlidplatte anzuwenden, bei hartnäckigen Wucherungen der *Conjunctiva palpebrarum* nach der ägypt. Ophthalmie auf die wuchernden Stellen; sonst auch bei fungösen Geschwüren, Warzen u. dgl.) (RUST, HELLING. Die beiden Autoren haben eigentlich nur 4 Gran Crocus, aber dies giebt nur eine Masse von Syrupconsistenz, die

noch ziemlich leicht abfließt; dagegen 8 Gran eine Paste von dünner Extractconsistenz, die sich sehr leicht aufstupsen lässt und nicht abfließt. Da das vegetabilische Pulver durch die concentrirte Säure verkohlt wird, so dürfte ein wohlfeileres hier dieselben Dienste thun.

44.

Ry *Acidi sulphur. rectificati* Dr. 1

Ol. Terebinth. Unc. 3

— *Olivar.* Unc. 2.

M. D. S. Umgeschüttelt einzureiben (zur Erzeugung eines künstlichen Exanthems). PEARSON.

Acidum tartaricum s. Tartari s. Vini. Sal essentielle Tartari. Weinsteinsäure; Weinsäure; Weinsalzsäure. Wesentliches Weinsteinsalz. [1 Unze $4\frac{3}{4}$ Sgr.; sub. pulv. 1 Drachme $\frac{5}{8}$ Sgr.] *Sol.* $1\frac{1}{2}$. — *Cave* Basen, viele Salze [namentlich Kalisalze, selbst die mit stärkeren Säuren; auch die zusammengesetzten weinsteinsäuren Kalisalze (*Tartari*) mit Ausnahme des *Tart. depurat.*, *Tart. stict.* und *Tart. ferruginos.*; — kohlensaure Alkalien u. Erden, falls man nicht, wie in den Brausepulvern, den Zweck hat, die Kohlensäure zu entbinden; — ferner mehrere Metallsalze, z. B. salzsaures und schwefelsaures Eisen], Seifen, Schwefellebern.

Innerl. zu Gr. 5–20 öfters tägl. (etwa Dr. 1–2 tägl. zu verbrauchen); in Pulvern [Limonadenpulver: Ry 45. — Für Brausepulver vgl. L. S. 138; Beispiele die beiden officinellen *Pulveres aërophori*, Ry 578 (*Kali carbon. acidul.*)], Zuckerwerkformen [Ry 46, 47], Auflösungen und Mixturen [Dr. 2 auf L. 1, alle 2–1 St. 2 Essl.; mit einem

Syrup (Unc. 2 oder mehr). — Oder (*Mist. ex Ac. tart. PH. MIL.*) Dr. 1 auf L. 1, Zucker Unc. 1, 2stündl. $\frac{1}{2}$ Tasse. — Ry 331 (*Elect. e Senna*); zum Getränk [entweder das Limonadenpulver Ry 45, welches der Kranke in beliebig vielem Wasser auflöst; oder Dr. 1-2 mit *Syr. Cerasor.* oder *Rubi Id.* Unc. 1-2, wozu der Kranke noch Zucker *q. pl.* setzen kann, auf 1 Quart Wasser. — Nur in sehr geringer Quantität, stark verdünnt, schmeckt die Weinsteinssäure angenehm, dem Citronensaft ähnlich; diese Regel gilt auch für die Bereitung von Punsch mit Weinsteinssäure; nur, wenn man zu viel von der Säure nimmt, schmeckt der Punsch unangenehm und wirkt nachtheilig auf die Verdauung. Die Conditoren wissen von dieser Regel, da die Weinsteinssäure wohlfeiler ist als der Citronensaft, guten Gebrauch zu machen. Vgl. den Anhang Getränke].

45.

Ry *Acidi tartarici* Dr. 2
Elaeosacch. Citri (Gtt. 4-6) Unc. 3.
M. f. Pulv. D. S. Limonadenpulver (auf 2 Tage).

Ähnlich *Pulv. refrigerans* PH. SLESV., aber mit nur $1\frac{1}{2}$ Tropfen Öl (gar wenig); 1 Unze 6 Shl. — *Pulv. refrigerans* PH. HANN. mit 6 Tropfen Öl, aber nur 1 Unze Zucker (zu wenig, oder der Kranke muss mehr dazu thun; richtet man dies jedoch so ein, um zu ökonomisiren, so könnte man ja lieber gleich den ganzen Zucker im Hause zusetzen lassen); 1 Unze $4\frac{1}{2}$, 4 Unzen 14 Mgr. — *Pulv. ex Ac. tart. PH. MIL.*, ohne Öl.

46.

Ry *Acidi tartar. pulv.* Dr. 2
Sacch. albi pulv. Unc. 4
Mucil. Gm. Tragac. q. s.
ut. f. Trochisci 80, *Sacch. Lact. conspergendi, leni cal. torrendi. D. in scatula.* — Bei Durst auf der Reise, bei Erhitzung oder Fieberhitze öfters 1-2 Stück.

47.

Ry *Sacch. albi* Unc. 4
coqus c. Aq. comm. q. s. ad. consist. tabulandi, adde
Acidi tartar. pulv. Dr. 2
Ol. Citri Cortic. Gtt. 12.
F. Morsuli 32. *D. in scatula.* — Bei Durst oder Erhitzung öfters $\frac{1}{2}$ - 1 Stück.

Adeps suillus (suilla). Axungia Porci. Schweinefett od. -Schmalz. [1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave: s. I. S. 35 sub 10.* — Das gewöhnlichste Constituens von magistral verschriebenen Salben. [Da es selbst Salbenconsistenz hat, kann es sowohl feste als flüssige Stoffe noch in einer gewissen Quantität aufnehmen, vgl. I. S. 276, 277. — Bei Individuen mit empfindlicher Haut wird es oft nicht gut ertragen, namentlich nicht gut in Augensalben; man wählt dann statt seiner eine Mischung von Mandelöl mit Wachs, Wallrath oder Cacaobutter, p. p. — Angenehmer als das reine Schweinefett ist das etwas wohlriechende *Ungt. rosatum.*]

Aerugo. Viride Aeris. Cuprum subaceticum. Grünspan. Basisches essigsaures Kupfer. [In Wasser unter partieller Zersetzung unvollkommen löslich. — 1 Unze $2\frac{1}{2}$ Sgr., *subt. pulv.* $3\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave* [mit durch Erfahrung sanctionirten Ausnahmen; so z. B. bei dem officiellen Liniment u. Unguent] Mineralsäuren, Kleesäure, Blausäure, Hydrothionsäure; Arsenik, Zink, Eisen, Blei; Schwefelmetalle; viele Salze [namentlich kohlensaure u. blausaure Alkalien, arsenichtsäure Salze, phos-

phosphorus Natron, Iodkalium]; Gerbstoff, Zucker, Manna, Honig, Eiweiss.

Innerl. (fast ausser Gebrauch. — $\frac{1}{2}$) zu Gr. $\frac{1}{2}$ - 1, einigemal tägl. in Pulver, Pillen.

Ausserl. als ätzendes Streupulver [für unreine, wuchernde Geschwüre — etwa mit rothem Präcipitat], in Linimenten u. Salben [etwa die officinellen Formeln. Oder Dr. 1 auf 1 Unze Fett. Auch hier oft mit rothem Präcipitat. — Ry 156 (Bals. Peruv.)], Ceraten [offic.], Pflastern [z. B. Ry 48]; auch wohl in Augengewässern [mittelst besonderer Compositionen aufgelöst, z. B. in der bekannten *Aqua saphirina s. coelestis*. PLENCK II od. SCARPAE, die aber jetzt in der PH. BOR. durch die zweckmässiger bereitete *Aq. coerulea* ersetzt ist. — Sonst ist der Auflöslichkeit in Wasser wegen das (neutrale) *Cuprum aceticum* bequemer.]; etc.

48.

Ry *Ceras flavae* Unc. $\frac{1}{2}$

Ol. Olivar. Dr. 1.

Leni igne liquatis et paululum refrigeratis addo

Ammoniaci depur. Unc. $\frac{1}{2}$,
olea cum

Tenebenth. comm. Dr. 1

leni calore liquatam, et

Aeruginis pulv. Dr. $\frac{1}{2}$.

M. f. Emplastr. D. — Auf Linnen gestrichen auf das Hühnerauge zu legen; sobald es abfällt, ein Fussbad, Abschaben des Hühnerauges, und das Pflaster wieder neu auflegen. (RUST.)

AETHERES. Die Ätherarten od. Naphthen. [Die Chemiker machen einen Unterschied zwischen Äther und Naphtha*, die Praktiker nicht.] Es sind 3 Präparate dieses Namens officinell. Sie lassen sich in allen Verhältnissen mit Alcohol vermischen [es gehören hieher die officinellen *Spiritus ætherei*, s. den Artikel]; vom Wasser aber erfordern sie eine bestimmte Quantität, um sich darin aufzulösen. [Schwefeläther 10, Essigäther 7 Theile; vgl. I. S. 135]. Sie lösen ätherische u. fette Öle, feste Fette, Campher, Balsame, die meisten Harze, Caoutchouc, Amber [fast vollständig], Wachs, Phosphor, mehrere organische Säuren [Essig-, Benzö-, Gallus-Säure etc.], mehrere Alkaloide u. s. w. auf. — Die hauptsächlich zu meidenden Verbindungen s. I. S. 37; man mei-

*) Den wir hier nur kurz durch Folgendes andeuten wollen: Äther ist das Oxyd des Ethyls, eines aus Kohlenstoff und Wasserstoff ($C_4 + H_{10}$) zusammengesetzten Radicals. Von den officinellen Präparaten gehört dahin der sogenannte Schwefeläther. — Alcohol ist ein Hydrat des Äthers (wird ihm durch eine mächtige chemische Verwandtschaft Wasser entzogen, so bildet sich Äther). — Naphthen sind salzähnliche chemische Verbindungen entweder des Äthers (des Ethyloxyds) mit einer Sauerstoffsäure (so von den officinellen Präparaten die Salpeter- und Essig-Naphtha) oder des Ethyls mit einem Salzbildner (so von den officinellen Präparaten die Chlor-Naphtha). Genauer s. b. LIEBIG in Annal. d. Pharm. Bd. 9. H. 1.

det; aber überhaupt [mit einigen bestimmten — ihres Orts zu berührenden — Ausnahmen] die Verbindungen mit mineralischen Mitteln meistens.

Über die Darreichung des *Aether phosphorat.* s. den Artikel. Schwefel- und Essigäther eignen sich fast nur für flüssige Arzneiformen; bisweilen lässt man sie [häufiger aber einen ätherischen Spiritus] wohl Pulvern unmittelbar vor dem Einnehmen [wenn sie bereits eingelehrt sind] zusetzen. Am häufigsten giebt man sie in Tropfen oder [etwa mit einem aromatischen Wasser, z. B. Zimmt-, Kirsch-, Orangenblüth-Wasser] in einem Julep oder, besonders zweckmässig [indem der Syrup das Entweichen des Äthers sehr verhindert], in einem Linctus [z. B. Dr. 1 Äther mit *Syr. Flor. Aurant.* Unc. 1-2]; oder man setzt sie, doch dann meist nur als verdauungsunterstützende, Geschmack und Geruch verbessernde Zusätze und nicht leicht in voller Gabe, zu Elixiren, auch [nach dem Erkalten der Colatur] zu Aufgüssen oder Abkochungen. Für Emulsionen gilt von mässigen Quantitäten Äther dasselbe, was vom Weingeist, s. I. S. 182. — Wenn man sie äusserlich als Augenmittel anwenden will, so ist die Stufenleiter für die verschiedenen Applicationsarten folgende: zuerst lässt man sie, in die Hand getropfelt, verdampfen und den Dampf an das Auge streichen [vgl. I. S. 385]; später geht man zu Einreibungen in die Augenlieder und die Umgegend des Auges über; endlich darf man, doch nur bei höchst torpiden Augen, und wo man eine sehr starke Reizung beabsichtigt, sie selbst eintropfeln.

Bei der innerlichen Anwendung der Naphthen hat man in der Regel wegen der Flüchtigkeit der Wirkung die Gaben häufig, unter Umständen selbst alle $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{4}$ St., zu wiederholen.

Aether aceticus. Naphtha Aceti. Essigäther; Essignaphtha. [Spec. Gewicht = 0,885-0,895. — 1 Drachme $2\frac{2}{3}$ Sgr.] Sol. 7. — Cave: s. *Aetheres*.

Innerl. in leichteren Fällen zu 5-15, in schwereren zu 20-40 Tropfen; die kleineren Gaben öfters tägl. [Man rechnet auf die Drachme etwa 180 Tropfen.] Pur [die kleineren Gaben auf Zucker, die grösseren — um den penetranten Geschmack zu mildern, dass er erträglich u. selbst angenehm werde — in Zuckerwasser oder Thee] od. in Tropfenmixturen [Ry 49; 1071 (*Tinct. Op. simpl.*)], Juleps [etwa Dr. $\frac{1}{2}$ -1 auf den Tag. — Ry 3 (*Acet. concentr.*)]; oft als Zusatz zu Aufgüssen, Abkochungen, Elixiren, Mixturen [vgl. *Aetheres* u. viele Beispiele durch das ganze Werk].

Äusserl. als Riechmittel, auch wohl zu Einreibungen [in Stirn, Schläfen, z. B. bei Ohnmachten], als Augenmittel [vgl. *Aetheres*], u. s. w.

49.

R_x *Aether. aetici*
Tinct. Castorei ana Scr. 1

Ol. Valerian. Gtt. 5.

M. D. S. Viertelstündl. 20 Tropfen, bis
 der Krampfanfall vorüber. (Bei hysterischen, hypochondrischen Krämpfen.)

Aether phosphoratus. Aether sulphuricus phospho-

ratus. Gephosphorter Schwefeläther. Eine möglichst gesättigte Auflösung des Phosphors in Schwefeläther. — 1 Unze wird, da gewöhnlicher, Weingeist und Wasser haltender, Äther nur etwa $\frac{1}{40}$ seines Gewichts Phosphor auflöst, etwa nur 2 Gran Phosph. enthalten; man kann deshalb in diesem Präparat den Phosphor nicht füglich in voller Dose geben, weil man zu viel Äther mitgeben müsste. (Wie man den Phosphor in voller Gabe und doch mit Äther geben könne, s. unt. *Phosphorus*.) Überdies ist es eine sehr üble Eigenschaft des Präparats, dass die Auflösung gesättigt ist: der Äther darf nur durch etwas nachlässige Bewahrung, öfteres Öffnen, Wärme p. p. leiden, so fällt etwas Phosphor nieder; eben dies geschieht, wenn man das Präparat zu kalt aufbewahrt, es muss also sorgfältig in der gewöhnlichen Zimmertemperatur gehalten werden; eben so scheidet sich Phosph. aus, wenn man das Präparat durch Weingeist (Tincturen) oder Wasser verdünnt. Will man das (entbehrliche, durch eine magistral verordnete Auflösung leicht zu ersetzende) Präparat (dessen ganzer Nutzen darin besteht, dass es mitunter einige Zeitersparnis gewährt) anwenden, so ist es rathsam, immer einen Zusatz von ätherischem oder fettem Öl zu machen, welcher, da diese Flüssigkeiten den Phosphor auch, und zwar in grösserem Verhältniss als der Äther, auflösen, der Ausscheidung am sichersten begegnet. Man lässt dann die Einzeldose tropfenweise in einem stark schleimigen Vehikel nehmen, und schärft ein, dass die Arznei (die in einem schwarz umzogenen Glase zu verabreichen ist) vor Luft, Wärme und Kälte bewahrt werde. — 1 Drachme $1\frac{3}{4}$ Sgr.

Innerl. (*ad Guttas decem!*) zu 8-20 Tropfen, alle 2-1- $\frac{1}{2}$ St. [äut Dr. 1 rechne man 200 Tropfen], in den oben angegebenen Verbindungen [Beispiele: R_x 50, 51].

50.

R_x *Aether. phosphorati Dr. 1*
Ol. animal. aether. Scr. 1.

M. D. in vitro charta nigra invol. S.
 Alle 2-1 St. 10-20 Tropfen in starkem
 Haferschleim.

† *Ol. Cantharid. infus. (PH. SLESV.)*
 Gtt. 8

— *Cajeputi Dr. $\frac{1}{2}$.*

M. D. in vitro charta nigra invol. S.
 4mal tägl. 10-12 Tropfen in starkem
 Haferschleim. (Bei Lähmungen torpider Subjecte.)

51.

R_x *Aether. phosphorati Scr. 2*

Aether sulphuricus. Naphtha Vitrioli. Oleum Vitrioli dulce. Schwefeläther. Vitriolnaphtha. [Spec. Gewicht = 0,730-0,740. — 1 Drachme $1\frac{1}{2}$ Sgr. Zum äusserlichen Gebrauch darf man den *Aether sulphur. venalis*, 1 Drachme $\frac{1}{2}$ Sgr., anwenden.] *Sol. 10* [vgl. *Aetherea*]. *Cave:* er wird nicht so leicht zersetzt als die Naphthen, so dass hier nur besonders concentr. Salpeter- und Schwefelsäure, kaust. Alkalien [auf längere Zeit] und Chlor zu caviren sind.

Innerl. (*ad Guttas viginti!*) zu 5-15 Tropfen alle 2-1 St., in dringenderen Fällen [z. B. Ohnmachten, Schlagflüssen — sobald der Kranke schlucken kann] zu 20-60 Tropfen (u. mehr) alle $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{4}$ St.; in diesen dringenderen Fällen am besten pur, doch die Einzelgaben wohl, um den gar zu penetranten Geschmack zu mildern, etwas verdünnt, mit Zuckerwasser, Thee, Wein od. dgl., eingeflößt. Sonst — die gewöhnlichen, kleineren Gaben — auf Zucker od. in Mixturen, Juleps [etwa Scr. 1-Dr. 1 auf den Tag. Man rechne auf die Drachme 200 Tropfen. — Ry 52, 53; 419 (*Flor. Arnic.*), 1071 (*Tinct. Opii simpl.*)]; s. auch *Ol. Cass. cinnam.*]; oft als corrigirender Zusatz zu Aufgüssen, Abkochungen, Elixiren u. s. w.

Aüsserl. als Riechmittel [z. B. bei Ohnmachten; — bei Scheintodten ist meist *Liq. Ammon. caust.* als kräftiger vorzuziehen], zu Einreibungen [bei örtlichen asthenischen Nervenaffectionen, z. B. Schwindel, Zahnschmerzen (wo man ihn auch in den hohlen Zahn bringen kann), Kopfschmerzen], Auftröpfelungen [z. B. auf eingeklemmte Brüche, auf Varicocelen, um durch schnelle Verdunstung Kälte und Zusammenziehung der vorgefallenen Theile zu bewirken], Injectionen [z. B. einigemal tägl. einige Tropfen in den Gehörgang, bei Schwerhörigkeit], auch wohl in Klystieren [bei Ohnmächtigen, Scheintodten — scrupel- u. drachmenweise]; als Augenmittel [vgl. *Aetheres*. — Zum Einreiben ums Auge etwa noch mit $\frac{1}{2}$ Perubalsam (*ANDREAE's Augenspiritus*). — Ry 651 (*Liq. Ammon. caust.*)] u. s. w. Ry 54.

(Innerl. u. aüsserl. als Auflösungsmittel des Phosphors, Camphers — vgl. die Artikel.)

52.

Ry *Aether. sulphurici* Unc. $\frac{1}{4}$

Ol. Terebinth. rft. Dr. 2.

M. D. S. Jeden Morgen 1 Quentchen mit Molken, bis ein Pfund verbraucht worden. (Passender wohl: 15-30 Tropfen einigemal tägl. — Gegen Gallensteine.)

DURANDE.

53.

Ry *Aether. sulphurici* Dr. 1

Extr. Chin. fusc. frig. par. Dr. 2

Aq. Flor. Aurant. Dr. 10.

Solvs. D. S. Theilöffelweise. (Als Analepticum.)

BERENDS.

54.

Ry *Ol. Anisi* Gtt. 15

Aether. sulphurici Dr. 1.

M. D. — Den Kamm damit zu befeuchten und die Haare öfters durchzukämmen. (Bei Ungeziefer als — unterhaltender — Ursache von Kopfgriind.)

WENZEL.

Aloë lucida. A. succotrina. Glänzende Aloë.

[Hauptbestandtheile: drastischer bitterer Extractivstoff und Harz. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$; *gr. pulv.* $1\frac{1}{2}$, *subt. pulv.* 28gr.] In Weingeist ganz, in Wasser zum größten Theil löslich. — *Cave* [mit sanctionirten Ausnahmen]: concentrirte Mineralsäuren [besonders Salpetersäure]; Salzbilder; kaust. Alkalien; mehrere Metallsalze [besonders *Aurum muriat.*, Sublimat, salpeters. Quecksilber u.

Silber, essigs. Blei]; in Auflösungen Ochsen-galle [gibt eine widerlich süsse, leicht Uebelkeit erregende Verbindung].

In n. erl. als Reizmittel zu Gr. $\frac{1}{2}$ - 1, 2-3 mal tägl.; als gelind eröffnendes Mittel Gr. 2-3 auf einmal [z. B. nach BERENDS bei Hartleichtigkeit in der Mittagsuppe]; als Drasticum Gr. 5-15-20 in einigen Portionen bald hinter einander. Am besten in Pillen [Sie kann allein, mit ein wenig Weingeist, zu Pillen geformt werden; schöner noch werden die Pillen, wenn man Seife oder ein Extract od. dgl. zusetzt. — Ry 55-58. — *Pilulae Rufi s. Aloës cum Myrrha* PH. BLESV.: Aloë 1, Myrrhe, Safran ana $\frac{1}{2}$, † *Syr. Foenic. q. s.*; daraus, nach alter unpassender Weise, Zweigran-Pillen.] oder Bissen [Ry 59]; nicht gern, des schlechten Geschmacks wegen [den Zimmt noch am erträglichsten verbessert], in Pulver [*Pulv. Sulphuris compositus (Flores Sulph. comp.; Species hierae-picrae)* PH. HANN.: Safran 1, Aloë, Myrrhe ana 24, Schwefel 48. — 1 Drachme $1\frac{1}{2}$ Mgr.] oder flüssiger Form [offic. *Tinct.*]. — Über CARVELA's antirrhachitische Methode vgl. dessen Schrift, übers. v. MELICHER, herausg. v. NASSE. 1835.

Ausserl. als Einstreupulver [bei atonischen, unreinen u. s. Geschwüren, doch selten unvermischt, sondern meist mit Zucker, Kohle, Kamillen-, China- oder Eichenrioden-Pulver, Campher, Myrrhe od. dgl. — Ry 60], auch endermatisch [als Purgans, zu Gr. 4-10 (od. mehr), nöthigenfalls nach einigen Stunden wiederholt; — nach A. L. RICHTER sehr unzuverlässig]; in Augenpulvern [Gr. 5-15 auf Dr. 2], Augensalben [Gr. 2-4 auf Dr. 2. Ry 1106 (*Zinc. oxyd.*)] u. a. Salben [Ry 61], Augensäften [selten; zu filtriren; gewöhnlicher das Extract. — Ry 430 (*Fol. Nicot.*)].

55.

Ry *Aloës lucid. pulv.* Scr. 1
Rad. Rhei pulv.
Sapon. medic. pulv. ana Dr. 1
Extr. Tarax. q. s.
 ut f. *Pilulae* 60. *Consp. Pulv. Rad. Irid. Flor. D. S.* Fröh u. Abends 6-8 Stück (um gelind abzuführen).

56.

Ry *Ferri pulverati* Scr. $\frac{1}{2}$
Aloës lucid. pulv. Scr. 2
Extr. Colocynth. Ser. 1
Mucil. Gm. Mim. q. s.
 ut f. *Pilulae* 40. *Consp. Pulv. Cass. cinnam. D. S.* Abends 1-2 Stück. (Bei habitueller Leibverstopfung.)
Pilulae aperientes STAHLII.

57.

Ry *Ammoniaci depur.* Dr. 2

Aloës lucid. pulv.

Ferri pulv. ana Dr. $\frac{1}{2}$

Extr. Tarax. q. s.

ut f. *Pilulae* 90. *Consp. Pulv. Cass. cinnam. D. S.* 3mal tägl. 3.

58.

Ry *Pulv. Aloës lucid.* Dr. $\frac{1}{2}$

— *Myrrhae* Dr. 1

— *Croci* Dr. $1\frac{1}{2}$

Extr. Aurant. Cort. q. s.

ut f. *Pilulae* 120. *Consp. Pulv. Croci. D. in vitro. S.* 3mal tägl. 4.

59.

Ry *Aloës lucid. pulv.* Gr. $\frac{1}{2}$ - 1

Ferri oxydul. nigri Gr. 2

Extr. Myrrhae

Pulv. Rad. Gentian. rubr. ana Gr. 5

Extr. Millefol. q. s.

ut f. *Bolus. Consp. Pulv. Croci. Disp.*

tal. nr. 6. D. S. 2-3mal tägl. 1 Stück.

60.

Rx Aloë lucid.

Myrrhas ana Dr. 1

Carbon. ppt. Unc. $1\frac{1}{2}$.

M. f. Pulv. D. S. Tägl. 1-2 mal einzustreuen, u. vor der Wiederholung des Einstreuens mit lauem Wasser abzuspülen. (Bei stinkenden atonischen Geschwüren.)

VOGT.

61.

Rx Aloë lucid. pulv. Dr. 1

Fellis Tauri insp.

Petrolei ana Dr. $1\frac{1}{2}$

Adip. suillt Unc. $1\frac{1}{2}$.

M. f. Ungt. D. S. 3mal tägl. 1 Theelöffel voll in die Nabelgegend einzureiben. (Gegen Eingeweidewürmer u. besonders durch sie erregte Kolikschmerzen. — Man kann auch auf 1 Unze der Salbe etwa noch Dr. 1 Campher oder Scr. 1 Ol. Tanacet. oder Dr. $\frac{1}{2}$ Ammon. carbon. pyro-oleos., oder Dr. 3 Seife setzen. — Statt des alten Ungt. de Arihanita.)

PH. BAT.

Eine minder zweckmässige Composition ist das Ungt. contra Vermes PH. SLRS V. aus eingedickter Ochsen-galle, Aloë, Schwefel, Colocynth. ppt., Wermuth- u. Rosmarin-Öl, und Butter. (1 Unze 6 Shl.)

Alumen. *Alumen crudum s. glaciule s. saccharinum. Sulphas aluminico-kalicus cum aqua, aut aluminico-ammonicus c. aq.* Alaun, roher od. gemeiner. Schwefelsaure Thonerde mit schwefelsaurem Kali od. schwefels. Ammonium. [Reagirt sauer. — 1 Unze $\frac{1}{2}$ Sgr., subt. pulv. 1 Sgr.] Sol. 13. — *Cave* [mit sanctionirten Ausnahmen]: reine, kohlen-saure u. hydrothionsaure Alkalien u. alkalische Erden [Kalkwasser]; viele Salze [Baryt-, Bleioxyd-, Quecksilber-Salze; borsaures, phosphors., salpeters. Natron; bernsteins., salzs. Ammoniak; neutrale weinsteinsäure Salze etc.]; mehrere organische Stoffe [thierischen Leim, (Gerbstoff), Kiweiss, Quittenschleim. — Er bildet mit Farbstoffen häufig unlösliche Verbindungen. Er schlägt die meisten sogenannten Extractivstoffe in Flocken nieder, u. müssen besonders aus diesem Grunde alle zu Injectionen, z. B. in die Harnröhre, bestimmten, mit Alaun versetzten gerbestoffigen Flüssigkeiten (also Abkochungen von Rinden etc., Auflösungen von gerbestoffhaltigen Extracten etc.) nach vorhergegangenem schnellen Erhitzen u. Wieder-erkalten lassen filtrirt werden].

Innerl. zu Gr. 4-10-20 [in nicht dringenden Fällen versuche man erst mit den kleineren Gaben, wie das Mittel vertragen wird], nach Umständen alle 3- $\frac{1}{2}$ St.; in der Regel gern etwas eingehüllt [durch Gummi, Zucker (vgl. *Sacchar. aluminat.*), flüssige Schleime od. dgl.]. In Pulvern [z. B. mit Zucker zu gleichen Theilen: das officinelle *Sacchar. aluminat.* — Ry 62, 63], Pillen u. Bissen [z. B. mit *Catechu ana* u. *Extr. Gent. q. s.* zu zweigranigen (!) Pillen: *Pil. adstringentes* PH. P.], Latwergen [Ry 64], Auflösungen u. Mixturen [Ry 65-68. — In Auflösung giebt GENDRIN seine sehr grossen Gaben zur Heilung oder Verhütung der Bleikolik, etwa Dr. 2 in Unc. 4, mit 2 Unzen eines schleimigen Syrups, dies in 4 Portionen tägl. zu verbrauchen (2 St. vor und 1 St. nach dem Einnehmen nichts zu essen); wenn Erbrechen oder Durchfall eintritt, geringere Dosen.]; zu Molken [s. I. S. 317 u. *Ser. Lact. aluminat.*].

Aüsserl. [in Pulvern und pulveraufnehmenden Formen immer sehr fein gepulvert] zu Mund- u. Schlundpulvern [pur; so lässt ihn z. B. VELPEAU bei einer Entzündung im Munde, welche daherg rührt, dass ein Theil der Schleimbaut zwischen die Backenzähne hervortritt und gequetscht wird, 2-4 Tage lang Morgens und Abends auftouchiren. So auch zum Einblasen in den Schlund bei verschiedenen Bräunen (LÖFFLER, VELPEAU), bei Croup (BRETONNEAU). Vgl. I. §. 116.], Mund- u. Gurgelwässern [Dr. $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$ auf Unc. 6. — Ry 69, 70], Pinselsäften [Dr. $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$ auf 1 Unze Saft], Zahnfleischlatwergen [Ry 71; ein anderes Beispiel I. S. 303], Zahnpulvern u. Zahnlatwergen [vgl. I. S. 218, Z. 9, 14, 21], Klystieren [selten; Scr. $\frac{1}{2}$ -Dr. $\frac{1}{2}$] u. anderen Injectionen [Dr. $\frac{1}{4}$ -1 (u. mehr) auf Unc. 6. — Ry 72], Schnupfpulvern [Ry 73, 74], Augenpulvern [Scr. $\frac{1}{2}$ bis höchstens Dr. 1 auf Dr. 2], Augewässern [zu Augenwaschwässern u. Bähungen Gr. 15-Dr. 1 auf Unc. 4; zu Augentropfwässern Gr. 5-10 auf Unc. $\frac{1}{2}$], Augensalben [Gr. 4-6 auf Dr. 2] u. anderen Salben [z. B. Dr. 1 auf Unc. 2 Butter, mit Charpie oder Leinwand einmal tägl. frisch aufgelegt; SUNDELIN bei varicösen Hämorrhoiden. — Ry 75, 76; 792 (Op.), 1083 (Sulph. dep.)], Streupulvern [z. B. mit Colophon. und Gm. Mimos. ana: Pulv. stypticus PH. HASS., HANN., SLESV. (1 Unze 3 Mgr.). — Ry 77], Umschlägen u. Waschungen [z. B. Unc. 1 auf Brantwein L. 1: 8. G. MORTON's Waschmittel zur Beschränkung der phthisischen Nachtschweisse. — Ry 78]; um den Gestank von Nachstühlen, Nachttöpfen p. p. temporär zu beseitigen [einige Dr. Alaun reichen hin, um den Geruch von einem solchen Gefäss für eine Nacht zu tilgen: PAYEN].

62.

Ry *Opii puri* Gr. $\frac{1}{2}$
Aluminis Scr. $\frac{1}{2}$
Pulv. gummosi Dr. $\frac{1}{2}$.
 M. f. *Pulv. Disp. tal. dos. nr. 8. D. S.*
 Alle 4-3 St. 1 Pulv. (Bei Ruhr, colliquativen Durchfällen.) WEBER.

63.

Ry *Opii puri* Gr. 3
Kino Gr. 24
Aluminis Dr. 2
Sacch. Lactis Dr. 1.
 M. f. *Pulv. Div. in 6 part. aeq. D. S.*
 Alle 3 St. 1 Pulver. VOGEL.

64.

Ry *Pulv. Aluminis* Dr. 1
 — *Cinnam. acuti* Scr. 2
 — *Rad. Ratanh.* Dr. 2
Mell. rosati Unc. 1 $\frac{1}{2}$.

M. f. *Electuar. D. S.* 4 mal tägl., umgerührt, einen reichlichen Theelöffel voll.
 VOGT.

65.

Ry *Sem. Papaver.* Unc. 1
Aq. comm. Unc. 7
 f. *Emulsio*; in *Colat. solve*
Aluminis Dr. $\frac{1}{2}$ (und allmählig mehr)
 et adde
Syr. simpl. Unc. $\frac{1}{2}$.
 M. D. S. Umgeschüttelt 2stündl. 2 Essl.
 (Gegen Bleikolik.) GÖTZE.
 Die natürliche Emulsion wird zwar durch den Alaun coagulirt; doch genügt das Umschütteln.

66.

Ry *Aluminis* Scr. 2
solve in
Aq. Menth. pip. Unc. 2
 adde

Tinct. Cinnamomi Unc. $\frac{1}{2}$

Syr. Capit. Papav. Unc. 1.

M. D. S. Anfangs stündl., späterhin alle 2-3 St., umgeschüttelt, 1 Essl. (Bei Menstrorrhagien.)

PLENCK.

Der Gerbestoff in der *Tinct. Cinnam.* ist nicht so copiß, dass man deshalb die Composition verwerfen müsste; doch muss deshalb umgeschüttelt werden.

67.

Ry *Aluminis* Dr. 1

solve in

Aq. Rosar. Unc. 4

adde

Syr. simpl. Unc. 1.

M. D. S. Esslöffelweise. (Bei Mutterblutflüssen ohne entzündlichen Zustand.)

Potio aluminosa des Hôpital de la Maternité.

68.

Ry *Aluminis* Dr. 2

Gm. Mimos. electi Unc. $\frac{1}{2}$

solve in

Aq. Salo Unc. 5

adde

Syr. simpl. Unc. 1.

M. D. S. 2stündl. 1 Essl.

69.

Ry *Aluminis* Dr. 1 (od. mehr)

solve in

Decocti Sem. Hord. excort. Unc. 10

adde

Syr. Capit. Papav. Unc. $\frac{1}{2}$.

M. D. S. Gurgelwasser. (Gegen Heiserkeit; namentlich für Sänger.)

BENNATI.

70.

Ry *Aluminis* Dr. 1

solve in

Aq. Salo Unc. 6

adde

Tinct. Pimpinell. Unc. $\frac{1}{2}$

Syr. Moror. Dr. 6.

M. D. S. Gurgelwasser, umgeschüttelt. (Bei atonischer Bräune.)

VOGT.

71.

Ry *Aluminis sublt. pulv.* Dr. 1

Extr. Ligni Campech. pulv. Unc. $\frac{1}{2}$

Bals. Peruv. Gtt. 6

Aq. Salo. q. s.

ut f. *Electuar. D. S.* Zahnfleisch-Latwerge.

72.

Ry *Aluminis* Gr. 10-15

Ferri sulphur. cryst. Gr. 5

solve in

Aq. destill. Unc. 2 $\frac{1}{2}$

adde

Mucil. Gm. Mim. Unc. $\frac{1}{2}$.

M. D. S. Zum Einspritzen. (Bei einer sehr hartnäckigen atonischen Gonorrhoea secundaria.)

73.

Ry *Aluminis* Scr. 1

Extr. Ratanh. exotici

Cort. Querc. ana Dr. 1.

M. f. Pulv. D. S. Schnupfpulver. (Gegen Auflockerung der Nasenschleimhaut aus reiner Atonie.)

VOGT.

74.

Ry *Sanguin. Draconis* Dr. $\frac{1}{2}$

Aluminis

Boli Armenae ana Dr. 1

Ferri oxydati rubri Dr. 2.

M. f. Pulv. subtiliss. D. S. Schnupfpulver. (Gegen Nasenbluten.)

GRIFFITH.

75.

Ry *Opii pulv., c. paux. Aq. in pullem redacti* Dr. $\frac{1}{2}$

Alumin. pulv. Dr. 1 $\frac{1}{2}$

Ungt. plumbici Unc. $\frac{1}{2}$.

M. D. — (Zur Erleichterung der Reposition von eingeklemmten Hämorrhoidal-knoten — nachdem vorher Blutegel angewandt — einzureiben. Die Salbe brennt zwar anfangs sehr, aber nach der 2ten oder 3ten Einreibung reponirt sich der Knoten.)

RUST.

76.

Ry *Camphorae triti.*

Opii pulv. ana Scr. 1 - Dr. $\frac{1}{2}$

lax c.

Bals. Paruw. Dr. 1

add

Aluminis pulv. Dr. $1\frac{1}{2}$

Ungt. plumbici Unc. $\frac{1}{2}$.

M. f. *Ungt. D. S.* Frostsalbe. (Bei Frostbeulen 2ten Grades.) RUST.

77.

Ry *Aluminis* Scr. 1 - 2

Gm. Mimos. Unc. $\frac{1}{4}$.

M. f. *Pulv. subtil. D.* — Die wunde Brustwarze unmittelbar nach dem Abwaschen mit Brantwein damit einzustreuen und vor dem Anlegen des Kindes wieder mit lauem Wasser abzuwaschen. VOGT.

78.

Ry *Aluminis* Dr. 1

solvs in

Aq. Rosar.

— *Sambuci* ana Unc. 1

add

Spir. Fini rst. Unc. $\frac{1}{2}$

Album. Ovi unius.

M. D. S. Zum Waschen, umgeschüttelt. (Gegen Excoriationen von langem Liegen.) NIEMANN.

Die starke Coagulation des Eiweisses, die durch den Alaun und den Weingeist erfolgt, liegt wohl in der Absicht des Autors (sonst könnte man statt des Eiweisses Mimosengummi nehmen). Ein Waschen (Reiben) möchte aber bei Excoriationen minder passend seyn als blosses Umschlagen.

Alumen ustum s. calcinatum. Sulphas aluminico-kalicus. Gebrannter Alaun. [1 Unze 28gr.] Nur äusserl. (≠), immer höchst fein gepulvert, zu Augenpulvern [Scr. $\frac{1}{2}$ - Dr. $\frac{1}{2}$ auf Dr. 2. — Ry 79], Streupulvern [um gelind zu ätzen — Ry 556 (*Hydr. oxyd. rubr.*) — oder auch, in Verbindung mit *Gm. Mimos.*, um Blut zu stillen]; auch wohl [mit Fett q. s.] zu gelind ätzenden Salben.

79.

Ry *Aluminis usti*

Zinci sulphurici

Boracis ana Scr. 1

Sacch. albi Scr. 2.

M. f. *Pulv. subtiliss. D. S.* Augenpulver. (Gegen Verdunkelungen der Hornhaut.)

BERN.

+ *Alumina pura.* Reine Thonerde. [Weisses, unauf lösliches Pulver. — 1 Drachme 28bl.] *Cave:* Säuren. — Innerl. zu Gr. 5-10, einigemal tägl., mit Schleim; in Pulver [etwa mit *Gm. Mimos.* und Zucker oder mit *Pulv. gammos.*], Schüttelmixtur [z. B. in einer Samen-Emulsion].

Ambra grisea. Grauer Amber. [1 Scr. 23 $\frac{1}{2}$ 8gr.] Fast ganz auflöslich in Schwefeläther; in Alcohol nur partiell.

Innerl. zu Gr. 2-20, mehrmals tägl. (Schon der Theure wegen versuchsweise erst die kleineren Gaben.) In Pulver [meist die schwächste Form. — Mit (wenigstens 2-3 Theilen) Zucker oder einem andern trocknen Pulver recht fein abgerieben (was auch in den pulveraufnehmenden Form nöthig ist); er ist gewöhnlich zu zäh, um sich ohne solchen Zusatz pulvern zu lassen. — D. in charta cerata.], Trochisken [Ry 80; 856 (*Rad. Ipecac.*)],

Pillen [vgl. I. 8. 245 Z. 2. — D. *in vitro*], Emulsionen [nicht aber in gewöhnlichen Schüttelmixturen, denn eine so grosse Rile, wie sie beim Moschus durch vitale Indication bisweilen geboten wird, ist hier nicht leicht nöthig]; auch wohl in Äther oder *Spir. sulph. aeth.* aufgelöst [officinell: *Tinct. Amb.*, $1\frac{1}{2}$ auf 60 *Spir. sulph. aeth.*; man kann den Amber in diesem Menstruum auch in grösserem Verhältniss auflösen, z. B. *Scr.* $\frac{1}{2}$ auf *Scr.* 8 (*post sufficientem digestionem filtra*), wo dann etwa 32 Tropfen 1 Gran enthalten; doch ist auch auf diese Weise das Mittel immer noch nicht in voller Gabe zu geben, auch eignen sich dergleichen Vorschriften nicht gut für extemporane Bereitung].

Äusserl. nur etwa als Geruchscorrigens, z. B. ein sehr kleiner Zusatz zu Waschpulvern.

80.

Ry *Ambrae gris.* *Scr.* $\frac{1}{2}$ *Pulv. Rad. Zingib.*— — *Irid. Flor.*— *Catechu ana Dr. 1*— *Sacch. albi Unc. 1*

contere exactissime; addo

*Mucil. Gm. Tragac. q. s.*ut. f. l. a. *Trochisci, Pulv. Rad. Irid.**Flor. conspergendi, levissimo modo ex-**siccandi, nr. 100. D.* — (Bei üblem

Mundgeruch.)

HENSCHEL.

*Ammoniacum depuratum. Gummi Ammoniacum dep.*Gereinigtcs Ammoniakgummi. [Pulver. — 1 Unze $4\frac{1}{2}$ Sgr.]Vgl. *Gummiresinae*.

Innerl. zu Gr. 5–15 (allmählig wohl bis zu Dr. $\frac{1}{2}$), einigemal tägl. In Pillen u. Bissen [Ry 81, 82; 57 (*Aloë luc.*), 358 (*Extr. Chelidon.*), 375 (*Extr. Helleb. nigri*), 396 (*Extr. Seneg.*), 902 (*Rad. Scill.*), 914 (*Rad. Seneg.*), 957 (*Sapo stib.*), 1013 (*Sulph. stib. aur.*)]. — Mit Süßholzsaff ana Unc. $\frac{1}{2}$, *Sulph. stib. aur.* Gr. 24, daraus mit etwas Wasser nach alter unpassender Art Zwei-Gran-Pillen: *Pilulae ex Ammoniaco* PH. MIL., Latwerge [nicht gern, des schlechten Geschmacks wegen, der hier nicht durch die Vorzüge, welche die flüssige Form oft gewährt, aufgewogen wird, und den man nur unvollkommen durch *Glycyrrhiza* corrigiren kann], (unvollkommenen) Auflösungen [Ry 83–86] und Emulsionen [die man wohl Ammoniakmilch, *Lac Ammoniaci s. ammoniacale* nennt. Ry 87; 470 (*Hb. Digital.*), 956 (*Sapo medic.*)]. — Mit *Gm. Mimos. ana 1*, *Aq. Hysopi* 16: *Lac Ammoniaci* PH. SLESV.; 1 mit *Gm. Mim.* $1\frac{1}{2}$, † *Aq. Puleg.* 16: *Lac Ammon.* PH. HANN.; beide Präparate würden in 1 Essl. 15 Gran enthalten, wenn sie nicht colirt würden; so aber ist der Gehalt etwas unsicher und die Präparate nicht zu empfehlen].

Äusserl. zu Pflastern [vgl. *Gummiresinae*]. Oft mit Essig oder *Acet. scillit. q. s.* bereitet. Z. B. mit Essig: EVERS bei hartaäckigen alten Grindköpfen (nach Abschneiden der Haare u. Erweichung der Borken durch Fett werden Stücke Leder, mit dem Pflaster 2 Messerrücken dick bestrichen, aufgelegt und erst nach 6–8 Wochen abgenommen; soll den Vorzug vor der Pechhaube verdienen). Oder mit Meerzwiebeleessig bereitet, warm auf Leder gestrichen aufgelegt und liegen gelassen, bis es sich von selbst löst: RUST als zortheilendes Mittel, z. B. bei allerlei chronischen Verhärtungen, beim Gliedschwamm oder beim ersten Stadium einer *Arthrocare* nach beseitigter Entzündung. — Officinell: *Empl. Ammon.* — Ry 48 (*Aerugo*)], seltner zu Salben, Linimenten und Catapla-

smen [ähnlich wie das Pflaster mit der nöthigen (grösseren) Menge Essig oder Weizenweissig zu bereiten. — R 423 (Fol. Hyosc.)], selten auch zu Augenwässern [R 88].

81.

R *Ammoniaci depur.*

Extr. Helen. ana Dr. 2

Pulv. Rad. Glycyrrh. q. s.

ut f. Pilulas 120. Consp. Pulv. Rad. Irid. Flor. D. S. 3mal tägl. 5-8.

82.

R *Rad. Scillae pulv.* Gr. 3

Ammoniaci depur.

Extr. Seneg. ana Dr. 1

Sem. Anisi vulg. pulv. q. s.

ut f. Boli 12. Consp. Pulv. Rad. Irid. Flor. D. S. 3mal tägl. 1 Stück.

83.

R *Ammoniaci depur.*

tere c.

Oxymell. scillit. Unc. 1

adde

Fini stibiati Dr. 2.

M. D. S. 3-4 mal tägl., umgeschüttelt, 1 Theelöffel.

84.

R *Ammoniaci depur.* Scr. 1

tere c.

Oxymell. scillit. Unc. $\frac{1}{2}$

adde

Fini stibiati Dr. 1

Syr. Jquirit. Unc. $1\frac{1}{2}$.

M. D. S. 2 stündl., umgeschüttelt, 1 Theelöffel. (Für ein Kind von etwa 5 Jahren.)

85.

R *Ammoniaci depur.* Dr. 2

tere c.

Spir. Mindereri Unc. 3

adde

Fini stibiati Dr. 1

Oxymell. simpl. Unc. 1

Infusi Flor. Samb. Unc. 3.

M. D. S. 2 stündl., umgeschüttelt, 1 Essl.

P. FRANK.

86.

R *Ammoniaci depur.* Dr. 2

tere c.

Fini Gallici albi Dr. 10

adde

Syr. Flor. Aurant. Unc. 1.

M. D. S. Theelöffelweise (jeder Theelöffel wird 7-8 Gran enthalten).

87.

R *Ammoniaci depur.*

Succi Glycyrrh. dep. ana Dr. 2

terendo sensim mace c.

Aq. Foenic. Unc. 6

ut f. Emuls., cui adde

Syr. Cap. Papav. Unc. $\frac{1}{2}$.

M. D. S. 2 stündl., umgeschüttelt, 1 Essl.

[Bei einem Gummiharz gestützt als Emulgens der Süssholzsaff, dessen Emulsionskraft sonst sehr unbedeutend ist.]

88.

R *Ammoniaci depur.* Dr. 1

Vitellum Ovi unius

Aq. comm. Unc. 5

f. Emuls., cui adde

Tinct. Opii simpl. Gtt. 15.

M. D. — Augenbähung. (Bei entzündlicher Beschaffenheit der Augen mit Gefässschwäche.)

BRERA.

Ammonium carbonicum (s. *aëratum* s. *Alkali volatile* s. *Carbonas ammonicus*) *crudum*. Rohes flüchtiges Laugensalz. [1 Unze $2\frac{1}{2}$ Sgr.] Sol. 2-3. — Cave wie beim folgenden.

Nur äusserl. (≠), als Riechpulver [etwa noch mit ätherischen Oelen. — R₂ 89], in Pflastern [wo man jedoch gewöhnlich dem *Ammon. carb. pyro-oleos.* den Vorzug giebt], Salben [Dr. 1-2 auf Unc. 1. (So in dem später anzuführenden † *Ungt. Rorism. comp.* PH. MIL.)]; Linimenten [z. B. Scr. 1 in Scr. 5 Wasser aufgelöst, mit *Ol. Olivar.* Dr. 6], Waschwässern [etwa 1 auf 24-12]. — Zur Entwicklung von Ammoniumdämpfen wendet man besser das kaustische Ammonium an, vgl. *Gas Ammon. caust.*

89.

R₂ *Ammon. carbon. crudum* Unc. $\frac{1}{2}$
Ol. Menth. pip.

Ol. Cajeputi ana Gtt. 12.

M. f. Pulv. D. in vitro epistom. vitr. clauso. S. Riechpulver.

Ammonium carbonicum (s. *aëratum* s. *Alkali volatile* s. *Carbonas ammonicus*) *depuratum*. Gereinigtes kohlenaures Ammonium od. flüchtiges Laugensalz. [1 Unze $4\frac{1}{2}$ Sgr.] *Sol.* 2-3. — *Cave* Säuren [ausser zu Sättigungen], saure Salze; kaustische u. kohlenaure Alkalien u. alkalische Erden; erdige und metallische Salze; Wärme, Luft.

Innerl. zu Gr. 4-10, mehrmals tägl. Nicht gern in Pulvern [in denen es seiner Flüchtigkeit wegen sich nicht lange hält; wenigstens verordnet man nicht viele Gaben und lasse in Wachspapier verabreichen], eher schon in Pillen od. Bissen [doch nicht in acuten Fällen]; auch [der Unbestimmtheit der Dose wegen] nicht gern in Latwergen; also in der Regel in Auflösungen, Mixturen [Man kann sich hierzu auch des officinellen *Liquor Ammon. carbon.* (1 auf 5) bedienen; sonst etwa in einem *Inf. Rad. Valer.* od. dgl. — R₂ 90, 91.], namentlich auch Sättigungen [vgl. J. S. 138. — Etwa mit Salpetersäure, zur extemporanen Bereitung eines *Ammonium nitricum*; R₂ 92].

(Äusserl. das vorige.)

90.

R₂ *Ammon. carbon. depur.* Dr. 2
solve in

Aq. destill. Unc. 6
adde

Syr. Alth. Unc. 1.
M. D. S. 2stündl. oder öfter $\frac{1}{2}$ -1 Eeßl.
 (Als Specificum (?) gegen Scharlach in allen Formen u. Stadien, auch gegen die darauf folgende Wassersucht.)

STRAHL.

91.

R₂ *Ammon. carbon. depur.* Scr. $\frac{1}{2}$
solve in

Aq. Cinnam. simpl. Unc. 1*adde**Tinct. Capsici ann.* Dr. $\frac{1}{2}$ *Syr. Croci* Unc. $\frac{1}{2}$.

M. D. S. Vor Schlafengehn auf Einmal zu nehmen. (Gegen Alptrücken.)

WALLER.

92.

R₂ *Ammon. carbon. depur.* Dr. 1*Acidi nitrici q. s.**ad neutralisationem; adde**Aq. destill.* Unc. 3*Syr. Alth.* Unc. 1.

M. D. S. 2stündl. 1 Eeßl. BERENDS.

Ammonium carbonicum pyro-oleosum. *Sal vo-*

latile Cornu Cervi Carbonas ammonicus admixto oleo empyreumatico animali. Brenzlich-öliges kohlen-saures Ammonium; (flüchtiges) Hirschhornsalz. [1 Unze $2\frac{3}{4}$ Sgr.] *Sol.* 2-3. — *Cave* wie beim vorigen.

Innerl. zu Gr. 3-10, mehrmals tägl. In Pulvern [*D. in clava cerata*; auch hier verordne man nicht zu viele Dosen vorrätig. — R₁₈₄ (*Camph.*), 926 (*Rad. Valer. min.*)], Pillen, Bissen, Auflösungen und Mixturen [doch nimmt man für die flüssigen Formen lieber den *Liq. Ammon. carbon. pyro-oleosi*], auch wohl Saturationen [vgl. I. S. 138 Note c)].

Ausserl. zu Riechpulvern [besonders für Hysterische; vgl. *Ammon. carb. crud.*], Schnupfpulvern [meist nur in Verbindungen; bei Scheintöden aber wohl pur einzublasen], Augentropfwässern [R₉₃], Augensalben [*Scr.* $\frac{1}{2}$ -1 auf Dr. 2. — R₉₄] u. anderen Salben [Dr. 1-2 auf Unc. 1. — R₆₁ (*Aloë luc.*), 202 (*Camph.*), 232 (*Castor.*)], Linimenten, Pflastern [R₃₃₄ (*Empl. de Galb. croc.*)].

93.

R₁ *Ammon. carbon. pyro-ol.* Gr. $2\frac{1}{2}$

Fellis Tauri insp.

Extr. Conii macul. ana Gr. 15

solbe in

Aq. Rosar. Unc. $\frac{1}{2}$.

D. S. Einigemal tägl., umgeschüttelt, ins Auge zu tröpfeln. (Bei Hornhautflecken.)

MATTHE JEAN.

94.

R₁ *Ammon. carbon. pyro-ol.* Gr. 6

Fellis Tauri insp. Dr. $\frac{1}{2}$

Mellis despum. Dr. $1\frac{1}{2}$.

M. exactiss. *D. in Olla alba.* *S.* Einigemal tägl. mit einem Pinsel zu appliciren. (Bei Hornhautflecken.)

RICHTER.

Statt des als Constituens nicht empfehlenswerthen Honigs wohl zweckmässiger *Ungt. simpl.* Dr. 2, und etwa 2 Gran *Ammon. c. p. o.* mehr.

Ammonium muriaticum (Sal Ammoniacum; Hydrochloras ammonicus) crudum. Rohes Salmiak. [1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr., gr. pulv. $2\frac{1}{2}$ Sgr.] *Sol.* 3. — *Cave* wie beim folgenden.

Nur äusserl. (≠), zu Klystieren [Dr. 1-2 auf Unc. 6-8], Niesepulvern [nur als Zusatz], Riechpulvern [mit gebranntem Kalk oder kaustischem od. kohlen-saurem Kali zu gleichen Theilen zusammenge-
rieben; sehr entbehrlich, da es einfacher ist, flüssiges Ammonium als Riechmittel zu geben. Wohl aber bedient man sich passend bei anderen Gelegenheiten (vgl. *Gas Ammon. caust.*) des rohen Salmiaks mit gebranntem Kalk oder mit Potasche zur Entwicklung von Ammonium-Gas, insofern man dabei wohlfeiler und mitunter selbst bequemer wegkommt, als wenn man das Gas durch Verdampfung des *Liq. Ammon. caust.* darstellen wollte.], zu Injectionen, Waschungen u. Fomentationen [meist in dem Verhältnisse = 1:8, etwa mit Zusatz von etwas Geistigem, von Essig p. p. — SCHMUCKER's Fomentationen z. unt. *Kali nitr.* — *Embrocatio frigida* PH. MIL.: Salmiak 1, Essig 8, Wasser 24 (es

ist nicht zweckmäßig, die Ingredientien schon gemischt aus der Apotheke kommen zu lassen; auch dürfte, namentlich für die Hospitalpraxis, Kochsalz meist den Vorzug verdienen; vgl. I. S. 369). — Unc. $\frac{1}{2}$ - 1 mit 10 Unc. Wasser: v. GRÄFE zu Umschlägen bei Hydrocele von Kindern. Vgl. Ry 95. — Die concentrirte Auflösung gegen Warzen: WAIZ; Reiben der Warzen 2-3 mal tägl. mit einem befeuchteten Stück Salmiak: BELL., zu Salben [nur als Zusatz; so namentlich zu Krätzsalben, etwa Dr. 1 auf jede Unze, vgl. *Ungt. sulphurat. comp.* u. Ry 1082-1084. (Zu Sublimatsalben doch passender gereinigten Salmiak.)]. Zu Augen-, Mand- u. Gurgelwässern, wie zum innerl. Gebrauch, gereinigten Salmiak.

95.

Ry *Ammon. muriat. crud.* Unc. 1*Aceti**Spir. Fini* *rst.* ana Unc. 4.

Solve. D. S. 3mal tägl. lauwarm überzuschlagen, mit einem Suspensorium zu befestigen. (Bei Hydrocele.)

KEATE. RUST.

Ammonium muriaticum depuratum. Sal ammoniacum depuratum. Alkali volatile salitum. Hydrochloras ammonicus depuratus. Gereinigter Salmiak; salzsaures Ammonium. [1 Unze 3, *subt. pulv.* 4 Sgr.] *Sol.* 3. — *Cave* [mit durch Erfahrung sanctionirten Ausnahmen]: kaustische u. kohlen saure fixe Alkalien u. alkalische Erden [Kali, Natr., Kalk u. Magnesia]; alkalische u. metallische Salze von schwächeren Säuren [Kali u. Natr. *acet.* u. *tartr.*, überhaupt neutrale weinsteinsäure Salze; — essigsaures Blei, Quecksilber, Eisen u. Kupfer; Borax]; Schwefelsäure, Salpetersäure und deren erdige u. Metall-Salze [Alaun, Bittersalz, Vitriole, salpetersaures Quecksilber u. Silber u. s. w.]; (Metalloxyde [namentlich von Quecksilber, Blei], jedoch nur bei Erhitzung oder längerer Einwirkung, besonders unter Wasserzusatz); Schwefellebern; Seifen; (manche Extracte — vgl. den Art. *Extracta*). [Silberne Löffel sogleich in Wasser abzuspülen, s. I. S. 394 *sub* 8].

Innerl. zu Gr. 5-15 mehrmals tägl., etwa Dr. 1 tägl. zu verbranchen; bei organischen Übeln [Vereiterungen, Verdickungen, Verhärtungen, Tuberkeln, Scirrhusitäten, in Harnblase, Prostata, Lymphdrüsen, Lungen u. s. w.], auch zum Theil bei Schleimflüssen, nach Neueren zu Scr. 1-2 mehrmals tägl., etwa Dr. $1\frac{1}{2}$ - 4 tägl. zu verbrauchen. In Pulvern [etwa mit *Rad. Glycyrrh.* oder *Pulv. gummos.*, doch schmeckt es immer höchst widerlich. — Ry 96, 97; 924 (*Rad. Valer. min.*), 1033 (*Tart. stib.*)], Auflösungen [auch in diesen ist der Salmiak noch sehr unangenehm; am besten corrigirt ihn noch *Extr. Glycyrrh.* oder der wohlfeilere *Succ. Glycyrrh. dep.* oder eine Mandelemulsion (Mandelsyrup). — Ry 98 (für Wohlhabende), 99; 376 (*Extr. Helleb. nigri*), 846 (*Rad. Helen.*), 917 (*Rad. Seneg.*), 1036 (*Tart. stib.*)], Latwergen [Ry 100]; kleinere Gaben auch in Pillen; am besten jedoch in der Regel in Bissen [z. B. alle 4-2 St. einen Bissen aus Scr. 1 (mit etwas Pflanzepulver und Extract constituit): FISCHER gegen organische Übel der Prostata u. Harnröhre. — Ry 101, 102; 216 (*Carbo Carnis*), 1004 (*Sulph. dep.*)].

Ausserl. zu Mund- u. Gurgelwässern [etwa Dr. 1 auf Unc. 6], Augenwässern [zu Augenpinselwässern Scr. $\frac{1}{2}$ - 1 auf Dr. 2; zu Augentropfwässern Gr. 5-10 auf Unc. $\frac{1}{2}$ (vgl. *Aq. Laurocer.*); zu Augenbähungen Dr. $\frac{1}{2}$ -1 auf Unc. 4. — Ry 103; 199 (*Camph.*), 319 (*Cupr. aluminat.*)]. Übrigens, mit einigen Ausnahmen bei Wohlhabenden (z. B. Ry 104, 105), für die äusserliche Anwendung das wohlfeilere *Ammon. muriat. crudum*.

96.

Ry *Opü* Gr. 1
Ammon. muriat. depur. Dr. 2
Flor. Chamom. vulg. Dr. 3
Elaeos. Foenic. Unc. $\frac{1}{2}$.
M. f. Pulv. D. S. 2stündl. 1 Theelöffel.
 — Bei leichten Wechselstiebern lieben manche Praktiker Pulver der Art; doch dürfen, des Geschmacks wegen, folgende Bissen den Vorzug verdienen:
 Ry *Opü pulv.* Gr. 1
Ammon. muriat. dep. pulv. Dr. 2
Extr. Chamom. vulg. Dr. 3
Flor. Chamom. vulg. pulv. q. s.
ut f. Bol. 16. Consp. Pulv. Cass. cinnam.
D. S. 3stündl. 1 Stück.

97.

Ry *Caryophyllor.* Dr. 2
Ammon. muriat. dep. Unc. $\frac{1}{2}$
Cort. Chin. regii Unc. $1\frac{1}{2}$.
M. f. Pulv. D. in vitro. — In der fieberfreien Zeit alle 3 - $1\frac{1}{2}$ St. 1 Theelöffel (u. allmählig mehr). VOGT.

98.

Ry *Ammon. muriat. depur.* Dr. 2
solve in
Aq. Flor. Aurant. Unc. 4
adde
Syr. Amygdal. Unc. 2.
M. D. S. 2stündl., umgeschüttelt, 1 Essl.
 CASPER.

99.

Ry *Tart. stibiati* Gr. 1
Ammon. muriat. depur. Dr. 2
Succi Glycyrrh. dep. Dr. 3
solve in
Aq. Foenic. Unc. 6.
D. S. 2stündl., umgeschüttelt, 1 Essl.
 Ähnlich, nur schwächer, ist *Mixtura*

Ammon. muriat. stibiata PH. MIL., mit etwas über 10 Unzen Wasser (*Aq. coqum.*).

100.

Ry *Cassiae cinnam. pulv.* Dr. 1
Ammon. muriat. dep. pulv. Dr. 2
Cort. Chin. fusci alcoholis. Dr. 6
Syr. Cort. Aurant. Unc. 3.
M. f. Electuar. D. S. 4mal tägl., umgerührt, einen gehäuften Theelöffel. (Auf 12 Gaben berechnet.) VOGT.

101.

Ry *Sulphur. dep.* Gr. 5
Ammon. muriat. depur. Scr. $\frac{1}{2}$
Extr. Dulcam. q. s.
ut f. Bolus. Consp. Pulv. Croci. Disp. tal. nr. 12. D. S. 2stündl. 1 Stück. (Bei catarrhalischen Brustaffectionen u. s. w.)

102.

Ry *Ammoniacy depur.* Dr. 1
Ammon. muriat. dep.
Sem. Anisi stell. ana Dr. 2
Extr. Glycyrrh. q. s.
ut f. Bol. 12. Consp. Sem. Lycop. D. S.
 4 - 6 mal tägl. 1 Stück.

103.

Ry *Ammon. muriat. depur.*
Sacch. albi ana Scr. $\frac{1}{2}$
solve in
Aq. Menth. pip. Unc. $\frac{1}{2}$.
Filtra. D. — Augenwasser, anfangs aufzupinseln, später einzutropfen. (Bei adynamischen Hornhauttrübungen.) JÜNGKEN.

104.

Ry *Ammon. muriat. depur.* Dr. 2-3
solve in

Aq. communis
 † *Aq. Coloniensis* ana Unc. 4-5.
 D. S. Waschwasser. (Bei Frostbeulen
 ersten Grades.) RUST.

105.

Ry *Amygdal. dulc. excorticat.* Unc. 1
Aq. Flor. Aurant. Unc. 2

Aq. Rosar. Unc. 8
 f. Emuls. In Colat. solve
Ammon. muriat. dep. Dr. 1
 et adde
Tinct. Benzoes Dr. 2.
 M. D. S. Waschwasser, umgeschüttelt.
 (Gegen Finnen u. spröde Haut.)
 HERRMANN.

Ammonium muriaticum ferruginosum s. martiatum. Flores Salis Ammoniaci martiales. Ferrum ammoniacale. Hydrochloras ammonicus cum Sesquichloreto Ferri. Eisensalmiak. Salzsaures Ammonium mit salzsaurem Eisenoxyd. [Zieht Feuchtigkeit aus der Luft an. — 1 Drachme $1\frac{1}{8}$ Sgr.] *Sol.* 3 [doch nicht immer ohne Bodensatz; man lasse deshalb die Auflösungen umschütteln]. *Cave* wie beim vorigen und wie bei *Ferr. muriat.*; ausserdem [mit durch Erfahrung sanctionirten Ausnahmen] Adstringentien; Sonnenlicht.

Innerl. zu Gr. 3-10, einigemal tägl.; nicht gern, weil er Feuchtigkeit anzieht; in Pulvern [wenigstens mit absorbirenden Pflanzenpulvern, nicht bei feuchtem Wetter, und nicht auf längere Zeit vorrätig. — Vgl. *Cort. Chin. fusc.*], Bissen oder Pillen [ebenfalls etwa mit einem absorbirenden Pflanzenpulver, und nicht mit Extracten, die viel salinische Bestandtheile enthalten (vgl. unten *Extracta*), sondern lieber mit *Extr. Glycyrrh.*, *Calami*; auch lasse man *in vitro bene clauso* verabreichen], sondern lieber in (Latwergen), Auflösungen, Mixturen [etwa mit einem aromatischen Wasser; z. B. Dr. 1 in *Aq. Cinnam. vinos.* Unc. $\frac{1}{2}$, zu 12-40 Tropfen; oder Dr. 1 mit *Succ. Glycyrrh. dep.* Dr. 2 in *Aq. Cinnamomi simpl.* od. *Aq. Flor. Aurant.* Unc. 6-4; 4 mal tägl. 1 Essl.].

Amygdalae amarae. Bittere Mandeln. [Man verordnet sie immer von der braunen Schale (Haut), durch Abbrühen, befreit; ausgeschlaibt, *excorticatae*. — 1 Unze *excort.* $1\frac{5}{8}$ Sgr.] *Cave:* s. *Ol. Amygd. am. aeth.* und Eiweissstoff (I. S. 36).

Innerl. in Substanz oder zerstoßen [s. B. gegen Wechselfieber in der Apyrexie 3 mal tägl. 7-8 (KRICHOW), oder kurz vor dem Anfall 2-3]; in Emulsion [selten als eigentliches Heilmittel, z. B. Ry 106 (eine ungewöhnliche u. unangenehme Composition); meist nur als Zusatz zu den süßen Mandeln (vgl. den folgenden Artikel)].

Ausserl. zu Schönheits-Pulvern und -Pasten [officinell *Pulv.* und *Pasta cosmet.* Ein ordentliches Pulver lässt sich freilich nicht daraus bereiten; man kann sie immer nur gröblich zerstoßen]; auch wohl die fertige Emulsion als Waschwasser [doch dürfte beim Coliren ein Theil des Wirksamen verloren gehn. — Ry 161 (*Benzoe*)].

106.

R. *Amygdal. amar. excortic.* Dr. $1\frac{1}{2}$ -2
Aq. comm. q. s.

f. *Emuls.*; in *Colat.* Unc. 1 *solve*.Mtr. *Centaur. min.* Dr. $\frac{1}{2}$ -1.

D. S. 1 St. vor dem Fieberanfall auf
 1mal zu nehmen. FRANK (in Posen).

Amygdalae dulces. Süsse Mandeln. [Wie die vorigen immer von den Schalen befreit (*excorticatae*) anzuwenden. — 1 Unze *excort.* $2\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave:* s. Eiweissstoff (I. S. 36) und fette Öle (I. S. 35).

Innerl. in Emulsion [„Mandelmilch, *Emuls. amygdalina*“, auch wohl „*Emuls. communis*“. — Als eigentliche Arznei oder als Exciplens andrer Arzneimitteln (um z. B. deren Schärfe einzuhüllen) Unc. 1 auf Unc. 8-6, esslöffelweise; zum Getränk Unc. 1 auf L. 1-2, zu halben oder ganzen Tassen. Manohem schmeckt die Emulsion besser, wenn man noch eine Kleinigkeit bitterer Mandeln, auf 1 Unze der süssen etwa Dr. $\frac{1}{2}$ -1, dazu nimmt (therapeutisch ist die Wirkung der bitteren Mandeln dabei wohl kaum zu beachten). Zur Versüssung der Emulsion (die indess mancher Kranke nicht einmal gern hat) Zucker (Dr. 2 bis höchstens Unc. 1 auf 1 Unze Mandeln) oder die unter *Syrupi* näher angegebenen Syrupe, oder *Pasta gummosa*; man setzt auch bisweilen noch etwas *Gm. Mimos.* zu, um die Emulsion noch schleimiger zu machen; bedarf man indess eines sehr kräftigen Demulcens, so nehme man lieber eine Mandelöl-Emulsion (falls nicht die gelind eröffnende Wirkung des Öls unerwünscht ist). — Den Mandelsyrup mit Wasser verdünnt statt der gewöhnlichen Emulsion zu benutzen, ist nicht passend; denn wenn er auch aus einer Mandelemulsion bereitet ist, so enthält er doch im Verhältniss zu den Mandeln so viel Zucker, dass er entweder den meisten Kranken bald zuwider wird oder, wenn man ihn stärker verdünnt, zu wenig als Mandelemulsion wirkt. Passender ist es deshalb, wenn etwa der Kranke von der Apotheke entfernt wohnt und man seinen Angehörigen nicht die nöthige Sorgfalt zum Bereiten der Emulsion zutraut, lieber eine Paste mitzugeben, die bloss mit Wasser angerührt werden darf, um eine Emulsion zu geben; eine solche bekommt man zwar gewöhnlich bei den Conditoren unter dem Namen Orschaden-Paste oder trockene Orschade (von dem franz. *Orgeat*, welches eigentlich Gerstenwasser bedeutet, bisweilen aber auch für Mandelmilch gebraucht wird); wo diese aber nicht zu haben oder wo sie, wie häufig, zu süss oder auch (durch längere Aufbewahrung) säuerlich seyn sollte, kann die Vorschrift R. 108 dienen, deren Anfertigung freilich theuer ist (I. S. 177. Z. 4-8). — Beispiele von Mandelemulsionen: R. 107; 960 (*Sem. Cannab.*), 967 (*Sem. Hyosc.*). — *Emuls. Amygdalar.* PH. SLESV.: Mandeln 1, Wasser 8, Zucker $\frac{1}{2}$ (8 Unz. 6 Shl.). — *Emuls. Amygd.* PH. MANN.: Mandeln 1 (nebst bittern $\frac{1}{8}$), Wasser (u. zwar destillirtes) 8, Zucker 1 (8 Unz. 6 Mgr.). — *Emuls. communis* PH. MIL.: Mandeln (oder auch Hanf- oder Mohr-Samen; also im einzelnen Falle zu bestimmen, welcher Samen) 1, Wasser 12, Zucker $\frac{1}{2}$.]; des Wohlgeschmacks halber als Zusatz zu Morsellen [zerschnitten; — ein Beispiel I. S. 230].

107.

R. *Amygdal. dulc. excortic.* Unc. 1
 — *amar.* — Dr. $\frac{1}{2}$ -1
Aq. comm. L. $1\frac{1}{2}$
 f. *Emulsio. Colat. adda*
Syr. simpl. Unc. 1.

M. D. S. Umgeschüttelt tassenweise.

108.

R. *Amygdal. dulc. excortic.* Unc. 6
 — *amar.* — Unc. $\frac{1}{8}$
benz. contusas misce terendo c.

Gm. Mimos. electi pulv. Unc. ½
Sacch. albi pulv. Unc. 3
(Ol. Aurant. Flor. Gtt. 3)

ut f. Pasta. D. S. Tägl. den 8ten oder 6ten Theil, mit 4 Tassen Wasser angerührt, zu halben Tassen.

Amylum. Faecula. Stärke. Stärk-, Kraft- od. Satz-Mehl. (Provinciell) Hefe. [Feines Pulver. — 1 Unze $\frac{2}{3}$ Sgr.] *Cave:* a. I. S. 36 sub 15.

Innerl. scrupelweise mehrmals tägl. in (Pulver) [nur als Zusatz zum *Tert. stibiat.*; vgl. den Artikel], Trochischen [Ry 109], Auflösung [„Schleim“. Man rührt das *Amylum* erst mit ein wenig kaltem Wasser zu einem dünnen Brei an, schüttet zu diesem unter Umrühren kochendes Wasser, und trinkt dies, sobald es lauwarm geworden; erkalten werden die Auflösungen, wenn sie nur einigermaßen concentrirt sind, dicklich und unangenehm, deshalb eignen sie sich nicht für die Bereitung in der Apotheke. — Scr. 1 - Dr. $\frac{1}{2}$ macht 6 Unzen Wasser schon stark schleimig], Gallerte [Dr. 3, wie oben mit kaltem Wasser angerührt, dann mit $3\frac{1}{2}$ Unzen Wasser auf 3 Unzen eingekocht, giebt eine ziemlich concentrirte Gallerte. Sonst kann man auch, wenn man noch feste oder doch keine flüssigen Zusätze macht, schon mit einer geringeren, selbst der halben, Quantität *Amylum* eine gute Gallerte darstellen. Als Corrigenzien Zucker und etwas Zimmt-, Orangenblüth- oder Rosen-Wasser]. — Zum Conspargiren [I. S. 90].

Ausserl. zu Streupulvern [bei Blutungen (pur oder mit adstringirenden, styptischen Dingen) dem *Gm. Mimos.* vorzuziehen, weil es sich nicht in dem Blute auflöst], Wasehpulvern [nur als Zusatz, vgl. I. S. 226; officinell: *Sapo aromat. pro Balneis*], Gurgelwässern [mit kaltem Wasser vermischt und umgeschüttelt, bei habituellen Bräunen von chronischer Entzündung der Deglutitionsorgane empfohlen], hauptsächlich aber zu Klystieren [des Heilzwecks halber in der Regel (wo das *Amylum* kräftig anhaltend wirken soll) nur mit sehr wenig Wasser, für einen Erwachsenen Unc. 3-4; auf diese Quantität Wasser Dr. 1-2 (höchstens) *Amylum*, die man, wie oben für den innerlichen Gebrauch angegeben, in kochendem Wasser auflöst, und dies dann, sobald es lauwarm geworden, injicirt; die Bereitung in der Apotheke ist bei dieser Concentration unpassend, denn während die Auflösung über die Strasse getragen wird, wird schon Kleister daraus. Will man differentere Zusätze machen, z. B. von *Extr. Opii*, *Hyosc.*, *Nucis vom.*, von Opium selbst, Opiumtinctur oder dgl., so verschreibt man jene Extracte oder das Opium mit dem *Amylum* in dispensirten Pulvern (z. B. Ry *Amyli* Dr. 1-2, *Extr. Hyosc. Gr. 2. M. f. Pulv. Disp. ital. dos. nr.* — *D. S.* Zu den Klystieren.), oder lässt die Opiumtinctur tropfenweise unmittelbar vor dem Einspritzen zusetzen. — Wenn man den Gebrauch der *Amylumklystiere* längere Zeit fortsetzt, dürfte es rathsam seyn, das *Amylum* ein wenig kochen zu lassen, weil man von ungekochter Stärke Intestinalconcretionen beobachtet haben will. Dann dürfte man aber die etwa zu dem Klystier mitbestimmten Narkotika nicht mitkochen lassen, sondern müsste sie apart, in einer concentrirten Auflösung oder in Tincturform aus der Apotheke kommen und erst unmittelbar vor dem Einspritzen zusetzen lassen].

109.

Ry *Pulv. Rad. Iridis Flor. Dr. 1½*

Amyli Dr. 2½

Sacch. albis. Unc. 2½

Mucil. Gm. Tragac. c. Aq. Rosar. nach Bedürfniss.
parat. q. s. Trochisci bechici albi Ph.
et f. Trochisci parvi, D. — Bei Husten HANN. (1 Unze 6 Mgr.)

* *Amylum Marantae.* Engl. *Arrow-root-meal.*
 Pfeilwurzelmehl. Indischer Salep. Gewöhnlich Arro-
 rut. [Feines Pulver. — 1 Unze 2½ Sgr. — Bei Armen wohl durch Kartoffel-
 stärke zu ersetzen.] *Cave* wie beim vorigen.

Innerl. in etwas grösseren Gaben als das vorige, in Auflö-
 sung [die man ähnlich wie beim vorigen zu machen hat, doch hier concentrirter
 machen darf; man rühre etwa 1½ Drachmen mit 1 Essl. kalten Wassers an, schütte
 das Gemisch unter Umrühren in 9 Unzen kochenden Wassers, und lasse dies 1 Mi-
 nute lang aufwallen, so erhält man 8 Unzen eines klaren Schleims, dem man Zucker,
 Zimmtsymp u. dgl. beimischen kann; eslöffelweise zu verbrauchen. Als Auffütte-
 rungs- oder Beifütterungs-Mittel bei Säuglingen (*TOURTEL sen.*) und über-
 haupt in der Kinderpraxis nehme man auf die angegebene Quantität Wasser nur 1
 Theelöffel voll, und setze dem Schleim bloss Zucker zu.], Gallerte [Concen-
 tration s. I. S. 286. Etwa mit Fleischbrühe oder mit Wein eingekocht, im letzteren
 Salz Zucker, Zimmt od. dgl. zugesetzt. Man überlasse diese wie die vorige Form
 der Köchin].

Aquae destillatae Vegetabilium. Destillirte (ab-
 gezogene) Pflanzenwässer. — *Cave:* s. äther. Öle (I. S. 35;
 auch die entsprechenden einzelnen zu vergleichen); bei der † *Aq. Vale-*
rianae. ist auch noch auf ihre flüchtige Säure Rücksicht zu nehmen,
 weshalb man sie nicht leicht zu natürlichen Emulsionen setzt.

Wir wollen hier nur über diejenigen Pflanzenwässer, die, we-
 nigstens in der Regel, nicht wirksam genug sind, um sie als Haupt-
 mittel pur zu reichen, und die man deshalb meist nur als Constituen-
 tien und Vehikel andrer Mittel anwendet, einige praktischen Regeln
 mittheilen. — Es sind dies folgende (die Buchstaben *S.*, *H.*, *A.* be-
 zeichnen die PH. SLESV., HANN. und ABSTR.):

† <i>Aqua Amygdalarum amararum di-</i>	† <i>Aqua Corticum Aurantiorum S.</i>
luta S. H. A. (statt	— <i>Florum Aurantii</i>
der <i>Aq. Cerasor.</i>)	— <i>Foeniculi</i>
† — <i>Anisi A.</i>	† — <i>Hyssopi S.</i>
— <i>aromatica</i>	† — <i>Lavandulae A.</i>
† — <i>Baccarum Juniperi A.</i>	— <i>Melissae</i>
† — <i>Carvi A.</i>	— <i>Menthae crispae</i>
— <i>Cerasorum</i>	— — <i>piperitae</i>
— — <i>amygdalata</i>	— — — <i>vinosa</i>
— <i>Chamomillae</i>	† — <i>Petroselinii Radicis A.</i>
— <i>Cinnamomi simplex</i>	— <i>Petroselinii (Seminis)</i>
— — <i>vinosa</i>	† — <i>Pulegii S. H.</i>
— <i>Citri</i>	† — <i>Rorismarini A.</i>

Aqua Rosarum— *Rubi Idaei*— *Rutae*— *Salviae*— *Sambuci*† *Aqua Scandicis odoratae S.*† — *Tanacetii (Herbae) A.*† — *Tiliae (Ph. Slesv. Anhg.)*† — *Valerianae S. H. A.*

Man wird nie einen praktisch erheblichen Fehler begehen, wenn man annimmt, dass 2 Unzen eines destillirten Wassers der Ph. Bor., Slesv. oder Hann. 1 Tropfen ätherischen Öls — die Wässer der Ph. Austr. doppelt so viel — enthalten, obwohl freilich das Verhältniss bei den einzelnen variirt [nach diesem Maassstabe kann man auch einzelne, etwa nicht officinelle, Wässer, durch eine magistrale Auflösung von Ölzucker in Wasser ersetzen]. Es können demnach im Allgemeinen alle diese Wässer zu Grundlagen (Constituentien) von kleineren und selbst grösseren, theelöffelweise und selbst esslöffelweise zu nehmenden Mixturen unbedenklich gewählt werden (für Erwachsene nämlich, denn Kindern würde man viele derselben nicht esslöffelweise zu geben wagen); doch versteht es sich von selbst, dass therapeutische Gründe oft das eine oder das andere, oft z. B. die erhitzen den unter ihnen, ausschliessen werden. Die kräftigsten, am leichtesten erhitzen den sind aber die *Aq. Cinnam. vinosa* u. *Aq. Menth. piper, vinosa*, und diese beiden wendet man daher nur selten — nur bei sehr kräftigen oder torpiden oder an geistige Getränke gewöhnten Individuen, namentlich Männern — als alleinige Constituentien von esslöffelweise zu nehmenden Arzneien an, vielmehr meistens nur als Zusatz zu solchen (etwa Unc. 1–2 auf Unc. 4–5 gemeinen oder einfachen destillirten Wassers). — Manche Kranke lieben auch starkriechende Arzneien nicht, haben auch wohl gegen eines oder das andre destill. Wasser eine Idiosyncrasie; man sehe sich in dieser Hinsicht besonders da vor, wo man ein solches Wasser als alleiniges Constituens anwenden will.

Sie sind theils trübe, theils klar; die erstere Eigenschaft haben wir bei den im Folgenden einzeln aufgeführten der Ph. Bor. immer besonders angemerkt. Wo man die Wahl hat, zieht man zu Arzneien, die möglichst schön aussehen sollen (namentlich zu vielen Juleps u. s. w.), natürlich die klaren vor. [Zwar werden auch die ursprünglich klaren bei langer Aufbewahrung wohl etwas trübe und schleimig; doch sollen sie dann nicht mehr angewandt werden.] — Übrigens sind sämmtliche destillirte Wässer farblos.

Die angenehmeren unter ihnen (wir werden sie unten einzeln auführen) dienen häufig, ausserdem dass sie die Grundlage flüssiger Arzneiformen bilden, auch zugleich als Geruchs- und Geschmacks-

corrigentien (I. §. 23. 24). — Destillirte Pflanzenwässer zur Bereitung von Aufgüssen oder gar Decocten verwenden zu lassen, ist in der Regel unnütze Verschwendung, denn sie verlieren dabei meist ihr Angenehmes und ihre geringe Wirksamkeit ganz; wohl aber setzt man sie bisweilen passend den fertigen Colaturen als Corrigentien bei [namentlich die blausäurehaltigen, denn statt der übrigen wählt man lieber Ölzucker, wodurch man die Mixture compendioser macht].

In der Armenpraxis hat man sie (etwa die *Aq. Foenic.*, namentlich für Kinder, oder unter Umständen die *Aq. aromat.* Ph. z. ausgenommen) alle zu vermeiden, und kann sie in der Regel durch den Gebrauch der Substanz als Thee ersetzen. [Bisweilen kommt man auch wohlfeiler weg, wenn man statt der destill. Wässer Ölzucker (für 2-3 Unzen Wasser 1 Tropfen Öl gerechnet) anwendet; doch ist dies in dem einzelnen Falle umständlich zu berechnen.]

Für die Auswahl der einzelnen im concreten Fall diene folgende Übersicht.

Angenehm riechen: die meisten, ganz besonders aber *Aq. Flor. Aurant.*, *Rosar.*, † *Tiliae* (letzteres jedoch nur kurze Zeit nach der Bereitung; später verschwindet das Arom u. mit ihm wohl die ganze Wirksamkeit).

Angenehm schmecken: besonders *Aq. Flor. Aurant.*, *Cinnam. simpl.*, die blausäurehaltigen (*Aq. † Amygdal. amar. diluta*, *Cerasor.*, *Cerasor. amygdal.*); auch *Aq. Rubi Id.* (doch nicht immer), *Foenic.*, † *Anisi* (diese beiden nicht für Jeden), *Citri*, *Rosar.* (diese beiden nur verdünnt). Als Corrigens für unangenehm bittere Arzneien passen aber besonders: *Aq. Cinnam. simpl.* und *vinosa*, *Menth. pip.* und *Menth. pip. vinosa*, *Flor. Aurant.*, † *Cori. Aurant.*

Beiden diesen Zwecken zugleich entsprechen die meisten mehr oder weniger, nur *Aq. aromat.*, † *Bacc. Junip.*, *Chamom.*, † *Hyssopi*, † *Lavand.* (schmeckt schlecht), *Petrosel.*, † *Puleg.*, † *Rorism.*, *Rutae*, *Salv.*, *Sambuci*, † *Tanac.*, † *Valer.* ausgenommen.

Zu Emulsionen darf man sie zwar alle nehmen; besonders gut aber eignen sich in der Regel (zum Theil schon aus therapeutischen Gründen, sonst aber der Annehmlichkeit halber): die blausäurehaltigen, *Aq. Flor. Aurant.*, *Foenic.*, (*Chamom.*). — († *Aq. Valer.* bisweilen zu vermeiden, s. S. 49.)

Zu Presssäften macht man wohl einen kleinen Zusatz von *Aq. Cinnam. simpl.*, *Menth. crisp.*, *Menth. pip.*, † *Puleg.*, † *Scandic. odor.*, (*Rutae*).

Zu Elixiren wählt man gewöhnlich: *Aq. Cinnam. simpl.* od. *vinosa*, † *Cori. Aurant.*, *Menth. cr.*, *Menth. pip.*, *Menth. pip. vinosa*, † *Puleg.*, auch wohl *Aq. Petrosel.*, *Rutae*, *Foenic.*, † *Carvi*, † *Hyssopi*.

Zu Linctus, wenn man eines wässerigen Zusatzes bedarf, meist *Aq. Foenic.*, † *Anisi*; doch auch die blausäurehaltigen, *Aq. Flor. Aurant.* u. a.

Zu Mand- u. Gurgelwässern am häufigsten *Aq. Salv.*, *Sambuci*, doch auch *Aq. But.*, *Rubi Id.*, *Rosar.*, *Flor. Aurant.*, *Citri* u. a.

Zu (voluminöseren) Augenwässern besonders oft *Aq. Rosar.*, doch auch *Aq. Samb.*, *Chamom.*, † *Valer.*, *Menth. crisp.*, *Menth. pip.*, selbst *Aq. Cinnam. simpl.* u. a. (Zu Augenwässern von geringerem Volumen, also zu Augentropfwässern, Augenpinselfässern, häufig *Aq. Opü.*)

Zu Waschwässern (u. o. kosmetischen Mitteln) *Aq. Rosar.*, *Flor. Aurant.*, † *Lavand.*, *Citri*, die blausäurehaltigen.

Zu Klystieren: *Aq. Chamomillae*, † *Valer.*

Zur Verdünnung von Säuren etwa *Aq. Citri*, *Rubi Id.*; auch wohl die blausäurehaltigen (doch diese nicht bei Salzsäure).

Zu antiphlogistischen Mixturen sind — wenn man eine recht strenge Antiphlogose bezweckt — fast alle destillirten Wässer zu reizend; wo man weniger strenge seyn darf, wählt man die blausäurehaltigen, *Aq. Rubi Id.*, *Chamom.*, *Foenic.*, *Meliss.*, † *Tiliae*.

Zu sedativen: *Aq. Chamom.*, *Foenic.*, die blausäurehaltigen.

Zu excitirenden: *Aq. Flor. Aurant.*, auch *Aq. Cinnam. simpl. u. vinos.*, *Meliss.*, *Menth. crisp.*, *Menth. pip.*, *Menth. pip. vinos.*, † *Puleg.*, † *Valer.*

Zu roberitirenden: *Aq. Cinnam. simpl. u. vinos.*, † *Cort. Aurant.*

Zu adstringirenden: *Aq. Salviae*, † *Cort. Aurant.* (die zwar für sich nichts Adstringirendes haben).

Zu alterirenden: *Aq. Chamomill.*, † *Valer.*

Zu diaphoretischen: *Aq. Sambuci*, *Chamomill.*

Zu diuretischen: *Aq. † Bacc. Junip.*, *Petrosel.*, † *Scand. odor.*

Zu expectorirenden, zu Husten-, überhaupt Brust-Mitteln: *Aq. Foeniculi*, † *Anisi*, die blausäurehaltigen, † *Aq. Hyssopi*.

Zu stomachischen: *Aq. Cinnam. simpl. u. vinos.*, † *Cort. Aurant.*, *Menth. crisp.*, *Menth. pip.*, *Menth. pip. vinos.*, † *Puleg.*, *Rutae*.

Zu carminativen dieselben oder noch lieber *Aq. † Carvi*, *Foenic.*, *Petrosel.*, † *Scand. odor.*

Zu anthelminthischen: *Aq. † Tanac.*, † *Valer.*, *Chamomill.*, *Rutae*.

Zu analeptischen: *Aq. Flor. Aurant.*, *Citri*, *Meliss.*, *Menth. pip.*, *Menth. pip. vinos.*

Zu Emmenagogis: *Aq. Chamom.*, † *Valer.* — U. s. w.

Aqua Amygdalarum amurarum. Bitterman-

delwasser. [Von L. 2 bitterer Mandeln L. 2 geistig-wässrigen (doch mehr wässrigen) Destillats abgezogen. — 4 Unzen sollen bei Mischung von *Liq. Kali caust.*, dann *Liq. Ferri murial. oxydati*, endlich Salzsäure, *q. s.*, 5 Gran blausaures Eisen geben. (Entspricht der *Aq. Am. am. concentrata* PH. SLESV., HANN.) — Doch hat GEIGER (Ann. d. Pharm. 1835. Febr. S. 195.) nachgewiesen, dass Bittermandel- und Lorbeerkirsch-Wasser sich sehr schnell verändern, ihren Blausäuregehalt vermindern (wogegen keine Vorschrift einer Pharmakopöe ganz schützen dürfte), so dass der Glaube, in jenen Wässern zuverlässigere, der Veränderung weniger unterworfenere Mittel als die reine Blausäure zu besitzen, erschüttert ist. — Ansehn trübe, milchig. — 1 Unze 2½ Sgr.] *Cave* Basen; Metallsalze [besonders Calomel, Silbersalze]; Wärme; Luft. Ausserdem vgl. *Ol. Amygd. amar. aeth.*

Innerl. (*ad Guttas quinquaginta!*) und äusserl. wie *Aq. Lauro-Cerasi*. [Doch löst man, weil es trübe ist, weniger gern Salze od. dgl. darin auf, die man in *Aq. Laurocer.* klar aufgelöst erhalten kann, liebt es auch weniger zu Augewässern. — Ry 110, 111; 242 (*Cetac.*). Verbindg. m. *Extr. Bellad.* s. dort.]

110.

Ry *Aq. Amygdal. amar.*

Liq. Ammon. anisati ana Unc. ½

Aq. Flor. Aurant. Unc. 6

Mucil. Gm. Mim. Unc. 1.

M. D. S. Stündl., umgeschüttelt, 1 Essl.

(Bei Cholera.)

GEREL.

111.

R. *Opii pulv.* Gr. 1
Gm. Mimos. pulv. Dr. 1
Aq. Menth. pip. Unc. 4

f. Emuls., cui adde
Aq. Amygdal. amar. Dr. 1.
M. D. S. Lauwarm und umgeschüttelt
zum Klystier. (Bei Cholera.) GEBEL.

+ *Aqua Anhaltina* (PH. HANN.). [Schwach-geistiges Destillat von verschiedenen gewürzhaften und balsamischen Pflanzenstoffen, auch Terpenthin. — 1 Unze 3 Mgr., 6 Unz. 15 Mgr.] Zu Waschungen, Umschlägen.

Aqua aromatica. [Über verschiedene aromatische Stoffe, zusammen L. 2, L. 12 geistig-wässrigen Destillate abgezogen. — Trübe. — 1 Unze 1 Sgr. — *Aq. aromat.* PH. P. ähnlich, aber etwas schwächer (1 Unze $\frac{2}{3}$ Sgr.).] Selten und meist nur äusserlich angewandt. Vgl. *Aquae dest. Vegetabil.*

Aqua Asae foetidae. Asandwasser. [Von 3 Drachmen 6 Unzen abdestillirt. — Trübe. — 1 Unze 1 Sgr.] Und

Aqua Asae foetidae composita. [*Asa foet.*, *Rad. Angel.*, *Calami ana* Dr. 3, davon 6 Unzen abdestillirt. — Trübe. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr.] — *Cave:* s. äther. Öle (I. S. 35); hier auch namentlich Metallsalze, besonders Silbersalze. — Innerl. zu 1 Theelöffel oder $\frac{1}{2}$ Essl. alle 2-1 St., pur oder in Mixturen [etwa Unc. 2 auf Unc. 6. — Als Corrigenes etwa *Aq. Rosar.* oder Äther].

Aqua Calcariae s. Calcis. Kalkwasser. [600-700 Theile Wasser enthalten 1 Kalkerdehydrat. — 1 Unze $\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave* [mit durch Erfahrung sanctionirten Ausnahmen] Säuren u. saure Salze; kohlensaure, schwefelsaure, phosphorsaure, weinsteinsaure u. boraxsaure Salze; salzsaures, bernsteinsaures u. essigsaures Ammonium; Metall-Oxyde u. -Salze; Seifen; Gerbestoff; Kleber; Stärkmehlaufösungen; Weingeist; alkaloidische Vegetabilien; (Harze, äther. Öle, Zucker); Luft. — Man lasse auch das Kalkwasser [namentlich bei der innerlichen Anwendung] nicht ohne Noth erwärmen, weil sich dabei mehr oder weniger Kalk absetzt, das Mittel also schwächer wird.

Innerl. anfangs zu Unc. 2-4 einigemal tägl., L. $\frac{1}{2}$ -1 auf den Tag; später wohl bis zu L. $1\frac{1}{2}$ auf den Tag. [Man lässt es auch wohl Noss am Morgen, wie einen Mineralbrunnen, nehmen.] Mit Milch, süssen Molken, Fleischbrühe, bei grosser Empfindlichkeit auch wohl mit öligen oder schleimigen Dingen.

Äusserl. zu Mund- u. Gurgelwässern [z. B. mit Milch ana: REIM gegen Brennen der Mundhöhle], Pinselsäften [z. B. mit *Syr. simpl.*

ane: WENDT gegen Schwämmchen der Kinder], Klystieren [1 Tasse, mit Zusatz von Haferschleim od. dgl.] u. a. Injectionen [oft als Vehikel anderer, namentlich reizender Arzneien; z. B. R₂ 151 (*Bals. Copaiv.*), 548 (*Hydrarg. mur. mit.*), 587 (*Kali caust. aicc.*)], Augewässern [R₂ 541 (*Hydr. mur. mit.*)], Waschungen [R₂ 608 (*Kali sulphurat.*)], als Verbandwasser [meist pur], zu Linimenten [z. B. häufig *ana* mit einem fetten Öl (welches durch das Kalkwasser verseift wird; — die Verbindungen sind umzuschütteln). Bei Verbrennungen zieht man wohl die, sonst zu Linimenten nicht beliebten, austrocknenden Öle (vgl. *Olea pinguis*) vor, weil sie gleichsam eine künstliche Epidermis bilden. So *Liniment. ad ambustiones* PH. SLESV. mit Leinöl; 1 Unze 1 Shl.; — „*Unguentum*“ *Calcis* PH. P. mit Mohnöl; 1 Unze 1 Sgr. — Auch wohl mit einem kleinen Zusatz von Oplumtinctur. In R₂ 1074 spielt die letztere die Hauptrolle. — Verbindg. m. *Ol. camphorat.* s. dort].

† *Aqua carbonata* (PH. SLESV.). *Aqua Acidi carbonici*. *Aqua aërata*. Kohlengesäuertes Wasser. [Brausenwasser mit Kohlensäure (bei 1 Atmosphärendruck) gesättigt. — 1 Unze $\frac{1}{2}$ Shl.] Etwa wie ein Mineralbrunnen [Säuerling] innerl. und bisweilen auch äusserl. zu gebrauchen (vgl. *Aquae minerales*); auch wohl [unzenweise] als Zusatz zu Saturationen.

Aqua Cerasorum. Kirschwasser. [Über L. 3 trockne saure Kirschen mit den Kernen L. 24 abgezogen. — Riecht und schmeckt angenehm. — 1 Unze $\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave* wie beim folgenden. — Constituens von Mixturen. Vgl. *Aquae destill. Vegetab.*

Aqua Cerasorum amygdalata. Kirsch- u. Mandelwasser. [Über trockne saure Kirschen mit den Kernen und bittere Mandeln, *ana* L. 1, L. 24 abgezogen. — Riecht u. schmeckt angenehm. — 1 Unze $\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave* mehrere Metallsalze, besonders Calomel und salpeters. Silber. — Constituens von Mixturen, auch wohl Waschwässern. Vgl. *Aquae destill. Vegetab.*

Aqua Chamomillae. Kamillenwasser. [1 Unze $\frac{1}{2}$ Sgr.] Constituens von Mixturen, auch wohl Klystieren, Augewässern. Vgl. *Aquae destill. Vegetab.*

Aqua Cinnamomi simplex oder *sine Vino* [oft abgekürzt: *s. F.*]. Zimmtwasser. [Über L. 1 *Cass. cinnam.* L. 10 abgezogen. — Riecht u. schmeckt angenehm. — 1 Unze $\frac{1}{2}$ Sgr.] Constituens von Mixturen, namentlich Elixiren; Corrigens von bitteren u. a. Arzneien; auch wohl zu Augewässern. Vgl. *Aquae destill. Vegetab.*

Aqua Cinnamomi vinosa. Geistiges Zimmtwas-

ser. [Über L. 1 *Cass. cinnam.* L. 9 geistig-wässrigen Destillate abgezogen. — Riecht u. schmeckt angenehm. — 1 Unze $\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerl. zu Dr. 2-Unc. $\frac{1}{2}$, öfters tägl. Als Constituens von Mixturen [in solchen, die eelöffelweise gereicht werden sollen, nicht nur als Zusatz (vgl. S. 50); oft aber als alläniges Constituens von theelöffelweise zu verbrauchenden], namentlich Elixiren; als Corrigenes von bitteren u. a. Arzneien. Vgl. *Aquae destill. Vegetab.*

Aqua Citri. Citronenwasser. [Über L. 1 Gelbes von Citronen L. 12 abgezogen. — Riecht u. schmeckt angenehm. — 1 Unze $\frac{1}{2}$ Sgr.] Constituens von Mixturen. Vgl. *Aquae destill. Vegetab.*

** **Aqua (ophthalmica) coerulea s. saphirina s. coelestis.** [*Cuprum limat.* 1, Salmiak 2, mit Kalkwasser 48 u. destillirtem Wasser 384 macerirt, dann filtrirt. — 1 Unze $\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave* Licht. — Nur als Augentropfwasser [nur ein Paar Mal tägl. ein Paar Tropfen in den innern Augwinkel zu bringen].

† **Aqua Coloniensis.** Kölnisches Wasser. *Eau de Cologne.* [Nicht officinell. — Wo es in einem kleinen Orte nicht (echt oder in ober guten Nachahmung) zu haben seyn sollte, kann man es durch folgende Composition nachahmen: Rosmarinöl 4 Tropfen, Pomeranzenblüthöl u. Cedroöl ana 10 Tropfen, Bergamottöl Scr. 2, *Spir. V. rectif.* Unc. 4 $\frac{1}{2}$, durch wiederholtes Umschütteln die Öle aufgelöst.]

Innerl. als Hausmittel zu 10-15 Tropfen, auf Zucker [gegen Krampzfälle, zumal hysterische].

Ausserl. als Riechmittel, zu Einreibungen, Waschungen [R 104 (*Ammon. muriat. dep.*), 153 (*Bals. Peruv.*)] etc.

Aqua communis. Gemeines Wasser. [Nach der Vorschrift der PH. BOR. soll unter dieser Benennung filtrirtes Regenwasser als das reinste angewandt werden und nur in Ermangelung desselben einige Zeit hindurch stehen gelassenes und dann filtrirtes Flusswasser, falls dies nicht zu viel heterogene Bestandtheile enthält; das in der Regel sehr unreine Quell- od. Brunnenwasser, *Aq. fontana*, dagegen, nur wo es ausdrücklich unter dieser Benennung von der Pharmacopöe (so z. B. bei der *Aq. vegeto-miner. Goulardi*) oder von dem Arzte vorgeschrieben wird. (In Gebirgsgegenden findet sich zum Theil sehr reines Quellwasser.) — 1 Unze $\frac{1}{2}$ Sgr.] Und

Aqua destillata (simplex s. communis). (Einfaches od. gemeines) destillirtes Wasser. [1 Unze $\frac{1}{2}$ Sgr.]

Der Raum verbietet es, die ungemein ausgedehnte innerliche und äusserliche Anwendung des Wassers hier umfassend abzuhandeln. — Wo bei gewissen Medicamenten die Verbindung mit gemei-

nem Wasser zu vermeiden, destillirtes zu wählen ist, haben wir dies fast immer durch „*Cave: Aq. comm.*“ angegeben. Wenn man recht vorsichtig seyn wollte, dürfte man zu den allermeisten mineralischen Mitteln kein gemeines Wasser nehmen, doch nimmt man es bei den weniger empfindlichen und in grösseren Dosen gereichten nicht so genau, und in der Armenpraxis ist es sogar rathsam, zu Mitteln wie Salmiak oder Salpeter nur gewöhnliches Wasser zu nehmen, auf die Gefahr hin, dass hierdurch ein sehr kleiner Theil des Mittels (auf eine unschädliche Weise) zersetzt werde. Wie man das destillirte Wasser zum äusserlichen Gebrauch, wo es selbst bei Wohlhabenden oft zu theuer seyn würde, einigermaßen ersetzen kann, s. I. S. 362 Z. 12 v. u. — Hier nur von einigen, mehr methodischen Applicationen des gemeinen Wassers.

A. Innerl. — BURSERIUS bei Blutspeien: halbtöndl. 8 — 10 Unzen kaltes Wasser (anfange so, wie es aus dem Brunnen kommt, allmählig noch künstlich kälter gemacht, z. B. durch Schnee, Eis); kein anderes Nahrungsmittel; so Tag und Nacht mehrere Tage oder eine Woche lang, oder doch bis zum Aufhören des Blutspeiens; dann allmählig weniger Wasser und leichte Nahrungsmittel. — CADET DE VAUX's Cur gegen Gicht und Rheumatismus: Der Kranke soll zur Zeit des Paroxysmus (ausserhalb desselben könne die Cur bloss mehr oder weniger Linderung, nicht völlige Heilung bewirken), im Bett oder doch warm bekleidet im Zimmer, binnen 12 Stunden 12 Pinten (s. I. S. 101) warmes Wasser trinken, jede Viertelstunde etwa ein Glas von 8 Unzen; das Wasser darf weder so heiss seyn, dass er es nicht in einem Zuge, sondern nur schlückweise trinken könnte, noch bloss milde lauwarm (im letztern Fall würde es das Erbrechen befördern, das ohnehin manchmal eintritt). Sollte es dem Kranken unmöglich seyn, die vorgeschriebene Quantität Wasser in so kurzer Zeit ganz zu trinken, so kann er sie auf $\frac{2}{3}$ oder die Hälfte vermindern und den Gebrauch mehrere Tage hinter einander fortsetzen, oder einen Tag aussetzen und dann eine stärkere Portion nehmen. — Die Kur erregt künstliche Krisen durch Schweiss und Urin, oft auch durch Durchfall und Erbrechen, und soll mehr oder weniger vollständig radirt heilen, worauf dann hinterher eine mässige Diät die Rückkehr neuer Anfälle verhüten muss. An ihrer Wirksamkeit lassen viele gelungene Fälle nicht zweifeln, aber sie ist auch höchst gefährlich, und bereits manchem Kranken, der sie ohne ärztlichen Rath und Beistand gebrauchte, tödtlich geworden. Man wird sie also wohl nur da anwenden dürfen, wo viele andre Mittel bereits vergebens versucht worden, und weder ein erhebliches Leiden der Verdauungsorgane, noch Neigung zu Congestionen nach edlen Theilen — besonders nach dem Kopf —, oder andre wichtige Complicationen zugegen sind; auch wird der Arzt den Kranken öfters während der 12 Stunden beobachten müssen, da die Gefahr bisweilen sehr rasch eintritt. — Bei der Anwendung des Wassers als Getränk für Kranke fürchtet man sich im Allgemeinen zu sehr vor dem frischen Wasser, wie es aus dem Brunnen kommt. Bisweilen wird allerdings ein Brunnenwasser durch seine Härte [d. h. seinen Gehalt an durch Ueberschuss von Kohlensäure aufgelöstem kohlensauren Kalk] schwerverdaulich, und dann ist es rathsam es zu kochen [wodurch die Kohlensäure vertrieben, der kohlensäure Kalk niedergeschlagen wird], — oder durch zu grosse Kälte nachtheilig [so dass man es etwas „verschlagen“ lassen muss], —

aber nicht immer. Hat man das Wasser gekocht, so muss man, wenn es nicht sehr fade schmecken soll, es wieder eine Weile stehen [wieder ein wenig Kohlensäure aus der Luft anziehen] lassen, oder man muss die fehlende Kohlensäure durch etwas Anderes, z. B. mitabgekochtes Brod, eine Pflanzensäure [Essig, Citronensaft, Weinsteinsäure, Obstsaft etc.] ersetzen.

B. Äusserl. — Zu Klystieren, welche bloss durch ihre Kälte wirken sollen, etwa Unc. 4-6. Will man dadurch einer Blutung aus dem Mastdarm steuern, so ist oft noch zweckmässiger eine Tamponade durch einen in den Mastdarm eingebrachten, am oberen Ende zugebundenen, Thierdarm, den man von aussen mit recht kaltem Wasser füllt und dann auch am unteren Ende zubindet. (Eben so auch bisweilen in anderen Höhlen.) — Um einen Theil fortwährend durch kaltes Wasser abzukühlen, bei Verletzungen, Quetschungen p.p., empfiehlt BÉRARD der Jüngere folgendes Verfahren: ein Eimer mit Wasser wird über das Theil aufgehängt, mittelst einer oder mehrerer sehr engen Glasröhren (Heber) das Wasser tropfenweise (die Tropfen dürfen nicht sehr hoch fallen, nicht nach Art einer Dusche oder eines Regenbades wirken) auf den Körpertheil geleitet; dieser ist dabei mit einem einfachen leinenen Tuche belegt, und unter ihm liegt Wachstaffet, um das Bett zu schützen, das abfliessende Wasser in ein neben dem Bett stehendes Gefäss zu leiten. Einer ähnlichen Behandlung, mehrere Wochen unausgesetzt, bedienten sich ROGNETTA, BRESCHET u. A. bei complicirten Fracturen. Bei beginnendem Panaritium lässt ROGNETTA den Finger, mit Leinwand umhüllt, auf den Rand eines leeren Gefässes halten und mittelst eines kleinen Schwamms aus einem daneben stehenden Gefässe mit kaltem Wasser den Finger und alle schmerzenden Theile der Hand fortwährend, stundenlang, befeuchten. (Die Methoden BÉRARD's und ROGNETTA's verdienen den Vorzug vor dem Eintauchen des Gliedes in Wasser, weil hierbei die abwärts geneigte Lage Blutcongestion begünstigt, und vor dem Fomentiren mit Compressen, weil diese bald warm und trocken werden oder eine unbequeme und schmerzhaft, stete Erneuerung erfordern.) — LEHMANN's Verfahren bei beginnendem Croup: mittelst zweier weichen Badeschwämme, welche abwechselnd in ein Gefäss mit sehr heissem, fast noch kochendem Wasser getaucht und auf die Kehlkopfgegend aufgelegt werden, so lange (10 bis höchstens 25 Minuten) fomentirt, bis sich eine hohe Röthe wie nach Senfteigen zeigt, allgemeiner Sch weiss ausbricht und die Symptome nachlassen; erfolgt diese Besserung nach 25 Minuten nicht, dann andere Mittel.

Aquae destillatae Vegetabilium s. S. 49.

Aqua Florum Aurantii s. *Naphae*. Pomeranzen- od. Orangenblüthwasser. [Riecht und schmeckt sehr angenehm. — 1 Unze $\frac{1}{2}$ Sgr.] Esslöffelweisé pur; häufiger noch als Constituens von Mixturen, von Waschwässern. Corrigen's verschiedener Arzneien. Vgl. *Aquae destill. Vegetab.*

Aqua Foeniculi. Fenchelwasser. [Riecht und schmeckt

Manchen angenehm. — 1 Unze $\frac{1}{4}$ Sgr. — *Aq. Foenic.* PH. MIL. ist eine Auflösung von *Elaeosacch. Foenic.* 1 in *Aq. comm.* 64.] Kindern bisweilen pur, theelöffelweise. Häufiger als Constituens von Mixturen, auch wohl Augenwässern. Vgl. *Aquae destill. Vegetab.*

* *Aqua foetida antihysterica.* [Von *Asa foet.*, *Galban.*, *Castor.*, *Myrrha*, *Faler.*, *Angel.* u. verschiedenen aromatischen Vegetabilien, zusammen Unc. 13 $\frac{1}{4}$, geistig-wässriges Destillat von L. 3. — Trübe. — 1 Unze 4 Sgr.] Innerl. etwa zu 1 Theelöffel 2 stündlich; pur oder in Mixturen [Ry 112].

112.

Ry *Elixir. Propriet. Paracelsi* Scr. 4
Aq. foet. antihyster. Unc. 3

Aq. Chamomill. Unc. 4.

M. D. S. Früh und Abends, ungeschüttelt, 1 Essl. (Bei Hysterie mit Dysmenorrhoe.)
 HEIM.

* *Aqua hydrosulphurata s. hepatica s. hydrothionica.* *Acidum hydrothionicum liquidum.* Schwefelwasserstoffwasser. Hydrothionsaures od. Leberluft-Wasser. Flüssige Hydrothionsäure. [1 Unze $\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave* Salpetersäure, Basen [Alkalien, Erden, Metalloxyde], Metallsalze; mehrere Extracte; Luft, Wärme.

Innerl. zu L. $\frac{1}{2}$ -1 u. mehr auf den Tag; bei Metallvergiftungen becherweise alle 1- $\frac{1}{4}$ St. Pur [bestes Corrigen: *Botulus Menth. pip.* hinterher genommen] oder zu künstlichen Mineralwässern [Ry 113, 114].

Ausserl. als Waschwasser [unverdünnt].

113.

Ry *Natri muriat.* Gr. 9
 — *carbon. dep.* Scr. 1
solvo in
Aq. comm. Unc. 21 $\frac{1}{2}$
addo

Aq. hydrosulph. Unc. 5 $\frac{1}{2}$.
 D. S. Künstliches Aachener Wasser. (Etwa des Morgens becherweise diese Portion zu verbrauchen.) PH. GALL.

114.

Ry *Natri muriat.* Gr. $\frac{1}{2}$
 — *carbon. dep.* Gr. 16
solvo in
Aq. comm. Unc. 21 $\frac{1}{2}$
addo

Aq. hydrosulph. Unc. 5 $\frac{1}{2}$.
 D. S. Künstliches Badeges-Wasser.
 (Wie das vorige.) PH. GALL.

Aqua Lauro-Cerasi. Kirschchlorbeerwasser. [Von L. 2 der frischen Blätter L. 3 geistig-wässrigen (doch mehr wässrigen) Destillats abgezogen. — Gehalt an Blausäure wie bei *Aq. Amygdal. amar.*; auch darf diese, wo das Kirschchlorbeerwasser in Ermangelung von frischen Blättern nicht bereitet werden kann, demselben substituirt werden. (Es ist wohl nur ein Versehen, dass die PH. BOR. hier nicht auch, wie bei der *Aq. Amygd. amar.*, *ed Guttas quinquaginta!* angibt.) — Meist klar. — 1 Unze 2 $\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave* [mit zahlreichen sanctionirten Ausnahmen] wie bei *Aq. Amygd. amar.*

Innerl. (*ad Guttas triginta!*) zu 10–12 (allmählig steigend bis wohl zu 60) Tropfen, mehrmals tägl. (Man rechne 70–75 Tropfen auf die Drachme.) Pur [wenn man es bei unvorsichtigen Leuten nicht tropfenweis geben will, mit Wasser oder Syrup verdünnt, auf Dr. 1 etwa Dr. 6 Wasser oder. Unc. 1 *Syr. Cerasor.*, wo dann 1 Theelöffel 10–11 Tropfen enthält.] oder in Mixturen [Ry 115; 176 (*Calcar. muriat.*), 250 (*Chintum sulph.*), 348 (*Extr. Bellad.*). Vgl. auch *Baryta muriat.*, *Extr. Acon.*, *Bellad.*, *Conii macul.*, *Hyose.* — Unc. $\frac{1}{2}$ mit *Tinet. kafn.* Dr. 2 (unchemische Verbindung, welche sich bald zer- setzt), 2stündl. 35–50 Tropfen mit Haferschleim (und daneben Ölemulsionen): FRICKE bei Tripper in der Entzündungsperiode. — Dr. 2 mit *Tinet. Op. simpl.* Ser. 1, 2stündl. 10–15 Tropfen: PITSCHAFT bei *Angina pectoris* (daneben nöthigenfalls noch jeden Abend oder einen um den andern ein Paar Gran *Extr. Aloë*). — Bei der Cholera gaben es Rigaer Ärzte theils pur, theils mit *Liq. Ammon. succin. ana*, in beiden Fällen zu 1 Theelöffel stündl.].

Ausserl. zu Dämpfen [mehrmals tägl. Dr. 1–4 auf einen erwärmten, mit etwas Sand bestreuten Teller gegossen, den Dunst 10–12 Minuten lang eingeathmet (etwa den Kopf mit einem dicken Tuche bedeckt): KRIMER u. A. bei Krampfständen der Lungen, der Brustmuskeln (?), im Keuchhusten], Klystieren [nicht leicht mehr als Dr. 1] u. a. Einspritzungen [in der Regel verdünnt; selten, nur etwa bei Krebsgeschwüren od. dgl.; pur (vorsichtig!)] — Ry 456 (*Hb. Bellad.*), 505 (*Hydrag. hydrocyan.*), 815 (*Plumb. acet. dep.*), 1092 (*Fitriol. alb.*), Augewässern [meist nur als Zusatz: zu Augenbähungen Dr. 1–4 auf Unc. 4 — Ry 523 (*Hydr. mur. corr.*), 1095 (*Zinc. hydrocyan.*) —; zu Augentropfwässern Dr. $\frac{1}{2}$ –1 auf Unc. $\frac{1}{2}$. Doch auch wohl per; z. B. Salmiak Gr. $2\frac{1}{2}$ in *Aq. Laurocer.* Unc. $\frac{1}{2}$ gelöst; ANDREAE bei Hornhautflecken; *Baryt. muriat.* Gr. $2\frac{1}{2}$ in *Aq. Laurocer.* Unc. $\frac{1}{2}$, stündl. einige Tropfen eingestüst: HARGENS zu gleichem Zweck.], Waschungen u. Umschlägen [Dr. 3 mit *Aq. Cürs* Unc. 3; hiermit getränkt (u. 2stündl. die Tränkung erneuert) ein Stück Baumwollwatte überschlagen: BROGLIA DAL PERSICO gegen Neuralgien; doch möchte die von diesem Autor angewandte *Aq. Lauroc.* stärker als die unsrige seyn. — Ry 116; 351 (*Extr. Bellad.*)], Breiumschlägen [selten. — Mit Brodkrume zum Brei, auf schmerzhaft und angeschwollene Märrorrhoidalknoten: TOMMASINI.], Bädern [4 Unzen zu jedem Bade: PAGANINI bei Entzündungen, Neuralgien, Geisteszerrüttung u. s. w.], Verbandwässern [Ry 353 (*Extr. Calendul.*)]; auch endermatisch [mit *Extr. Hyose.*, *Bellad.* od. dgl. als Brei: KRAUS bei Neuralgie p. p.].

115.

Ry *Extr. Dulcamar.* Scr. 1
— *Cardus bened.* Dr. 1

solvs in

Aq. Foenic. Unc. 1

addo

Aq. Laurocer. Dr. 1.

M. D. S. 4mal tägl., umgeschüttelt,
60 Tropfen. (Bei hartnäckigem, hefti-

gem Husten, der nach der Influenza zu-
rückbleibt; auch bei anderen chronischen
katarrhal. Husten.) HUFELAND.

116.

Ry *Aq. Laurocer.* (oder *Amygd. amar.*)— *vegeto-min.* Goul. ana Unc 2— *Rosar.* Unc. 3.

M. D. — Umgeschüttelt zum Wa-

schen oder Buben. (Bei heftigen Neuralgien. — Mit Zusatz von einigen Unzen Essig bei erhöhtem Erthismus der Ge- | schlechtstheile. — beider Geschlechter — und dessen Folgen.)
Liquor antereethicus PH. P.

Aqua Melissa. Melissenwasser. [Riecht u. schmeckt ziemlich angenehm. — 1 Unze $\frac{1}{2}$ Sgr.] Constituens von Mixturen. Vgl. *Aquae destill. Vegetab.*

Aqua Menthae crispae. Krauseminzwasser. [Riecht u. schmeckt angenehm. — 1 Unze $\frac{1}{2}$ Sgr.] Constituens von Mixturen, namentlich Elixiren; auch wohl zu Augengewässern. Vgl. *Aquae destill. Vegetab.*

Aqua Menthae piperitae. Pfefferminzwasser. [1 Unze $\frac{1}{2}$ Sgr. — *Aq. M. p.* PH. MIL. wie ihre *Aq. Foenic.* (s. S. 58 Z. 1) bereitet.] Wie *Aq. Cinnam. simpl.*

Aqua Menthae piperitae vinosa s. spirituosa. Geistiges Pfefferminzwasser. [Über L. 1 Pfefferminzkraut L. 6 geistig-wässrigen Destillats abgezogen. — Trübe. — 1 Unze $\frac{2}{3}$ Sgr.] Wie *Aq. Cinnam. vinosa.*

† **AQUAE MINERALES s. medicatae (nativae et facticiae).** Mineralwässer (natürliche u. künstliche). Wir sprechen hier nur von der Anwendung der versendeten oder in STRUVESchen Trinkanstalten zu gebrauchenden Mineralwässer; Vorschriften über den Gebrauch der natürlichen Wässer an der Quelle zu geben, müssen wir den Brunnenärzten überlassen, deren Jedem sein Brunnen ein Gegenstand speciellen Studiums seyn muss. Unseres Wissens werden in Deutschland nur folgende Brunnen (häufig und auf grössere Entfernungen) versendet oder in STRUVESchen Anstalten getrunken [wir ordnen sie nach OSANN und bezeichnen mit einem * die natürlichen, mit einem † die STRUVESchen, welche versendet werden, mit einem ! diejenigen STRUVESchen, zu deren Darreichung in Bechern in den Trinkanstalten besondere Vorkehrungen getroffen sind]:

1. Eisenwässer.

Erdig-salinische:

Pyrmont, Trinkquelle oder Hauptbrunnen * † !

— , Augenbrunnen *

Driburg *

Alkalisch-salinische:

Eger, Franzensbrunn * † !

Marienbad, (Auschowitz) Ferdinandsbrunn * † !

Alkalisch-erdige:

Spas, Pouhon * † !

Schwalbach, Stahlbrunnen *

Cudowa * †

Tönnisstein *

Erdiges:

Wildungen *!

2. Schwefelwässer.

Alkalisch-salinisches:

Weilbach *

Erdig-salinische:

Nenadorf, Schwefelbrunnen *

Eilsen, Georgenbrunnen *

3. Alkalische Wässer.

Erdig-alkalische:

Ems, Kesselbrunn (Therme) * †!

—, Krähnen (Therme) * †!

Schlangenbad (Therme) *

Salinisch-alkalische:

Bilin †

Fachingen *

4. Bittersalzwässer.

Saidschütz * †

Püllna * †

5. Glaubersalzwässer.

Alkalische:

Karlsbad, Sprudel (59-60° R.)!

—, Neubrunn (48-50° R.) †!

—, Mühlbrunn (45-47° R.)!

—, Theresien- oder Gartenbrunn (42-45° R.)!

Marienbad, Kreuzbrunn * †!

6. Kochsalzwässer.

Eisenhaltiges:

Kissingen, Ragozi * †!

Reich an Iod- u. Brom-Salzen und an Kohlenwasserstoffgas:

Adelheidsbrunn *

7. Sauerlinge.

Alkalisch-muriatischer:

Selters * †!

Alkalisch-salinische (alkalisch-sauerstoffsalzige)

Obersalzbrunn (Schles.) * †

Eger, Salzquelle * †!

Alkalisch-erdiger:

Giesshübel, Buchsauerling oder Rodisfarther Sauerbrunn *

Eisenhaltiger:

Geilnau * †.

Von diesen Wässern wird das Schlangenbader meistens nur zum Waschen benutzt. Die übrigen werden in der Regel nur getrun-

ken, seltener äusserlich, etwa zu Klystieren, Augenwässern [vgl. z. B. † *Fol. Theae*], angewandt. Das Trinken geschieht meistens in methodischen Curen; nur die Bittersalzwässer, besonders das [merklich kräftigere] Püllnaër, werden auch bisweilen bloss als gelinde Abführmittel zu Einmaliger oder einigemaliger Wirkung benutzt [so dass man einige grosse Weingläser an Einem Tage —, oder ein Paar Gläser vor dem Frühstück (im Winter noch im Bette) oder bei Personen, die nüchtern kein Wasser vertragen, 1 Stunde nach dem Frühstück —, oder auch Abends vor Schlafengehn ein Glas, und am folgenden Morgen noch ein Paar Gläser, nehmen lässt]; das Selterser Wasser und der Giesshübler Buchsäuerling bisweilen bloss als diätetisches Getränk [jenes zu $\frac{1}{2}$ - 1 Flasche und mehr täglich oder auch, wie der Buchsäuerling, ganz *ad libitum*; bisweilen mit Weid (z. B. 2 Wasser mit 1 Franzwein u. Zucker *q. l.*, jedes Weinglasvoll *ex tempore* gemischt), Milch, Molken p. p.; — namentlich wird der Buchsäuerling bisweilen als gewöhnliches Getränk während einer Karlsbader Cur oder auch zur Nachcur nach einer andern Brunnencur getrunken].

Für die methodischen Curen lässt sich weder die Quantität, welche von jedem Brunnen täglich getrunken werden soll, noch die Dauer der Cur genau bestimmen, beides muss sich hauptsächlich nach der Wirkung richten. [Von der früher üblichen Eintheilung der Brunnencuren in grosse oder starke, mittlere, und kleine oder schwache, ist jetzt, weil die grossen (wahre Überschwemmungscuren) ausser Gebrauch gekommen sind, nicht eben mehr die Rede; man instituiert in der Regel nur mittlere und bisweilen kleine Curen in jenem Sinne. — Eine scheinbar ungünstige Wirkung des Brunnens im Anfange darf weniger oft zum Aufgeben der Cur als zur Verlängerung derselben bestimmen: oft regt der Brunnen zu Anfang alte Leiden auf, die er erst spät beseitigt.] In der Regel lässt man jedoch mit 3 oder 4 Bechern oder Gläsern (welche 5-6 Unzen fassen, — wie sie an den meisten Heilquellen in Gebrauch sind) auf den Tag beginnen, binnen 2 bis 5 Wochen [so oft die Wirkung zu stark wird, mit der Quantität zurückgehend] allmählig auf 8, auch wohl 12 (und — namentlich bei warmen Brunnen — mehr) Becher steigen, und dann binnen 1 bis 3 Wochen wieder bis auf diejenige Becherzahl, mit welcher man anfang, fallen. [Bei den Bittersalzwässern, wenn man diese zu methodischen Curen anwendet, nur halb so grosse Quantitäten täglich.] In manchen, sehr chronischen Fällen ist es rathsam, täglich nur einige wenigen Gläser gebrauchen, dies aber recht lange fortsetzen zu lassen [so namentlich wohl, wo man einen Brunnen nur als Palliativmittel gegen ein jahrelang dauerndes Übel, z. B. Geilnau bei Lithiasis, gebrauchen lässt; man muss jedoch in solchen Fällen, um der Gewöhnung zu begegnen, ab und zu aussetzen, auch wohl mit der Quantität etwas steigen lassen]. Ist ein Kranker an einem Tage zum Trinken nicht disponirt, so quäle man ihn nicht damit, lasse lieber an einem andern Tage etwas mehr trinken [an kühlen, unfreundlichen Tagen ist es oft rathsam, etwas weniger —, an heissen, etwas mehr trinken zu lassen].—

Bisweilen verbindet man den Gebrauch zweier Brunnen; seltner so, dass man die Wässer mit einander mischt als so, dass man an demselben Tage erst von dem einen, dann von dem andern eine Anzahl Gläser trinken lässt [wobei man dann wohl allmählig durch Verminderung der Becherzahl des ersten, Vermehrung der des zweiten, zu dem letzteren ganz übergeht; auf diese Weise pflegt man namentlich bei den Karlsbader Quellen von den minder heissen zu den heisseren, namentlich zum Sprudel, überzugehen (wobei man an demselben Tage die minder heisse Quelle zuerst, die heissere zuletzt trinken lässt)]. — Bisweilen macht man Zusätze zum Brunnen, z. B. von Milch [von Kühen, Ziegen oder Eselinnen, meist warm, so dass das Gemisch lau wird], Molken, eröffnenden Salzen [namentlich Karlsbader oder Bittersalz, falls man es nicht vorzieht, lieber durch ein Klystier aus gewöhnlichem oder Mineral-Wasser, oder nöthigenfalls durch eine apart gereichte Arznei, z. B. eine Portion Pillen des Abends, für hinlängliche Öffnung zu sorgen]; über das Verbinden von Presssäften mit Mineralwässern vgl. I. S. 340 [auch andere eigentliche Arzneimittel (die man überhaupt während der Brunnencur möglichst vermeidet, ausser den bereits genannten nur etwa noch leichte Amara ausgenommen; sonst setzt man, wenn Arzneien nöthig werden, lieber den Brunnen aus) wolle man nicht mit dem Brunnen vermischen]. Kann ein Kranker das viele kalte Wasser [zumal bei einer Cur im Winter] oder die reichliche Kohlensäure eines Brunnens nicht vertragen, so lässt man denselben ein wenig erwärmen, was oft dadurch am besten geschieht, dass man warme Zusätze macht [z. B. von Milch, bei den Glaubersalzwässern (in einer Trinkanstalt) von Karlsbader Wasser p. p.]. Nur die eigentlichen Säuerlinge zu erwärmen, ist in der Regel Schade, weil gerade in diesen die Kohlensäure das hauptsächlich Wirksame ist. Dagegen erwärmt man die Thermalwässer gern so, dass sie den an der Quelle getrunkenen möglichst gleich kommen. — Die Brunnencur muss durch die gesammte Lebensordnung möglichst unterstützt werden; dies wird man in der Regel am besten erreichen, wenn man die Lebensordnung der an den natürlichen Heilquellen eingeführten ähnlich einrichtet, also etwa folgendermassen [es bedarf wohl heutiges Tags kaum noch der Erinnerung, dass die hier gegebenen Regeln nicht sacrosanct sind und dass es einseitig wäre zu glauben, es sey beim Gebrauche eines Brunnens nur Eine diätetische Methode anwendbar und heilsam]: Der Kranke trinkt früh, nüchtern [nur bei sehr reizbaren Personen, sehr schwacher Verdauung, an kalten, nebligen Morgen, darf vor dem Brunnen etwas Kaffee oder Chocolate ohne Milch erlaubt werden], binnen einem Paar Stunden, becherweise [etwa jede Viertel- oder halbe Stunde einen Becher, oder auch kleinere Portionen öftet, wie es ihm am behaglichsten ist — jedesmal erst dann eine neue Portion, wenn er fühlt, dass die vorige verdaut ist. Die Flasche (Kruke) werde nach jedem Einschenken gut verkorkt und umgekehrt an einem kühlen Orte aufbewahrt; in einer Trinkanstalt fällt dies begreiflich weg. Bei den versendeten Wässern sind die klei-

neren Flaschen (Kruken) den grösseren vorzuziehen.], unter mässiger Bewegung, wo möglich im Freien [deshalb ist in der Regel die wärmere Jahreszeit vorzuziehen; sonst ist man von dem Princip, Brunnencuren nur in dieser zu instituiren, zurückgekommen, und findet für manche Fälle die kältere Jahreszeit sogar passender. Bei Kranken, welche Bewegung am frühen Morgen sehr angreift, oder welche des Morgens zur Transpiration geneigt sind, oder bei ungünstiger Witterung, rauher Morgenluft, ist es oft rathsam, die ersten Gläser im Bette (wo aber dann halbstündige Pausen zwischen den einzelnen Gläsern unerlässlich sind) trinken und später einige Bewegung vornehmen zu lassen.], und möglichst angenehmer, doch nicht geistesanstrengender, Unterhaltung [Brustkranke sollen aber wenig sprechen]. Nach beendigem Trinken pflege der Kranke eine Zeitlang einer körperlichen und geistigen Ruhe, ohne jedoch zu schlafen; dann frühstücke er. Nach einer abermaligen Pause kann am Vormittag etwa noch ein [einfaches oder mit Heilstoffen künstlich geschwängertes] Bad genommen [und nach demselben etwa noch der Unterleib oder der ganze Körper frottirt p. p.] werden. [Oft wird man zweckmässig erst einige Tage oder eine Woche nach dem Anfang der Trinkcur zu baden beginnen lassen.] Am Nachmittag wo möglich wieder eine, active oder passive, Bewegung im Freien. Gegen Abend nochmals Brunnen zu trinken, ist nur ausnahmsweise zu gestatten. — Die ganze (körperliche und geistige) Diät sey (nach allgemeinen Grundsätzen und nach der Individualität des Kranken) geregelt und mässig, alle Nahrungsmittel leicht verdaulich, so dass man nicht nöthig hat, durch erhitzende Gewürze, deren Wirkung schlecht zu der des Brunnens passen würde, die Verdauung zu unterstützen; sollte diese dennoch so leiden, dass man es für nöthig fände, ihr durch Arznei zu Hülfe zu kommen, so werden leichte Amara wohl fast immer die Arome und Acrien entbehrlich machen. Aus chemischen Gründen hat man nur etwa zu vermeiden, dass Säuren irgend einer Art mit dem Brunnen zusammentreffen [deshalb ist am Vormittag selbst Obst zu untersagen; — frisches Obst bekommt überhaupt während der Cur Vielen nicht gut, gekochte Pflaumen aber desto besser]. — Die Menstruation nöthigt bisweilen zum Unterbrechen der Kur, manchmal auch bloss zum Aussetzen der nebenbei gebrauchten Bäder. — Besonderer Vorbereitungscuren, welche früher sehr üblich waren und meistens in einem symptomatischen Reguliren einzelner Functionen bestanden, bedarf es keineswegs immer; nur bisweilen werden sich allgemeine oder örtliche Blutentziehungen [die letzteren auch wohl während der Cur], Entleerung des Darmcanals p. p. nöthig machen, häufiger ein allmähliges Regeln einer unpassenden Lebensweise, und einige vorläufige Gewöhnung an kaltes Wasser und Bewegung. Wichtiger als die Vorcur ist in der Regel eine Nachcur,

Fortsetzung des Brunnengebrauchs in kleinen Quantitäten und der geregelten, mässigen Lebensweise noch Wochen oder Monate lang. — Am strengsten sind die angedeuteten diätetischen Anordnungen beim Gebrauch der Thermalwässer durchzuführen [bei welchen auch z. B. der Gewöhnung des Kranken an den Genuß geistiger Getränke nicht so leicht als bei anderen Brunnen nachgesehen werden darf], am mindesten streng bei den bloss purgirenden Wässern.

Der Gebrauch der Thermalwässer ruft leicht Zahnschmerzen (bei empfindlichen Zähnen), auch Erschlaffung, bisweilen Entzündung, des Zahnfleisches hervor. Man suche deshalb die Berührung zwischen Wasser und Zähnen möglichst zu vermeiden, trinke nicht bald nach dem Brunnen kalt, putze die Zähne nicht vor dem Trinken, lasse etwa mit Weinstein stark belegte Zähne erst nach der Cur von demselben [der einigermaßen schützt] reinigen, handle das erschlaffte Zahnfleisch mit balsamischen oder adstringirenden Flüssigkeiten [in vielen Fällen wird die Zahntinctur R. 117 passen], das entzündete mit Blutegeln p. p.

117.

R. Caryophyllor.

Rad. Galarag.

— Zingiberis

Cort. Chinæ fusci ana Dr. 2

Laccae in Granis Dr. 1½

Benzoe

Syracis calamit. ana Dr. ½

Spir. Feni rftiss. Dr. 6

Aceti concentr. Unc. 1½

Aceti Unc. 5.

Digere; in Colat. solve

Acidi boracici Dr. ½.

Fültra. D. S. STRUVESche Zahntinctur.

(Mit gleichen Theilen Wasser verdünnt, mittelst einer Schwammbürste auf Zahnfleisch und Zähne anzuwenden. — Man könnte dieses Compositissimum bei magistraler Verordnung wohl durch Weglassen des Galgans, Ingwers und Storax vereinfachen.)

* *Aqua Opii.* Opiumwasser. [Über 1 Opium 6 Wasser abgezogen. Unsicheres Präparat; nur aus frischem Opium bereitet recht kräftig. — 1 Unze 4½ Sgr.] Zu Augenwässern [zu Augenpinselwässern q. v.; zu Augentropfwässern verdünnt oder ebenfalls pur — vgl. z. B. *Extr. Bellad.* —; zu Augenbähungen Dr. ½ - 2 auf Unc. 4. Für die beiden ersteren Arten von Augenwässern wird es oft als Constituens gebraucht]; als Constituens antodontalgischer Latwergen.

Aqua oxymuriatica s. Chlori. Acidum muriaticum oxygenatum s. oxymuriaticum (liquidum). Chlorina liquida. Liquor Chlori. Oxydirt-salzsaureres Wasser; Chlorwasser etc. [Das Präparat wird für den inneren Gebrauch mit *Aq. destill.*, für den äusseren mit *Aq. font.* bereitet; der Arzt muss also, namentlich bei Arzneien für die innerliche Anwendung, nicht unterlassen, den Apotheker durch die Unterschrift darauf aufmerksam zu machen, dass die Arznei diese Bestimmung habe, also nicht etwa bloss ein: *Nach Verordnung* darunter setzen.

Aber auch zum äusserlichen Gebrauch wird es bisweilen ratheam seyn, ausdrücklich zu schreiben: *Ry Aq. oxymyriat. c. Aq. destill. paratas.* — 1 Unze resp. $1\frac{1}{2}$ und $\frac{3}{4}$ Sgr.] *Cave:* s. I. S. 32 *sub* 2. Der Leichtzersetzbarkeit wegen ist es rathsam, einige durch Erfahrung sanctionirte Verbindungen ausgenommen, Verbindungen mit anderen Mitteln zu vermeiden, oder doch nur auf sehr kurze Zeit zu verordnen [so z. B. wenn man das Mittel, wie wohl geschieht, mit *Decoct. Althaeae* oder zum äusserlichen Gebrauch mit Honig verbindet]. Zwar mag manche empfohlene Formel gerade durch die Bildung von Salzsäure wirksam geworden seyn, aber diese Bildung liegt doch nicht in der Absicht.

Innerl. zu Dr. 1–4 [Viele geben die Dose niedriger an, aber von einem gut bewahrten, nur Chlor enthaltenden Wasser darf man unbedenklich diese Dose geben; von einem veränderten dagegen, welches Salzsäure enthält, kann mitunter schon eine weit geringere Dose unangenehm wirken, den Mund aufätzen, Erbrechen und Durchfall erregen, u. s. w.] einigemal tägl. [etwa Unc. $\frac{1}{2}$ –2 auf den Tag]; am besten bloss mit *Aq. destill.* verdünnt [allenfalls noch mit etwas *Syr. simpl.*; doch ist es zweckmässiger, jede Einzelgabe apart versüssen zu lassen]; auch wohl unverdünnt [nur muss man dann, des erstickenden Geruches wegen, beim Einnehmen die Nase subalten und die Arznei rasch verschlucken lassen]. Zum Getränk [Unc. $\frac{1}{2}$ –1 auf ein Quart Zuckerwasser, ebenfalls nur portionenweise zu mischen].

Äusserl. zu Mund- u. Gurgelwässern [Ry 118, 119. — Gegen üblen Geruch aus dem Munde, besonders von schlechtem Zahnfleisch und Zähnen, *ex tempore* mit 2 Theilen Wasser verdünnt und jedesmal 5–10 Tropfen *Spir. muriat. aeth.* zugesetzt: LOCKSTAEDT.], Pinselsäften [etwa mit *Mel. despum.* oder *Syr. simpl.* ans, oder 1 auf 2 dieser Säfte], Einathmungen [s. I. S. 382], Injectionen [Ry 388 (*Extr. Op.*)], Augewässern [selten; etwa Dr. 2 (oder mehr) auf Unc. 4, am besten bloss *Aq. destill.*, da eine Zersetzung hier besonders nachtheilig werden könnte], Waschungen [verdünnt oder nicht. — Mit gleichen Theilen Wasser verdünnt wendet es SCHÖNLEIN oft (statt der kalten Begiessungen, die er für nicht gefahrlos hält) zu Waschungen im Scharlach an, wenn bei torpidem Fieber das Exanthem sich nicht auf der Haut entwickeln will: man soll alle 2 St. mittelst eines Schwammes den ganzen Körper damit waschen und es auf der Haut verdunsten lassen. — Ähnliche Waschungen schlägt EISENMANN bei (gutartigem) Varioleld vor.], Linimenten [z. B. oft bei Hautkrankheiten Dr. 1 oder mehr auf 1 Unze fetten Öls], Salben [z. B. 1 auf 8 Fett: *Ungt. chlorat.* PH. AUSTR. (*ex tempore parand.*)]. Zum Sprengen in Krankenzimmern [ein milderer Mittel, aber freilich auch weit weniger kräftig als die Chlorröucherungen]; auch wohl zum Waschen von Kleidungsstücken und Mobilien, die auf Ansteckungsstoffe verdächtig sind [doch ist hier das Durchröuchern mit Chlor oder das Waschen mit einer Auflösung von *Chlorum Calcar.* (vgl. den Artikel) als kräftiger vorzuziehen].

118.

Ry Gummi Tragacanth. Gr. 10

also in

Aq. comm. (besser destill.) Unc. 4

addo

Aq. oxymuriat. c. Aq. dest. par.

Syr. simpl. ana Unc. $\frac{1}{2}$.

M. D. in vitro charta nigra invol. S. Gergelwasser. (Bei Geschwüren und chronischen Entzündungen in der hinteren Mundgegend.)

Formel der Maison de Santé zu Paris.

119.

Ry Aq. oxymur. Unc. $\frac{1}{2}$

Mell. rosati Unc. 1

Infusi Hb. Salv. (Unc. $\frac{1}{2}$) Unc. 6.

M. D. in vitro charta nigra invol. S. Zum Ausspülen und Auspritzen des Mundes. (Bei asthenischen Aphthen und ähnlichen Halsentzündungen der Kinder.)

BERENDS.

Die Vorschrift mag wohl durch Salzsäure mehr als durch Chlor wirksam werden.

Aqua Petroselini. Petersilienwasser. [Trübe. — 1 Unze $\frac{1}{2}$ 8gr.] Constituens von Mixturen. Vgl. *Aquae destill. Vegetab.*

★ ★ **Aqua phagedänica.** *Aq. aurea.* Altschadenwasser. [1 $\frac{1}{2}$ Gran Sublimat auf 1 Unze Kalkwasser. Durch Zersetzung bildet sich ein safrarfarbener Niederschlag (Quecksilberoxydhydrat, während salzsaurer Kalk und etwas unzersetzter Sublimat aufgelöst bleibt), der in der Flüssigkeit schwebt, weshalb diese vor der Application jedesmal umgeschüttelt werden muss. — 1 Unze $\frac{1}{2}$ 8gr.]

Nur äusserl. (≠) und pur als Verbandwasser oder zu gelind reizenden Einspritzungen in abnorme Höhlen [eitrige, fistulöse Geschwüre od. dgl.].

† **Aqua picea** PH. SLESV. Theerwasser. [1 Theer mit 12 Wasser unter öfterem Umrühren macerirt, dann die klare Flüssigkeit decantirt. — 1 Unze $\frac{1}{2}$ 8gr.]

Innerl. tassenweise, zu $\frac{1}{2}$ - 1 Quart auf den Tag [etwa wie einen Mineralbrunnen, besonders des Morgens, unter Bewegung im Freien; und dies wenigstens wochenlang fortgesetzt], pur oder allenfalls, um es angenehmer zu machen, mit etwas Wein.

Äusserl. [selten] als Verband- oder Wasch-Wasser, pur.

★ ★ **Aqua plumbica s. saturnina.** Bleiwasser. [Acet. plumb. Unc. $\frac{1}{2}$ auf Aq. destill. L. 2. — Trübe, weisslich. — 1 Unze $\frac{1}{2}$ 8gr.] Äusserl. (≠) zu Fomentationen, Waschungen, Einspritzungen, Cataplasmen. Vgl. *Acet. plumbic.*

† **Aqua Pruni Padi** PH. HANN. [Von L. 2 der frischen Binde L. 3 geistig-wässrigen, doch mehr wässrigen, Destillats abgezogen. Gehalt an Blausäure merklich schwächer als bei *Aq. Amygd. amar.* und *Laurocer.* — 1 Unze 1 Mgr., 6 Unz. 4 $\frac{1}{2}$ Mgr.] Innerl. theelöffelweise, pur

oder in Mixturen. Auch äusserl. [wo sie durch ihre Wohlfeilheit oft den Vorzug vor den genannten beiden Wässern verdienen wird] in verschiedenen Formen.

Aqua Rosarum. Rosenwasser. [Riecht sehr angenehm; schmeckt auch, verdünnt, angenehm. — 1 Unze $\frac{1}{2}$ Sgr.] Beliebtes Constituens von Augenwässern [hier *Aq. Ros. non salitarum* vorzuschreiben, ist ganz überflüssig, denn wenn die Rosenblüthen auch eigesalzen aufbewahrt wurden, so ist doch das Salz nicht flüchtig, geht also bei der Destillation des Wassers nicht mit über], Waschwässern; überhaupt zu allerlei cosmetischen Mitteln. Vgl. *Aquae destill. Vegetabb.*

Aqua Rubi Idaei. Himbeerwasser. [Riecht angenehm, schmeckt aber bisweilen unangenehm, wanzentartig. — 1 Unze $\frac{1}{2}$ Sgr.] Constituens von Mixturen. Vgl. *Aquae destill. Vegetabb.*

Aqua Rutae. Rautenwasser. [1 Unze $\frac{1}{2}$ Sgr.] Constituens von Mixturen. Vgl. *Aquae destill. Vegetabb.*

Aqua Salviae. Salbeiwasser. [1 Unze $\frac{1}{2}$ Sgr.] Als Constituens von Mixturen; häufiger zu Mund- u. Gurgelwässern. Vgl. *Aquae destill. Vegetabb.*

Aqua Sambuci. Holunder- oder Flieder-Wasser. [1 Unze $\frac{1}{2}$ Sgr.] Als Constituens von Mixturen, von Augen-, Mund- u. Gurgelwässern etc. Vgl. *Aquae destill. Vegetabb.*

★★ **Aqua sulphurato-stibiata.** *Aq. sulphurata* P. R. F. Auflösung von Schwefelspiessglanzkalk. [*Calcar. sulphurato-stib.* Dr. 2 mit L. 5 auf L. 4 gekocht; filtrirt (vgl. I. S. 142). — *Solutio Calc. sulphurato-stib.* PH. HANN. (*Decoct. Sulphureti Calcis Hoffmanni*) ist nur halb so stark; 1 L. $\frac{4}{5}$ Mgr.]

Man giebt es pur, oder etwa mit Milch, Fleischbrühe, taschenweise, zu L. 1, wenn es vertragen wird, auch L. 2–3 tägl. Nebenbei Sorge man nöthigenfalls durch andre Mittel für regelmässige Digestion, vermeide aber den gleichzeitigen Gebrauch der unter *Calcar. sulphurato-stib.* angegebenen zersetzenden Stoffe.

★★ **Aqua vegeto-mineralis Goulardi.** GOULARD'sches Bleiwasser. [*Acet. plumbic.* Unc. $\frac{1}{2}$, *Aq. font.* L. 2, *Spir. Fini* rft. Unc. 2. — Trübe (jedesmal umzuschütteln), weiss. — 1 Unze $\frac{1}{2}$ Sgr.] Äusserl. (≠) wie *Aqua plumbica*; vgl. *Acet. plumbic.* [Es versteht sich, dass man, wenn man die Formel magistral verschreibt, mit den Verhältnissen der Ingredientien variiren kann; z. B. Ry 120. — Ry 116 (*Aq. Laurocer.*).]

120.

Ry *Aceti plumbici* Unc. 1*Aq. fontanae* L. 2*Spir. Vini* f. st. Unc. $\frac{1}{2}$.

M. D. S. Als Foment, kalt oder warm,

umgeschüttelt. (Etwas weniger reizend, mehr zusammenziehend und dadurch zertheilend als die officinelle Formel. — Bei nicht allzu activen äusseren Entzündungen.)

RUST,

* *Aqua vulneraria vinosa. Aq. traumatica s. scopularia spirituosus.* Geistiges Wund- od. Schuss-Wasser. *Arquebusade*, wohl noch mit dem Zusatz weisse zum Unterschied gegen die Thedensche (*Mixt. vulnerar. acida*). [Geistig-wässriges Destillat von 6, über verschiedene aromat. Kräuter, zusammen 1. — 1 Unze $\frac{5}{8}$ Sgr.] Verbandwasser (=).

AQUAE destillatae Vegetabilium s. S. 49.*AQUAE minerales* s. S. 60.

Argentum foliatum. Folia Argenti. Blattsilber. — Zum Überziehen von Pillen und Bissen [I. §. 151].

Argentum nitricum crystallisatum. Sal Argenti. Luna nitrica. Crystalli lunares. Nitrus argenticus. Silbersalpeter. Krystallisirtes salpetersaures Silberoxyd. [1 Gran $\frac{1}{4}$ Sgr.] *Sol.* 2. — *Cave* [mit zahlreichen durch Erfahrung sanctionirten Ausnahmen, z. B. Ry 123], ausser dem unter „Salpetersaure Salze“ (I. S. 33) Aufgeführten, auch: reine, kohlen-saure, salz., hydriods., hydrobroms., hydrothions., phosphors., arsenichts., blausaure Alkalien und die entsprechenden Säuren; essig-saures Kali, Natr., Blei; u. a. Salze; Seifen; Gerbestoff; viele Extracte; überhaupt viele vegetabilischen Auszüge [wehalb auch der Kranke den oft gleichzeitig verordneten Thee von Baldrian od. dgl. erst $\frac{1}{2}$ Stunde oder noch länger nach der Arznei nehmen mag], Schleimharze, Harze, äther. Öle, Äther, Phosphor, Kohle, Zucker, Süssholz, Gummi, etc.; Hitze, Luft, Licht; Zinn- oder Blei-Löffel zum Einnehmen. Der grossen Zersetzlichkeit wegen dürfte es vielleicht rathsam seyn, ihn bloss in *Aq. destill.* aufgelöst, esslöffelweise, pur zu geben (und nach jeder Gabe, um recht sicher zu seyn, dass nichts im Munde zurückbleibe, den Mund mit warmem Zuckerwasser ausspülen zu lassen), doch ist dies noch nicht üblich; auch scheinen die Zersetzungen hier etwas weniger als beim Sublimat die Wirkung zu beeinträchtigen, worüber jedoch, weil der Silbersalpeter seltner gebraucht wird, schwer zu urtheilen ist.

Innerl. (*ad Granum dimidium!* — *Non solutum* ≠) zu Gr. $\frac{1}{16}$ - $\frac{1}{2}$ - 1; 2-4 mal tägl. (Gern mit Opium und Schleim.) In Auflösungen [z. B. Gr. 3 in *Aq. destill.* Unc. $\frac{1}{2}$, zu 5-40 Tropfen ($\frac{1}{16}$ - $\frac{1}{2}$]

Gran), oder noch *Tinct. Opii simpl.* Dr. $\frac{1}{2}$ dazu, dann zu 6-48 Tropfen, in schleimigem Getränk. Oder R₁₂₁.] oder, besonders die grösseren Gaben, in Pillen [aber auch in diesen immer aufgelöst (I. §. 150). R₁₂₂].

Ausserl. zu Pinselungen in Mund und Rachen [in der Regel nur Gr. 2-6 auf Unc. 1, doch auch wohl stärker (z. B. Scr. 1 auf *Aq. destill.* Unc. 1; 1-2 mal tägl. zu appliciren: MACKENZIE bei Diphtheritis), da ja selbst die vorsichtige (!) Anwendung des Hüllensteins in Substanz zum Ätzen im Munde erlaubt ist. — Mund- und Gargelwässer, die man auch angewandt hat, dürften doch sehr gewagt und durch Pinselungen meist zu ersetzen seyn.], Einspritzungen in verschiedene Höhlen [nicht mit zinnernen Spritzen. — Z. B. für Harnröhre und Vagina Gr. $\frac{1}{2}$ -2 auf Unc. 1; so empfiehlt CLARKE nach Ausrottung der blumenkohlartigen Auswüchse am Uterus zur Verhütung des Wiederwachsens eine Auflösung von Gr. 1 auf Unc. 1 einzuspritzen, oder doch bei grosser Empfindlichkeit der Vagina ein damit befeuchtetes Stück Leinwand bis an die kranke Stelle des Muttermundes zu schieben. — Bei Schnupfen von einer Auflösung von Gr. 2-3 in 5-6 Unzen Wasser Dr. 1-2 erwärmt in die Nase zu ziehen: LÜWENHARD. — Bei eiterartiger Absonderung und selbst Caries im Gehörgange laue Einspritzungen zu Gr. $\frac{1}{10}$ auf Unc. 1: BUCHANAN; HERRMANN. Bei Taubheit von scrofulöse-fehlerhafter Absonderung des Ohrenschmalzes Gr. 1 auf Unc. 1: COATES. — Wo man in abnormen Höhlen eine adhäsive Entzündung hervorrufen will, kann man eine viel stärkere Auflösung, etwa 1 auf 48-16 (Scr. $\frac{1}{2}$ -Dr. $\frac{1}{2}$ auf Unc. 1) anwenden.], Augengewässern [Zu Augentropfwässern Gr. $\frac{1}{4}$ -1 auf Unc. $\frac{1}{2}$; nach v. GRÄFE bei schweren, torpiden, mit sehr vielem eiterigen Ausflusse verbundenen Augenblennorrhöen (wo man auf rasche Zersetzung des Mittels durch diesen Ausfluss zu rechnen hat) auch noch weit mehr, bis zu Gr. 5 auf Unc. $\frac{1}{2}$, 2 mal tägl. einzutropfen. — In Augenpinselwässern ist zwar auch schon eine Auflösung von Gr. $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$ in Dr. 2 recht wirksam, doch kann man auch eine weit concentrirtere anwenden, da ja selbst die vorsichtige Anwendung des Hüllensteins in Substanz am Augapfel erlaubt ist; doch wird man nach Application stärkerer Pinselwässer der Art gut thun, wie nach der Application in Substanz, sogleich etwas Milch oder Mandelöl ins Auge fallen zu lassen.], Augensalben [Gr. $\frac{1}{4}$ auf Dr. 2: SCHÖN gegen Hornhautgeschwüre von gonorrhöischer Augenentzündung. — Viel stärker R₁₂₃.] und anderen Salben [R₁₂₄], Verbandwässern [zu $\frac{1}{2}$ bis einigen Granen auf die Unze. — R₁₂₅]. — Als Ätzmittel das folgende Präparat.

121.

R₁₂₁ *Argenti nitrici cryst.* Gr. $\frac{1}{2}$ -3
solve in

Aq. destill. Unc. 2

adde

Tinct. Opii simpl. Scr. $\frac{1}{2}$

Mucil. Gm. Mimos. Unc. 1.

M. D. in vitro charta nigra invol. S.

3 mal tägl. 1 Essl. [Gr. $\frac{1}{12}$ - $\frac{1}{2}$].

122.

R₁₂₂ *Argenti nitrici cryst.* Gr. 5
solve in

Aq. destill. q. s.

adde

Opii pulver. Gr. 5

Pulv. Rad. Alth. Dr. 1

Extr. Dulcamar. q. s.

ut f. *Pilulae* 60. *Consp. Pulv. Rad. Alth. D. S.* 3 mal tägl. 1-6 [Gr. $\frac{1}{12}$ - $\frac{1}{2}$].

123.

Ry *Argenti nitrici cryst. sublim. pulv.* Gr. 3
Adip. suilli Dr. 1

Aceti plumbici Gtt. 5.

M. exactiss. D. in olla alba. S. Augen-
 salbe. — In sehr geringer Quantität al-
 les 3-2-1 Tage zu appliciren. (Gegen
 Knochentuberkel, besonders aber gegen
 Knochentuberkel, veraltete, mit Auflockerung
 der Palpebralconjunctiva verbundene
 Augenblennorrhöen und gegen chroni-
 sche, mit Pannusbildung und Hornhaut-
 trübungen verbundene Conjunctivitis.)

v. GRÄFE, nach GUTHRIE.

Zweckmässiger wäre es wohl, das salpe-
 ters. Silber erst in etwas destill. Wasser
 auflösen zu lassen. — v. GRÄFE bringt
 diese Salbe auch, auf spiralförmig ge-
 fertigte Wachsboogies gestrichen, bei
 tief wurzelnden, torpiden, hartnäckigen
 Genorrhöen in die Harnröhre. — GU-
 THRIE nimmt zu seiner Augensalbe „ge-
 gen chronische Ophthalmien“ bisweilen
 bis zu 10 Gran salpeters. Silbers und 15
 Tropfen Bleiessigs.

124.

Ry *Argenti nitrici cryst. pulv.* Scr. $\frac{1}{2}$
Ungt. Zinci Dr. 2

Bals. Peruviani Dr. $\frac{1}{2}$.

M. f. Ungt. D. S. Schwarze Verband-
 salbe. (Wenn syphilitische Geschwüre
 bis auf eine kleine Stelle heil sind, aber
 die völlige Vernarbung nicht zu Stande
 kommen will. Die Salbe bleibt 2-3 Tage
 ungewechselt liegen, bis sie durch den
 Eiter oder zugleich mit dem Schorf ab-
 gestossen wird.)

FRICKE.

125.

Ry *Argenti nitrici cryst.* Dr. $\frac{1}{2}$
solve in

Aq. Chamomill. Unc. 6

addo

Tinct. Opii simpl. Dr. $1\frac{1}{2}$.

M. D. in vitro charta nigra invol. S.
 Verbandwasser, umgeschüttelt mit Lapp-
 chen aufzuschlagen und Wachstafel dar-
 über zu legen. (Bei qualitativ schlechter
 Eiterung; oder zum Vernarben eines
 ganz dazu vorbereiteten, aber nun stehen
 bleibenden Geschwürs; u. s. w.)

RUST.

Argentum nitricum fusum. Lapis infernalis.

Causticum lunare. Nitras argenticus fusus. Höllen-
 stein. Geschmolzenes salpetersaures Silberoxyd.
 [1 Drachme 10 $\frac{3}{4}$ Sgr.] Nur (≠) als Ätzmittel in Substanz [als sol-
 ches sehr ausführlich abgehandelt in G. A. RICHTER's *Arzneimittell.* Bd. 4.
 S. 433 ff. u. Suppl. Bd. 8. 550 ff.]; zu jedem andern Behuf das vor-
 hergehende Präparat.

Arsenicum album. Catx s. Flores Arsenici. Acidum
arsenicosum. Weisser Arsenik; Arsenikkalk; Arse-
 nikblumen. Giftmehl; Rattengift; Hüttenrauch. Ar-
 senichte Säure. [1 Unze *pulv.* 2 Sgr.] *Sol.* 60; auch in Weingeist
 schwer löslich. — *Cave:* Säuren; Basen [falls nicht arsenichtsäure
 Salze gebildet werden sollen]; Schwefel und Phosphor; schwefelhaltige
 Mittel; Kupfersalze, salpetersaures Quecksilber u. Silber; Seifen;
 Gerbestoff; stark reagirende Extractivstoffe; Kleber, Gallerte, Ei-
 weiss, Milch, Fleischbrühe, Zucker, Stärkmehl; Kohle u. koh-
 lenhaltige Körper [mit sanctionirten Ausnahmen]; *Aq. comm.*

Innerl. (≠) zweckmässig nur in Auflösung, und zwar am besten mit Kali (oder Natron) verbunden in Form der *Solutio arsenicalis* — vgl. den Artikel.

Äusserl. zu Augenwässern [Gr. 1–1½ auf Unc. ½: MÜLLER im letzten Stadium der *Ophthalmia bellica* zur Entfernung der Conjunctiva-Wucherungen]; Pinselungen, Waschungen u. Umschlägen [z. B. bei harig-näckigen Hautausschlägen, Condylomen, Gr. ½–2 auf Unc. 1], Verbandwässern [mit denen man nur mässig reizen, nicht ätzen will; Gr. ⅓–⅔ auf Unc. 1. (So z. B. nach RUST als Verbandmittel bei Krebsgeschwüren, die man für unheilbar hält; die Flüssigkeit kann destill. Wasser oder eine andere für den Zustand des Geschwürs passende seyn.)]; zu ätzenden Streupulvern, Pasten u. Salben [Ry 126–128].

126.

Ry *Arsenici albi* Scr. 2

† *Cineris solearum antiquarum combustarum* [Asche von alten verbrannten Schuhsohlen — vielleicht durch *Ammon. carbon. pyro-oleos.* zu ersetzen?] Gr. 8
Sanguinis Draconis Gr. 12
Cinnabaris Dr. 2.

M. f. Pulv. subtiliss. D. in vitro, sub sigillo. S. Cosmisches Pulver; äusserlich anzuwenden. — Man macht einen Theil von diesem Pulver mit Speichel oder Wasser zu einem dicklichen Brei, trägt diesen mit einem Pinsel in der Dicke eines Groschens auf das Geschwür, auch auf den Rand desselben, auf, und lässt ihn an der Luft trocknen. Fängt während des Auftragens das Geschwür zu bluten an, so streut man von dem Pulver selbst auf, bis die Blutung steht. — Findet man am andern Tage durch das Secret des Geschwürs Brei oder Pulver abgespült, so trägt man von neuem auf. — Hat sich ein Brandschorf gebildet, so bleibe er unberührt, man befördere auch seine Abstossung nicht; nur wenn er sich an einzelnen Stellen löst und an andern noch hängen bleibt, kann man das Losgetrennte mit der Scheere ab schneiden; ist er abgefallen — oft erst nach 2–4 Wochen —, so verbindet man mit einer einfachen Salbe. (Bei Krebsgeschwüren. — Wirkt das Mittel, so entsteht nach ½ St. gewöhnlich

ein furchtbarer Schmerz; ist es am Kopfe, so schwillt das ganze Gesicht auf; je grösser der Schmerz, desto sicherer der Erfolg.) RUST.

Für weniger dringende Fälle verdient das mildere, aber auch langsamer wirkende HELLMUNDsche (von RUST modificirte) Verfahren den Vorzug: vom folgender Salbe:

Ry *Plumbi acet. crudi* Scr. 1

Extr. Conii macul.

Bals. Peru. ana Dr. 1

Tinct. Opii croc. Scr. ½

Ungt. cerei Unc. 1.

M. D. S. Unguentum narcotico-balsamicum; — nimmt man auf jede Drachme gewöhnlich Gr. 1½–2, doch auch bis zu Gr. 8, von dem Cosmischen Pulver, und legt dies auf Plumaceaux über das Geschwür, so dass auch noch der gesunde Rand eines Strohhalms breit bedeckt wird; den andern Tag werden die Plumaceaux abgenommen, alles Krustenartige und Sphacelöse mit dem Myrtenblatt entfernt und wieder so verbunden; so fährt man 5–8 Tage fort, bis sich ein Brandschorf gebildet hat. Dann vermindert man die Dose des cosmischen Pulvers, und verbindet zuletzt, wenn sich das Geschwür gehörig gereinigt hat, mit dem blossen *Ungt. narcot. bals.* Sollte etwa eine Stelle wieder unrein werden, so behandelt man diese wieder ein paar Tage mit Arseniksalbe. (Man kann auf diese

Weisse sehr tief eindringen, auch an Stellen, wo man nach der obigen RUSTschen Methode mit Pulver oder Pinsel nicht recht ankommen kann, z. B. in der Stirnhöhle.) — Bei beiden Methoden machen hinzukommendes Fieber u. dgl. oft ausserdem eine Behandlung nach allgemeinen Grundsätzen nöthig. Eine ähnliche Composition wie das Cosmische Pulver, doch kaum halb so viel Arsenik enthaltend, ist *Pulvis arsenicalis* PH. SLEŠV. Anhg. (1 Drachme 2 Shl.)

127.

Auch das DUPUYTRENSche Verfahren, den Arsenik äusserlich anzuwenden, ist milder als das COSMISCHE und wohl auch als das HELLMUNDSCHE. DUPUYTREN bediente sich theils eines Pulvers aus *Arsen. alb.* und Calomel, theils einer aus diesem Pulver mit *Gm. Mim.* und *Aq. dest.* bereiteten Paste. Man würde die beiden Mittel bequem etwa in folgenden Formeln verschreiben:

R₁ *Arsenici albi* Gr. 8–12

Hydrarg. muriat. mitis Dr. 3.

M. f. Pulv. D. in vitro, sub sigillo. —

R₂ *Arsenici albi subtt. pulv.* Gr. 4–6
(u. mehr)

Hydrarg. muriat. mitis Dr. 1½

Gm. Mimos. pulv. Dr. 3

Aq. destill. q. s.

ut f. Pasta mollis. D. in vitro, sub sigillo.

In der — milder wirkenden — Paste wählte er auch wohl noch ein stärkeres Verhältniss des Arsens zum Calomel,

bis zu Gr. 12 auf die angegebene Quantität. — Man trägt (nachdem etwa vorhandene Crusten durch Kataplasmen abgeweicht) das Pulver mit einem Charpiepinselchen oder die Paste mit einem Pinsel oder Spatel, jenes ½, höchstens 1 Linie dick, diese etwas dicker, auf das Geschwür auf (wenn dieses sehr gross ist, nur auf einen Theil desselben). Die Mittel machen keinen Brandschorf, weniger Schmerz und Geschwulst als das Cosmische, adhären auch nicht so. Nach 8–10 Tagen fallen sie in der Regel von selbst ab; alsdann, wenn nöthig, Erneuerung. Gewöhnlich reichen 5–6 Applicationen, oft schon 2–3, zur Heilung hin.

128.

R₁ *Cerae flavae* Gr. 45

† *Butyri recent. insulsi* Unc. ½.

Liquefactis et fere refrigeratis adde

Arsenici albi subtt. pulv. Gr. 3–5

Opii pulv. Gr. 6–10,

antea c. Aq. dest. paulatim in pulvem trita, nec non

Zinci oxydati Dr. ½.

M. exacte. D. sub sigillo. — Gleichmässig auf das Geschwür gestrichen, mit Leder bedeckt, 24 St. liegen zu lassen; dies alle 4–5 Tage zu wiederholen; in den Zwischenzeiten mit Wachs-, Terpentin- od. Elemi-Salbe zu verbinden. (Gegen schmerzhaft und nässende Geschwüre im Gesicht u. an den Lippen.) HARLESS.

Die Salbe ist sehr fest, ceratähnlich, wird im Winter der Erwärmung (etwa durch einen heissen Spatel) bedürfen.

Asa foetida depurata. Gereinigter stinkender Asand, Stinkasand. Teufelsdreck. [Pulver. — 1 Unze 4½ Sgr.] Vgl. *Gummiresinae*.

Inn. erl. zu Gr. 5–20 und mehr (bei bedeutendem Torpor selbst wohl bis zu Dr. 1), 2–4 mal tägl. In Pillen u. Bissen [des übeln Geruches wegen lässt man sie wohl mit *Pulv. Rad. Irid. Flor.* oder *Vanillae* bestreuen oder mit Blattgold oder Blattsilber überziehen, doch hilft dies wenig; mehr schon, wenn man der Masse eine Kleinigkeit eines wohlriechenden ätheri-

schen Öls (besonders *Ol. Menth. pip.*) zusetzt. — Ry 129-134; 31 (*Acid. phosph.*), 230 (*Castor.*), 367 (*Extr. Conii mac.*), 403 (*Fel Tauri insp.*), 450 b. (*Gutti*), 951 (*Sapo jalap.*), 1099 (*Zinc. oxyd.*), 1107 (*Zinc. sulphur.*). Vgl. auch: *Extr. Lactuc. vir.*]; selten, des übeln Geschmacks wegen [dem *Syr. Croci* noch am erträglichsten corrigirt] in Auflösungen [Ry 135] oder Emulsionen [Ry 136. — *Lac Asae foet.* PH. SLESV. (*Asa f.* mit *Gm. Mim.* ana 1, *Aq. Hyssopi* 16) und „*Solutio*“ *Asae f. aquosa* PH. HANN. (*Asa f.* 1, *Mucil. Gm. Mim.* 2, *Aq. destill.* 14) werden beide colirt, dadurch im Gehalt etwas unsicher; nicht zu empfehlen].

Äusserl. als Riechmittel [für Hysterische, z. B. Dr. $\frac{1}{2}$ in Dr. 2 *Acet. concentr.* aufgelöst. Noch bequemer, obwohl schwächer ist eine *Asand-tinctur.*], zum Klystier [Dr. $\frac{1}{2}$ -1, mit *Gm. Mimos.* oder Eigelb subigirt, etwa in einem Aufguss von *Flor. Chamom. vulg.*, *Rad. Valer. min.* od. dgl., auch wohl noch mit Zusatz von Salzen, Öl; oder (z. B. für einen Scheintodten) in ein Paar Unzen Essig (unvollkommen) aufgelöst. — Ry 137; 195 (*Camph.*), 933 (*Rad. Valer. min.*)]. Selten zu Pflastern, Salben u. Katal-plasmen [wie *Ammoniacum depur.*], etc.

129.

Ry *Asae foet. depur.* Dr. 1
Galbani —
Myrrhae pulv. ana Dr. $\frac{1}{2}$
Castorei — Gr. 15.
M. f. c. Tinct. Valer. q. s. Pilulae 72.
Consp. D. in vitro. S. 3mal tägl. 3-8.
 (Bei Hysterie.) SYDENHAM.

130.

Ry *Asae foet. dep.* Unc. $\frac{1}{2}$
Opii pulv.
Rad. Ipecac. pulv. ana Gr. 4
Ol. Menth. pip. Gtt. 8.
M. f. c. Spir. V. rst. pauxillo Pilulae
 120. *Consp. Pulv. Cass. cinnam. D. in*
vitro. S. 3 mal tägl. 10. (Gegen nach
 Tripper zurückbleibende chronische
 krampfhaftes Harnbeschwerden.)
 CONRAD.

131.

Ry *Asae foet. depur.*
Pulv. Rad. Valer. min. ana Dr. 2
Olei Valerian. Gtt. 10
Extr. Valer. q. s.
ut f. Pilulae 120. Cons. D. in vitro. S.
 3mal tägl. 8-10. SCHUBARTH.

132.

Ry *Asae foet. depur.* Dr. 2
Saponis medicati pulv. Dr. 1
Ol. Foenic. Gtt. 6.
M. f. c. Spir. V. rst. pauxillo Pilulae
 Gr. 2 [lieber: 90]. *Consp. Sem. Lycop.*
D. S. 3mal tägl. 10.
Pilulae ex Asa foet. PH. MIL.

133.

Ry *Asae foet. depur.* Dr. 2
Sapon. medic. pulv.
Rad. Rhei pulv. ana Dr. 1
Ol. Menth. pip. Gtt. 5
Fellis Tauri insp. q. s.
ut f. Pilulae 120. Cons. Pulv. Rad.
Irid. Flor. D. in vitro. S. 3mal tägl. 8.

134.

Ry *Asae foet. depur.* Dr. 1
Ferri pulver. Scr. 1
Rad. Valer. min. pulv. Dr. 2
Ol. Tanacet. Gtt. 8
Extr. Chamom. vulg. q. s.
ut f. Boli 36, obduc. Argento foliato.
D. S. 3mal tägl. 3. (Bei *Helminthiasis* ei-
 nes 10jährigen Kindes.)

135.

Ry *Asae foet. depur.* Dr. 2

tere cum

Liq. Ammon. acet. Unc. 1

adde

Aq. Menth. cr. Unc. 3

Syr. Croci Unc. $\frac{1}{2}$.

M. D. S. Alle 2-1 St., umgeschüttelt,
 † Theelöffel bis 1 Essl. (nach dem Alter
 des Kindes; zur Unterstützung Asand-
 mysiere. — Bei Millarschem Asthma).
 (MILLAR.

136.

R_x Asae foet. depur. Dr. $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$

Mucil. Gm. Mim. Unc. 2

Syr. Alh. Unc. 1.

F. Emuls. D. S. 2stündl., umgeschüt-
 telt, 1 Theelöffel. (Bei ausgebildetem
 Keuchhusten.) KOPF.

137.

R_x Asae foet. depur. Dr. 1-2

Futell. ovi unius

terendo sensim misce c.

Inf. Flor. Chamom. vulg. (Unc. $\frac{1}{2}$)
 Unc. 6

ut f. Emuls. D. S. Zu 2 Klystieren,
 umgeschüttelt (zu jedem etwa noch
 $\frac{1}{2}$ Tasse kochendes Wasser zuzusetzen).

Asphaltum. Bitumen Judaicum. Asphalt; Ju-
 denpech. Schlackiges Erdpech. Schwarzer Bern-
 stein. [1 Unze 2 $\frac{5}{8}$ Sgr.] Innerl. zu Gr. 10-15; in Pulver [mit Sacch.
 Lact.], besser in Pillen. (Obsolet.)

† **Auripigmentum. Arsenicum (sulphuratum) flavum**
a. citrinum. Sulphuretum Arsenici flavum. Operment.
 Rauschgelb. Gelber Arsenik. Gelbes Schwefelarsenik.
 [1 Unze pulv. 4 Sbl.] Nur äusserl. bisweilen zum Wegbeizen von
 Haaren [z. B. 1 mit gebranntem Kalk 12, Amylum 10 und Wasser q. s. zu
 einem weichen Teige; damit der behaarte Theil gesalbt und, sobald die
 Masse trocken geworden, sie mit Wasser abgewischt: AUGUSTIN's *Pasta opi-*
latoria]. Alle übrigen Anwendungsarten [namentlich der innerliche Ge-
 brauch gegen Wechselfieber] nicht zu empfehlen.

* **Aurum.** Gold, metallisches.

Innerl. (≠), sehr fein gefeilt, zu Gr. $\frac{1}{4}$ -1 u. mehr, 3-4 mal
 tägl. in Pulver oder Pillen. Oder grössere Gaben, Gr. 1-4 u.
 mehr [etwa noch in Verbindung mit Amylum oder Sem. Lycopod., diese beiden
 Pulver zuvor mit Weingeist ausgewaschen], 1-2 mal tägl. mit einem be-
 feuchteten Finger langsam in die Zunge [oder wenn es hier nicht ertra-
 gen werden sollte, in einen andern Schleimhauttheil, vgl. *Aurum muriat.*] ein-
 zureiben. — Statt des gefeilt Goldes auch wohl das Goldpul-
 ver [*Or divisé*; gewöhnlich bereitet durch Amalgamiren des Goldes mit Queck-
 silber und Wiederentfernen des Quecksilbers, entweder indem man es durch Salpe-
 ternsäure auflöst oder durch Verdampfen]. Das letztere auch in Salben [für
 schmerzhaftes syphilitische Geschwüre Gr. 10-12 auf 1 Unze Fett: NIEL; zur
 Zertheilung von Bubonen und Meilung von Feigwarzen Gr. 15 und mehr auf
 einige Drachmen Ungt. ceruum: CHRESTIEN], namentlich auch in en-

dermatisch angewandten Salben [z. B. Gr. 1, allmählig Gr. 2, p. dosi, auf einer Stelle an der Seite des Halses anzuwenden (wo man aus irgend einem Grunde das Gold nicht in die Zunge einreiben kann); wenn man bis auf Gr. 2 gestiegen ist, zum *Aur. muriat.* überzugehen, von dem man dann etwa mit $\frac{1}{10}$ Gran beginnt: NIEL]; in Linimenten [auf syphilit. Auswüchse und Fungositäten mit Speichel einzureiben: NIEL], Pinselsäften [Gr. 10-25 auf 1 Unze Syrup: NIEL bei Rachenschankern].

Aurum foliatum. Folia Auri. Blattgold. — Zum Überziehen von Pillen u. Bissen [I. §. 151.]; selten noch zur Verschönerung von Pulvern, Species od. dgl. [vgl. *Pulv. antiepilepticus*].

* *Aurum muriaticum. Aurum muriaticum natronatum. Chloretum Auri cum Chloreto Natrii.* Salzsäures Goldoxyd-Natron. [Gelbes Pulver. — 1 Gr. $1\frac{1}{2}$ Sgr.] *Sol.* $1\frac{1}{2}$. — *Cave:* man giebt es, ausser einigen durch Erfahrung sanctionirten Verbindungen, am besten ganz pur, da es selbst gegen organische Substanzen höchst empfindlich ist. Die Auflösungen sind vor dem Licht zu schützen.

In nerl. (*ad Granum unum!*) zu Gr. $\frac{1}{16}$ — $\frac{1}{8}$, allmählig steigend bis zu Gr. 1, 1-2 mal tägl. In Pulver [mit Zucker (nur auf sehr kurze Zeit zu verbinden); — z. B. anfangs $\frac{1}{12}$ Gran, später allmählig $\frac{1}{4}$ Gran, 2 mal tägl.: RUST bei Krebsgeschwüren], Pillen [nicht gern, weil die meisten Constitutionen es zersetzen würden]; am besten wohl in Auflösungen [z. B. (in sehr kleiner Dose) Gr. 1 in *Aq. destill.* Unc. $\frac{1}{2}$, 3 mal tägl. 6, allmählig bis 14, Tropfen in Wasser; dabei ein Sarsaparilldecoct (mindestens 1 St. nach dem Goldsalz) u. passende Diät; so Monate lang; LEHMANN bei secundärer Syphilis].

Ausserl. am häufigsten zu Einreibungen in die Zunge [etwa mit der doppelten Menge *Pulv. Rad. Irid. Flor.* (dieses Pulver zuvor mit Wasser u. Weingeist ausgewaschen); nur 1 mal tägl.; anfangs 15 oder 12 Tage lang jedesmal $\frac{1}{15}$ oder $\frac{1}{12}$ Gran, dann 14 oder 11 Tage lang jedesmal $\frac{1}{14}$ oder $\frac{1}{11}$ Gran u. s. w., bis auf diese Weise etwa Gr. 4-6 verbraucht (nach den Einreibungen den Speichel nicht zu verschlucken): CHRESTIEN. Will das Mittel auf diese Weise bei wenig reizbaren, phlegmatischen, scrofulösen Subjecten nicht bald wirken, so steigt NIEL bisweilen rasch von $\frac{1}{12}$ Gran auf $\frac{1}{3}$ und geht nach einiger Zeit wieder zurück, — unter vorsichtiger Beobachtung der Wirkung. — Wo in seltenen Fällen die Einreibungen in die Zunge nicht vertragen werden, soll man sie in die Innenfläche der Backen oder das Zahnfleisch —, oder wenn sich bei der Anwendung im Munde überhaupt Rachenschanker verschlimmern, in grösseren (etwa doppelten) Dosen in die Basis der Eichel oder die Innenfläche der grossen Schaamlefen, machen. Die letztere Applicationsfläche wählt NIEL namentlich auch bei inveterirter Leukorrhöe.]; doch auch zu Salben [Einreibe- und Verband-Salben. Gr. $1\frac{1}{2}$ -3 (-10) auf $\frac{1}{2}$ Unze Fett. — Z. B. Gr. $1\frac{1}{2}$ -2 auf Unc. $\frac{1}{2}$: GRÜTZNER bei Skirrhotitäten, Indurationen und Exostosen, besonders syphilitischen (doch nicht auf grosse Flächen einzureiben). — Gr. 2 auf Unc. $\frac{1}{2}$: WENDT bei syphilit. Geschwüren], namentlich zu endermatischen Salben [mit wenig Fett, auf eine Stelle an der Seite des Halses anzuwenden:

NIZL, vgl. *Aurum*, S. 76], zu Augenwässern [Gr. 1 auf *Aq. destill.* Unc. 3: JAHN zu Augentropfwässern und Augenbähungen bei chronischen Ophthalmien. — Gr. $\frac{1}{2}$ - 2 auf Unc. $\frac{1}{2}$, 4 mal tägl. einen grossen Tropfen einzufliessen: SCHÖN gegen nach gonorrhöischer Augenentzündung zurückgebliebene Hornhautflecke.], Verbandwässern [bei syphilit. Geschwüren u. Auswüchsen wendet JAHN dieselbe Auflösung wie für das Auge an].

Baccae Berberidis (recentes). Berberizenbeeren; Sauerdorn-, Beissel- od. Passel-Beeren. [Enthalten vorzüglich Äpfelsäure und Schleimzucker. Reifen im September u. October, doch lässt sich der Saft aufbewahren.] Selten der ausgepresste Saft zu Gallerten [I. S. 285] oder statt des Citronensafts zu kühlenden Getränken und zu Punsch.

Baccae Juniperi. Wachholderbeeren. Kad-digbeeren. [Enthalten vorzüglich äther. Öl u. Wachholderzucker. — 1 Unze $\frac{1}{3}$ gr. pulv. $\frac{2}{3}$, sub. pulv. $\frac{5}{8}$ Sgr.]

Innerl. zu Scr. 1-2 einigemal tägl. In Pulver [unangenehm], Bissen, Latwerge; am häufigsten im Aufguss [Zerstossen. — Tägl. Unc. $\frac{1}{2}$ - 1 auf Unc. 4-12 zu verbrauchen. (Z. B. Unc. $\frac{1}{2}$ auf Unc. 6: *Infus. Junip.* PH. MIL.) R_x 138, 139; 1077 (*Turion. Pini*). Oder als Thee, Dr. 2-6 auf 3 Tassen. Oft auch mit Wein (od. Bier) infundirt; z. B. 3 Unzen, mit eben so viel *Rad. Levist.*, mit $\frac{3}{4}$ Quart Rheinwein 36 St. macerirt oder im gelinder Wärme digerirt, von der Colatur 4 mal tägl. $\frac{1}{2}$ Weinglas. Diätetisch in Substanz [bei schwacher Verdauung früh nüchtern mehrere Beeren ganz verschluckt; bei epidemischen ansteckenden Krankheiten als Präservativ gekaut; — als Kaumittel bei riechendem Athem dürften andre Mittel (z. B. *Mastix*, *Kalmus*, *Vanille*) zweckmässiger seyn].

Ausserl. zerstoßen zu Räucherungen [man darf sie, da ihr Geruch nicht zart ist, nicht leicht zerstört wird, auf glühende Kohlen werfen, Auch zu balsamischen Frictionen (I. S. 386). Etwa noch in Verbindung (Unc. 1 mit Dr. 1) mit Bernstein, *Mastix* od. *Takamahak.*], zu Umschlägen [sowohl trockenen (mit warmem Brod, mit andern aromatischen Dingen) als feuchten (z. B. mit Brod und Essig auf Stirn oder Schläfen bei Kopfschmerz)]; infundirt als Zusatz zu aromatischen Bädern. — JASSEN'S Krätzsalbe: R_x 1087.

138.

R_x *Baccar. Junip.* cont. Unc. 1
Sem. *Petrosel.* — Unc. $\frac{1}{2}$
Aq. comm. ferv. q. s.

digere per $\frac{1}{2}$ hor. In Col. refriger. Unc. 6
solvo

Elaeosaccha Junip. (Gtt. 6) Unc. 1
et adde

Spir. nitrico-aether. Dr. 1.

M. D. S. 2stündl. 1 Essl.

139.

R_x *Infusi Bacc. Junip.* (Unc. $\frac{1}{2}$) Unc. 8
Aether. sulphur. Gtt. 20

Oxymell. scillit. Unc. $\frac{1}{2}$.

M. D. S. Esslöffelweise. BRERA.

Baccae (Fructus) Lauri. Lorbeeren. [Enthalten äther. und fettes Öl, — 1 Unze 1 Egr., gr. pulv. $1\frac{1}{3}$, sub. pulv. $1\frac{2}{3}$ Sgr.]

Innerl. [selten] zu Gr. 5-20 einigemal tägl.; in Pulver [vgl.

Fruct. Capsici ann. ppt., Nuc. mosch.] oder verwandten Formen, Aufguss [wässerigem oder weinigem, etwa Unc. 1. auf L. 1, esslöffelweise].

Ausserl. zu Bädern [selten; etwa L. 1, infundirt]; als Zusatz zu Salben [z. B. zum officinellen *Ungt. Rorismar. comp.*], Pflastern.

† *Baccae (Fructus) Ribis nigri (recentes)*. Schwarze Johannisbeeren. Ahl-, Gicht- od. Wanzen-Beeren. [Bestandtheile ähnlich wie bei den folgenden.] Innerl. diätetisch in Substanz; oder ein daraus bereiteter Roob, langsam verschluckt oder in Gurgelwässern [bei entzündlichen Bräunen].

Baccae Ribis rubri (recentes). Johannisbeeren. [Enthalten vorzüglich Schleimzucker, Apfel-, Citronen- und Gallertsäure.] Bisweilen der frisch ausgepresste Saft zu kühlenden Getränken, zu Gallerte [I. S. 285].

Baccae Rubi Idaei (recentes). Himbeeren. [Bestandtheile ähnlich wie bei den vorigen; auch etwas äther. Öl.] Wie *Baccae Ribis rubri*.

BALSAMA (i) NATURALIA (es). Natürliche Balsame. [Natürliche dickflüssige Verbindungen von Harz mit ätherischem Öl. — Man verwechsle sie nicht mit den künstlichen Balsamen, I. S. 275.] Es gehören hieher: *Bals. Peruvian.*, *Styrax liquidus* [welche beiden noch Benzoësäure enthalten], *Bals. Copaivae*, *Terebinthina communis* u. *laricina*; auch die † *Resina Pini empyreumatica liquida* [deren ätherisches Öl zwar grossentheils ein empyreumatisches ist]. [*Balsamum Tolutanum* gehört, so wie es in unseren Officinen vorkommt, bereits erhärtet, zu den Harzen in der gewöhnlichen pharmaceutischen (und katagraphologischen) Bedeutung des Worte.]

Sind unauflöslich in Wasser [doch nimmt das Wasser durch Aufnahme von etwas äther. Öl Geruch und Geschmack an, löst auch die Benzoësäure fast ganz auf], auflöslich in Alkohol [die Auflösung wird durch Zusatz von Wasser trübe, milchicht, aber ohne dass alsbald vollständige Ausscheidung erfolgte]; lösen sich auch in Äther [*Bals. Peruv.* nur zum Theil] und ätherischen Ölen auf, und lassen sich mit den fetten Ölen, doch nicht immer in jedem Verhältniss, vermischen, mit wässerigen Flüssigkeiten nur durch Emulgiren verbinden. — Man hat im Allgemeinen die Verbindungen mit starken Mineralsäuren, Salzbildern, Basen und Metallsalzen zu meiden.

Sie werden im Allgemeinen [nicht alle einzelnen] in folgenden Formen angewandt:

1. In Pulvern, — selten, weil man sie darin nur in zu gerin-

gem Verhältniss als dass sie viel wirken könnten [vgl. I. S. 206] aufnehmen darf; höchstens setzt man einmal *Bals. Peruv.* einem Riechpulver od. dgl. als Adjuvans [wozu es doch auch sehr schwach ist], oder irgend einem anderen Pulver als Corrigen. in geringer Quantität zu.

2. In Trochisken dürfte man höchstens einmal eine (keiner Subaction bedürfende) Kleinigkeit von *Bals. Peruv.* als Corrigen. aufnehmen und die Trochisken dann nicht dörren lassen.

3. In Pillen u. Bissen. Theer, Terpenthin und *Styrac. liq.* können ohne Umstände mit einem schleimigen Pflanzenpulver zur Pillenmasse gemacht und so namentlich zu Bissen geformt werden. Schöner freilich wird die Masse, wenn man noch etwas Anderes, etwa Extract und Pulver, dazu nimmt. Die flüssigeren Balsame dagegen, *B. Copaiv.* und *B. Peruv.*, müssen, wenn man sie in nur einigermassen beträchtlicher Quantität aufnehmen will, subigirt werden [vgl. I. S. 240], falls nicht auch noch Wachs [vgl. *Bals. Copaiv.*] oder Harz, von letzterem mindestens 2 mal so viel als Balsam, in der Composition vorkommt. Zwar geben erst ungefähr 5 Harz mit 1 solchen Balsam für sich eine gute Pillenmasse, doch genügen in der Verbindung mit anderen Sachen, um nur die Ausscheidung des Balsams zu verhüten, auch schon 2 Harz. Die Balsame als Constituentien von Pillenmassen mit einem *q. s.* anzusetzen, ist immer unpassend, schon deshalb, weil sie dazu nicht indifferent genug sind.

4. In Latwergen. Auch hier müssen sie, wenigstens die dünneren, in der Regel subigirt werden, vgl. I. S. 293–94 u. S. 297 sub 6.

5. In Pflastern. Wo man, wie sehr oft beim Terpenthin und beim Theer, einiges Verjagen der flüchtigeren Theile nicht fürchtet, kann der Balsam ohne Weiteres mit der Pflastergrundlage zusammengeschmolzen werden. *Bals. Peruv.* dagegen darf immer nur der halb erkalteten Pflastermasse zugemischt werden (I. S. 263). — Quantitätsverhältnisse s. I. S. 259, 260.

6. In Salben [nicht gern in Einreibesalben, s. I. S. 277 sub 3.]. Von den dünneren Balsamen darf man höchstens $\frac{1}{2}$ auf 1 einer guten Salbengrundlage nehmen. — Theer, der für sich schon die Consistenz eines zäheren Liniments hat, bedarf nur eines geringen Zusatzes von Fett oder noch besser Hammeltalg [welches letztere man geschmolzen mit ihm zusammenreiben lässt]. — Der steifere gemeine Terpenthin hat für sich fast schon Salbenconsistenz; nur ist er zu

zähe, um sich als Salbe gehörig handhaben zu lassen; man setzt ihm deshalb eine gleiche oder — u. so auch dem dünneren venedischen Terpenthin — eine grössere Quantität von Schweineschmalz oder von einer anderen Salbe, oder auch etwas Hammeltalg, zu, oder nimmt ihn mit Honig, Eigelb, Schleim od. dgl. verrieben in Salben auf. — *Styrax liq.* hat Salbenconsistenz.

7. In flüssiger Form, theils (die dünneren) pur, theils in Mixturen [in geistigen oder ätherischen Flüssigkeiten, äther. Ölen gelöst oder (besonders oft) mit wässerigen Flüssigkeiten emulgirt], innerlich und äusserlich zu verschiedenen Zwecken (zu Klystieren u. s. Injectionen, zu Waschungen, Einreibungen [wozu sich nur die dünneren gut qualificiren: I. S. 372] u. s. w.).

Balsamum Copaivae s. Copahu. Copaiwabalsam. [Dünnflüssig. Auflöslich in Alcohol, Äther, äther. und fetten Ölen. — 1 Unze 2½ Sgr.] Vgl. *Balsama naturalia*.

Innerl. zu 20–40–60 Tropfen [auf Dr. 1 gehn etwa 70], oder zu $\frac{1}{3}$ – $\frac{1}{2}$ –1 Theelöffel, 2–4 mal tägl. [SWEDIAUR rath, nach etwas grossen Gaben, weil sie den Magen leicht stark angreifen, 15 Tropfen *Tinct. aromat. acid.* in etwas Wasser nachzutrinken, doch ist diese Vorsicht wohl meist überflüssig. — Sonst sind Säuren gute Geschmacks corrigentien, eben so auch *Syr. Bals. Peru.*, *Spir. sulph. aeth.* und *Spir. nitr. aeth.*, *Tinct. aromat.*, und für Leute, die Bitterkeiten gern nehmen, *Tinct. amara*. — Bitterer schwarzer Kaffee nachgetrunken tilgt den zurückbleibenden Geschmack gut.] Am einfachsten auf Zucker, und so namentlich bei Armen; sonst aber, wo es darauf ankommt, entweder den widrigen Geschmack möglichst zu verdecken oder auch das Mittel mit anderen zu verbinden, in Gallertkapseln [s. I. S. 341], Bissen [Ry 140], Pillen [Es hält schwer, den Balsam in relativ ansehnlicher Quantität in eine Pillenmasse zu bringen. Wollte man ihn subigiren, so würde die Composition sehr voluminös werden (hier kann man sich das bei Bissen, wie in Ry 140, gefallen lassen). Man hat wohl den Balsam durch *Magnesia usta* gebunden (verseift); aber die Mischung des Balsams und der *Magnesia* muss mehrere Tage oder eine Woche lang stehen, wenn sich beide innig verbinden sollen, und dann fragt es sich noch, ob die (unauflösl. wahrscheinlich schwer verdauliche) Balsamseife so wirkt wie der unveränderte Balsam. Am zweckmässigsten bedient man sich wohl, wenn man etwas ansehnliche Dosen Balsam in dieser Form geben will, der vom Apotheker J. F. SIMON empfohlenen Compositionen, in welchen der Balsam durch weisses Wachs gebunden wird: Ry 141, 142. Es sollen dieselben nach bereits angestellten ärztlichen Experimenten die Verdauungswerkzeuge durchaus nicht belästigen und eher eröffnen als, wie man befürchten könnte, verstopfen. — Geringere Dosen des Balsams mit Harz und einem Pflanzenpulver zu Pillen zu machen, hat keine Schwierigkeit; so z. B. Ry 157, welche Formel sich dadurch empfiehlt, dass sie durch lauter wirksame Massen constituirt, also verhältnissmässig sehr compendiös ist.], Paste [Ry 143], Latwerge [Ry 144], Emul-

sion [etwa Dr. 1-2 auf Unc. 3, 3 mal tägl. 1 Essl. — Ry 145, 146] oder anderen Mixturen [Ry 147-150. — Nur, weil sie beliebt sind, theilen wir die wunderlichen Compositionen Ry 147, 148 mit. Sehr zweckmässig ist und verdeckt zugleich den Geschmack sehr gut Ry 149. — *Bals. Cop.* mit *Spir. aeth. ana*, 4 mal tägl. 15 (und bald mehr) Tropfen auf Zucker: A. COOPER. — FR. BROWN lässt in ein mit Zuckerwasser halb angefülltes Weinglas den Balsam, und einige Tropfen *Tinct. amar.* hinderdrein, tröpfeln; mit diesen Tropfen zusammenlaufend bildet der Balsam alsbald ein Kügelchen, welches man mit dem Wasser hinuntertrinkt; die Bitterkeit verdeckt dabei den Balsamgeschmack]. Es ist bei diesem Mittel, weil es oft sehr lange gebraucht und dadurch wohl dem Kranken sehr zuwider wird, nöthig, dass man mit erträglich schmeckenden Compositionen abzuwechseln wisse.

Ausserl. zu Klystieren [Dr. 2-4, emulgirt] u. a. Injectionen [z. B. in die Harnröhre bei Nachtripper — doch selten (man zieht zu diesem Behuf meist den Terpenthin vor); etwa Dr. 2 mit Unc. 8-6 Wasser emulgirt. — Ry 151. — SOUCHIER hat bei Blasenkatarrh mit puriformem Ausfluss Einspritzungen von 2 Unz. Bals. (jedemal eine Einspritzung von Gerstenabsud vorangeschickt) mit gutem Erfolge versucht; es dürfte aber doch bei einer etwanigen Nachahmung des, wohl nicht gefahrlosen, Verfahrens rathsam seyn, mit kleineren Quantitäten zu beginnen.], Salben [z. B. Dr. 1 mit *Ungt. Rosismar. comp.* Unc. $\frac{1}{2}$: WENDT zum Einreiben in Damm und *Regio pubis* gegen hydropische Zufälle bei Kindern].

140.

Ry *Bals. Copaivae**Gm. Mimos. pulv. ana* Dr. 2*Aq. Flor. Aurant. Scr.* 2*terendo bene mixtis adde**Cubeb. pulv. Dr.* 2.*M. f. Bol. nr. 6. Consp. Pulv. Cass.**cinnam. D. S.* 3 mal tägl. 1 Stück.

HENSCHEL.

141.

Ry *Cerae albae* Dr. 2*leni calore liquefactae et semirefrigera-
tae (denuo rigescere incipienti) adde
agitando**Bals. Copaivae* Dr. 2.*F. Pilulae* 80. *Consp. etc.* (Jede Pille
enthält $1\frac{1}{2}$ Gran Bals.) J. F. SIMON.

142.

Ry *Cerae albae* Scr. 2*leni calore liq. factae et semirefrigera-
tae adde agitando**Bals. Copaiv.* Dr. 2*et tandem*

II.

*Cubeb. pulv. (oder Rad. Rhei) pulv.*Unc. $\frac{1}{2}$.*M. F. Pilulae* 120. *Consp. etc.* (Jede
Pille enthält 1 Gran Balsam u. 2 Gran
Pflanzenpulver.)

J. F. SIMON.

SIMON hat eigentlich folgende 5 Com-
binationen angegeben, in denen er gute
Pillenmassen erhielt; wir bezeichnen sie
mit A bis E.

	Wachs	Balsam	Pflanzen- pulver
A	1	1	
B	1	$1\frac{1}{2}$	2
C	1	2	3
D	1	$2\frac{1}{2}$	4
E	1	3	6

Man bemerkt aber leicht, dass B und C
weniger praktisch sind als D, weil sie,
bei gleichem Verhältnisse des Balsams
zur ganzen Masse, weniger des mitwir-
kenden Pflanzenpulvers enthalten, und
dass D wieder für die meisten Fälle we-
niger praktisch ist als E, indem E zwar

den Balsam in einem etwas niedrigeren, aber dafür auch das Pflanzenpulver in einem beträchtlich höheren Verhältnisse und unter allen 5 Combinationen das wenigste Wachs enthält. Es empfehlen sich also besonders, je nachdem es um die Wirkung des reinen Balsams oder der Verbindung von Balsam und Cubeben zu thun ist, *A* oder *E*, welche unsern Ry 141 u. 142 entsprechen.

143.

Ry *Amygdalar. dulc. excortic.* Dr. 6
probe contusis adde

Pulv. Rad. Alh. Dr. 1

— *Catechu* Dr. $\frac{1}{2}$

Bals. Copai. Dr. 3.

M. f. Pasta. D. S. Theelöffelweise.

CASPER.

Verdeckt zwar den Copaiyageschmack gut, klebt aber überall im Munde an, und ist ziemlich theuer.

144.

Ry *Bals. Copai.* Dr. $4\frac{1}{2}$
subige c.

Viello Ovi unius

adde

Pulv. Cubeb. Dr. $4\frac{1}{2}$

Conserv. Rosar. Unc. $\frac{1}{2}$.

M. f. Electuar. D. S. 3-4 mal täglich, umgerührt, 1 Theelöffel. VOGT.
Schmeckt sehr schlecht; dürfte nur dann passen; wenn ein Kranker Bissen nicht schlucken will und es auf die Verbindung mit Cubeben ankommt.

145.

Ry *Bals. Copai.* Dr. 2

Gm. Mimos. pulv. Dr. 1

Vini Rhenani Unc. 2

f. Emulsio, cui adde

(*Tinct. Ferri acet. aeth.* Dr. 1)

Syr. Bals. Peruv. Unc. 1.

M. D. S. 3 mal tägl., umgeschüttelt,
1 Ekel. LOCKSTAEDT.

146.

Ry *Bals. Copai.* Dr. 2

Gm. Mimos. pulv. Dr. $\frac{1}{2}$

terendo admisce

Aq. Citri Dr. 2

Syr. Succ. Citri Dr. 6.

D. S. 4 mal tägl., umgeschüttelt, 1 Theelöffel. LOCKSTAEDT.

147.

Ry *Bals. Copai.*

Syr. Succ. Citri

Aq. Flor. Aurant.

— *Menth. crisp.* ana Unc. $\frac{1}{2}$

Acidi sulphur. diluti Dr. $\frac{1}{2}$.

M. D. S. $\frac{1}{4}$ - 5 mal tägl., umgeschüttelt, 1 Theelöffel in etwas Haterschleim. (Bei dadurch hervorgerufenem Durchfall einige Tropfen Opiumtinctur zu jedem Theelöffel.) DELPECH.

Vgl. I. S. 342. Der Geschmack des Citronensyrups verschwindet neben dem der Schwefelsäure. — WUTZER bedient sich derselben Formel mit nur halb so viel Schwefelsäure.

148.

Ry *Spir. nitr. aeth.* Dr. $\frac{1}{2}$

Bals. Copai.

Spir. Vini rft.

Syr. Flor. Aurant.

Aq. Ment. crisp. ana Unc. $\frac{1}{2}$

— *Flor. Aurant.* Dr. 2.

M. D. S. Umgeschüttelt Morgens 2, Mittags u. Abends 1 Theelöffel.

CHOPART.

Vgl. I. S. 342.

149.

Ry *Bals. Copai.* Unc. $\frac{1}{2}$

Spir. sulph. aether. Dr. 2

Syr. Cinnam. Unc. 1.

M. D. S. Theelöffelweise, umgeschüttelt. HENSCHEL.

150.

Ry *Bals. Copai.*

Ol. Terebinth. rft.

— *Succini rft.* ana Dr. 2.

M. D. S. 3 mal tägl. 30 (allmählig bis 60) Tropfen auf Zucker zu nehmen u.

½ Glas Rothwein nachzutrinken. (Gegen *Pollutio nocturna und diurna*, *Fluor albus* u. a. Blennorrhöen. — *Elixir balsamicum* neuerer französischen Aerzte.)

151.

Ry Bals. Copaivae Dr. 2

Balsamum Nucistae (welche Benennung sonst auch wohl für das reine *Oleum Nucistae* vorkommt). [Wachs Dr. 1, Mandelöl Dr. 2, *Ol. Nucist.* Dr. 3, *Ol. Macid.* 3 Tropfen. — 1 Unze 7½ Sgr.] Zu Einreibungen.

Balsamum Peruvianum s. Indicum nigrum. Schwarzer peruvianischer Balsam. Perubalsam. [Dickflüssiger als Copaivabalsam. Er lässt sich nur schwer und sehr unbestimmt tropfen; deshalb giebt man ihn nicht gern pur in Tropfenform, und bestimmt auch in Mischungen seine Totalquantität oft lieber nach dem Gewicht als nach Tropfen. Man rechne ungefähr 75 Tropfen auf die Drachme. — Nur in sehr starkem Alcohol (5 Theilen) fast ganz auflöslich. — 1 Drachme 1½ Sgr. — Will man durch Perubalsam allerlei Mischungen den angenehmen Geruch od. Geschmack der Vanille mittheilen, so darf man ihn nur in sehr geringer Menge, zu einigen Tropfen auf die Laze, zusetzen — eine Regel, welche die Schokoladefabricanten meist besser beobachten als die Aerzte.] Vgl. *Balsama naturalia*.

Innerl. zu Gr. 3-10, einigemal tägl. In Bissen [nicht gern in Pillen], Latwerge, Mixturen [mit geistigen, ätherischen Dingen, flüchtigen Ölen. Officinell: *Mixt. oleoso-balsam.*], Emulsionen [die gewöhnlichste und in der Regel beste Art der Darreichung, wenn man den Balsam in voller Dose geben will; — bisweilen bloss mit einem Syrup, als Locksaft. — Ry 152].

Ausserl. [zur Verbindung mit wässerigen Flüssigkeiten ist hier oft eine *Tinctura Bals. Per.* bequemer; wo sie nicht officinell, kann sie leicht in dem Verhältnisse von 1 zu *Spir. V. rftiss.* 6-8 angetertigt werden] zu Mundwässern [Ry 1062 (*Tinct. Lacc.*)], Zahntincturen [Ry 980 (*Spir. Cochl.*)], Ohrtropfen, Augewässern [meist nur als Zusatz zu andern Mitteln, Gr. 5-10 auf Unc. ½; in wässerigen Flüssigkeiten emulgirt oder als Tinctur. — Ry 746 (*Ol. Caryoph.*). Vgl. *Aether sulph.*], Waschungen [Ry 153. Vgl. *Tinct. Bals. Per.*], Linimenten, Salben u. Ceraten [Der Perubalsam lässt sich nur schwer mit den meisten fetten Ölen verbinden; es ist deshalb rathsam, ihn, namentlich in Linimenten, mit diesen durch Schleim oder Eigelb zu subigiren. — Ry 154-156; 76 (*Alum.*), 124 (*Argent. nitr. cryst.*), 172 (*Borax*), 201, 203 (*Camph.*), 222 (*Carbo ppt.*), 765, 766 (*Ol. Nucist.*), 1048 (*Terebinth.*), 1073 (*Tinct. Opii simpl.*)], Pflastern [vgl. I. S. 260 (Tabelle) u. 263. — Ry 200 (*Camph.*); eine andere Formel I. S. 265-266]; als Zusatz zu mancherlei andern, namentlich kosmetischen, Mitteln, etc.

Mucil. Gm. Mim. Unc. ½

Aq. Calcar. Unc. 6.

F. Emuls. D. S. Mehrmals tägl. umgeschüttelt einzuspritzen. (Bei Geschwüren des Mastdarmes, der Vagina und der Harnröhre.) ABERNETHY.

152.

R_z *Bals. Peruv.* Dr. 6
Ol. Oliv. Provinc. Unc. 3
Fitella Ovor. 2
terendo sensim misce c.
Aceti Unc. 3.
D. S. 2stündl., umgeschüttelt, 1 Essl.
 (Gegen *Gonorrhœa secundar.*)

FRICKE.

153.

R_z *Bals. Peruv.* Dr. $\frac{3}{4}$
Mixt. oleoso-balsam. Dr. 6
 \dagger *Aq. Coloniens.* Unc. 1.
M. D. S. Zum Waschen. (Bei Frostbeu-
 len ersten Grades.)

RUST.

154.

R_z *Bals. Peruv.* Dr. 1
Ol. Amygdal. Dr. $1\frac{1}{2}$
Gm. Mimos. pulv. Dr. 2
terendo sensim misce c.
Aq. Rosar. Unc. 1
ut f. Emuls. D. S. Mehrmals täglich,
 umgeschüttelt, aufzustreichen. (Bei wun-
 den Brustwarzen.) DANNEMANN.
 1 Eigelb statt des Gummi möchte pas-

sender seyn, vgl. I. 8. 178 Z. 4, 5 v. u.

155.

R_z *Bals. Peruv.* Dr. 1
Fitell. Ovi unius
Spir. Serpylli Unc. 3.
Terendo M. D. — Die Warzen damit,
 umgeschüttelt, zu bestreichen, u. dann
 mit einem sehr feinen Pulver aus *Cort.*
Chinae fusc. Dr. 1, *Gm. Mimos.* Dr. 2
 zu bestreuen. (Bei wunden Brustwar-
 zen.)

JÖRG.

156.

R_z *Aeruginis pulv.* Gr. 5
Bals. Peruv. Dr. 1
Ungt. cerei Dr. 2.
M. f. Liniment. D. — Auf Baumwolle
 in den leidenden Theil zu bringen. (Bei
 übel riechenden Ausflüssen aus Ohren,
 Nase, weiblichen Genitalien, zur Besei-
 tigung des Gestanks. — Oder zu dem-
 selben Zweck Eintröpfelungen von einer
 Mischung aus 1 Theil Perubalsam und
 3 Theilen *Fel Tauri rec.* nach vorher-
 gegangenen Einspritzungen einer Sei-
 fenauflösung.)

G. A. RICHTER.

Balsamum Tolutanum. Tolubalsam. [Trocken. —
 1 Drachme $1\frac{1}{2}$ Sgr.] *Sol.* Alcoh. 6. — Vgl. *Resinae*. — Innerl. zu
 Gr. 5–20, einigemal tägl. (Dr. $\frac{1}{2}$ –1 auf den Tag); in Pillen [R_z 157],
 Bissen, Emulsion, Auflösung.

157.

R_z *Bals. Copaiv.* Dr. 1
 — *Tolutani pulv.* Dr. 2

Cubeb. pulv. Dr. 3.
M. f. Pilulae 120. *Consp. Pulv. Cass.*
cinnam. D. S. 3mal tägl. 10.

LOCKSTAEDT.

Baryta muriatica. Terra ponderosa salita. Chlo-
retum Barrii cum Aqua. Salzsäure Schwererde. [1 Dr.
 2 Sgr.] *Sol.* $2\frac{1}{2}$ –3. — *Cave* Alkalien; Schwefelsäure, Phosphor-
 säure, Borsäure, Kohlensäure, Citronensäure, Weinsteinssäure; schwe-
 felsäure, phosphorsaure, salpetersäure, weinsteinsäure, kohlen-säure
 u. bernsteinsäure Salze, Borax; Gerbestoff; *Aq. comm.*

Innerl. zu Gr. $\frac{1}{2}$ –2, vorsichtig steigend bis zu Gr. 6; 3–4mal
 tägl. In Pillen [damit sie sich recht gleichförmig in ihnen vertheile, vorher

aufgelöst. — Ry 158], Auflösungen [z. B. Dr. $\frac{1}{2}$ in *Aq. Laurocer.* Unc. $\frac{1}{2}$, wo dann etwa 9-10 Tropfen einen Gran enthalten. Von dieser Auflösung verordnet z. B. HEIM bei Gonorrhöe, selbst im entzündlichen Stadium, alle 2 St. 15-25 Tropfen, v. AMMON bei Entzündung des *Orbicularis ciliaris* 3-6mal tägl. 10-40 Tropfen. — Ry 159, 160]. Blausäurehaltige Mittel sollen am besten die durch das Mittel leicht erzeugte Vomiturition verhüten.

Äusserl. zu Augentropfwässern [Gr. 2-5 auf Unc. $\frac{1}{2}$ — Vgl. *Aq. Laurocer.*]; selten zu Einspritzungen, Waschwässern etc. [etwa Gr. 5-15 auf Unc. 1], Bädern [wo es der Preis erlaubt, zu allgemeinen Unc. 1-2, zu Fussbädern Dr. 2-4].

158.

Ry *Barytae muriat.* Dr. $\frac{1}{2}$
solve in Aq. destill. q. s., adde
Succi Glycyrrh. dep. Dr. $\frac{1}{2}$
Rad. — *pulv. q. s.*
ut f. Pilulae 120. *Consp. Pulv. Rad. Glycyrrh.* D. S. 3-4mal tägl. 4-8 (1-2 Gran — jede Pille enthält Gr. $\frac{1}{4}$).

159.

Ry *Barytae muriat.*
Extr. Conii mac. ana Gr. 12
solve in
Aq. Cinnam. simpl. Unc. $\frac{1}{2}$.
D. S. 3-4mal tägl., umgeschüttelt, 10-20 Tropfen (Gr. $\frac{1}{2}$ - 1 von jedem Mittel). Für ein Kind von 10 Jahren.

160.

Ry *Barytae muriat.*
Extr. Conii mac. ana Dr. $\frac{1}{2}$
solve in
Aq. destill. Unc. $\frac{1}{2}$
adde
Vini stibiati Dr. $1\frac{1}{2}$.
M. D. S. 3stündl., umgeschüttelt, 15-30 Tropfen. (Gegen chronische Hodenanschwellung.) WYLIE.
Der Zusatz von Spiesglassenzwein ist ein chemischer Fehler; doch kann die sehr geringe Quantität des Brechweinsteins ($\frac{1}{3}$ Gran) wenigstens der Wirkung des Hauptmittels nicht schaden.

Benzoë. Resina Benzoës. Asa dulcis. Benzoëharz. Wohlriechender Asand. [1 Unze $4\frac{1}{2}$, *subt. pulv.* 68gr.] Vgl. *Resinae*. Ausserdem cave salzsaures Eisen.

Innerl. (selten) zu Gr. 5-15 einigemal tägl., in Pillen, Bissen, Emulsion.

Äusserl. zu Zahnpulvern [Dr. 1-2 auf Unc. 1], Zahnfleischentzündungen, Zahntincturen [Ry 117], Schönheitspulvern, Waschwässern [in Form einer Emulsion, besonders gern mit bittern Mandeln, wie Ry 161. Doch geht beim Coliren solcher Emulsionen die meiste Benzoë verloren; wollte man aber die Emulsion mit *Gm. Mimos.* oder Kiegebereiten lassen, damit sie nicht colirt zu werden brauchte, so würde sie unangenehm klebrig werden, mit Gummi auch beim Eintrocknen auf der Haut einen glänzenden Ueberzug bilden; — es scheint also zweckmässiger, nur die *Tinct. Benzoës* (vgl. den Art.) zu den Waschwässern anzuwenden.], Pflastern, Räucher-Species u. Pulvern [officinell: *Spec. ad suffiend.*].

161.

Ry *Benzoës pulv.* Dr. 2

Amygdal. amar. excort. Dr. 6
Aq. Rosar. Unc. 8.

F. Emuls. In Colat. solvo
Boracis Dr. 2.

D. S. Umgeschüttelt zum Waschen.
SCHUBARTH.

Bismuthum nitricum præcipitatum. *Magisterium Bismuthi s. Marcasitæ. Marcasita alba. Subnitræ bismuthicæ.* Wismuth-Magisterium, -Niederschlag od. Kalk. Schminkweiss; Perlweiss; Spanisch Weiss (*Blanc d'Espagne*). Basisch-salpetersaures Wismuthoxyd. [1 Unze 3½ Sgr.] *Cave* Phosphorsäure, Weinsteinssäure, Citronensäure; *Tart. depur.*; reine u. kohlensaure Alkalien; alkalische Erden; Schwefel u. Schwefelverbindungen; Iodkalium; Gerbestoff.

Innerl. zu Gr. ½ - 2, steigend bis zu Gr. 6-10; 3-4mal tägl.; gern mit gewürzhaftem Zusatz. Gegen Cholera, Diarrhöen und Ruhren wohl noch in grösseren Gaben. [Nach LEO bei der oriental. Cholera zu Gr. 3, alle 3-2 St., in Pulver (mit Zucker), mit etwas Melissenhee zu nehmen; wenn die Zunge stark belegt, etwa noch *Rad. Rhei tostæ* Gr. 3 zu jeder Gabe. (Dabei, wenn heftiger Schmerz in Händen u. Füssen, einigemal tägl. Frictionen mit einer erwärmten Mischung aus *Liq. Ammon. caust.* 1, *Spir. Angel. comp.* 6. — Nur bei sehr vollblütigen, jungen und starken Personen zum Anfang der Behandlung wohl ein Aderlass von 6-8 Unz.; eher bei heftigen Schmerzen in der Magen-egend gleich anfangs 12-16 Egel.) Mit den Wismuthgaben so fortzufahren, bis sich Harnabgang einstellt; dann noch einige Tage früh und Abends ein solches Pulver. — TROUSSEAU giebt bei Diarrhöen und Ruhren, auch bei Dothienteritis vom 21ten Tage an, das Wismuthmagist. zu 18-36 Gran *p. die* (auf 2 oder 3 Dosen vertheilt), und selbst Kindern in den ersten Lebensmonaten 6 Gran *p. die*. (!) In Pulver [R_y 162, 163; 384 (*Extr. Nuc. Vom. spir.*)], Pillen [R_y 164].

Ausserl. (selten) in Salben [1 auf 3 Fett: KERKSIG gegen Krätze].

162.

R_y *Bismuthi nitr. præcip.* Gr. 12

Rad. Zingiber. Gr. 8

Conchar. ppt. Scr. 2

Sacch. albi Dr. 2.

M. f. Pulv. Disp. in 8 part. aeq. D. S.
2-3mal tägl. 1 Pulver in Kamillen- oder Pfeffermünzthee. (Gegen Magenkrampf.)

163.

R_y *Rad. Ipecacuanh.* Gr. ¼ - ½

Bismuthi nitr. præcip. Gr. 2-3

Magnes. carbonat. Gr. 4

Elaeos. Anisi Gr. 8.

M. f. Pulv. Disp. tal. dos. nr. 12. D. in charta cerata. S. 4mal tägl. 1 Pulver. (Bei Uebelkeiten und Vomiturition, die aus blosser Verstimung des Magens ohne erhebliche Zeichen von Sordes chronisch andauern.) KOPF.

164.

R_y *Bismuthi nitr. præcip.* Scr. ½

Extr. Valerian. Dr. 1

Ol. Valerian. Gtt. 10

Pulv. Rad. Valer. q. s.

ut *f. Pilulæ* 60. *Consp. D. in vitro.*
S. 3mal tägl. 6. (Bei nervösem Magenkrampf.) SCHUBARTH.

Boletus igniarius. *Agaricus chirurgorum.* Feuer-schwamm. [Nicht salpetrirt, was er zu chirurgischen Zwecken nicht anwenden darf. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr.]

* **Boletus Laricis.** *Agaricum.* *Agaricus albus.* Lärchenschwamm. [Hauptbestandtheil ein drastisches Harz. — Für pulververanfachende Formen schreibe man ihn „präparirt“ (s. I. S. 129) vor. — 1 Unze conc. $2\frac{2}{3}$, praep. $3\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerl. zu Gr. 2-10, einigemal tägl. [als Drasticum, zu Dr. $\frac{1}{2}$ -1, obsolet]; gern mit etwas Aromatischem; in Pulver [z. B. gegen Abend stündl. 2 Gran mit einem Ölzucker: DE HAEN gegen colligative Nachtschweisse]. Die grösseren Gaben sind, weil sie beim Zutritt von Feuchtigkeit stark aufquellen, in Pulver unangenehm zu nehmen., Pillen, wenigem Aufguss [macerirt oder digerirt; Dr. 2-3 auf Unc. 6, eßlöffelweise].

Äusserl. als blutstillendes Mittel [s. Colophonium].

* **Bolus alba s. Melitensis s. Turcica.** Weisser Bolus. [1 Unze gr. pulv. $\frac{1}{2}$, praep. 1 Sgr.] Nur äusserl., zu (Streupulvern), Waschpulvern [vgl. d. officinelle Pulv. cosmet.], Augensalben [q. v. — Ry 165], Augensalben [Gr. 5-15 u. mehr auf Dr. 2].

165.

Ry *Boli albae*
Tartari depurati

Sacch. albi ana Dr. 1.

M. f. Pulv. D. S. Augenpulver; 2-3mal tägl. zu appliciren. (Bei adynamischen Hornhauttrübungen.) BALDINGER.

* **Bolus Armena.** *Argilla rubra.* Armenischer od. rother Bolus. [1 Unze $\frac{1}{2}$, praep. $1\frac{1}{3}$ Sgr.]

Innerl. zu Gr. 5-10, einigemal tägl., in Pulvern [Ry 166] oder Schüttelmixturen [stark umzuschütteln. Bei Ruhr, Durchfällen bisweilen in einer Leinsamenemulsion].

Äusserl. zu Mundpulvern [z. B. mit Zucker zum Ausstreuen des Mundes (oder auch mittelst eines Pinsels zu appliciren): DEWEES bei missfarbig werdenden Aphthen Neugeborner], Schnupfpulvern [Ry 74 (Alum.)], Augensalben [Ry 501 (Hydr. ammon. mur.)] u. a. Salben [Ry 1102 (Zinc. oxyd.)].

166.

Ry *Rad. Rhei* Dr. 1
Boli Armenae
Magnes. carbon.
Klaeosacch. Macidis ana Dr. 2.

M. f. Pulv. D. in vitro. S. 3mal tägl. 1 Theelöffel. (Bei Gonorrhöa secundaria; bei chronischen Vaginal- u. Uterinblennorrhöen; bei weniger starken, mehr habituellen Metrorrhagien.) RUST.

Borax. *Borax Sodae alcalinus.* *Natrum boracicum* (natronatum). *Boras natricus cum Aqua.* Borax; basisch

boraxsaures Natron. [Der Zusatz *Veneta* ist ganz überflüssig. — 1 Unze 2, *subt. pulv.* 3 Sgr.] *Sol.* 12; in Syrup u. Honig leichter auflöslich. — *Cave* [mit *sanction. Ausnahmen*] Mineralsäuren, Bernstein-säure; reines u. kohlen-saures Kali, Salmiak, Weinsteinrahm, Alaun, schwefelsaure Magnesia, Kalk-, Baryt- u. Metall-Salze. Auch hat der Borax die Eigenschaft, den Schleim von Stärkmehl [auch Moosstärke], Gummi und Salep beträchtlich zu verdicken, gallert-artig zähe zu machen, welche Verdickung aber durch Zucker, Honig oder Säuren wieder aufgehoben wird; auch hierauf ist beim Verordnen von Pinselsäften, Lecksäften u. s. w., namentlich aber von Augenwässern (wo deshalb *Mucil. Cydon.* vorzuziehen) Rücksicht zu nehmen.

Innerl. zu Gr. 15-30, 2-4 mal tägl., oder zu Gr. 5-20 alle 2 St.; zur Verstärkung der Wehen auch wohl in noch kleineren u. häufigeren Gaben [z. B. zu Gr. 4-6 alle $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{4}$ St.: Kopf]. In Pulver [Ry 167], Trochisken [Ry 168], Auflösungen [Ry 487 (*Hb. Sabin.*)], Leck-säften [z. B. für ein Kind von einem Paar Jahre Dr. 1 auf *Mell. rosati* Unc. 2, 4 mal tägl. 1 Theelöffel].

Ausserl. zu Mund- u. Gurgelwässern [Dr. 1-2 auf Unc. 6], Pinselsäften [Dr. $\frac{1}{2}$ -2 auf 1 Unze Saft], Zahnpulvern [Dr. 1-2 auf Unc. 1], Injectionen [z. B. bei *Fluor albus* Scr. $\frac{1}{2}$ -2 auf jede Unze], Augenpulvern [pur oder in Verbindungen. — Ry 79 (*Alum. ust.*), 991 (*Stann. rasp.*)], Augenwässern [welche man zweckmässig filtriren lässt. — Zu Augen-Waschungen u. Bähungen Dr. 1-2 auf Unc. 4; Ry 169. — Zu Augentropfwässern Gr. 5-20 auf Unc. $\frac{1}{2}$; Ry 170, 171], Augensalben [Gr. 15 auf Dr. 2: PITSCHAFT gegen verschiedene chronische Ophthalmien] und anderen Salben [z. B. Dr. $\frac{1}{2}$ auf Unc. $\frac{1}{2}$ Fett: bei entzündeten Hämorrhoidalknoten oder von geöffneten Hämorrhoidalknoten hinterlassenen Geschwüren; auch nach PITSCHAFT gegen Flechten (neben innerlicher Behandlung). — Dr. 1 auf *Ungt. rosati* Unc. $\frac{1}{2}$, Abends einzureiben: Frostsalbe von HUFELAND; vgl. Ry 262 (*Chlor. Calcar.*)], Linimenten [Ry 172], Streupulvern [Ry 173], Waschpulvern [s. I. §. 130], Waschwässern [z. B. Dr. $\frac{1}{2}$ auf *Aq. Flor. Aurant.*, *Aq. Rosar.* ana Unc. $\frac{1}{2}$, 3-4 mal tägl. anzuwenden u. auf der Haut trocknen zu lassen: HUFELAND gegen Leberflecke, besonders bei plethorischem Frauenzimmer, gegen Hitzblätterchen u. s. w. Oder eine halbso starke Auflösung: Derselbe, gegen die rothen Nasen der Damen von Blutüberfluss und Erweiterung der Nasenhautgefässe. — Ry 161 (*Benzoe*)].

167.

Ry *Boracis* Dr. 1*Croci* Scr. $\frac{1}{2}$ *Ol. Cass. cinnam.* Gtt. 2.*M. A. Puls. Div.* 2 part. aeq. D. S.

Stündl. 1 Pulver. (Bei Unthätigkeit der Geburtswehen.) WEDEL.

168.

Ry *Boracis pulv.* Dr. 2

Sacch. albi pulv. Unc. $\frac{1}{2}$
Mucil. Gm. Tragac. q. s.
 ut f. *Trochisci torrendi*, *Sacch. Lactis pulv. consp.*, nr. 30. D. S. 4-6mal tägl. ein Stück im Munde zergehen zu lassen. (Bei Aphthen.)

169.

Ry *Boracis* Dr. 2
 solve in

Aq. destill. Unc. 4.
Filtra. D. — Als Foment, kalt oder warm — wie es am besten vertragen wird, über die Augen zu schlagen. (Bei scrofulöser Lichtscheu.) RUST.

170.

Ry *Boracis* Gr. 15
Sacch. albi Dr. $\frac{1}{2}$
 solve in

Aq. Rosar. Unc. $\frac{1}{2}$.
Filtra. D. S. Einigermal tägl. ins Auge zu träpfeln. (Gegen Hornhautflecken.) PLENCK.

171.

Ry *Boracis*
Sacch. albi ana Gr. $7\frac{1}{2}$
 solve in
Aq. Rosar. Unc. $\frac{1}{2}$
Filtra, adde
Extr. Aloës
 — *Opii* ana Gr. $1\frac{1}{2}$.

† *Bromum. Bromium.* Brom. Murid. [Schwarzrothe, unangenehm riechende, sehr flüchtige, ätzende, organische Gerüche und Pflanzenfarben zerstörende Flüssigkeit.] *Sol.* 34; auch auflöslich in Weingeist und besonders in Äther. — *Cave:* vgl. I. S. 32; doch wird man es vorläufig nur nach mitgetheilten Vorschriften prüfen.

Innerl. etwa nach POURCHÉ: in 40 Theilen destill. Wassers aufgelöst, 2mal tägl. 5-6 Tropfen in Zuckerwasser u. allmählig zu stelgen.

Aüsserl. zu Salben [z. B. 3-6 Gran (nicht Tropfen) Brom mit † *Kali hydrobrom. pulv.* Gr. 12 auf $\frac{1}{2}$ Unze Fett: MAGENDIE zum Einreiben auf Scrofelgeschwülste], Umschlägen [verdünnt].

Bulbi Allii Cepae. Radix Cepae. Zwiebeln. [Bestandtheile wie bei den folgenden.]

Literum solve. D. — Wie das vorige.

RICHTER.

Der Autor schreibt das Filtriren nicht vor, und bei den beiden Extracten dürfte es wider seine Absicht seyn, da die gelind mechanisch-reizende Eigenschaft einer etwas trüben Extractlösung bei Hornhautflecken nur nützen kann; beim Borax und Zucker aber, wo das Filtriren nur fremdartige Beimengungen fortschafft, ist es jedenfalls passend.

172.

Ry *Boracis pulv.* Dr. 1
Balsami Peruv. Dr. $1\frac{1}{2}$
Ol. Amygdal. Unc. 1
Fitelli Ovor.

Album. — ana Dr. 2-3.

Terendo M. f. Linim. D. — Auf Charpie über die durchgesogene Brustwarze zu legen. HARLESS.

173.

Ry *Boracis* Dr. $\frac{1}{2}$
Sacch. albi Dr. 1.

M. f. Pulv. D. — 2mal tägl. eine Messerspitze voll in die Zunge des Kindes einzureiben und auf die Brustwarze der Mutter unmittelbar vor dem Anlegen des Kindes zu streuen oder, mit einigen Tropfen Milch zum Brei gemacht, aufzustreichen. (Bei Schwämmchen der Säuglinge.) KLUGE.

Innerl. (selten) den ausgepressten Saft [zu Unc. $\frac{1}{2}$ -1 (-2) tägl., mit Zucker, als Diureticum bei Wassersucht].

Ausserl. zerrieben als Riechmittel [bei Krämpfen u. Ohnmachten Hysterischer], oder halb durchgeschnitten, zerquetscht oder geschabt aufgelegt als gelindes *Epispasticum* [z. B. bei Nasenbluten in den Nacken: VAN SWIETEN; bei krampfhafter od. rheumatischer Ischurie od. Strangurie auf Mittelfleisch, Harnröhre, Blasengegend od. Nabel]; in Asche gebraten und zerquetscht zu reizenden Cataplasmen [z. B. KERNDL's *Cataplasma acre* zur Zeitigung torpider Bubonen u. a. Abscesse: 2 Loth so zubereiteter Zwiebeln, eben soviel gepulverter Senf u. $\frac{1}{2}$ Loth schwarze Seife mit Wasser zum Brei gekocht (zweckmässiger bloss mit kochendem Wasser zum Brei angerührt); man legt den Brei so warm als es vertragen wird, einen Zoll dick auf, darüber einen einfachen heissen Breiumschlag, den man öfters wechselt, um das darunter liegende *Catapl. acre*, das nur 1 mal tägl. frisch aufgelegt wird, warm zu erhalten; Nachts statt des ganzen Breiumschlags ein Ammoniakpflaster. — Will man ein etwaß weniger reizendes Cataplasma, so kann man nach HORN ein Paar Loth *Spec. ad Catapl.* mit Wasser zu einem Brei kochen und diesem nach Belieben Senfpulver und gebratene zerquetschte Zwiebeln, etwa von jedem 1 Loth, doch auch mehr oder weniger, zusetzen lassen. — Zur Bereitung in der Apotheke eignen sich dergleichen Cataplasmen nicht.]; leicht abgekocht, mit Wasser oder Milch, zu Klystieren [etwa Dr. 2].

Bulbi Allii sativi. Radix Allii. Knoblauch. [Vorberrschende Bestandtheile: scharfes äther. Oel und Zucker.]

Innerl. (selten) im Presssaft [etwa 2-3 Theelöffel tägl., mit vielem Zucker, auch wohl mit Molken], oder im Aufguss [etwa Unc. 1-2 mit 1 Pf. kochender Milch (Knoblauchsmilch) oder Fleischbrühe infundirt od. ebullirt, verflüst, und dies, besonders Morgens nüchtern, zu halben oder ganzen Tassen in einem Tage zu verbrauchen; für Kinder verhältnissmässig weniger], oder in Substanz.

Ausserl. wie die vorigen als gelindes *Epispasticum* [z. B. den ausgepressten Saft auf Baumwolle einigemal tägl. in den Gehörgang gebracht, bei rheumatischer Taubheit] oder zu Cataplasmen; extrahirt zu Klystieren [Dr. 1-2, mit Milch oder Wasser leicht abgekocht. Oft kann man schon Würmer abtreiben, wenn man die Dämpfe von einem frischen Knoblauchsaufguss oder Absud an den After des Kindes gehn lässt], Umschlägen [Ry 174].

174.

Ry *Bulbos Allii sativi incis. nr. 3-4*

Spir. Vin Gall. Unc. 27.

Macerata per 36 hor.; liquori decantato adde

Decoct. Rad. Bardan. (oder Cort.

Querc.) (Unc. 1) Unc. 8.

M. D. S. Haarmittel. (Gegen das Ausfallen der Kopshaare vielfach erprobt,

namentlich bei Damen. Man trinkt einen Schwamm damit, befeuchtet mit diesem — mehrere Wochen lang — jeden Abend das Haar und besonders die Kopfhaut, bedeckt den Kopf mit einem Tuche, einer Nachtmütze od. dgl., salbt am Morgen das Haar ein wenig mit Klauenfett und kämmt es dann mit einem nicht zu engen Kamme.)

† *Butyrum vaccinum*. Butter [frische, ungesalzene. — 1 Unze 2 Sgr.]. *Cave* wie bei den Fetten (I. S. 35 sub 10). — *Constituens* von Salben, meist nicht zu empfehlen [I. S. 276 sub 2].

Calcaria muriatica. Calx salia. Sal Ammoniacum (s. muriaticum) fixum. Phosphorus Hombergii. Chloratum Calci. Salzsaurer Kalk; Calcane; fixer Salmiak. [Zersetzt an der Luft; heisst dann wohl *Oleum Calci*, Kalköl. Die PH. AUSTR. hat unter der Benennung *Ol. Calc.* eine Auflösung, 1 auf *Aq. destill.* 1. — 1 Unze 7½ Sgr.] *Sol.* ½ (oder wenig mehr); auch auflöslich in Weingeist. — *Cave* kaustisches Kali u. Natron; kohlen saure Alkalien; Schwefel-, Phosphor-, Salpeter-, Weinstein-, Bernstein-Säure; die Salze dieser Säuren, auch essigsaure Salze, Borax, viele Metallsalze.

Innerl. zu Gr. 2-10 (wenn es vertragen wird, - 20), einigemal tägl.; in wässriger oder geistiger Auflösung. [In wässrigen Auflösungen ist *Succ. Glycyrrh. dep.* das beste Corrigena für Zunge und Magen, für den letzteren sonst auch schleimige, aromatische oder narkotische Zusätze. — Ry 175-177. Oder Dr. 1 in *Tinct. Calami* Unc. 1, zu 30-40 Tropfen *p. dosi*: NIKMANN bei Scrofeln der Kinder.]

Ausserl. zu kalten Bähungen [man verschreibt ihn zu dem Ende gepulvert in einem wohlverschlossenen Glase, lässt dann eine Portion in eine zusammengelegte Serviette legen, diese mit ein wenig Wasser befeuchten (oder noch besser, wenn es die Jahreszeit erlaubt, etwas Schnee mit in die Serviette legen), die Erhitzung, welche vorübergehend entsteht, abwarten, und dann die Serviette auf den kranken Theil legen. — Doch sind diese Bähungen theuer u. wohl ohne wesentlichen Vorzug.], zu Waschungen [z. B. Dr. 1 auf *Aq. Rosar.* Unc. 8: SUNDELIN gegen Flechten], Bädern [Unc. 1-2], selten zu Augentropfwässern [Gr. 1-2 auf Unc. ½], Salben [Ry 178]. — Auch bedient man sich desselben sehr zweckmässig, um in feuchten Zimmern oder bei feuchtem Wetter in Krankenzimmern die Luft künstlich auszutrocknen [SCHÖNLEIN. Man lässt zu dem Ende eine oder mehrere Portionen in offenen Gefässen aussetzen und — damit es nicht gar zu theuer werde — so oft es zerflossen ist, wieder über Feuer austrocknen].

175.

Ry *Calcar. muriat.* Dr. 1

Extr. Conii macul. Gr. 15

solve in

Aq. Cinnam. simpl. Unc. ½.

D. S. 3mal tägl., umgeschüttelt, 8-16 Tropfen (*Calcar. mur.* Gr. 2-4, *Extr. Con. mac.* Gr. ½-1). Für ein Kind von 10 Jahren.

176.

Ry *Calcar. muriat.* Dr. 1

solve in

Aq. destill. Dr. 6

adde

Aq. Laurocer. Dr. 2.

M. D. S. 3mal tägl. 30 Tropfen. (Gegen Scrofeln, Kropf.) REMER.

177.

Ry *Calcar. muriat.* Dr. 1

Extr. Hyoscyami Scr. ½

solve in

Aq. destill. Unc. 6

adde

Syr. Glycyrrh. Unc. 1.

M. D. S. 4 mal tägl., umgeschüttelt, 1 Essl. (Bei scrofulöser Lungenschwindsucht.)

BEDDOES.

178.

Ry Calcar. muriat. Dr. 1

Pulv. Hb. Digital. Dr. 2

Aceti concentr. Scr. 2

Adip. suilli Unc. 1.

M. f. Ungt. D. — (Gegen chronische Drüsengeschwülste.)

SUNDELIN.

Calcaria sulphurata. *Hepar Sulphuris calcareum. Hepar Calcis. Sulphuretum Calcii cum Sulphate calcico.* Schwefelcalcium (mit etwas schwefelsaurem Kalk). Geschwefelter Kalk. Kalkschwefelleber. [Pulver, befeuchtet od. an feuchter Luft nach Schwefelwasserstoffgas riechend. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr.] *Sol.* etwa 500 [nicht immer gleich]. *Cave* Säuren (also auch saure Säfte u. saure Salze) [wenn man nicht Schwefelwasserstoffgas entwickeln will]; Metall-Oxyde u. -Salze.

Innerl. zu Gr. 5-10 mehrmals tägl. In Pillen od. Bissen [gern noch ausser dem flüssigen oder weichen Constituens mit einem pulverigen Zusatz; nicht etwa mit *Argent.* od. *Aur. foliat.* überzogen; in einem Glase zu verabreichen. — Ry 179-181], weniger gern in Pulvern [in Wachs-papier. — Ry 182]. Auch wohl zu künstlichen Mineralwässern [z. B. Gr. 10-15 in 3 Pfund Selterser Wasser aufgelöst — wodurch sich kohlensaurer Kalk, der durch Überschuss von Kohlensäure aufgelöst bleibt, und Schwefelwasserstoffgas bilden —: DÜBEREINER].

Ausserl. zu Salben, Waschungen [selten — etwa Dr. 1 auf Unc. 3], Bädern [Unc. 2-4; kräftiger noch, wenn man durch allmähliges Zusetzen einer Säure (gewöhnlich der gleichen oder doppelten Menge verdünnter Schwefelsäure) das Schwefelwasserstoffgas entbindet. So der *Liquor hydro-sulfureticus pro Balneo* der PH. AUSTR., welcher bereitet wird, indem man 3 Unzen *Calc. sulphurat.* mit 3 Dr. Weinsteinsäure und L. 12 Brunnenwasser in wohlverschlossenen Flaschen $\frac{1}{4}$ St. schüttelt, dann auf etwa 12 St. an einen kühlen Ort setzt, und nun die klar abgegossene Flüssigkeit sogleich in ein schon zubereitetes laues Bad gießt. — Noch kräftiger und den natürlichen Schwefelbädern ähnlicher (noch Kohlensäure enthaltend) nach DÜBEREINER: 2-4 Unzen mit eben so vieler gepulverten Kreide in 200-250 Maass Flusswasser eingerührt, und dann unter beständigem Umrühren 3-6 Unzen *Acid. sulph. rst. venale* zugesetzt], auch wohl zur Bereitung von Schwefelwasserstoffgas-Dampfbädern [vgl. *Gas hydrothion.*].

179.

Ry Calcar. sulphurat. Dr. 1

Cass. cinnam. pulver.

Extr. Aconiti ana Gr. 15

— Gentian. q. s.

ut f. Pilulae 60. Consp. Pulv. Cass. cin-nam. D. in vitro. S. 3-4 mal täglich

 $\frac{1}{4}$ Stück.

(BUSCH.

180.

Ry Calcar. sulphurat.

Res. Guajaci nat. ana Scr. 2

Fell. Tauri insp. q. s.

ut f. Pilulae 60. Consp. Pulv. Vanill. D. in vitro. S. 3mal tägl. 10.

181.

R₁ *Calcar. sulphurat.**Extr. Dulcamar. ana* Dr. 1*Stipit. Dulcamar. pulv. q. s.*ut f. Bolⁱ nr. 6. *Consp. Pulv. Cass. cinnam. D. in pyxide. S.* Tägl. 3 Stück.

182.

R₁ *Hb. Aconiti* Dr. $\frac{1}{2}$ *Calcar. sulphurat.* Dr. 2*Succi Glycyrrh. dep.* Dr. 1.*M. f. Pulv. Div. in 15 part. aeq. D. in charta cerata. S.* Alle 2 St. 1 Pulver.

BUSCH.

Calcaria sulphurato-stibiata. *Calx Antimonii cum Sulphure (Hoffmanni). Hepar Antimonii calcareum. Sulphuretum Calcii cum Sulphureto Stibii et Sulphate calcico.* Schwefelspiessglanzkalk. [*Calx Antimonii sulphurata* PH. P. entspricht so ziemlich diesem Präparat der PH. BOR. — Pulver, angefeuchtet oder an feuchter Luft nach Schwefelwasserstoffgas riechend. — 1 Drachme 1 Sgr.] *Sol.* verschieden, immer nicht recht vollständig. — *Cave* Säuren, saure Säfte und saure Salze; Metall-Oxyde u. -Salze; Alkalien. Für concentrirte Auflösungen auch Weingeist.

Innerl. zu Gr. 2-6 mehrmals tägl.; in Pulver, Pillen [mit ähnlichen Cautelen wie bei *Calcar. sulphurata*], am häufigsten aufgelöst in Form der officinellen *Aq. sulphurato-stibiata* [vgl. den Artikel].

Äusserl. zu Umschlägen, Waschungen [z. B. bei *Crusta lactea* Dr. $\frac{1}{2}$ auf L. 1 (colirt), 4 mal tägl. anzuwenden: HAASE; sonst etwa Dr. $\frac{1}{2}$ -1 auf Unc. 6, colirt], selten zu Bädern [Unc. $\frac{1}{2}$ -2 mit einigen Quart Wasser abgekocht, dann ins Bad gegossen], Pflastern [etwa mit *Empl. foot.*].

Calcaria usta. *Calx viva s. pura s. caustica. Oxydum calcicum.* Gebrannter Kalk; Calciumoxyd.

Nur äusserl., als Ätzmittel [z. B. fein gepulvert mit gleichen Theilen schwarzer Seife (*Liniment. causticum* VOGELII) oder, namentlich für Damen, mit 2 Theilen solcher Seife (POLLAU in Berlin) zu einer Paste gemacht, zum Zerstören von Muttermälern; man wendet es mittelst eines gefensternten Pflasters an, befestigt es mit einem darüber gelegten Pflaster, und lässt es so mehrere Stunden liegen; es bildet sich ein Schorf, der abfallend eine weisse, nicht entstellende Narbe zurücklässt; oft ist, namentlich bei grösseren Mälern, wiederholte Anwendung nöthig; immer, wenn das Mal nicht wiederkommen soll, vollständige Vertilgung desselben. — Auch wohl mit $\frac{1}{2}$ *Auripigment.* (s. den Art.) zum Wegbeizen von Haaren]; auch zum Austrocknen der Luft in Zimmern [in offenen Gefässen ausgesetzt; zu diesem Behuf etwa vom Maurer zu entnehmen].

Man wendet auch wohl den milderer gelöschten Kalk, *Calcaria extincta*, an [s. R₁ 721, 722 (*Natr. carb. dep. sicc.*)].

Camphora. Campher. [So gut als unauflöslich in Wasser (*Sol.* nach BRANDES 530) u. nur durch Hülfe von Zucker oder besser noch Gummi, Ei-gelb, mit demselben in grösserer Menge zu vermischen (emulgiren). Leicht auflöslich in Weingeist (in $\frac{2}{3}$ Weing. von 0,806 spec. Gew.), Äther und ätherischen Spiritus (aus welchen dreierlei Auflösungen ihn jedoch Wasser und wässrige Flüssigkeiten)

igkeiten wieder ausscheiden), ferner in ätherischen und fetten Ölen; weniger leicht in (gewöhnlichem, nicht concentrirtem) Essig, weshalb man bei der Bereitung des Campheressigs (z. B. Ry 187) gewöhnlich *Gm. Mimos.* zu Hülfe nimmt, so wie man dies auch beim Auflösen in solchen Mischungen von Weingeist und Wasser, welche schwächer weingeistig sind als etwa der *Spir. F. rectificatus*, also z. B. in Wein (wie in Ry 209), thut. — Für Pulver und pulveraufnehmende Formen muss der Campher sehr fein zerrieben werden, was nur durch Zusatz von etwas Weingeist, Äther oder Öl möglich ist; zwar beobachtet das der Apotheker auch ohne Anweisung des Arztes, und dieser darf deshalb nur etwa, um anzudeuten, dass er davon unterrichtet ist, *Camphora c. Spir. Vini trita*, oder bloss *trita*, schreiben. Nie darf man das Pulver, wie es wohl beim äusserlichen Gebrauch jemanden einfällen könnte, pur verordnen (es würde so bald zusammenbacken), sondern immer nur in dem I. S. 206 (Tabelle) angegebenen Verhältnisse mit andern Pulvern verbunden. — 1 Unze $3\frac{1}{2}$, 1 Drachme *trita* $\frac{2}{3}$ Sgr.] *Cave* Salzbilder; für Campherauflösungen auch wässeriges Kali.

Innerl. zu Gr. 1–5 [nur selten, bei hohen Graden von Torpor oder um durch Überreizung Schwäche und Abspannung hervorzubringen — bei höchst torpiden Nervenfebern, lähmungsartigen Zuständen, inveterirten asthenischen Rheumatismen, Wahnsinn, Wasserscheu —, noch mehr; doch sind enorme Gaben, wie man sie wohl gegeben hat (bis zu 2 Drachmen!) unverzeihlich, da man bisweilen schon von Scr. 1 leichte Vergiftungszufälle sah], 2–4mal tägl., in dringenderen Fällen alle 2–1 St. (Als Corrigenes von Canthariden, Mercurialpräparaten u. dgl. in kleineren Dosen. — Die reizende örtliche Einwirkung des namentlich in Pulver u. pulveraufnehmenden Formen und in grösseren Dosen angewandten Camphers auf den Magen soll die Verbindung mit Salpeter verhüten; sicherer ist es wohl noch, die grösseren Dosen in flüssiger Form darzureichen.) — In Pulver [Als Constituens ist blosser Zucker nicht empfehlenswerth (I. S. 212 sub 2), sondern Zucker mit *Gm. Mimos.* (so besteht z. B. *Pulv. camphoratus* PH. MIL. aus *Camph.* Gr. 2, *Gm. Mim.* Gr. 6, Zucker Gr. 12) oder noch besser *Pulv. gummosus* (in dem das Süssholz zugleich den Geschmack gut verbessert) zu wählen. — Man lasse die Pulver in Wachspapier verabreichen, und verordne in dieser Form noch weniger als in allen anderen auf längere Zeit. — Ry 183, 184; 15 (*Acid. benz.*), 782, 783 (*Opium*), 855 (*Rad. Ipecac.*), 1000 (*Sulph. dep.*), 1011 (*Sulph. stib. aurant.*)], Pillen u. Bissen [in denen man für geringe Quantitäten kein Constituens zu berechnen braucht. Die Pillen lasse man, wenn sie nicht ganz rasch verbraucht werden, in einem Glase verabreichen. — Ry 32 (*Acid. phosphor.*)], Latwerge [erst zerrieben, dann durch Syrup oder Honig subigirt, und nun erst den andern Ingredientien beigemischt. — Ry 448 (*Graphit.*)], Auflösungen [in verschiedenen Menstruis. Officinel sind die Auflösungen in 8 Theilen frischen Mohnöls: *Oleum camphoratum*, und in 12 Theilen rectificirten Weingeists: *Spiritus camphoratus*, die man nicht bloss, wie es gewöhnlich geschieht, äusserlich, sondern auch, wo sonst diese Menstrua passen, unbedenklich innerlich anwenden kann. Hieher gehören auch noch: *Aether sulphuricus camphoratus* PH. HANN. (1 auf 3; mithin etwa 10 Tropfen 1 Gran enthaltend; — 1 Dr. $1\frac{1}{2}$ Mgr.) und *Spir. sulphurico-aether. camphoratus* od. *Liq. nervinus* PH. BLEY.,

HANN. (1 auf 6; mithin etwa 12 Tropfen 1 Gran enthaltend; — 1 Dathme 1 Mgr.). Auch magistraler Auflösungen, in Weingeist, Wein, Äther, ätherischen Spiritus, Essig (in Wein u. Essig etwa mit Hülfe von Gummi) bedient man sich häufig; z. B. Ry 186, 187; 13 (*Acet. Rut.*), 919 (*Rad. Serpent. Virg.*). Dass man die Einzelgaben der geistigen und ätherischen Auflösungen nicht mit gewöhnlichen wässerigen Vehikeln, sondern nur mit schleimigen oder sonst dickflüssigen geben solle, s. I. S. 341.] und Emulsionen [vgl. I. S. 178, 179; ein Zusatz von *Succ. Glycyrrh. dep.* verdeckt ein wenig den Geschmack des Camphers und vermehrt zugleich die Haltbarkeit der Emulsion. Recht zweckmässig ist es auch, den (zuvor zerriebenen) Campher bloss mit Syrup zu mischen und so theelöffelweise nehmen zu lassen; oder auch den Campher in fettem Öl auflösen und dies zur Emulsion machen zu lassen, etwa in 8 Theilen Mohnöls (*Ol. camphorat.*) oder Mandelöle. — Unpassend aber ist es, den Campher mit Mandeln abreiben zu lassen, denn um der Mandeln willen muss colirt werden, und dabei bleibt ein Theil des Camphers im Seichtuch zurück. — Ry 188-191; 418 (*Flor. Arnic.*), 485 (*Hb. Sabin.*), 646 (*Liq. Ammon. carb. pyro-ol.*), 916 (*Rad. Seneg.*), 1016 (*Sulph. stib. rub.*)], nicht aber in Schüttelmixturen ohne Emulgens [I. S. 313].

Ausserl. wird der Campher, theils in Substanz, theils zerrieben, theils auf verschiedene Weise aufgelöst oder emulgirt, auf die meisten Applicationsorgane angewandt; so

auf Mund und Rachen: als Kaumittel [bei Neigung zu Anginen ab u. zu ein Stückchen: HIMLY]; — bei Halsschmerzen von Erkältung ein Stückchen auf der Zunge zergehen lassen und den Speichel hinunterschlucken: RITTER; — in Mund- u. Gurgelwässern [Ry 192; 360 (*Extr. Chin. fusc.*)], Pinselsäften [Ry 193];

auf Zahnfleisch und Zähne in Latwergen [Ry 789 (*Opium*)], Pillen, auch in Substanz [ein Stückchen in den hohlen Zahn];

auf den Dickdarm: zum Klystier Gr. 5-20 (od. *Ol. camphorat.* Dr. 1-3) mit einem Paar Drachmen *Gm. Mimos.* oder 1 Eidotter, etwa in einem Kamillen- oder Baldrian-Aufguss oder in Essig. — Ry 194, 195;

auf die Nase und überhaupt die Luftwege: z. B. bei Schnupfen, Halsentzündungen ein Stückchen Camph. vor Nase oder Mund zu halten; — bei heftiger Angina, gichtischen, rheumatischen Brustleiden p.p. die Dämpfe von heissem Wasser, worin Campher geworfen, einzuathmen; — als erregendes Riechmittel (so im *Acid. acet. aromatico-camphorat.*);

auf das Ohr in Substanz [z. B. bei Zahnschmerz, bei rheumatischen od. hysterischen Kopfschmerzen, ein Stückchen, mit Baumwolle umwickelt, ins Ohr], in Tropfen [Ry 196-198], bisweilen in Salben [Ry 232 (*Castor.*)]; oder Dämpfe von heissem Wasser, worin Campher geworfen, mittelst eines Trichters ins Ohr geleitet;

auf das Gesichtsorgan in Augenpulvern [mit Weingeist fein zerrieben, dann mit Zucker gemengt], Augensalben [Gr. 2-15 auf Dr. 2, meist zweckmässig in fettem Öl aufgelöst oder doch mit ein wenig fettem Öl angerieben; das letztere wird man namentlich bei grösseren Gaben bisweilen vorziehen, um nicht zu viel Öl in die Masse zu bringen; benutzt man jedoch das Öl mit zur Constitution der Masse, so kann man auch die grösseren Gaben in 4-6 Thei-

len fetten Öls auflösen (und dann noch so viel Wachs als nach der Tabelle I. S. 276 nöthig ist, geschmolzen und halb erkaltet, dazusetzen) lassen; — z. B. Gr. 15 auf \dagger *Ungt. de Styrace* (s. Ry 995) Dr. 2: BEER gegen Skirr der Augenlider. — Ry 326 (*Cupr. sulph.*), 555 (*Hydr. oxyd. rubr. ppt.*), 1007 (*Sulph. dep.*), Augenwässern [selten in geistigem Menstruum (vgl. *Spir. camphorat.*), häufiger emulgirt in wässrigem, und zwar wohl meistens am zweckmässigsten (weil in einer gewöhnlichen Emulsion das Pulver, wenn auch fein zertheilt, doch noch einigermaßen mechanisch reizen würde) in fettem Ölaufgelöst (s. S. 94 Z. 6, 7 v. u.) und dies durch Eigelb oder *Gm. Mimos.* mit Wasser emulgirt. — Zu Augen-Waschungen u. Bähungen Gr. 4-20 auf Unc. 4 (Ry 199); zu Augentropfwässern Gr. 1-5 auf Unc. $\frac{1}{2}$], auch in Dunstform [I. S. 243. sub 1)];

auf die Haut in Waschpulvern [I. S. 226, 227. — Ein wenig Campher kommt auch zur officinellen *Pasta cosmet.*], Pflastern [vgl. I. S. 260, 263. — Ry 200; 332 (*Empl. fusc.*), 333, 334 (*Empl. de Galb. croc.*), 335 (*Empl. Hydrarg.*), 945 (*Res. Pini Burg.*); s. auch 2 Beispiele I. S. 265, 266. — Ein Zusatz von Campher pflegt die Pflaster geschmeidig zu erhalten.], Einreibesalben [entweder zerrieben oder, wenn man ihn recht fein vertheilen will, in fettem oder äther. Öl aufgelöst, oder doch mit etwas Öl (oder natürl. Balsam) angerieben; vgl. I. S. 277 (d. Tabelle) u. 278 sub 4. — Ry 202; 61 (*Aloë luc.*), 76 (*Alum.*), 654 (*Liq. Ammon. caust.*), 796 (*Petrol.*), 807 (*Phosph.*)], Linimenten [aufgelöst oder subigirt. Oft benutzt man hier die officinellen Auflösungen: *Spir. camphorat.*, *Spir. camphorato-crocat.*, *Ol. camphorat.*, doch auch magistrale in Weingeist, Äther, ätherischen u. fetten Ölen, Cantharidentinctur u. dgl. m. — Officinell: *Linim. saponato-camphorat.*, *ammoniato-camphorat.* — Ry 198, 204, 205; 652 (*Liq. Ammon. caust.*), 803 (*Phosph.*). — Man lässt auch wohl den Campher fein gepulvert mit Speichel oder anderen thierischen Flüssigkeiten einreiben, z. B. in die innere Seite der Oberschenkel: v. SÖMMERRING, BRERA u. A. gegen Zufälle in den Harnwerkzeugen von Canthariden, gegen Priapismus, Pollutionen, Harnverhaltungen, Amenorrhöe, Rheumatismen, manche Koliken u. s. w.], Cataplasmen [selten und nur als Zusatz; — so z. B. bei Gangrän, wo man jedoch, falls man feuchter Mittel bedarf, häufiger Bähungen anwendet. — Ry 288 (*Cort. Chin. fusc.*)], Bähungen u. Waschwässern [hierzu oft der *Spir. camphorat.* — Ry 206, 207; 780 (*Ol. Tereb.*). — In 2 Theilen *Spir. V. rft.* aufgelöst, zum Waschen des Mittelfleisches: GEORGE bei Pollutionen.], Bädern [Unc. $\frac{1}{2}$ -1, durch Eigelb mit einem aromat. Kräuter-aufguss subigirt; bei Nervenfebern, Dysmenorrhöe. — Zu einem Fussbade Dr. 2.]; oft benutzt man die Dämpfe des Camphers, in Kräuterkissen [q. v., wenn es ertragen wird; doch in der Regel nur Scr. $\frac{1}{2}$ - Dr. $\frac{1}{2}$ auf die Unze aromatischer Kräuter od. dgl.; — zu diesem Behuf nicht gepulvert, sondern nur geschabt, *Camph. rasa.* — Man lässt auch wohl Campher in Stückchen in einem leinenen Säckchen unter dem Hodensack (bei Pollutionen, Erectionen) oder in einem Gürtel um die Hüften (bei Nymphomanie p.p.) tragen.], Räucherungen [Bei chronischen Rheumatismen nach DUPASQUIER auf folgende Weise: entweder in einem eigenen Räucherungsapparat oder durch Umhüllung des Kranken mit einer wollenen Decke bis zum Halse, während unter seinem Stuhle auf einer heissen Metallplatte der Campher, portionenweise hingeworfen, verdunstet,

oder auch unter der mit Reifen ausgespannten Bettdecke, unter welcher man eine mit Campher bestreute heisse Bettpfanne (Bettwärmer) vorsichtig bald auf die eine, bald auf die andre Seite bringt. Der Kranke kann bei einer Temperatur der Dämpfe von 36° R. denselben $\frac{1}{2}$ - 1 St. ausgesetzt bleiben und die Räucherung bei starken Constitutionen und bedeutendem Leiden 3-4mal tägl. wiederholt werden; nach dem Verschwinden der Schmerzen sollen die Räucherungen wenigstens noch eine Woche fortgesetzt werden. Zu einer Räucherung des ganzen Körpers verbraucht man ungefähr $\frac{1}{2}$ Unze Campher; bei fixen Rheumatismen macht man nur partielle Räucherungen mit weniger Campher. Nach jeder Räucherung muss der Schweiss ein Paar Stunden im Bett abgewartet werden.], oder indem man den Dampf des entweder nur gelind erwärmten oder auch wohl auf eine heisse Metallplatte, selbst auf glühende Kohlen, geworfenen Camphers in Watte, Flanell od. dgl. auffängt und dieses Zeug entweder bloss auflegt oder den kranken Theil damit reibt. Vgl. Ry 979 (*Spec. ad sufflond.*). Zur Cultur der jungen, neu aufgesetzten Nasen empfiehlt v. GRÄFE (Rhinoplastik, S. 36) eine künstlich zu bereitende „aromatische Baumwolle“. —;

auf das Venensystem: HUNNIUS heilte einen aufs Höchste gestiegenen soporösen, wahrscheinlich durch seröse Ergiessung im Gehirn bedingten Zustand durch Einspritzung von 6 Gran Camph., mit $1\frac{1}{2}$ Drachmen dünnen Quittenschleims, in die Medianvene (wohl kaum zur Nachahmung zu empfehlen);

auf Geschwüre in Streupulvern [mit Zucker, Kohle, China, Kamillen, Myrrhe u. dgl. — Ry 208; 308 (*Cort. Salic.*)], Ceraten [Ry 201], Verbandsalben [wie die Einreibsalben zuzurichten, s. oben. — Ry 203; 8 (*Acet. plumb.*), 289 (*Cort. Chin. fusc.*), 496 (*Hydr. ammon. mur.*), 660 (*Liq. Stibii mur.*), 796 (*Petrol.*). — *Balsam. universale* PH. SLEST. s. S. 15.], Verbandwässern [Ry 209]. —

Zur Verhütung der Typhus-Ansteckung in Lazarethten empfiehlt G. A. RICHTER Campherdämpfe (eine Mischung von fein geschabtem Campher mit einer gesättigten Kochsalzauflösung über ein Kohlefeuer gesetzt).

183.

Ry *Opii puri* Gr. 4
Sulph. stibiati aurant. Gr. 8
Camphor. c. Spir. F. trit. Gr. 24
Kali nitr. depur. Dr. 1.
M. f. Pulv. Div. in 8 part. aeq. D. in charta cerata. S. Tägl. 4 Pulver.

REIL.

184.

Ry *Camphorae trit.*
Ammon. carbon. pyro-ol. ana Gr. 3
Pulv. gummosi Scr. 1.
M. f. Pulv. Disp. tales nr. 12. D. in charta cerata. S. Alle 3-2 St. 1 Pulv.
 (Bei Nervenfieber in Folge der Cholera.)
 (L. W. SACHS.)

185.

Ry *Camphorae trit.* Gr. 9
Res. Guajaci nat. pulv. Dr. 1
Sapon. stibiati Dr. $\frac{1}{2}$
Ext. Guaj. Ligni (oder Calami) q. s.
ut f. Pilulae 54. Consp. Pulv. Cass. cin-
nam. D. in vitro. S. 3mal tägl. 6.

LOCKSTAEDT.

186.

Ry *Camphorae trit.* Dr. 2
Vini Galliei albi L. 1
Succ. Cürri unius rec. expr.
Solve terendo. D. S. Umgeschüttelt stündl.
1 Eeal. (mit Zucker versüsst).

SCHWARTZ.

187.

Ry *Camphor. trit.* Dr. $\frac{1}{2}$ *Gm. Mimos. pulv.* Dr. 1*Sacch. albis.* — Dr. 2.*Terendo in mortar. lapid. sensim adm.**Aceti* Unc. 6.

Solve. D. S. Campher essig. (Sowohl innerl., namentlich in typhösen Fiebern $\frac{1}{2}$ - 1 Essl. alle 2-18t., bei Geisteskrankheiten 1-2 Essl. 2-4mal tägl.; als auch, und häufiger, äusserl. (doch dann ohne Zucker), zu Waschungen, Umschlägen, Einreibungen bei typhösen Fiebern, Quetschungen, Verrenkungen, zu Klystieren [$\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ dieser Portion], als Zusatz zu Fussbädern [die aufgeschriebene Portion etwa 4fach], als Riech- u. Räucher-mittel bei ansteckenden Krankheiten.)

Acetum camphoratum PH. HASS.

Das *Acet. camphorat.* der PH. SLESV. (1 Unze 3 Shl.) hat keinen Zucker und nur 5 Unzen Essig; es passt deshalb besonders zum äusserlichen, so wie die als Ry 188 aufgeführte Mixtur derselben Pharmakop. zum innerlichen Gebrauch.

188.

Ry *Camphorae opo Spir. V. rftiss. pulv.*
Dr. 2*tere c.**Gm. Mimos. pulv.* Dr. 2*Sacch. albi pulv.* Dr. 3.*Exacte mixtis paulatim sub continua trituratione affundantur**Aceti Vini* Unc. $\frac{1}{2}$ *Aq. destill.* Unc. 6.

D. — Innerl. in ähnlicher Art wie Ry 197.

Mixt. camphorata acida PH.SLESV. (1 Unze $1\frac{1}{2}$ Shl.)

189.

Ry *Camphorae trit.* Gr. 12-20*Gm. Mimos. pulv.* Dr. 2*Aq. comm.* Unc. 5*f. Emuls., in qua solve**Extr. Hyoscyami* Scr. $\frac{1}{2}$ — *Glycyrrhiz.* Dr. 2*Kali nitr. dep.* Dr. 2*et addo**Syr. simpl.* Unc. 1.

M. D. S. Umgeschüttelt 2stündl. 1 Essl. (Bei erethischer Gonorrhöe.)

So componirt diese Formel erscheint, so lässt sie sich doch rechtfertigen. Sie hat 2 Hauptmittel, Campher und Salpeter; 1 Adjuvans, Bilsenextract; und 2 Geschmackscorrigentien: das *Extr. Glycyrrh.* soll den Geschmack des Camphers, der Syrup wieder den Geschmack des *Extr. Glycyrrh.*, beide zugleich den des Salpeters verbessern; das Gummi dient, ausser als Emulgens, auch zugleich zum Einhüllen der beiden scharfen Hauptmittel. Wo man weniger Rücksicht auf den Geschmack zu nehmen braucht, lasse man den Syrup weg und nehme allenfalls etwas mehr Wasser; wo der Süßholzgeschmack einem Kranken besonders widrig, vielleicht widriger als der Camphergeschmack ist, nehme man bloss Syrup (wie in Ry 745).

190.

Ry *Camphorae* Scr. 1*olve in**Ol. Amygdal.* Scr. 8*adde**Gm. Mimos. pulv.* Dr. 2*Succi Glycyrrh. dep.* Dr. $\frac{1}{4}$.*Fiant cum**Aq. Sambuci* Unc. 6*Syr. Capit. Papav.* Unc. 1I. e. *Emulsio.* D. S. 2stündl., umgeschüttelt, 1 Essl.

191.

Ry *Camphorae trit.* Gr. 24*Extr. Aconiti* Gr. 6-12*terendo sensim misce c.**Syr. Amygdal.* Unc. 2.

D. S. Theelöffelweise (jeder Theelöffel enthält ungefähr 2 Gran Campher).

192.

Ry *Camphorae trit.* Scr. $\frac{1}{2}$ *Gm. Mimos. pulv.* Scr. 2

terendo sensim misce. c.

Mell. rosati Unc. $1\frac{1}{2}$

Aq. Salviae Unc. 6

et adde

Tinct. Ratanh. saccharat. Dr. 3.

M. D. S. Mundwasser, (Gegen schlaffe Mercurialgeschwüre.) SUNDÉLIN.

(Da es unnöthig und unpassend wäre, die Tinctur durch Reiben in dem offenen Mörser zu schwächen, so soll sie erst zuletzt, durch blosses Umschütteln, der fertigen Emulsion zugemischt werden.)

193.

Ry Camphorae Gr. 6

solve in

Ol. Amygdal. Dr. 6

adde

Gm. Mimos. pulv. Dr. 1

Syr. Alth. Dr. 6

f. l. a. Emulsio, cui adde

Tinct. Opii simpl. Dr. $\frac{1}{2}$.

M. D. S. Pinselsaft, umgeschüttelt. (Gegen Mercurialgeschwüre im Munde.) BERENDS.

194.

Ry Rad. Valerian. min.

— *Angelic. ana* Dr. 6

Aq. commun. ferv. q. s.

Ebulliant semel. Colat. Unc. 6 *refrigerata fiat cum*

Camphorae trit. Gr. 24

Gm. Mimos. pulv. Dr. 2

l. a. Emulsio, cui adde

Tinct. Opii croc. Gtt. 30.

M. D. S. Alle $\frac{1}{4}$ St., umgeschüttelt, den 3ten Theil mit lauwarmer Gerstenabkochung zum Klystier. VOGT.

195.

Ry Camphor. tritae Scr. 2

Asae foet. depur. Dr. 2

subige

Vitello Ovi unius in

Decocto Cort. Chin. fusci (Unc. 1)

Unc. 8.

D. S. Umgeschüttelt und ein wenig er-

wärmt zu 2 Klystieren. (Bei Nervenflebern.) G. A. RICHTER.

196.

Ry Camphorae Gr. 1

solve in

Ol. Amygdal. Unc. 1

adde

Liq. Ammon. anis. Gtt. 5.

M. D. S. Ein Paar Tropfen tägl. ins Ohr zu lassen. (Gegen nervös-asthenische Schwerhörigkeit.) RUST.

Nur sehr schwach, besonders im Vergleich zu der folgenden Formel.

197.

Ry Camphorae Dr. $\frac{1}{2}$

solve in

Ol. Amygdal. Dr. 2

adde

Ol. Cajeputi Dr. 1.

D. S. Einige Tropfen auf Baumwolle in die Ohren zu bringen. (Bei torpider Harthörigkeit.) VOGT.

198.

Ry Camphorae Dr. $\frac{1}{2}$

solve in

Aether. sulphur. Dr. 2.

D. S. Ins Ohrläppchen und in den Zitzenfortsatz einzureiben. (Gegen nervös-asthenische Schwerhörigkeit.) RUST.

199.

Ry Cort. Chinæ reg. gr. pulv. Unc. $\frac{1}{2}$

Vini Gallici albi q. s.

digere per horas tres; in Colat. Unc. 4 *refriger. solve*

Ammon. muriat. dep. Dr. 1

et adde

Camphorae trit. Dr. $\frac{1}{2}$

Gm. Mimos. pulv. Dr. 2,

ut f. l. a. Emulsio. D. S. Umgeschüttelt zum Bähnen. (Bei Gangrän der Augenlider. — Nachahmung einer Formel von LE FEBURE, käme es auf raschere Bereitung an, so wäre es noch zweck-

müssiger, *Extr. Chinae spirituosum* in Wein aufzulösen, u. s. w.)

200.

R_y *Empl. Litharg. simpl.* Unc. $\frac{1}{2}$

leni cal. liquefact. admisce

Opii, puls. Gr. 15 et

Camphorae trit. Dr. $\frac{1}{2}$

antea cum

Bals. Peruv. Dr. 1

trit. F. *Emplastr. D. S.* Auf Leder gestrichen aufzulegen. (Auf Frostbeulen 2ten Grades.) RUST.

Die über die Regel beträchtliche Quantität des Balsams kann hier nicht schaden, da *Empl. Lith. simpl.* zu den festesten Pflastern gehört und noch Pulver dazu kommen.

201.

R_y *Cerae albas* Dr. 1

Ol. Amygdal. q. s.

Leni calore liquefactis, colatis et semi-refrigeratis adde

Camphorae ops Spir. V. pulv. Scr. 1
antea cum

Bals. Peruv. Dr. 1 *tritum.*

M. f. l. a. Ceratum in tabulam effundendum et in taleolas secundum. D. — (Auf Frostbeulen, aufgesprungene Haut, p. p. anzuwenden, bei eleganten Leuten.)

202.

R_y *Camphorae trit.* Dr. $\frac{1}{2}$

Ammon. carbon. pyro-ol. pulv. Dr. 1

Sapon. medicati pulv. Dr. $1\frac{1}{2}$

Petrolei Dr. 1

Fell. Tauri rec. Dr. $1\frac{1}{2}$

Ungt. Resin. Pini Burg. Unc. $\frac{1}{2}$.

M. f. Ungt. D. S. 3stündl. 1 Theelöffel voll in den Unterleib einzureiben. (Gegen Mesenterialschrofeln.)

HUFELAND.

Für Arme statt des *Sapo medic.* passend
Sapo domest.

203.

R_y *Camphorae trit.* Gr. 10-15

Bals. Peruv. Gr. 15

Ungt. rosati Unc. $\frac{1}{2}$.

M. f. Ungt. D. — (Zu ähnlichen Zwecken wie R_y 201.) LOCKSTAEDT.

204.

R_y *Camphorae* Dr. 1

solve in

Ol. Chamom. cocti Unc. $1\frac{1}{2}$

adde

Ol. Cajeputi Dr. 1.

D. S. Zum Einreiben.

VOGT.

205.

R_y *Saponis Hispan. albi* Unc. $\frac{1}{2}$

Camphorae Dr. 2

Ol. Rorismar. Dr. $\frac{1}{2}$

Spir. V. rft. Unc. 3.

Solve et filtra. D. S. Zum Einreiben.

Spir. Rorismarini saponatus PH.

SEEST. (1 Unze 4 Shl.)

206.

R_y *Camphorae* Dr. 2

solve in

Ol. Terebinth. rft. Unc. $\frac{1}{2}$

adde

Gm. Minos. pulv. Unc. $\frac{1}{2}$

ut f. c.

Infuso Flor. Arnio. (Unc. 1) Unc. 6

l. a. Emulsio. D. S. Umgeschüttelt überzuschlagen. (Bei *Sphacelus siccus*.)

G. A. RICHTER.

207.

R_y *Camphorae* Scr. 1

solve in

Spir. Vini rft. Unc. 2

adde

Aceti Unc. 8.

M. D. S. Gewärmt mittelst eines Schwammes eingemaltäg. Hände, Brust, Unterleib damit zu waschen. (Bei Unthätigkeit der Haut in athenischen Fiebern, beim Rücktritt der Exantheme.)

SUNDELIN.

208.

Ry *Camphorae tritae*
Myrrhae ana Dr. 2
Cort. Chinæ fuscæ
Flor. Chamom. vulg. ana Unc. ½
Carbon. ppt. Unc. 1.
M. f. Pulv. D. in vitro. S. Zum Einstreuen
(bei feuchtem Brand). RUST.

209.

Ry *Camphorae trit. Dr. 2-3*
Gm. Mimos. pulv. Dr. 2
solvo terendo in
Fini Gallici albi Unc. 8.
D. S. Campherwein. (Als Verband-
wasser bei feuchtem Brande, Hospital-
brand, überhaupt faulig-brandigen Ge-
schwüren im Charité-Krankenhaus zu
Berlin häufig angewandt.)

Canella alba. Cortex Canellae albae s. corticosus s. Winteranus spurius. Weisser Zimmt; weisser Kaneel. [Hauptbestandtheile: äther. Öl, bitterer Extractivstoff, Harz und das dem Mannazucker ähnliche Canellin. — 1 Unze $1\frac{2}{3}$, *subt. pulv.* $2\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. zu Scr. $\frac{1}{4}$ –1, einigemal tägl., in Pulver u. pulveraufnehmenden Formen; in Aufguss [wässrigem oder weinigem; Dr. 2–4 auf den Tag] oder allenfalls in Ebullition [Ry 302 (*Cort. Pomor. Aurant.*)].

Cantharides. Spanische Fliegen. [Hauptbestandtheil: ein scharfer, blasenziehender Stoff (Cantharidin oder Canthariden-Campher). — 1 Unze *gr. pulv.* $10\frac{1}{2}$ Sgr.; 1 Drachme *subt. pulv.* $1\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave* Salpetersäure, Salzsäure; (Salzbilder).

Innerl. (*Pulvis ad Granum unum!*) zu Gr. $\frac{1}{4}$ –1 (u. mehr) einigemal tägl. (namentlich gegen Wasserscheu oder zur Verhütung derselben die grösseren Gaben). Am zweckmässigsten (weil so die Wirkung am zuverlässigsten, sich mehr immer gleich bleibend als bei der Darreichung in Substanz ist) in einem mit fettem Öl bereiteten Digestions-Aufguss [oder in der Tinctur: vgl. den Artikel]. Freilich fehlt es bis jetzt noch an Versuchen über den Grad der Concentration, welche man einem solchen Aufguss zu geben habe, und über die Einzeldosen, so dass man Vorsichts halber in solchem Aufguss mit mindestens eben so kleinen Dosen als man sie von den Canthariden in Substanz giebt, anfangen muss. Übrigens kann man einen solchen Aufguss [wie z. B. das † *Ol. Canthar. infus.* der PH. SLESV. (s. den Art.)] entweder tropfenweise, jede Einzelgabe in schleimigem Vehikel, oder mit noch mehr fettem Öl verbunden oder auch von Hause aus weniger concentrirt bereitet [wie Ry 210, 211] in einer Emulsion, geben. [Dagegen ist es unpassend — obwohl es noch häufig geschieht —, Canthariden in einer Mandelemulsion oder überhaupt in einer echten Emulsion zu geben; denn wenn man sie mit den Samen zugleich verreiben lässt, geht beim Coliren ein unbestimmbar grosser Theil verloren und die Dose wird höchst unsicher; aber auch, wenn man sie erst nach dem Coliren der Emulsion zusetzt (Schüttelmixtur), würde die Einzeldose noch zu unsicher seyn.]

Will man die Canthariden nach alter Weise in Substanz geben, so beschränke man sich wenigstens auf folgende Formen: Pulver [Diese waren von jeher nicht beliebt, weil bei ihnen leicht eine zu heftige örtliche Wirkung auf den Magen oder auch eine zu heftige allgemeine Wirkung eintritt. Deshalb müssen die Canthariden auch immer höchst fein gepulvert werden. Das zweckmässigste Constituens ist wohl *Pulv. gummos.* Ausserdem gebe man jede Einzelgabe in schleimigem Vehikel. — Ry 212], Pillen u. Bissen [für die Darreichung in Substanz am zweckmässigsten. — Auch hierin müssen die Canthariden höchst fein gepulvert seyn. — Ry 213, 214; 395 (*Extr. Scill.*)]. Beliebt bei der Darreichung der Canthariden ist auch ein Zusatz von Campher, um die stärkere Einwirkung auf Harn- und Geschlechtsorgane zu verhüten [doch vielleicht in dieser Hinsicht bisweilen unzuweckmässig, immer unzuverlässig; es scheint der Campher vielmehr ein *Antidotum* zur Tilgung dieser Wirkung als ein *Prophylacticum* gegen dieselbe zu seyn — etwa wie Mercur wohl einen primären Schanker heilt, aber keinen verhütet. — Nach W. GERHARD dürfte eher das Opium jenem Zwecke entsprechen].

Ausserl. in Substanz [zwischen den Fingern gerieben, einen (von den anhängenden Canthariden befreiten) Finger an das Zahnfleisch des schmerzenden Zahns gehalten]; in Streupulvern [heftig reizend. — Immer höchst fein gepulvert. — Mit *Hydrarg. oxydat. rubr. ppt.* zu gleichen Theilen, etwa aller 2 od. 3 Tage, doch auch öfter, einzustreuen: MURSINNA bei schlaffen, torpiden und deshalb zu wenig eiternden Geschwüren. — Das Wesentlichste der KRUTTGESCHEN anthydrophobischen Methode (die jedoch der RUSTEICHEN — s. den Anhang: Vergiftungen — gewiss nachzusetzen ist) besteht in (nöthigenfalls, bei tieferen Wunden, nach Wegschneiden der zuerst erzeugten Blase wiederholtem) Einstreuen und Rindrücken von Cantharidenpulver in die zuvor durch warmes Wasser gereinigte Wunde. (Darüber noch ein Cantharidenpflaster; ausserdem früh und Abends Dr. $\frac{1}{2}$ - 1 grauer Quecksilbersalbe, zuerst um die Wunde, dann abwechselnd, wie bei einer Inunctionscur, an den Extremitäten, einzureiben, auch innerl. Calomel, bis zur völligen Salivation; dann 6 Wochen langes Verbinden der Wunde mit Cantharidensalbe.)), Salben [In diese nimmt man sie entweder a) gepulvert auf; z. B. 1 auf 8 Fett, tägl. einer Erbse gross in die Haut einzureiben: *Ungt. epispasticum* PH. P. (1 Unze $2\frac{1}{3}$ Sgr.), von der Wirkung eines gelinden Zugpflasters, daher für Kinder und chronische Uebel. Ry 661 (*Liq. Stib. muriat.*). Oder b) mit fettem Öl od. Fett ausgezogen (wohl zweckmässiger, wenn auch die einmal ausgesprochene Behauptung, dass die so bereiteten Salben bei gleicher oder noch stärkerer hautrübenden und blasenziehenden Kraft weniger auf die Harnorgane wirkten, sich nicht bestätigen sollte). Auf die letztere Weise ist das officinelle *Ungt. Canthar.* bereitet (und das fette Öl nachher durch Wachs zur Salbe gemacht); so auch das noch stärkere Ry 215], Pflastern [2 officinell, und zum Überfluss sogenannter Blasentaffect (der aber in der Regel wohl nur den Vorzug der Eleganz haben dürfte) hie und da käuflich].

210.

Ry *Cantharidum gross. pulv.* Gr. 2

Ol. Amygdal. Unc. $\frac{1}{2}$.

Digere in Balneo Vaporis per $\frac{1}{4}$ horam;

Colat. addt

Gm. Mimos. pulv. Dr. 2

† *Syr. opiat.* Unc. 1

Aq. comm. Unc. 5.

F. Emulsio. D.S. Umgeschüttelt 2 stündl.

1 Essl.

LOCKSTAEDT.

211.

R₂ *Cantharidum gross. pulv.* Gr. 3
Ol. Amygdal. Dr. 3.
Digere leni calore per horam; Colat. adde
Gm. Mimos. pulv. Dr. 1
Syr. Bals. Peruv. Unc. 1
Infus. Hb. Digital. (Scr. 1) Unc. 1.
F. Emulsio. D.S. Umgeschüttelt 2stündl.
 1 Theelöffel. LOCKSTAEDT.

212.

R₂ *Cantharidum* Gr. 12
Lapid. Cancr.
Sacch. albi ana Dr. 1½.
M. f. Pulv. subtiliss. Div. in 12 part.
seq. D.S. Tägl. 2-3 Pulver. (Zur Ver-
 hütung der Wasserscheu.) RUST.

213.

R₂ *Pulv. subtiliss. Cantharid.* Gr. 3
Pulv. Rad. Alth. Scr. 1
Extr. Glycyrrh. q. s.

ut f. Pilulae 12. Consp. Sem. Lycop.
D. S. 2-3mal tägl. 1 Stück.

214.

R₂ *Cantharidum subtiliss. pulv.* Gr. 1
Camphorae trit. Gr. 3
Sapon. medic. pulv. Scr. 1
Spir. V. rft. q. s.
ut f. Pilulae 12. Consp. Sem. Lycop.
D. in vitro. S. 3mal tägl. 1 Stück. (Ge-
 gen paralytische Knuersis der Wöchner-
 innen.) (POCTA.)

215.

R₂ *Cantharid. gross. pulv.* Unc. ½
Adip. suilli Dr. 7
Sebi ovilli Dr. 1.
Digere in Balneo Vaporis, usque dum
Massa fuscescat; filtra servide; Mas-
sam refrigerat. D. S. Blasensalbe. (Ei-
 ner als Geheimmittel verkauften „Po-
 made vésicatoire de BACHNER“ nach-
 gebildet.) (BöHLIG.)

Capita Papaveris. *Codia.* Mohnköpfe. [Hauptbe-
 standtheile: bitterer Extractivstoff, Harz und Morphinum. — 1 Unze cont. 1 Sgr.]
 Innerl. in Aufguss oder leichter Abkochung [Dr. 2-4, mit Was-
 ser oder Milch, zur Colatur von Unc. 4-6, 2stündl. 1 Essl.]. — Aüsserl. in,
 meist concentrirter, Abkochung zu Einspritzungen, Augen-
 wässern, Fomentationen, Cataplasmen p.p.

† **Carbo animalis praeparatus** PH. SLESV. Anhg. Ge-
 brautes Elfenbein (vgl. den Art. † *Cornu Cervi ust. nigrum*) mit Salzsäure ge-
 kocht, mit destill. Wasser ausgewaschen, getrocknet u. gepulvert. Diese Bereitung
 hat den Zweck, eine reine Thierkohle (Stickstoffkohle) darzustellen, indem die
 Kalksalze, das Schwefelcalcium, das phosphorsaure, salzs. u. kohlens. Natron durch
 die Salzsäure theils aufgelöst, theils zersetzt, dann durch das Aussüssen fortgeschafft
 werden. Das Präparat ist wohl weniger zur arzneilichen Anwendung (etwa wie
 † *Cornu Cervi ust. nigr.*), als zum Reinigen und Entfärben von Flüssigkeiten be-
 stimmt. — 1 Unze 3 Shl.

† **Carbo Carnis s. animalis.** Fleisch- od. Thier-
 kohle. [Durch Brennen von kleingehacktem Kalbfleisch mit den Rippen in einer
 Kaffeetrommel bereitet. — Ist Stickstoffkohle mit Cyan-Metallen. — 1 Drachme
 sub. pulv. 3 Sgr.] *Cave:* s. Cyanmetalle, I. S. 34.

Innerl. nach Einigen zu Gr. ½-2, besser wohl nach Anderen
 zu Gr. 5-10, nach GUMPERT zu Gr. 10-20; 2-4mal tägl. In Pul-

ver [etwa mit *Pulv. Rad. Glycyrrh.* od. *Alth.* — Z. B. Morgens u. Abends bei Scirrhen und Polypen Gr. $\frac{1}{2}$ - 2, bei offnem Brustkrebs (örtlich *Bala. Locatelli*) Gr. 2 - 3, bei scirrösen Krüpfen von einer Mischung aus 2 Theilen *Carbo Spong.* mit 1 Theil Thierkoble Gr. 2-4: WEISE; wenn bei ihrem Gebrauch Nachtschweisse entstehen, die Gabe vermindern; das Mittel wirke stark auf den Uterus, daher bei schwangern Frauen sehr vorsichtig! Diät: nur Milch-, Mehl- und Obst-Speisen; kein Fleisch oder doch kein Gänse-, Enten-, Schweinefleisch; kein Braantwein, Kaffee. — Bei hartnäckigen scrofulösen Drüsenvereiterungen Erwachsener nach SCHINDLER mit Zucker *ana*, 4mal tägl. eine Messerspitze. — Vgl. *Ferr. oxydat. fusc.*], pulveraufnehmenden Formen [Ry 216].

Aüsserl. zu Zahnpulvern, Streupulvern, Salben.

216.

Ry *Carbon. Carnis pulv.* Gr. 3
Ammon. muriat. dep. pulv. Scr. 4
Extr. Conii macul. Gr. 2
 — *Glycyrrh. q. s.*

ut f. *Bolus. Consp. D. in vitro. Disp. tales nr.* — *D. S.* 3mal tägl. 1 Stück.
 (Bei Anschwellungen u. Scirrhotät der Prostata und der Schleimhaut der Harnröhre.)
 MAGENDIE.

† *Carbo Panis.* Brodkohle. [1 Unze *subt. pulv.* 1½ Sgr.]
 Zu Zahnpulvern [s. I. S. 217].

Carbo praeparatus s. purus. Carbo vegetabilis. Präparirte vegetabilische Kohle. [Kohle mit Wasser ausgekocht, bis zur vollkommenen Verkohlung geglüht u. sehr fein gepulvert. — 1 Unze 2½ Sgr.]

Innerl. zu Gr. 10-30, mehrmals tägl. In Pulver [in einem Glase oder in Wachspapier zu verabreichen (weil es Kohlensäure aus der Luft anzieht). — Ry 217], Morsellen [namentlich als Kohlenschokolade bei Aphthenbildung im colliquativen Stadium der Lungenphthise: SCHÖNLEIN. — Ry 218], Trochisken [Ry 219], Pillen, Bissen, Latwerge.

Aüsserl. zu Zahnpulvern [Ry 220, 221; 307 (*Cort. Salic.*)], Zahnlatwergen, Zahnfleisch-Latwergen [ein Beispiel I. S. 303], Cataplasmen [Ry 288 (*Cort. Chin. fusc.*)], Streupulvern [pur oder mit *Pulv. Flor. Chamom. vulg.*, *Cort. Chin. fusc.*, *Cort. Querc. u. a. m.* — Ry 60 (*Aloë luc.*), 208 (*Camph.*)]. — Bei übel riechenden Fusseschweissen streut man es als ein unschuldiges Palliativmittel in die Strümpfe.], Salben [z. B. Dr. 3 auf 1 Unze Fett: ALIBERT's Grindsalbe; vgl. *Natr. carb. dep. sicc.* — Ry 222; 289 (*Cort. Chin. fusc.*), 547 (*Hydr. mur. mite*); vgl. auch *Chlorum Natri*], Linimenten [Ry 260 (*Chlor. Calc.*)]. — Auch wohl zum Einathmen [eine Flasche mit weiter Öffnung halb damit gefüllt, verschlossen, geschüttelt, dann geöffnet und den feinen Staub eingeblasen: PIEPENBRING bei Lungensucht mit übelriechendem copiosen Auswurf]; zur Luftreinigung in Krankenzimmern, Sectionssälen [wozu man sie zwar nicht aus der Apotheke entnehmen wird. Man soll nach DÜBEREINER frisch ausgeglühtes Kohlenpulver, schwach befeuchtet, in flachen Gefäßen im Zimmer vertheilen und tägl. Ein od. ein Paar Mal erneuern. — Auch sollen die Studirenden nach dem Seciren ihre Hände mit Holzkohlenpulver reiben, dann mit Seifen-

wasser waschen, was den üblen Geruch ganz tilge (in Paris von einer Commission erprobt)].

217.

Ry Carbonis ppt. Dr. 6

Ligni Quassiae

Magn. carbon. ana Dr. 1.

M. f. Pulv. D. in vitro. S. 2-3mal tägl.

1 Theelöffel. (Gegen Pyrosis.)

HEIM.

218.

Ry Semin.^m Cacao tost. Unc. 3.

In mort. ferreo calido in massam subtiliss. redige, adde

Sacch. albi pulv. Unc. 1½

Carbonis ppt. Unc. ½

Bals. Peruv. Scr. ½.

M. f. Morsuli pond. Dr. 2. D. — Kohle-schokolade, mehrmals tägl. ein Täfelchen langsam zu verzehren.

219.

Ry Vanillae pulv. Dr. 1

Carbon. ppt. Unc. 1

† Chocoladae pulv.

Sacch. albi ana Unc. 1½

Mucil. Gm. Tragac. q. s.

auf Trochisci Gr. 18, Pulv. Cass. cinam. conspergendi, leni cal. exsiccandi, D. S. 3-4 mal tägl. 2 Stück im Munde zergehn zu lassen. (Gegen riechenden Athem.)

CHEVALLIER.

Wo die Vanille zu theuer ist, kann man

sie wohl durch 10-15 Gran Bals. Peruv. ersetzen.

220.

Ry Carbonis ppt. Unc. 1

Cort. Chinac fusc. Unc. ½

Myrrhae Dr. 2.

M. f. Pulv. subtiliss. D. S. Zahnpulver.

Pulv. dentifric. niger PH. SLESV.

(1 Unze 8 Sfl.)

Das gleichnamige Compositum der PH. HANN. enthält nur halb so viel China und keine Myrrhe. (1 Unze 6 Mgr.)

221.

Ry Carbonis ppt. Dr. 3

Cort. Chin. fusc. Dr. 2

Rad. Calami decortic. Dr. 1

Myrrhae Dr. ½

Ol. Caryophyll. Gtt. 3.

M. f. Pulv. subtiliss. D. in vitro. S. Zahnpulver.

222.

Ry Carbonis ppt. Unc. ½

Adip. suill. Unc. 1

Bals. Peruv.

Tinct. Myrrh. ana Dr. 1.

M. f. Ungt. D. — (Reizende Kohlen-salbe.)

VOGT.

Carbo Spongiae.

Spongiae ustae.

Meer-

schwamm- oder Badeschwamm-Kohle. Gebrannte Schwämme. [Thierische Kohle mit Iodmetallen und sehr wenig Cyanmetallen. — Pulver. — 1 Drachme 1½ Sgr.] Cave: s. Iod- u. Cyan-Metalle, I. S. 34.

Innerl. zu Scr. ¼ - Dr. ½ einigemal tägl.; gern mit Gewürz. — In Pulver [Ry 223, 224; 718 (Natr. carb. dep. sicc.); vgl. auch Carbo animal.], Zuckerwerkformen [Ry 225], Pillen, Bissen, Latwerge [Ry 1005 (Sulph. dep.)], Aufguss od. Abkochung [diese Präparate nennen Manche „Aqua strumalis“. — Ry 226].

Aüsserl. zu Cataplasmen [mit Semmel u. Milch — selten].

223.

Ry Carbon. Spong. Unc. ½

Magnes. carbon.

Kali nitr. depur.

Sacch. albi ana Dr. 2.
M. f. Pulv. subtiliss. D. S. 3mal tägl.
 1 Theelöffel. (Gegen Kropf.)
 CLEARUS — nach MEAD.

224.

Ry *Hb. Digital. Gr. 4-8*
Carbon. Spong. Unc. 1
Elaeos. Poenic. Dr. 2.

M. f. Pulv. Div. in 12 part. aeq. D.
in charta cerata. S. 2-3 mal täglich
 † Pulver. (Gegen Kropf und scrofulöse
 Affectionen.) RUST.

225.

Ry *Carbon. Spongiae*
 † *Chocoladae pulv.*

Sacch. albi pulv. ana Ung. 1
Mucil. Gm. Tragac. q. s.
ut f. Trochisci nr. 48, Pulv. Cass. cin-
nam. conspergendi, leni cal. torrendi.
D. S. 3mal tägl. 1-2 Stück. (Gegen
Kropf und scrofulöse Drüsengeschwül-
ste bei Kindern.)

226.

Ry *Carbon. Spong. Unc. 1*
Aq. comm. L. 1.

Effulliant paulisper, postea digerantur
in loco tepido per 12 horas. Colat. ad-
misce

Aq. Cinnam. simpl. Unc. 2.
D. S. 3stündl. 2 Essl. (Gegen Kropf.)
 HUFFELAND.

† *Cardamomum (i) longum (i).* Lange Cardamo-
 men. Und

Cardamomum minus. Kleine Cardamomen. [Man
 verschreibt gewöhnlich *Card. exorticatum*, d. h. die Samen ohne die (weniger
 wirksamen) Kapseln. — Hauptbestandtheil: äther. Öl. — 1 Drachme $\frac{5}{8}$, *subt.*
pulv. 1 $\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerl. zu Gr. 5-15 einigemal tägl., in Pulver [Ry 300 (*Cort.*
Pomor. Aurant.), 8/11 (*Rad. Galang.*)], Latwerge u. s. w. Meist je-
 doch nur als aromatischer Zusatz zu andern Mitteln, in geringerer
 Gabe. — Diätetisch zu Warmbier, Bischof, Glühwein u. s. w.

Caricae (wohl mit dem Zusatz *pingues* *). *Ficus passae.*
 Trockene Feigen. [Hauptbestandtheile: Zucker und Schleim. — 1 Unze
 1 $\frac{1}{8}$ Sgr.]

Innerl. lothweise in Abkochung. (Bisweilen als Corri-
 gens in Species, s. I. S. 195.)

Ausserl. in Substanz [mit Milch leicht abgekocht oder nur aufge-
 weicht, halb durchgerissen und mit der innern Fläche aufgelegt, zur Zeitigung vom
 Abscessen in der Mundhöhle, namentlich am Zahnfleisch; verursacht dies indess
 durch Druck Schmerz, so lässt man nur die Abkochung im Munde halten; oder
 wenn in einem engen Munde an der äusseren Fläche des Zahnfleisches für eine halbe
 Feige nicht Platz genug ist, nimmt man dafür eine eben so präparirte durchgeris-
 sene grosse Rosine]; abgekocht zu erweichenden Mund- u. Gur-

*) Doch sind hier, wie in der Regel, dergleichen Zusätze, die eine vorzüglich
 gute Drogue bezeichnen, für einen gewissenlosen Apotheker unnütz, für einen
 gewissenhaften überflüssig und nur beleidigend.

gelwässern [z. B. $\frac{1}{2}$ Loth Perlgrauen u. eine in Viertel zerschnittene Feige mit einem Paar Tassen Wasser leicht abgekocht, colirt u. dazu ein Paar Esslöffel Honig].

Caryophylli (aromatici). Gewürznelken. Gewürznäglein. Kreidnelken. [Hauptbestandtheil: äther. Öl. — 1 Unze $2\frac{1}{2}$, subtl. pulv. $3\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerl. zu Gr. 5-10, mehrmals tägl.; in Pulver [Ry 97 (*Ammon. muriat. dep.*), 300 (*Cort. Pomor. Aurant.*)] und pulveraufnehmen den Formen [Latwerge: Ry 228 (*Cass. cinnam.*)]; in Aufguss [namentlich in weinigem; etwa Dr. 1-3 auf Unc. 6]. Oft als Corrigens. — Diätetisch lässt man wohl Morgens nüchtern ein Paar Nelken kauen.

Ausserl. zu Zahnpulvern und Zahnlatwergen, als Conspergens von Zahnpillen; zu Kräuterkissen [vgl. I. S. 199. — Ry 227], Pflastern [hier jedoch häufiger das Öl]; infundirt zu Zahntincturen [Ry 117], Fomenten od. dgl., ja wohl gar als Zusatz zu Bädern [das scheint aber doch Verwandsung].

227.

Ry *Caryophyllorum* Dr. 2
Hb. *Majoranæ* Unc. $\frac{1}{2}$
— *Rorismarinis* Unc. 1.

Gross. pulv. M. D. S. In ein Säckchen genäht und mit kölnischem Wasser besprengt auf die Magengegend zu legen.

Cassia cinnamomea. Cinnamomum Indicum. Zimtcassie; Zimmtsorle; gemeiner, indischer, chinesischer, französischer od. englischer Zimmt. [Bei nicht geingerer Wirksamkeit wohlfeiler, aber etwas weniger angenehm als der echte Zimmt, *Cinnamomum acutum*. — Hauptbestandtheile: äther. Öl und Gerbestoff. — 1 Unze cont. $2\frac{1}{2}$, subtl. pulv. $3\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerl. zu Gr. 5-20, mehrmals tägl. In Pulver [Ry 300 (*Cort. Pomor. Aurant.*), 835 (*Rad. Caryophyllat.*)], Zuckerwerkformen [namentlich Morsellen; — ein Beispiel I. S. 130], Bissen, Latwerge [Ry 228; 100 (*Ammon. muriat. dep.*), 836 (*Rad. Caryophyllat.*)], Aufguss [wässrigem oder (warmem od. kaltem) weinigem; selten (etwa in fieberhaften Zuständen, wo man Erhitzung fürchtet) mit Essig aufgegossen. Etwa Dr. 2- Unc. $\frac{1}{2}$ auf Unc. 6, alle 2-1 St. 1 Essl., oder beim weinigem Aufguss ein Paar Mal tägl. $\frac{1}{2}$ Weinglas. — Als Thee (wozu man jedoch meist den echten Zimmt vorziehn wird) Dr. 1-2 auf 2 Tassen. — Ry 275 (*Cort. Caschirill.*), 842 (*Rad. Galang.*), 844 (*Rad. Gent. rubr.*)]. — Oft als Corrigens. Als Conspergens.

Ausserl. bisweilen als Zusatz zu Zahnpulvern, Zahnlatwergen [Ry 236 (*Catechu*)].

228.

Ry *Caryophyllorum*
Rad. Zedoar. ana Dr. $\frac{1}{2}$
— *Calami decorticat.*
Cassiae cinnamomeae ana Dr. 1

Hb. *Menth. pip.* Dr. 2.
Subtl. pulveratis adm.
Mell. despum. Dr. 15.
F. Electuar. D. S. 3-4mal tägl., umgerührt, 1 Theelöffel.

† *Cassia lignea*. *Xylocassia*. Mutterzimmet. Cassienrinde. [Von der PH. AUSTR., welche allein diese Droge aufgenommen hat, unpassend auch *Cinnamomum occidentale* genannt.] Wie *Cassia cinnamomea* [aber weit weniger angenehm].

Castoreum. Bibergeil (russisches, sibirisches; — auch polnisches, deutsches gehört zu dieser bessern Sorte). [Hauptbestandtheile: ein eigenthümliches Harz, ein eigenthümliches Fett (Castorin) und äther. Öl. — 1 Scrup. 32 $\frac{1}{2}$, 1 Gran *subt. pulv.* 2 $\frac{3}{4}$ Sgr. Als Surrogat das folgende.] Immer in möglichst wohl verwahrten Gefässen zu verpacken.

Innerl. zu Gr. 2-10 (u. mehr) alle 4-2-1 St. Am zweckmäßigsten in der Regel [weil es so am raschesten und eindringlichsten wirkt] in Pulver [mit Zucker od. dgl. verrieben. — Ry 229; 926 (*Rad. Valer. min.*)] oder allenfalls in Emulsion [s. I. 8. 313 Z. 7 v. u.]; doch auch [nur nicht da, wo man etwas rascher einwirken will oder wo auch der Geruch des Bibergeils mitwirken soll, der in den folgenden Formen ziemlich verdeckt wird] in Trochisken [*Troch. Castor.* PH. AUSTR.: *Castor.* Dr. 2, Zucker Use. 4, Traganteschleim q. s., daraus 3gränige Trochisken], Pillen od. Bissen [so namentlich in Verbindung mit Gummiharzen. — Sehr wenig Constituens erforderlich (I. 8. 245 Z. 2). — Ry 230; 129 (*Asa foet. dep.*), 344 (*Extr. Aloë Ac. sulph. corr.*)], Latwerge [nur wenn man es mit andern, voluminösen Mitteln verbinden will, wo es dann beim Ansatz der Constitutionen nicht berücksichtigt zu werden braucht. — Ry 231]. — (Wo man sehr rasch einwirken will, wie z. B. bei hysterischen Krämpfen, verdienen die Tincturen den Vorzug, obwohl man mit diesen nicht die volle Wirkung des Mittels erzielen kann.)

Ausserl. (hier doch in der Regel durch wohlfeilere Mittel vollkommen zu ersetzen) als Riechmittel [in Pulvern; doch sind die Tincturen zu diesem Behuf bequemer], bisweilen in Klystieren [Dr. $\frac{1}{4}$ -1, mit Kamillenaufguss emulgirt], Salben [Ry 232]. Auch endermatisch schon mit Erfolg versucht.

229.

Ry *Castorei* Gr. 18

Kali nitr. depur. Dr. $\frac{1}{2}$ -1

Sacch. albi Dr. 1.

M. f. Pulv. Div. in 6 part. aeq. D. in charta corata. S. 3stündl. 1 Pulver in Haferschleim. (Bei activen Congestionen zum Uterus, Abortus drohenden Uterinkrämpfen.)

BERENDS. SUNDELIN.

230.

Ry *Castorei pulv.* Dr. 1

Asa foet. depur. Dr. 1 $\frac{1}{2}$

Ol. Ment. pip. Gtt. 4

Extr. Valerian. q. s.

ut f. *Pilulae* 90. *Consp. Pulv. Vanillae.*
D. in vitro. S. 3mal tägl. 6.

231.

Ry *Castorei pulv.* Dr. 1

Hb. Chenopod. ambros.

Hb. Mari veri, singul. pulv. Scr. 5

Mellis despum. Unc. 2.

M. f. Electuar. D. in pyxide alba, epistomio subereo clausa. S. 4mal tägl., umgerührt, 1 reichlichen Theelöffel.

VOGT.

232.

Ry Camphorae trit. Gr. 2

Acidi succin. crudi

Ammon. carbon. pyro-oleosi ana

Gr. 4.

Pulveratis adde

Castorei pulv., c. pauzillo Aq. in pullem redacti Scr. 1

Adipis suilli Scr. 4

Ol. Anisi Gtt. 8.

M. f. Ungt. D. in pyxide alba, epistomio subereo clausa. S. Mittelst Charpie (langer Fäden) etwas davon ins Ohr zu bringen und über Nacht darin zu lassen. (Gegen asthenisch-nervöse Schwerhörigkeit.)

RUST u. A.

Castoreum Canadense s. Anglicum. Englisches od. canadisches Bibergeil. [Bestandtheile wie beim vorigen, aber weniger äther. Öl. — 1 Drachme $8\frac{1}{2}$, 1 Scrup. sub. pulv. $3\frac{1}{2}$ Sgr.] Wie das vorige, doch in beträchtlich grösseren Gaben.

Catechu. Extractum s. Succus Catechu. Terra Japonica. Catechu; japanische Erde. [In (vielen) Wasser u. schwachem Weingeist fast vollkommen auflöslich. Hauptbestandtheil Gerbstoff (krystallisirbarer, eisengrünender: Catechin). — 1 Unze $2\frac{1}{2}$, sub. pulv. $3\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerl. zu Sor. $\frac{1}{2}$ - Dr. $\frac{1}{2}$, mehrmals tägl. — In Pulver [Ry 233], Trochisken [Ry 80 (Ambra gris.), 856 (Rad. Ipecac.)], Pillen [s. L. S. 243. — Ry 414 (Ferr. sulph. cryst.), 704 (Myrrha)], Latwergen, Auflösungen [will man eine geistige, so dient dazu die officinelle Tinctur. Will man eine wässerige, so lässt man es wohl mit heissem Wasser, in welchem es sich in grösserer Menge auflöst, übergiessen oder leicht abkochen, noch heiss coliren (schreibt man gepulvertes, also von den beigemengten Unreinigkeiten grösstentheils befreites Catechu zur Auflösung vor, so ist auch das Coliren weniger nöthig) und erkaltet umgeschüttelt gebrauchen; oder man kann es auch mit Schleim gleichsam zur Emulsion machen lassen. Etwa Dr. 2 auf Unc. 6, alle 2 - 1 St. 1 - 2 Essl. Ry 234. — In Wein (12 od. mehr Theilen) kann man das gepulverte Catechu ohne Weiteres auflösen (und nur Vorsichts halber umschütteln) lassen. Ry 235]. Verbindung mit Bals. Copaiv.; Ry 143.

Ausserl. zu Gurgelwässern [in ähnlichen Auflösungen wie innerlich], Zahnpulvern [i. S. 218 sub 3) 4)], Zahnpillen, Zahnlatwergen, Zahnfleischlatwergen [Ry 236], Zahntincturen [dazu etwa die Tinctur], auch in Substanz gegen Zahnschmerzen [der Verfasser verordnet es häufig — ein Stückchen in den hohlen Zahn gesteckt —, um Schmerzen, die bei Caries des Zahns durch etwas Kaltes oder Heisses, durch mechanische Reizung, Käuen u. s. w. so leicht hervorgerufen werden, rasch zu stillen, selbst rascher als durch Opiatpillen. Bei rheumatischen, congestiven u. a. Zahnschmerzen leistet es nichts.]; zu Injectionen, u. s. w.

233.

Ry Opi puri Gr. 6

Catechu Dr. $1\frac{1}{2}$ Elaeos. Caryophyllor. Unc. $\frac{1}{4}$.

M. f. Pulv. Div. in 12 part. aeq. D. in charta cerata. S. 3stündl. 1 Pulver.
(Bei chronischen Durchfällen.)

VOGEL.

234.

Ry *Catechu* Dr. 2

solue in

Aq. comm. bullient, Unc. 6.

Solut. adhuc calidam cola, Colat. refriger. adde

Aq. Cinnam. simpl. Unc. 2.

M. D. S. Umgeschüttelt 2stündl. 1 Rssl.

HENSCHEL.

235.

Ry *Catechu pulv.*

*Elaeos. Caryophyllor. ana Dr. 2
tere cum*

Fini Gallici rubri Unc. 6.

D. S. Umgeschüttelt 2stündl. 1 Rssl.

236.

Ry *Pulv. Opii* Gr. 6

— *Nucis moschat.*

— *Cass. cinnam. ana Dr. ½*

— *Kino Dr. 1½*

— *Catechu Dr. 2*

Mellis rosati q. s.

ut. f. Electuar. D. in pyxide alba. S.

Zahnfleischlatwerge, umgerührt.

(PH. EDINB.)

Cera alba. Weisses Wachs. [1 Unze 2½ Sgr.] Und

Cera flava. Gelbes Wachs. [1 Unze 2½ Sgr.] Wachs ist

mit fetten und ätherischen Ölen, thierischen Fetten, Wallrath, Harzen, in allen Verhältnissen durch Schmelzen zu verbinden. — Das weisse etwas härter als das gelbe; doch ist der Unterschied nicht bedeutend.

Innerl. — man zieht hier das gelbe vor — scrupelweise öfters tägl., in Emulsion [s. I. 9. 177. — Ry 237, 238], Latwerge [auch hier ist ein Subigiren des — mit oder ohne Zusatz von fettem Öl — geschmolzenen Wachses nöthig; in Ry 239 aber ist die Rosenconserve Grundmasse und Subigens (Emulgens) zugleich].

Ausserl. zu Kügelchen geformt als Tampon bei Zahnblutungen [das geschmeidigere gelbe]; zu Salben, Ceraten und Pflastern [zu Ceraten, eleganteren Salben (falls diese nicht schon durch andere Ingredientien dunkler gefärbt werden) und Augensalben wählt man das weisse, zu Pflastern das gelbe. — Ry 240. — Weisses Wachs 1, Schweinefett ½, in Tafeln gegossen: *Cerat. simplex* PH. AUSTR. — SANDTMANN u. FRICKE bei tiefen, lange dauernden Geschwüren: gelbes Wachs geschmolzen und wieder so weit abgekühlt, dass es noch flüssig bleibt, in die Geschwüre hineingegossen, dass dieselben ganz ausgefüllt sind; festgeworden bleibt es so lange liegen, bis es durch die Eiterung losgestossen wird, worauf man das Verfahren erneuert.], Kerzen [officinell *Cereae simplices* u. *plumbici*], Räucherungen [bei Schleimhindsucht u. s. w. gelbes Wachs, allein oder mit Zusatz von Harz, über Kohlen oder in einer Spirituslampe erhitzen und die Dämpfe einathmen oder doch das Zimmer damit füllen zu lassen]. — Wachspapier Ry 241.

237.

Ry *Ceras flav.* Unc. ½.

leni cal. liquata in mortar. calefacto

fiat cum

Futellis Ovor. 6

Aq. Ment. crisp. Unc. 6

L. a. Emuls., cui adde

Syr. Croci Unc. 1.

M. D. S. Umgeschüttelt eeslöffelweise.

(Bei Ruhr.)

VOGEL.

238.

Ry Ceræ flavæ

Ol. Amygdal. ana Unc. $\frac{1}{2}$.

Leni calore mixta in mortar. calefacto fiant c.

Gm. Mimos. pulv. Unc. $\frac{1}{2}$.

Syr. Papaver. Unc. 1

Aq. comm. Unc. 5

L. a. Emulsio, cui adde

(*Tinct. Opii croc.* Scr. 1)

(*Liq. Ammon. succin.* Dr. $1\frac{1}{2}$).

M. D. S. 2stündl., umgeschüttelt, 1 Essl.

239.

Ry Ceræ flav. Unc. $\frac{1}{2}$

Ol. Amygdal. Unc. $1\frac{1}{2}$.

Leni calore liquatis adm.

Conserv. Rosar. Unc. 2.

F. Electuar. D. in pyxide alba. S.

Ungelührt 3stündl. 2 Theelöffel.

SCHWARTZE.

240.

Ry Ceræ flavæ

$\frac{1}{2}$ *Butyri rec. insalsi* ana Unc. 1.

Liquefacta conterantur c.

Aq. comm. paravillo.

F. Ungt. D. — (Bei Verbrennungen.)

STAHL.

241.

Ry Cetacei Dr. 1

Ceræ albæ

Terebinth. laric. ana Dr. $1\frac{1}{2}$.

Liquefiant simul Baln. Mar. et spa-

thula vel alio quodam instrumento ex-

tendantur super chartulas. Refrigerat.

D. (Wachspapier; als Decke bei stark

nässenden Wunden und Geschwüren,

oder statt des theureren Wachstafels in

den Schuhen u. s. w. zu tragen; auch

wohl — etwa noch mit Öl oder Eiweiss

dünn bestrichen — als Unterlage zur

Verhütung des Decubitus.)

PH. GALL.

Cerasa acida. (Frische) saure Kirschen. [Hauptbestandtheile: Äpfelsäure, etwas Gallertsäure; färbender Extractivstoff.] Diätetisch zu Suppen, Gallerten [I. S. 285], der ausgepresste Saft zum Getränk [s. den Anhang: Getränke] u. s. w.

Cerasa acida siccata. Trockene (gedörnte) saure Kirschen. Diätetisch in Abkochungen zum Getränk [werden gewöhnlich mit den Kernen zerstoßen, so dass etwas Blausäure in das Getränk kommt; s. den Anhang: Getränke. — Bei Nierenkolik, wo oft alle anderen Getränke weggebrochen werden, gewöhnlich ertragen und erquickend: ASCHERSON. — *Cave* kupferne Gefässe], besonders wenn die Jahreszeit keine frischen Früchte anzuwenden erlaubt.

CERATA. Cerate. Über die Consistenz der officinellen vgl. I. S. 272.

****Ceratum Aeruginis s. viride. Cera viridis.** Grünspancerat. Grünes Wachs-pflaster. [Grünspan 1, Terpenanthin 4, Resin. Pini Burg. 6, gelbes Wachs 12. — 1 Unze 2 Sgr.] Nur als Hühneraugenpflaster [nachdem der härtere Theil des Hühnerauges mit einem Messer weggenommen ist, verordnet man tägl. ein Fussbad mit Seife, und legt in der Zwischenzeit das Pflaster auf].

Ceratum Cetacei (s. labiale) album. Emplastrum Spermatia Ceti. Weisses Wallrathcerat. Wallrathpflaster. Weisse Lippenpomade. [Wallrath, weisses Wachs u. Mandelöl ana. — Consistenz fester als Leim folgenden, pflaster-ähnlich. — 1 Unze $4\frac{3}{4}$ Sgr.] Zu ähnlichen Zwecken wie das folgende; auch beliebt zum Auflegen auf die Brüste bei Entwöhnung des Kindes [wozu es aber durch einen Verband befestigt werden muss].

* *Ceratum Cetacei (s. labiale) rubrum.* Rothes Wallrathcerat. Rothe Lippenpomade oder Lippenpomade schlechtweg. [Wallrath 1, weisses Wachs 8, Mandelöl 12, geschmolzen, durch Alkanna roth gefärbt, nebst ein wenig Citronen- und Bergamottöl. — Consistenz weicher als beim vorigen, mehr zur Salbe übergehend. — 1 Drachme $\frac{3}{4}$ Sgr.] Zum Auflegen oder Einreiben [s. I. S. 273–74] auf spröde, öfters aufspringende Haut oder Lippen, wozu es sich durch seine weichere Consistenz besser als das vorige eignet.

Ceratum Resinae Burgundicae. Ceratum Resinae Pini. Emplastrum citrinum. Gelbes Heftpflaster. [Wachs 4, burgundisches Harz 2, Hammeltalg und gemeiner Terpenthin ana 1. — 1 Unze $2\frac{1}{4}$ Sgr. — Das Empl. citrin. Pg. P. (1 Unze $2\frac{1}{4}$ Sgr.) enthält mehr Harz (Hauptbestandtheil) und Hammeltalg.] Seltener für sich, denn als Excipiens anderer, reizenderen Stoffe, die in Pflastergestalt angewandt werden sollen [z. B. des Tart. stibiati. (vgl. den Artikel)], benutzt.

Cereoli plumbici s. saturnini s. mitigantes. Bleikerzen; Bleibougies. [1 Stück $2\frac{1}{4}$ Sgr.]

Cereoli simplices s. exploratorii s. dilatatorii. Einfache od. Untersuchungs- od. Erweiterungs-Kerzen od. -Bougies. [1 Stück $2\frac{1}{4}$ Sgr.]

† *Cerevisia.* Bier. Wenn man es als Menstruum flüssiger Auszüge [vgl. I. §. 67. 68. 70.], mehr noch wenn man es diätetisch verordnet, muss man die Sorte speciell kennen. Die weissen Biere enthalten gewöhnlich sehr wenig Weingeist, viel Kohlensäure und Zucker; sie passen selten zu einer längere Zeit fortgesetzten diätetischen Anwendung (eher bisweilen in acuten Krankheiten), auch in der Regel nicht gut zur Extraction vegetabilischer Substanzen; überdies sind sie dem Sauerwerden am meisten ausgesetzt. Die süssen braunen Biere sind am meisten nahrhaft, passen oft zu diätetischer Anwendung in chronischen Krankheiten [so besonders die Mumme; in Berlin das Fredersdorfer und das sogenannte Manheimer Bier]. Die bitter-

ren braunen Biere [wozu das Bairische (das wohl am zuverlässigsten bloss mit Hopfen bereitet wird), dann von den in Nord-Deutschland gebrauten das sogenannte Bairische, das Stettiner, Grünthaler, Hopfen-Lager-, Weizen-Lager-Bier, das (stark mit bitteren Kräutern und Pomeranzen behandelte) Jostysche, — überhaupt die meisten und die verbreitetsten Biersorten Deutschlands u. der angrenzenden Länder, gehören] enthalten eine nicht unbeträchtliche Quantität Weingeist, und wirken mehr noch, als man es hiernach erwarten würde, berauschend durch ihren beträchtlichen Gehalt an Hopfen [Lupulin] oder anderen bitteren, *per abusum* auch bisweilen narkotischen, Substanzen. Sie können am ersten ein Surrogat des Weins zu diätetischem Gebrauch abgeben, passen auch am besten zum Menstruum flüssiger Auszüge [indem sie durch ihren Weingeistgehalt oft besser extrahiren als Wasser, und die Mitwirkung des Hopfens oft erwünscht ist. Da während der Extraction der Weingeistgehalt sich immer mehr oder weniger verringert, so sind die mit ihnen bereiteten Auszüge für die meisten chronisch Kranken nicht zu erhitzend]. Die starken oder Doppel-Biere sind eine Potenzirung bald mehr der süssen [so die englischen Biere Ale und Porter], bald mehr der bitteren [so z. B. das Stettiner und Grünthaler Doppelbier] braunen Biere, und demnach bald mehr nährend, bald mehr excitirend, dies letztere aber [da allein ihr Weingeistgehalt zwischen 5 und 8 Procent wasserfreien Alcohols zu betragen, also dem eines schwachen Weins gleichzukommen, pflegt] doch immer in beträchtlichem Grade, so dass, sowohl bei diätetischer Anwendung als wenn man sie (was nicht üblich) zum Extrahiren benutzen wollte, ihre Quantität eben so vorsichtig wie die des Weins abzumessen. — Der, hauptsächlich Kohlensäure enthaltende Bierschaum (Gäsch), der sich besonders auf den weissen Bieren in beträchtlicher Menge zu bilden pflegt, wird wohl als Hausmittel benutzt; der Arzt wird sich zweckmässiger der Kohlensäure in anderen Gestalten bedienen. — Warmbier s. im Anhang: Getränke.

Cerussa (alba). Carbonas plumbicus. Bleiweiss. Kohlensaures Bleioxyd. [Richtiger: kohlensaures und sechstel essigsaures Bleioxyd. — 1 Unze *subt. pulv.* $1\frac{5}{8}$ Sgr.] Cave Säuren; Schwefelverbindungen; Iodkalium; salzsaure Salze.

Nur äusserl. (≠), als austrocknendes Streupulver [vorsichtig, besonders bei Kindern!], zu Salben u. Pflastern [wozu man sich jedoch gewöhnlich der officinellen — *Ungt. Ceruss., U. Ceruss. camphorat.; Empl. Ceruss., E. consolidans, † E. defensiv. rubr.* PH. HANN. — bedient]. Vgl. *Plumb. carbonic.*

Cetaceum. Sperma Ceti. Wallrath. [Hauptbestand-

theil: Cetin, ein sublimirbares, schwer (nur zur Hälfte) verseifbares Fett. — 1 Unze 3 Sgr., „tritum“ (v. Sacch. part. tribus) $3\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerl. scrupelweise öfters tägl.; in Pulver [mit Zucker, Milchzucker od. *Gm. Mimos.* abgerieben (ein Zusatz von einigen Tropfen Mandelöl oder das Besprengen mit einigen Tropfen Weingeist befördert das Verreiben). Doch sind mindestens 3 Theile Zucker erforderlich, und dadurch wird diese Form sehr voluminös.], Bissen [es lässt sich in einem wenig erwärmten Mörser fast pur dazu verarbeiten, schöner noch mit Zusatz von einigen Tropfen Öl; in Verbindung mit anderen Bissenmassen — freilich selten — darf man kein Constituens dafür berechnen], am häufigsten in Emulsion [s. I. S. 177. — Ry 242-244].

Ausserl. zu Pflastern u. Ceraten [doch werden die beiden officinellen Cerate in der Regel alle Bedürfnisse erfüllen], Salben [s. I. S. 276. — Mit weissem Wachs ana und 4 Theilen Provencer Öl zusammenzuschmelzen, mit Zusatz von etwas Wasser agitirt: *Ungt. Cetac. PH. SLESV.* (1 Unze 48hl.)], Wasch-Pulvern u. -Pasten [z. B. zu den officinellen: *Pulv. cosmet.* und *Pasta cosmet.* — Vgl. I. §. 130.]; emulgirt zu Wasch-wässern.

242.

Ry *Cetacei* Unc. $\frac{1}{2}$.

*Liquatae in mortar. calefacto admisce-
terendo*

Gm. Mimos. pulv. Dr. 2-3

Syr. simpl. Unc. $\frac{1}{2}$

Aq. comm. calidae Unc. $2\frac{1}{2}$

ut f. *Emuls.*, cui *refriger. adde*

Aq. Amygdal. amar. Dr. 1.

M. D. S. 2stündl. oder öfter, umgeschüttelt, $\frac{1}{2}$ Essl.

243.

Ry *Cetacei* Unc. $\frac{1}{2}$

Ol. Amygdal. Dr. 2 - Unc. $\frac{1}{2}$

liquatis in mortar. calefacto admisce-

terendo

Gm. Mimos. pulv. Dr. 3

Syr. simpl. Unc. $\frac{1}{2}$

Aq. Cerasor. Unc. 2.

D. — Wie das vorige.

LOCKSTADT.

244.

Ry *Cetacei* Dr. 2

Ol. Amygdal. Unc. $1\frac{1}{2}$

*liquatis in mortar. calefacto admisce-
terendo*

Syr. Violar. Unc. $1\frac{1}{2}$

Conservas Rosar. Unc. $\frac{1}{2}$.

D. S. Umgeschüttelt theelöffelweise.
(Bei Husten u. dgl.)

MARCUS.

+ *Chinioëdinium*. *Chinioëdina*. Chinioëdin (nicht Chiniodin). [Verbindung von Chinin, Cinchonin und einem gelben harzigen Farbstoff. Reagirt alkalisch; bildet mit Säuren in Wasser u. Weingeist leicht lösliche, nicht krystallisirbare Verbindungen. — Bitter; in kaltem Wasser fast unauflöslich; in Weingeist sehr leicht, in Äther nur theilweis auflöslich. — 1 Drachme 3 Sgr. (diese Wohlfeilheit empfiehlt das so wirksame Mittel sehr).] *Cave* wie bei *Chinium*.

Innerl. zu Gr. 2-4, 3mal tägl. in Pulver, Pillen. Auch in einer Auflösung in 8 Theilen *Spir. Vrfitts.* [„*Tinctura Ch.*“; 1 Drachme $\frac{2}{3}$ Sgr.], zu $\frac{1}{2}$ -1 Theelöffel, eben so oft. — SERTÜRNER lässt

auf jede Gabe ein wenig Limonade od. Essig nachtrinken, damit das Mittel nicht durch alkalischen Magensaft zersetzt werde (?).

Endermatische Versuche von A. L. RICHTER sind ungünstig ausgefallen.

(BUCHNER's *Chinium resinoso-sulphuricum* scheint sich chemisch und dynamisch vom Chinioïdin wenig zu unterscheiden.)

Chinium. Chininium. Quinium. Chinin, Kinin od. Quinin. [Pulver. — Bildet mit Säuren Salze. — 1 Scrup. 10 Sgr.] Sol. 400; siedend Wasser 250; Alcohol 30, siedend 2; Äther 60. — Cave Salzbilder; salpetersaures Quecksilber- u. Silber-Oxyd, *Aurum muriat.*; Gerbstoff; für concentrirte wässrige Lösungen auch Alcalien. — Die wässerigen Lösungen der Chininsalze verhalten sich gegen Reagentien wie das Chinin.

Innerl. in etwas geringeren Dosen als *Chinium sulphuricum*; in Pulver, Pillen, Auflösungen [z. B. Gr. 8 in *Spir. V. alcoh.* Unc. $\frac{1}{2}$, nebst *Aether. sulph.* Dr. $\frac{1}{2}$, gelöst, zu 20-60 Tropfen ($\frac{1}{3}$ -1 Gran)].

Äusserl. anatripsologisch [z. B. Gr. 4-8 zweimal tägl. in das Zahnfleisch und die innere Seite der Backen einzureiben (mit ähnlichen Cauteleu wie bei *Chinium sulphur.*): POINTE].

+ **Chinium muriaticum. Hydrochloras quinicus.** Salzsäures Chinin. [1 Scrupel 8 Sgr.] Sol. 600, siedend Wasser 60; *Spir. V. rftiss.* 300. — Cave wie bei *Chinium*; auch Alkalien, alkalische Erden, weinsteinsäure Alkalien; Sublimat; Weinsteinsäure. — Innerl. und endermatisch wie *Chinium sulphur.*

+ **Chinium phosphoricum. Phosphas quinicus.** Phosphorsaures Chinin. [1 Scrupel 8 $\frac{1}{2}$ Sgr.] Leicht löslich in Wasser und Weingeist. — Cave wie bei *Chinium*; auch Alkalien, alkal. Erden; weinsteinsäure Alkalien; Weinsteinsäure. — Innerl. wie *Chinium sulphur.*

Chinium sulphuricum. Chininium s. Quinium sulphuricum. Sulphas quinicus. Schwefelsäures Chinin od. Kinin. [1 Scrup. 5 $\frac{1}{2}$ Sgr.] Sol. 740, siedend Wasser 30; *Spir. V. rftiss.* 60; auch in Äther sehr schwer auflöslich. — Die Auflöslichkeit in Wasser und Weingeist wird sehr erhöht durch einen Zusatz von Schwefelsäure (*Acid. sulph. dilut.* 1 $\frac{1}{2}$ Theile oder *Mixt. sulph. acid.* 1 Theil), wodurch sich neutrales schwefelsäures Chinin (Sol. 11) bildet. — Cave wie beim vorigen.

Innerl. als Stärkungsmittel zu Gr. $\frac{1}{4}$ –1, 2–3mal tägl.; gegen Wechselfieber u. a. schwere Nervenkrankheiten Gr. 4–12 auf die Apyrexie oder auf 24 Stunden vertheilt [etwa Morgens u. Abends Gr. 2–3, in hartnäckigeren Fällen Gr. 4–6; oder alle 4–3–2 St. Gr. 2. — Doch ist man bei hartnäckigen und bösartigen Fiebern und Neuralgien auch oft ohne Nachtheil bis zu Scr. 1, Dr. $\frac{1}{2}$, und noch mehr, in 24 St. gestiegen. — Auch hier, wie bei der Rinde, empfehlen Einige (z. B. NASSE) als ein ökonomischeres Verfahren, es bloss kurz oder unmittelbar vor dem Anfall zu geben, etwa zu Gr. 2–3. — Man nimmt beiläufig Gr. 1–2 als (in der Wirkung) äquivalent einer Drachme der Rinde an]. Wo es Durchfall vermehrt oder erregt [wodurch namentlich die antifebrilische Kraft sehr geschwächt wird], etwa mit einem ganz kleinen Zusatze von Opium [oft reicht schon $\frac{1}{2}$ –1 Tropfen der *Tinct. Opii croc.* zu jeder Gabe hin]; bei sensiblen Individuen, damit es weniger aufrege, nach G. A. RICHTER mit ganz kleinen Gaben Bibergeil. Über andere, bei Wechselfiebern bisweilen nöthige Zusätze vgl. *Cort. Chin. fusc.* — In Pulver [Zucker, auch Ölzucker, corrigiren die ungemaine Bitterkeit minder gut als unauflösliche Pulver, z. B. Anis, Fenchel, Pomeranzenschalen. Bestes Vehikel beim Einnehmen: schwarzer Kaffee. — KOPF gegen Magenschwäche und Mangel an Esslust: 3stündl. *Chin. sulph.* Gr. $\frac{1}{4}$, Schokolade Gr. 7, Milchzucker Gr. 2. — v. AMMON gegen scroful. Augenentzündungen: früh und Abends *Chin. sulph.* Gr. 1–2 mit *Natr. carb. dep. sicc.* Gr. 4–5 und einem passenden Constituent. (Wie KOPF's Dose sehr klein, so ist diese verhältnissmässig gross.) — Ry 245–247; 1032 (*Tart. stib.*)], Pillen [Ry 248; 741 (*Ol. Amygd. amar. aether.*)]. Vgl. *Extr. Aloës.*], flüssiger Form [z. B. Gr. 2 in *Spir. Vini rft.* Unc. $\frac{1}{2}$, unmittelbar vor Eintritt des Frosts 30–40 Tropfen (u. am fieberfreien Tage ein Digestivpulver) zu nehmen: BROCKMÜLLER. (Wäre eine sehr ökonomische Methode, wenn sie ausrichte.) Oder nach MAGENDIE Gr. 8 mit 3 Unzen Syrup zusammengerieben (beim Gebrauch umgeschüttelt), wo dann jeder Theelöffel etwa Gr. $\frac{1}{2}$, der Esslöffel Gr. 2 enthält. Oder — besonders zweckmässig — durch Hülfe von Schwefelsäure (s. oben) in Wasser oder Wein aufgelöst; z. B. Ry 249, 250; oder Gr. 12 mit *Mixt. sulph. acid.* Scr. $\frac{1}{2}$ in $\frac{1}{2}$ Quart Mallaga, wo dann jedes Weinglas ziemlich 2 Gran enthält].

Ausserl. hauptsächlich endermatisch [am besten in der Regel (weil das blosse Pulver oft zu reizend) in Salbenform; bisweilen noch, namentlich bei Empfindlichen, mit kleinem Opium-, Morphin- oder sonstigem narkotischem Zusatz; bei Wechselfiebern zu Gr. 4–6 (od. mehr), während der Apyrexie (auch das Blasenpflaster soll nicht während des Paroxysmus in Wirkung seyn); nöthigenfalls auch ein Paar solcher Applicationen während der Apyrexie. Bei anderen Krankheiten meist in geringeren Gaben.]; allenfalls auch anatripsologisch [z. B. nach POINTE bei Wechselfieber-Kranken, welche China und China-Alkaloide innerlich nicht vertragen, 2–3mal tägl. 10 Minuten lang 3–4 Gran auf Zahnfleisch und Innenfläche der Wangen (bei weichem, schwammigen Zahnfleisch nur in die Wangen) einzureiben, dabei den Speichel nicht zu verschlucken, lieber auszuwerfen. (Die Methode möchte wohl der endermatischen nachstehen.)], in Schnupfpulver [15 Gran mit 1 Unze Taback, in 5–6 Tagen verbraucht, von HUC bei intermittirendem nervösen Kopfschmerz mit Glück versucht], Kly-

stieren [½ St. vor dem Fieberanfall und beim Eintritt desselben jedesmal Gr. 4 mit Amylum: v. CASTELLA, wo ein gereizter Zustand des Magens die innerliche Anwendung verbietet], Pflastern? [wohl nicht zu empfehlen].

245.

Ry *Opii* Gr. 1

Chinii sulphur. Gr. 3

Sacch. albi

Gm. Mimos. ana Gr. 6.

M. f. Pulv. D. S. Kurz vor dem Anfall zu nehmen. (Bei böartigen Wechselfiebern.) NEUMANN.

Statt des Zuckers und Gummis wäre wohl ein anderes Constituens zweckmässiger (s. oben) und, wenn es eines schleimigen Zusatzes bedürfen sollte, Haferschleim als Vehikel.

246.

Ry *Chinii sulphur.* Gr. 2

Ferri sulph. cryst. Gr. 1

Sem. Foenic. Scr. 1

Ol. Chamomill. citrati Gtt. 1.

M. f. Pulv. Disp. tal. nr. 6. D. in charta cerata. S. Alle 3 St. 1 Pulv. (Bei einem heftigen Wechselfieber.)

247.

Ry *Chinii sulphur.* Gr. 3

Ferri oxyd. fusc. Scr. ½

Rad. Glycyrrh. glabr. Gr. 12

Ol. Menth. crisp. Gtt. 1.

M. f. Pulv. Disp. tal. dos. nr. 12. D. in charta cerata. S. 4mal tägl. 1 Pulv. (Gegen Gonorrhoea secundar. mit

allgemeiner Schwäche.)

OTTO.

Man sollte meinen, dass eine kleinere Dose schwefels. Chinins passender wäre.

248.

Ry *Chinii sulphur. pulv.* Gr. 15

Cinnam. acuti — Dr. ½

Extr. Chin. reg. q. s.

ut f. *Pilulae* 30. *Consp. Pulv. Cinnam. acuti. D. S.* Alle 4-2 St. 4 Stück.

HENSCHEL.

249.

Ry *Chinii sulphur.* Gr. 12

solvs, ope

Mixt. sulph. acid. Scr. ½,

in

Aq. Cinnam. simpl. Unc. 6

adde

Syr. Cinnam. Unc. 1.

D. S. Esslöffelweise. HENSCHEL.

250.

Ry *Chinii sulphur.* Scr. 1

Elaeosacch. Menth. pip. Dr. 2

solvs, ope

Acidi sulphur. diluti Dr. ½,

in

Aq. Laurocer. Unc. ½.

D. — (Es werden 15-16 Tropfen 1 Gran enthalten.)

Chlorum Calcariae. *Chloretum Calcariae s. Calcis. Chloris calcicus. Calcaria chlorinica s. chlorosa s. chlorata s. oxymuriatica.* Chlorkalk; oxydirtsalzsaure Kalk. (Ist chlorichtsaurer Kalk mit Chlorcalcium und in der Regel etwas kaust. Kalk.) [Grüßliches, weisses, schwach nach Chlor riechendes Pulver, von widerlich schrumpfendem Geschmack; wird an der Luft feucht und entwickelt (durch Einfluss der Kohlensäure) Chlor, zerstört dadurch organische Farb- und Riech-Stoffe. — 1 Unze 1 Sgr.] *Sol.* 6-8 [variiert], doch löst es sich nicht vollständig auf, und die Auflösung muss deshalb zum innerlichen Gebrauch filtrirt, zum äusserlichen wenigstens decantirt werden. [Eine ziemlich concentrirte Auflösung ist der

† *Liquor Calcar. oxymur. s. chloratae* (Leichenwasser) der PH. SLESV.: Chlorkalk 1 mit Regenwasser 8 unter öfterem Umrühren $\frac{1}{2}$ St. macerirt, dann rasch filtrirt, in gut verschlossenen, schwarz umzogenen Gläsern aufbewahrt. (1 Unze 1 Shl., 1 L. 6 Shl.) Man kann diese Vorschrift leicht so, dass die Auflösung weniger concentrirt wird, modificiren, sie, wo es um der Verbindung mit andern Mitteln willen nöthig ist, mit destill. Wasser bereiten, sie auch concentrirt, zur Verdünnung bei der Anwendung, aufbewahren lassen.] *Cave:* es wird ausserordentlich leicht, selbst durch die meisten organischen Körper, zersetzt; deshalb in der Regel, sanctionirte Verbindungen ausgenommen, pur. Man meide auch Wärme und für die Auflösungen Licht.

Innerl. zu Gr. 2-10 mehrmals tägl.; in Auflösung [Ry 251]; auch wohl in Trochisken [doch in dieser Form gewöhnlich nur gegen üblen Mundgeruch. Ry 252].

Ausserl. zu Mund- u. Gurgelwässern [Dr. 2-Unc. 1 auf Unc. 8; die schwächeren Verhältnisse, um bloss einen üblen Mundgeruch zu tilgen; die stärkeren bei Aphthen, Soor p.p., wo man bisweilen sogar den Chlorkalk in Substanz aufstreuen oder mit einem Pinsel aufstupfen lässt. — Ry 253, 254. — Bisweilen zieht man hier, des minder unangenehmen Geschmacks wegen, das † *Chlorum Natri* vor.], Pinselsäften [Ry 255. Die concentrirte Auflösung pur aufpinseln: KOPF bei Mundfäule.], Zahnpulvern [Ry 256]; als Riechmittel [bei Asphyxien, bei Vergiftung durch verschiedene Gasarten (vgl. den Anhang: Vergiftungen) — mit etwas Wasser oder Essig befeuchtet — etwa noch (WETZLER) mit gepulvertem *Kali sulphuric. acidum* (zu nach dem Augenmaass gleichen Theilen). — Bei (büchtig-) ansteckenden Krankheiten können Ärzte (oder andere Personen, die nicht lange beim Kranken bleiben) sich auch eines Riechfläschchens bedienen, welches ein nach der obigen WETZLERSchen Vorschrift bereitetes Gemenge enthält, worauf beim Gebrauch ein wenig Wasser getrüpfelt wird.]; zu Augewässern [Zu Augen-Waschungen und Bähungen einige Gran bis zu Dr. 2 auf Unc. 4. Ry 257. — Zu Augentropfwässern (oder überhaupt zu Wässern, welche auf die ganze Conjunctiva oder einen grossen Theil derselben einwirken sollen, weshalb wir auch Ry 258 hierher rechnen) ein Paar Gran bis Dr. $\frac{1}{2}$ auf Unc. $\frac{1}{4}$; z. B. Scr. $\frac{1}{4}$ - Dr. $\frac{1}{2}$ auf Unc. $\frac{1}{4}$: FISCHER bei Blennorrhöen; selten schwächer, z. B. Gr. $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ (und rasch steigend mehr) auf *Aq. destill.* Unc. $\frac{1}{4}$, 1-2mal tägl. einige Tropfen lauwarm einzuflüssen: JÜNGKEN gegen hartnäckige Graulationen auf der Conjunctiva bei ägyptischer Ophthalmie (starke Auflösungen zum Pinseln üppiger Granulationen).], Einspritzungen in verschiedene Höhlen, Waschungen [Beim Eicheltripper lässt OTTO mit einer Mischung aus 2 Unzen concentrirter Chlorkalkauflösung und 6 Unzen *Decoct. Rad. Helen.* waschen; es reiche dies auch gegen gleichzeitig vorhandene Schanker meist aus, bei veralteten Schankern solle man noch Dr. 2 Opiumtinctur zusetzen. — Gegen Krätze wird in der Charité zu Berlin je nach der Empfindlichkeit der Haut und der Dauer des Übels 2-4mal tägl. der Körper und besonders die leidenden Theile mit einer, nicht decantirten oder durchgeheibten, Auflösung von Unc. 1-2 in Unc. 16 Brunnenwasser (beim Gebrauch jedesmal umzuschütteln) gewaschen (starkes Reiben dabei zu vermeiden; den weis-

sen Niederschlag, der sich auf der Haut bildet, auf derselben zu lassen. Nur bei einer feinen Haut wirke das Verfahren bisweilen zu heftig, erzeuge Entzündung, Erosionen oder stärkeren Ausbruch der Bläschen, und sey dann zu mildern oder ganz zu unterlassen). Sehr ähnlicher Methoden bedienen sich FANTONETTI (der aber aller 3-4 Tage ein Bad nehmen lässt, um die Haut vom Kalk zu reinigen), MAGENDIE u. A.), Umschlägen und Verbandwässern [Unc. $\frac{1}{2}$ auf L. 1 Wasser, mit Compressen über scrofulös verhärtete Drüsen zu schlagen und oft zu erneuern: WERNECK. — Die concentrirte Auflösung, nachdem vorher 2-3 Tage erweichende Umschläge gemacht: LISFRANC bei Verbrännungen des 2ten Grades. Schwächer ist Ry 259. — Dr. 1 auf Unc. 6: WERNECK zum Verbinden syphilitischer, um sich fressenden Geschwüre, auch phagedänischer Fussgeschwüre (vgl. oben die OTTOsche Vorschrift). — Dr. 3-4 mit L. 1 Wasser unter Reiben gemischt; nach $\frac{1}{2}$ St. decantirt, so dass eine milchige Wolke mit übergeht, das unaufgelöste Körnige des Mittels aber zurückbleibt; umgeschüttelt als (flüssig zu erneuerndes) Verbandwasser bei verschiedenartigen Geschwüren, Kopfgrind p. p., auch zum Einspritzen in fistulöse Geschwüre p. p.; eine stärkere Solution (Unc. 2 auf L. 1) werde oft bei Brand (Pseuderysipel, Decubitus p. p.) nöthig, bisweilen auch, z. B. bei Frostbeulen, ein Zusatz von *Tinct. Opii croc.* Dr. 1-2: TRÜXEN. Sonst wird auch gegen Frostbeulen die concentrirte Auflösung empfohlen. — Einer verhältnissmässig schwachen Auflösung, Dr. $\frac{1}{2}$ -2 auf L. 1, aber nicht decantirt, sondern jedesmal vor der Anwendung umgeschüttelt, bedient sich RUST bei brandigen Geschwüren, Hospitalbrand u. s. w.], Linimenten [Bei Herpes od. Erbgrind Dr. 3-5 der concentrirten Auflösung auf *Ol. Olivar.* Dr. 7, wohl umgeschüttelt 3mal tägl. aufzuspinseln: KOPF. (Ähnliche Verordnungen bei syphilit. Umschlägen empfohlen.) Vgl. Ry 260. — Bei Krätze Ry 261.], Salben [Gegen Kropf einen Tag um den andern ungefähr 15 Gran von einer Salbe aus Chlorkalk Gr. 5-10 u. Fett Scr. 8 einzureiben: WERNECK (erfolgt Hautreizung, noch längere Pausen). — Scr. 1 - Dr. 1 auf 1 Unze frischer ungesalzener Butter: CIMA zum Einreiben auf scrofulöse Drüsen. — Scr. 1 - Dr. 1 auf $\frac{1}{2}$ Unze Fett: gegen schlecht eiternde Bubonen empfohlen. — Ry 262, 263.], Bädern [z. B. örtliche laue Bäder, Dr. 2 auf jedes Pf. abgekochten Flusswassers: WERNECK bei scrofulösem Winddorn. — In eine lauwarm gemachte Mischung von Unc. 1 - $1\frac{1}{2}$ der concentrirten Auflösung mit *Aq. destill.* L. 4 den kranken Theil 2mal tägl. $\frac{1}{2}$ St. lang halten: KOPF bei scrofulösen Hand- u. Fuss-Geschwüren. — Allgemeine Bäder (2 Pf. u. mehr auf 1 Bad, und ein solches mehreremal binnen einigen Tagen genommen, $\frac{1}{2}$ -1 St. lang) empfiehlt WAGNER in Odessa als Prophylacticum gegen Pest]. Besonders häufig wird auch der Chlorkalk [indem man ihn der Luft aussetzt; oder noch kräftiger, indem man ihn durch eine Säure, in der Regel am passendsten verdünnte rohe Salzsäure, zersetzt] zu einer bequemen und allmählichen Entwicklung des Chlorgases benutzt, um durch dieses schädliche Gasarten, Miasmen, Contagien u. dgl. zu zersetzen und zu zerstören [Um in irrespirablen Gasarten nicht zu ersticken, bindet man ein mit einer Auflösung des Chlorkalks — etwa Scr. $\frac{1}{2}$ auf Unc. 1 — getränktes Stück Leinwand vor Mund und Nase. — Zur Luftreinigung in Krankenzimmern, Abtritten, beim Ausleeren von Kloaken, stellt man Chlorkalk etwas angefeuchtet in Näpfchen aus, oder man spritzt die concentrirte Auflösung auf dem Boden umher, oder lässt in eine verdünnte Auflösung getauchte Tücher aufhängen. (In der Charité zu Berlin werden Schirme von grobem

Zeuge aufgestellt und von denjenigen Kranken, welche umhergehen können, wiederholt mit der verdünnten Auflösung bestrichen.) Man kann sich auch einer hie und da käuflichen, gleich in flüssiger Gestalt präparirten, Chlorkalkflüssigkeit bedienen, welche wohlfeiler und kräftiger (stärker nach Chlor riechend) zu seyn pflegt als man sie aus dem trockenen Chlorkalk darstellen kann. — Eine noch stärkere Entwicklung des Chlorgases erfolgt, wenn man Chlorkalk in kleinen Portionen in verdünnte Salzsäure schüttet. — Wo man auf diese Weise Chlorgas entwickelt, hat man in Zimmern, namentlich Krankenzimmern, die unter *Fumigationes oxymuriat.* angegebenen Cautelen, obwohl in geringerem Grade, zu beobachten. — Die Excremente bei Ruhr, Cholera p. p. überschütte man mit trockenem Chlorkalk. Stark faulende Leichen, die man untersuchen will, begießt man von Zeit zu Zeit mit einer Auflösung von Unc. 1 auf ein Quart, oder schlägt sie in darin (oder auch in eine concentrirte Auflösung, vgl S. 117 das „Leichenwasser“ der PH. SLESV.) getauchte Leinwand ein. — Zur Desinfection von Kranken-Effecten schreibt das königl. Polizeipräsidium in Berlin (vgl. CASPER krit. Repert. Bd. 24. Heft 2.) eine Auflösung von Unc. 1 auf 1 Quart vor; darin soll nach Blattern, Faulfieber, Fleckfieber, wahrem Nervenfieber, Rotz- oder Milzbrand- Ansteckung, Karbunkel, brandiger Rose, brandiger Bräune, Hospitalbrand, die Wäsche der Kranken 24 St. lang eingeweicht, andre Effecten, Meubles, Bettstellen, Hausgeräth damit gewaschen, auch wohl die Zimmerwände damit überstrichen werden; nach der Ruhr soll bloss die Leib- u. Bettwäsche darin eingeweicht und die Nachtgeschirre damit ausgewaschen, nach Gicht, Lungenschwindsucht, Krebs bloss die Wäsche damit gereinigt werden.] oder auch, um es gegen Lungenkrankheiten anzuwenden [zu diesem Behuf bewerkstellige man die Gasentwicklung in einiger Entfernung vom Kranken und nicht zu stark, auch nur ab und zu des Tags auf einige Zeit, vorsichtig die Wirkung beachtend. Man kann von solchem behutsamen Anschwängern der Atmosphäre mit Chlorgas wohl eher günstige Resultate erwarten als von den Einathmungen mittelst eigener Apparate (deren Resultate auch bis jetzt — vgl. G. A. RICHTER ausführl. Arzneimittell. Bd. IV. S. 95, 96. u. Suppl. Bd. 8. 499 ff. — noch sehr zweideutig erscheinen)].

251.

Ry *Chlori Calcar.* Scr. 1 - Dr. 1
solve in

Aq. destill. L. $\frac{1}{2}$ - 1.

Solut. filtratae adde

Syr. simpl. Unc. $\frac{1}{2}$.

M. D. in vitro charta nigra involuto. S.
Alle 3 - 2 St. 2 - 3 Essl. (Bei scrofulösen
Drüsenleiden.) CIMA.

252.

Ry *Chlori Calcar.* Dr. $\frac{1}{4}$

Sacchari albiss. Unc. 2

Mucil. Gm. Tragac. q. s.

ut f. Trochisci nr. 80, Amyla conspergendi, non torrendi. D. in vitro albo. —
(Etwa 2stündl. 1 Stück. — Auch gegen den Geruch vom Tabacksrauchen anwendbar.)

253.

Ry *Chlori Calcar.* Dr. 2
solve in

Aq. Cinnam. simpl.

— *Menth. pip. ana* Unc. 3.

D. in vitro charta nigra involuto. S.
Mundwasser, umgeschüttelt. (Gegen übeln Mundgeruch.) MOST.

Die destillirten Wässer verlieren durch den Chlorkalk allmählig ihren Geruch u. Geschmack, und es bildet sich Salzsäure. Deshalb verordnet man keine grössere Totalquantität.

254.

Ry *Chlori Calcar.* Dr. 3
solve in

Aq. destill. Unc. 3.

Solutioni filtratae adde

Spir. Vini rftiss. Unc. 3

Ol. Rosar. Gtt. 4.

M. D. in vitro charta nigra involuto. — 1 Theelöffel mit 1 Weinglase Wasser zu mischen; damit, mittelst einer Schwammbürste, Zahnfleisch und Zähne zu reinigen, auch den Mund auszuspülen.

CHEVALLIER.

Das Rosenöl wird hier allmählig, doch nicht vollständig, zerstört; das unzerstörte bildet mit dem sich nach und nach bildenden Chloräther (s. unten) eine angenehm riechende Mischung. — Verdünnungen dieses Mundwassers oder ähnlicher Compositionen werden unter der Benennung *Pneumatokathartion* als Geheimmittel verkauft; folgende Vorschrift von FREYBERG macht sie entbehrlich: Dr. 1 frisch bereiteten Chlorkalks wird unter gelindem Reiben in *Aq. destill.* L. 6 aufgelöst, dann *Spir. V. alcohol.* Unc. 8 hinzugegan, die Flüssigkeit 24 St. an einen kühlen Ort gestellt, dann filtrirt und in einem wohlverschlossenen, umzogenen Glase aufbewahrt. Der Zusatz irgend eines wohlriechenden Öls darf, wenn das Mittel nicht widrig werden soll, nur sehr gering seyn, ist aber auch nicht nöthig, da die Mischung mit der Zeit eine Ätherbildung eingeht und dann von selbst einen erquickenden, apfelähnlichen Geruch und Geschmack bekommt. Will man dies beschleunigen, so reibt man dem Chlorkalk nur mit einer kleinen Quantität Wasser, setzt aber die ganze Quantität des Alcohols hinzu, lässt die Mischung, die von Zeit zu Zeit umgeschüttelt wird, in einem verschlossenen, umhüllten Gefässe mehrere Wochen lang stehen, verdünnt sie nun erst mit dem übrigen Wasser, und filtrirt.

255.

Ry *Chlori Calcar.* Gr. 15-30
solvo in

Mucil. Gm. Mimos. Unc. 1
adde

Syr. Cort. Aurant. Unc. ½.

M. D. in vitro charta nigra involuto.
S. Umgeschüttelt aufzuspinseln. (Auf

IL

exulcerirte Stellen des Zahnfleisches.)
ANGELOT.

256.

Ry *Chlori Calcar.* Gr. 5-20*Conchar. ppt.* Unc. ¼*Ol. Caryophyllor.* Gtt. 2.

M. f. Puls. D. in vitro bene clauso. S. Zahnpulver. (Gegen üblen Mundgeruch u. cariöse Zähne, auch gegen gelb gefärbte Zähne, z. B. vom Tabacksrauchen, verordnen französische Ärzte oft Zahnpulver dieser Art; oft wählen sie statt der *Conchas* die theureren rothen Corallen zur Grundlage. Ein längerer Gebrauch solcher Zahnpulver dürfte jedoch durch den salzsäuren und kaustischen Kalk — vgl. S. 117 Z. 8, 7 v. u. — dem Zahnfleisch nachtheilig werden, und zur Tilgung üblen Mundgeruchs überdies *Aq. oxymuriat.* zweckmäßiger seyn. — Das Pulver muss vor Feuchtigkeit bewahrt, deshalb immer nur so viel, als jedesmal verbraucht wird, ausgeschüttet, dann das Glas wieder sorgfältig verschlossen werden.)

257.

Ry *Flor. Arnicae* Dr. 2— *Chamom. vulg.* Unc. ¼*Aq. comm. fervid.* q. s.

stent per ¼ hor.; in Colat. Unc. 5 solve

Chlori Calcar. Ser. 1.

Filtra. D. in vitro charta nigra invol.
S. Zum Umschlagen (gegen Brand der Augenlieder).
ANDREAE.

258.

Ry *Chlori Calcar.* Gr. 2½-15

solvo in

Aq. destill. Dr. 2.

Filtra D. in vitro charta nigra involuto.
S. Augenzwasser. (Mit einem Pinsel alle 3 St. auf die Conjunctiva zu bringen, dann sogleich das Auge mit einer in kaltes Regenwasser getauchten Compressen zu bedecken. Man erneuere die Auflösung täglich. — Bei *Ophthalmia purulenta* Erwachsener, auch Kinder, wenn sie chronisch geworden.)
VARLEZ.

16

259.

Ry *Chlori Calcar.* Unc. $\frac{1}{4}$.
solue in

Aq. comm. L. 1.

Solutioni dequantatis adde

Mucil. Gm. Mim. Unc. 2.

M. D. in vitro charta nigra invol. S. Mit
kleinen Lappen, nicht zu kalt, überzu-
schlagen. (Bei Verbrennungen des 2ten
und 3ten Grades.) TRUSEN.

Der Mimosenschleim wirkt nach einiger
Zeit zersetzend und dürfte wohl entbeh-
rlich seyn. Noch mehr gilt dies vom Quit-
tenschleim, welchen der Autor bisweilen
statt des Mimosenschleims anwendet.

260.

Ry *Chlori Calcar.* Gr. 15

Carbon. ppt. Unc. $\frac{1}{2}$

Aq. comm. q. s.

ut f. *Liniment.* D. S. Umgeschüttelt ein
Paar Mal tägl. aufzupinseln. (Gegen
Herpes.) NEUMANN.

261.

Ry *Chlori Calcar.* Unc. 4

Sapon. domest. nigri Unc. 2

Aq. comm. q. s.

ut f. *Linim.* (Bei Krätze.)

SCHÜNLEIN.

262.

Ry *Chlori Calcar.*

Boracis ana Dr. 1.

Subtil. pulveratis adde

Adipis suilli Unc. 1.

M. D. — (Bei Frostbeulen.)

TRUSEN.

263.

Ry *Sulphuris depur.* Unc. $1\frac{1}{2}$

Chlori Calcar. Unc. 2

Adipis suilli Unc. 10.

M. D. S. Früh und Abends einzureiben
(10 Tage lang; darauf einige Bäder:
gegen Krätze.) HOSPITAL.

+ *Chlorum Natri. Chloretum Natri. Chloris natricus.*
Natrum chlorosum s. chloratum s. chlorinicum s. oxymuriati-
cum. Chlornatron; oxydirt-salzsaures, richtiger chlo-
richtsaures, Natron. [Schwach nach Chlor riechend, von herb alkali-
ischem Geschmack; zerstört organische Farb- u. Riech-Stoffe.] *Sol.* 3. — *Cave*
wie bei *Chlorum Calcar.*

Innertl. entbehrlich.

Ausserl. in Salben [z. B. *Scr.* $\frac{1}{2}$ mit *Carbon. ppt.* Dr. 1 auf *Ungt.*
rosat. Dr. 3; LANGEMEYER bei syphilit. Geschwüren. — *Scr.* 1 - Dr. $\frac{1}{2}$ auf *Ungt.*
rosat. Dr. 3, damit 3mal tägl. zu verbinden: *Cullerier, Ségalas* u. A. bei
jätchenden chronischen syphilit. Geschwüren, selbst solchen, bei denen sich be-
ginnender Brand zeigt]; in concentrirter [fast ätzend], häufiger ver-
dünnter Auflösung [vgl. + *Liq. Natri chlorati*] zu Einspritzungen,
Mund- u. Gurgel-Wässern [Dr. $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ auf Unc. 6, etwa eines schlei-
migen Vehikels, mit Rosenhonig od. dgl.], Pinselsäften [etwa Dr. $\frac{1}{2}$ auf
1 Unze Syrup od. dgl.], Waschungen [besonders für Ärzte und Wärter
zum Waschen der Hände bei ansteckenden Krankheiten geeignet, da es die Hände
nicht so spröde macht wie Chlorkalk; man wende etwa eine concentrirte, während
des Waschens stark zu verdünnende, Auflösung an], Verbandwässern
[z. B. Dr. 1 auf Unc. 8; im *Hôtel-Dieu* zum Waschen schmutziger, brandiger p. p.
Geschwüre gebräuchlich. — Viel stärker Ry 264.], u. s. w. — Zum Desinfectiren
von Räumen oder Sachen sind Chlor und Chlorkalk wohlfeiler.

264.

R_x † *Chlori Natri* Unc. $\frac{1}{2}$
solvo in*Aq. destill.* Unc. $2\frac{1}{2}$

adde

Tinct. Catechu Dr. 2.

M. D. in vitro charta nigra involuto.
S. Verbandwasser, umgeschüttelt (häufig zu erneuern — an der innern Mundfläche mit einem Pinsel aufzutragen — bei Wasserkrebs).

VAN DAM.

Cinchonium sulphuricum. *Sulphas cinchonius.* Schwefelsaures Cinchonin. [Bitterkeit etwas milder als beim *Chinium sulphur.* — 1 Scrup. $3\frac{1}{2}$ Sgr.] *Sol.* 54; *Spir. V. rftiss.* $6\frac{1}{2}$. (In Äther unauf löslich.) Wird durch Zusatz von Schwefelsäure [wie beim *Chinium sulphur.*] in Wasser $\frac{1}{2}$, Weingeist 1 [nicht in Äther] auflöslich. — *Cave* Salzbilder; Alkalien, alkalische Erden, Alkaloide; weinsteinsäure Alkalien; salzsaur. Gold; Gerbstoff.

Innerl. in etwas grösseren Gaben [nach MAGENDIE in $1\frac{1}{2}$ mal so grossen] als das *Chinium sulphur.*, in ähnlichen Formen; am bequemsten und angenehmsten in Weingeist oder Wein aufgelöst, oder mit Syrup verrieben als Lecksaft, oder in Pillen.

265.

R_x *Cinchonii sulphurici* Gr. 6-48*Kali acetici**Sacch. albiissimi* ana Unc. $\frac{1}{2}$

solvo in

Aq. Chamomill. Unc. 6.

D. S. 2stündl. 1 Essl. (Bei Wechsel-
fiebern, die nicht frei von gastrischer
Complication.)

SUNDELIN.

Cinnabaris (factitia). *Hydrargyrum sulphuratum rubrum.* *Bisulphuretum Hydrargyri.* Cinnober (künstlicher). *Vermillon.* Rothes Schwefelquecksilber. [1 Unze $5\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave* Salzbilder.

Innerl. [ziemlich obsolet] zu Gr. 2-20; 2-3 mal tägl.; in Pulver, pulveraufnehmenden Formen.

Ausserl. zu Salben [z. B. 1 mit *Sulph. depurat.* 2, Fett 8 und etwas Cedroöl: BIETT gegen Flechten, besonders *Herpes lichenoides*], Räucherungen [in denen sich Dämpfe von metallischem Quecksilber u. von schwefliger Säure bilden. — Etwa Dr. 1 auf jede, zu localen Räucherungen (wie sie z. B. SAM. COOPER selbst auf Halsgeschwüre, mittelst einer krummen Röhre, anwendet) einige Gran, auf Kohlen oder ein glühendes Eisen gestreut; am besten in eigenen Räucherungsapparaten, 5-20 Minuten lang und (die allgemeinen Räucherungen) alle 2-3 Tage wiederholt]. DIEFFENBACH empfiehlt noch das Rauchen von mit Cinnober imprägnirtem Taback [Dr. 1-2 auf $\frac{1}{4}$ Pfund, oder auf ein Cigaro Gr. 3-6], so dass der Dampf durch die Nase geblasen wird, bei syphilitischen Nasengeschwüren.

Cinnamomum acutum s. verum s. orientale s. Ceylonense. Canella Ceylanica. Cortex Cinnamomi [welche Benennung indess auch bisweilen für die weniger liebliche, aber bei nicht geringerer Wirksamkeit wohlfeilere und deshalb häufiger (namentlich auch zu den officinellen Präparaten) angewandte *Cassia cinnamomea* gebraucht wird]. Zimmt (echter od. feiner). Kaneel. [Hauptbestandtheile; äther. Öl u. Gerbstoff. — 1 Drachme cont. $\frac{1}{2}$, sub. pulv. $1\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerl. wie *Cassia cinnamom.* [Ry 64 (*Alum.*), 273 (*Cort. Cascarill.*).]

Aüsserl. als Kaumittel [den ganzen Tag über, und den Speichel dabei hinunter schlucken: STOLL gegen alte Diarrhöen].

Coccionella. Cochenille. [Hauptbestandtheil ein rother Extractivstoff (Coccusroth). — 1 Drachme sub. pulv. 2 Sgr.] Als färbender Zusatz zu Zahnpulvern [s. I. S. 218, 219] u. Zahnlatwergen [I. S. 195. sub 1)]; seltner lässt man sie zu gleichem Zweck in geringer Menge mit Flüssigkeiten, namentlich Tincturen, digeriren [die Farbe lässt sich mit Wasser und Wein ausziehen, wird durch schwache Säuren, Alaun, Borax erhöht, durch Alkalien violett, durch Bleizucker violett, fast blau, durch starke Säuren, Gerbstoff rothgelb, durch salzsaures Eisenoxyd dunkel-schwarzbraun oder olivengrün].

+ *Colla animalis. Gluten animale. Thierleim.* Tischlerleim. — *Cave* s. I. S. 35 sub 12. — Hauptsächlich nur noch zu Bädern [L. $\frac{1}{2}$ - 1, zuvor in einem Topf Wasser durch Kochen aufgelöst. — Bisweilen bezweckt man durch einen Zusatz von Leim, Bäder von Salzen od. a. Stoffen weniger hautreizend zu machen; vgl. z. B. *Kali sulphurat. pro Bath.* Ob aber dadurch die Bäder nicht sehr an Wirksamkeit verlieren sollten?]. Hausmittel gegen erfrorne Glieder: Leim dick gekocht, warm aufgestrichen und noch ein damit getränktes Stück Zuckerpapier oder Zeug darüber gelegt; fällt dies nach einigen Tagen ab, nöthigenfalls Erneuerung.

Colocynthis praeparata. Trochisci Alhandal. Praeparirte Koloquinte. [Koloquintenmark 5, Gm. *Mimos.* 1. — Feines Pulver. — 1 Drachme $2\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave* wie bei *Poma Colocynthis.*

Innerl. (*ad Granum unum!*) als Reizmittel zu Gr. $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$; als gelindes Purgans zu Gr. 2 - 4; als drastisches (kaum noch in Gebrauch) zu Gr. 5 - 10; 2 - 4 mal tägl.; in Pulver, Pillen,

Aüsserl. zu Einreibungen [jedemal 15 - 20 Gran, mit Schweinefett, in den Unterleib, bei Wahnsinnigen: CHRESTIEN].

(Zu Abkochungen u. Aufgüssen *Poma Colocynth.*)

Colophonium. Geigenharz. [1 Unze sub. pulv. 1 Sgr.] Vgl. *Resinae.*

Nur äusserl., als Streupulver [nicht unvermischt. — Z. B. bei carissen u. s. Geschwüren; man befeuchtet es, nachdem man es aufgestreut hat, wohl noch mit etwas Weingeist. — Mit *Gm. Mimos. ana*, bei veraltetem *Prolapsus ani* 3-4mal tägl. den Mastdarm zu bestreuen: v. KLEIN. — *Pulo. stypticus* einiger Pharmacopöen s. S. 37. — REIL empfiehlt bei Blutungen Coloph. gepulvert und mit Weingeist befeuchtet mit (nicht gepulvertem) Lärchenschwamm (doch thut gewöhnlicher Feuerschwamm wohl dieselben Dienste) aufzulegen.], als Paste mit Werg [bei Gliedeschwamm, bei Arthrocace im ersten Stadium, nach beseitigter Entzündung; man ballt Werg oder Hanf in Form eines Vogelnestes, streut Colophonium dick in die Vertiefung hinein, legt dies über die Geschwulst, begiesst nun das Ganze sammt dem Gelenk mit *Spir. Fini rftiss.*, löst dadurch das Colophonium (unvollkommen) auf, und bildet so eine dicke Paste, die sich — indem man das Begiessen täglich oder öfter wiederholt, bald ganz fest um das Glied anlegt], als (mitwirkendes) Constituens von Pflastern [so von mehreren officinellen]; selten zu Räucherpulvern.

Conchae praeparatae. Präparirte Austerschalen. [Kohlensaurer Kalk mit wenigem thierischen Stoff. — Feines Pulver. — 1 Unze 2½ Sgr.] *Cave* Säuren (auch saure Salze u. Säfte) [ausser in Brausemischungen; wo man Kohlensäure entbinden will]; auch die unter *Aq. Calcar.* angegebenen Salze.

Innerl. zu Scr. ¼-1, mehrmals tägl. In Pulver [z. B. das officinelle *Pulo. antiepilept.* — Ry 162 (*Bismuth. nitr. princip.*), 561 (*Hydrarg. sulph. nigr.*), 736 (*Nuc. Vom.*), 744 (*Ol. Cajep.*). — Auch wohl zu Brausepulvern, von denen jedoch dasselbe gilt was von den aus *Lapides Cancr.* bereiteten. — Bisweilen als Pulverconstituens (I. S. 211).], Trochisken, Pillen u. Bissen [Ry 882 (*Rad. Rhei*). — Namentlich auch zum Bestreuen derselben (I. S. 90.)], Latwergen [Ry 1005 (*Sulph. depur.*)], Schüttelmixturen [Ry 266].

Äusserl. zu Streupulvern, Zahnpulvern [z. B. das officinelle *Pulo. dentifric.*, oder Ry 267; 256 (*Chlor. Calcar.*), 679 (*Mastiche*)], Augenpulvern [q. v. — Ry 724 (*Natr. muriat.*)].

266.

Ry *Conchar. ppt.* Dr. ½
Gm. Mimos. pulv. Dr. 1
 iore c.
Syr. Althaeae
Aq. communis ana Unc. 1.
M. D. S. Umgeschüttelt 2 stündl. 1 Theelöffel. (Bei Diarrhöe eines Säuglings.)

267.

Ry *Concharum ppt.* Dr. 6
Rad. Calami decorticatae Dr. 2
Ol. Caryophyllor.
 — *Bergamott. ana* Gtt. 3.
M. f. Pulo. D. in vitro. S. Zahnpulver.
 LOCKSTAEDT.

* **Conserva Rosarum.** Rosenconserven. Rosenzucker. [Frische Rosigrosenblätter 1 mit Raffinade 2. — 1 Unze 2½ Sgr.]
 Selten noch als Zusatz zu Mixturen [sie verunziert dieselben nur, indem die Theilchen der Rosenblätter darin herumschwimmen], eher zu Latwergen [namentlich zum innerlichen Gebrauch, s. I. S. 294-95].

Cornu Cervi. Hirschhorn. [Hauptbestandtheile: gallertgebender Knorpel und phosphorsaurer Kalk. — Man verordnet es immer geraspelt (und abgespült, abgewaschen), *raspatum* (et *ablutum*). — 1 Unze *rasp.* $\frac{5}{8}$ Sgr.] *Cave:* s. l. S. 35 sub 12.

Innerl. abgekocht zu Tisanen [zu concentrirteren Kraftbrühen etwa Unc. 1 mit L. 2-3 auf L. 1 gekocht, sonst schwächer. R_x 268. Doch überlässt man diese Form in der Regel der Küche und bestimmt nur die etwa zuzusetzenden Gewürze (etwas Zimmt, Muskatennuss od. dgl.)], Gallerten [Unc. 1 $\frac{1}{2}$ mit L. 1 auf Unc. 3 eingekocht, ist eine mittlere Concentration, und diese Portion den Tag über (zu 1-2 Theelöffeln jedesmal) zu verbrauchen, eine mittlere Gabe. — R_x 269, 270; 635 (*Lich. Isld.*)].

268.

R_x *Cornu Cervi raspati*
Micas Panis albi ana Unc. $\frac{1}{2}$
coque c. Aq. comm. L. 3 ad Colat.
 L. 2, in qua solve
Gm. Mimos. Dr. 2
Sacch. albi Unc. $\frac{1}{2}$.
D. S. Tassenweise in einem Tage zu verbrauchen.

Decoctum album SYDENHAMI (nach der PH. SLEEV. — 8 Unz. 6 Shl., L. 2 12 Shl.).
 Statt der halben Unze Zucker würde *Elaeosacch. Flor. Aurant.* oder *Cinnam.* (Gtt. 3) Unc. 1 den Geschmack angenehmer machen.

269.

R_x *Cornu Cervi raspati* Unc. 3
coque c. Aq. comm. L. 2 ad Colat.
 Unc. 6, cui adhuc calidae admisce

Syr. simpl. Unc. 1,
antea cum
Ol. Cinnam. Gtt. 2
mixtam. Repone in loco frigido, ut f. Gelatina. D. in pyxide alba. S. In 2 Tagen zu verbrauchen.

270.

R_x *Cornu Cervi raspati et abluti* Unc. 3
Aq. comm. L. 3 $\frac{1}{2}$
coque ad modicum ignem in vase tecto per 7-8 horas; liquori, per pannum laneum colato, adhuc calido, admisce
Sacch. albi Unc. 1
Vini Rhenani
Succi Citri rec. expr. et colati
 ana Dr. 2.
Repone in loco frigido, ut f. Gelatina. D. in pyxide alba. S. 2stündl. 1-2 Theelöffel.
Gelat. C. C. PH. SLEEV.

Cornu Cervi ustum album. Weissgebranntes Hirschhorn. Knochenasche. [Aus basisch-phosphorsaurem und kohlensaurem Kalk bestehend. — 1 Unze *praep.* 2 Sgr.] *Cave* Säuren, besonders Mineralsäuren. — Innerl. zu Scr. $\frac{1}{2}$ -1 einigemal tägl., in Pulver [vgl. *Nux mosch.*] od. pulveraufnehmenden Formen. — Äusserl. zu Zahnpulvern.

+ **Cornu Cervi ustum nigrum.** *Carbo ossium.* *Ebur ustum.* Schwarzgebranntes Hirschhorn (oder Elfenbein od. a. Knochen). Knochenkohle. [Bestandtheile wie beim vorigen, nebst thierischer Kohle.] Innerl. u. äusserl. etwa wie das vo-

rige, auch wohl zu Streupulvern. [Auch zur Reinigung und Entfärbung von Flüssigkeiten, wozu jedoch noch besser \dagger *Carbo animal. praeparatus*, s. den Art.]

Cortex Angusturae. Angusturarinde. [Hauptbestandtheile: äther. Öl und bitterer Extractivstoff (Angusturabitter), nach SALADIN auch ein Alkaloid (Cusparin) von dem Chinin ähnlicher Wirkung. — 1 Unze conc. 2, sub. pulv. $2\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave* Salzbilder; Alkalien; Metallsalze [besonders salzsaures Gold, salpeters. Silber, essigs. Blei, Brechweinstein, Quecksilber- u. Eisen-Salze]; Gerbestoff.

Innerl. zu Scr. $\frac{1}{2}$ - 1 (selten — etwa bei Wechselfiebern — mehr), mehrmals tägl. (Immer mit aromatischem Zusatz, um Ekel u. s. w. zu verhüten.) In Pulver u. pulveraufnehmenden Formen; Aufguss od. Ebullition [Unc. $\frac{1}{2}$ auf Unc. 6, 2stündl. 1 - 2 Essl. — Am besten im weinigen Aufguss. — R. 271, 272], Abkochung [Unc. $\frac{1}{2}$ - 1 mit Unc. 16, oder wohl besser nur mit Unc. 12, auf Unc. 8, 2stündl. 1 Essl.].

Selten äusserl., infundirt oder abgekocht, zu Fomentationen u. dgl.

271.

R. *Cort. Angusturae gross. pulv.*
Flav. Cort. Aurant. inc. ana Unc. $\frac{1}{2}$
Aq. comm. ferv. Unc. 8.
Digere per $\frac{1}{4}$ *hor., Colat. refriger. adde*
Tinct. Calami Dr. 2
Syr. Bals. Peruv. Dr. 6.
M. D. S. Stündl. 1 Essl. VOGEL.

Flor. Arnic. inc. ana Unc. $\frac{1}{2}$
Aq. comm. ferv. q. s.
Ebulliant semel; in Colat. Unc. 6 *solte*
Gm. Mimos. Dr. 2
et post refrigerat. adde
Tinct. Opii simpl. Dr. 2
Syr. Cort. Aurant.
Aceti ana Unc. 2.
M. D. S. Stündl., umgeschüttelt, 2 Essl.
 (In der fauligen Ruhr.)
 G. A. RICHTER.

272.

R. *Cort. Angusturae gross. pulv.*

\dagger **Cortex Cacao tostus.** Geröstete Kakaoschalen. [1 Unze gr. pulv. 1 Shl.] Ein gutes Surrogat des Kaffees, wo dieser zu erhitzen ist [grüßlich zerstoßen oder gemahlen, 2 Esslöffel voll mit 3 Tassen Wasser auf 2 Tassen gekocht, dazu Milch und Zucker].

Cortex Cascarillae. Cascarill-, Eluterien- od. graue Fieber-Rinde. Schakarille. [Hauptbestandtheile: äther. Öl, Harz u. Bitterstoff. — 1 Unze cont. $1\frac{1}{2}$ gr. pulv. $1\frac{1}{2}$, sub. pulv. 2 Sgr.] Innerl. zu Gr. 15-30 einigemal tägl. In Pulver u. pulveraufnehmenden Formen [selten, weil zu viel holzige Theile, ausser etwa gegen Wechselfieber]; häufiger in Aufguss [tägl. Dr. 3-6 auf Unc. 3-6, 2stündl. 1-2 Essl. — Kräftig ist ein weiniger Aufguss. R. 273. Sehr leicht verdaulich, aber auch wohl ziemlich schwach, ist der kalte wässerige: R. 274.], Ebullition [R. 275; 830 (*Rad. Arnic.*), 839 (*Rad. Colombé*)], Abkochung [Das äther. Öl ist in der Cascarille sehr gebunden, und die

fixen (bittern, harzigen u. schleimigen) Theile durch den Aufguss nicht recht vollständig auszuziehen, daher dürfte die Abkochung in der Regel den Vorzug verdienen. — Täglt. Dr. 3-6 mit Unc. 5-9 auf Unc. 3-6, 2stündl. 1-2 Essl.], oder, besonders zweckmässig, in Infuso-Decoct [ein Beispiel I. S. 164; doch ist auch R_y 276 als Ersatz eines Infuso-Decocts anzusehen (da Extr. Cascar. durch Abkochen bereitet ist) und weniger umständlich].

Ausserl. zu Zahnfleischlatwergen [häufiger das Extract], zu wohlriechenden Räucher-Species u. -Pulvern [sie riecht verglimmend (z. B. auf brennenden Taback geschüttet) der Ambra nicht unähnlich].

273.

R_y Cort. Cascarill. gross. pulv. Unc. 1½
Flavod. Cort. Aurant. inc. Unc. 1
Cinnamomi acuti cont. Dr. 2.
M. f. Species. D. S. Mit ¾ Quart Mal-
lagawein 2½ St. zu digeriren, dann
durchzuseihen u. auszupressen; 4mal
täglt. ½ Weinglas.

274.

R_y Cort. Cascarill. gross. pulv. Unc. 1
Aq. comm. q. s.
Macera, subinde terendo, per nycthe-
meron; Colat. Unc. 6 adde
Spir. sulph. acith. Dr. 1
Syr. Zingib. Unc. 1.
M. D. S. 2stündl. 1 Essl.

275.

R_y Cort. Cascarill. gross. pulv.
Hb. Centaur. min. conc. ana Unc. 3
Cass. cinnam. cont. Unc. ½.
M. f. Species. D. S. Täglt. den 8ten
Theil, mit 3 Tassen Wasser aufgewallt,
zu verbrauchen.

276.

R_y Cort. Cascarill. gross. pulv. Unc. ½
Aq. comm. fervid. q. s.
digerere per ½ hor.; in Colat. Unc. 6 solve
Extr. Cascarill. Dr. 2
et adde
Syr. Cort. Aurant. Unc. 1.
M. D. S. Umgeschüttelt 2stündl. 1 Essl.

Cortex Chinae fuscus s. officinalis. Cortex Peruvianus. Braune Chinarinde. Rinde (κατ' ἐξοχήν). [Unter diesen Benennungen findet sich in den Officinen am häufigsten *China Huamalies*, nächst dem *Ch. Loxa* (Kronchina), *Ch. Huanuco s. grisea* und *Ch. Jaën s. Ten.* An Alkaloidgehalt folgen sie so auf einander: Huanuco, Huamalies, Loxa, Jaën. Zweckmässig hat die PH. BAD. die reichste, Huanuco, als die allein für sich (nicht zur Bereitung der Alkaloide, denn dazu dürfen sie alle benutzt werden) anzuwendende bestimmt, obwohl freilich die meisten Erfahrungen mit der Huamalies gesammelt worden. — Hauptbestandtheile: Cinchonin, Chinin (wenig, bisweilen keines), Chinasäure, eisengrünender Gerbstoff, rother oxydirter Gerbstoff (Chinaroth od. Corticin; — diesem Bestandtheil schreibt man besonders die Schwerverdaulichkeit der China in Substanz und in vielen Auszügen zu) und Harz. — 1 Unze cont. 7½, subt. pulv. 9½ Sgr.] *Cave* [mit sanctionirten Ausnahmen]: Salzbilder; Alkalien, Alkaloide, alkalische Erden [die Verbindung mit *Magnes. usta* ist, obwohl zersetzend, sanctionirt]; Kalk- und Baryt-Salze; Chloreisen, Eisenoxysalze, Quecksilbersalze, salpeters. Silber, salzs. Gold; weinsteinsäure Salze [die Verbindung mit *Tart. stibiat.* — vgl. den Artikel — ist bei Manchen beliebt]; — in der flüssigen Form

auch; Weinsteinssäure [also auch Rheinwein, wenn er nicht ganz abgelagert ist; jedenfalls lasse man umschütteln]; Eisenpräparate überhaupt; Bleisalze; Galläpfel-Auszug, rothe Weine [diese werden, wenn sie an Gerbstoff sehr reich sind, vollkommen entfärbt, indem die Verbindung desselben mit dem Cinchonin oder Chinin den Farbstoff mit sich niederreißt; der mit Rothwein bereitete † *Syr. Chinae* ist ein schwaches Präparat], thier. Leim, Stärkmehl, Kleber, Eiweiss.

Surrogate für Arme (die indess jetzt, bei grösserer Wohlfeilheit der China, besonders der Königschina, weit seltener als sonst angewandt werden): *Cort. Cascarill.*, *Rad. Caryophyllat.*, *Flor. et Hb. Millefol.*, *Cort. Aurant.*, oder andre bitter, adstringirende und aromatische Mittel (nöthigenfalls mit Zusätzen von Campher, Äther u. dgl.) in schicklichen Verbindungen, z. B. *Pulvis Chinae factitiuus* P. H. P. (1 Unze 2½ Sgr.): *Ry Cort. Hippocast.*, *Salicis*, *Rad. Gentian. rubr.*, *Calami*, *Caryophyllat.* ana. *M. f. Pulv. atropholis*. Oder *Decoctum Chinae factitiae* P. H. P.: *Ry Pulv. gross. Cort. Salicis*, *Hippocast.* ana *Unc. ½*, *Rad. Calami*, *Caryophyllat.* ana *Dr. 2*; *coq. c. Aq. comm.* *Unc. 16 ad Colat.* *Unc. 8*. — Bei Wechselfiebern noch insbesondere Arsenik (BRIM). — Äusserlich *Cort. Querc.*, *Hippocast.*, *Salicis*, Kohle, Campher, ganz besonders aber *Flor. Chamomill. vulg.* (RUST). — Hält man die China selbst für unentbehrlich, so suche man wenigstens durch die Form zu ersparen, gebe nicht ohne Noth statt des Pulvers die flüssigen Auszüge. Ist aber auch die flüssige Form unentbehrlich, so empfiehlt HUFELAND noch statt des *Decoctum Chinae* eine Mischung aus 6 Unzen des obigen *Decoctum Chinae factit.*, 2 Unzen *Decoct. Chinae* u. 1 Drachme Chinapulver. — Statt der ehemals gebräuchlichen Mixturen, in denen man verschiedene Präparate der China verband (z. B. *Decoct.*, Pulver, Extract u. Tinctur zugleich), die selbst die Kasse Wohlhabender stark angriffen, die man aber, namentlich bei Wechselfiebern, manchmal nicht entbehren konnte, reicht man jetzt wohlfeiler u. besser die China-Alkaloïde.

Innerl. zu Gr. 15–Dr. 2, einigemal tägl. [Die grösseren Gaben jedoch nur bei Wechselfiebern. — Bei Quotidianen u. Tertianen *Unc. 1–1½*, bei Quartanen wenigstens *Unc. 2*, auf die Apyrexie vertheilt; (börsartige Fieber machten sonst wohl noch grössere Dosen nöthig — jetzt die Alkaloïde). — Und zwar bei Wechselfiebern in der Regel in Pulver oder, was eigentlich dasselbe ist, in Schüttelmixturen. Wo das Pulver nicht vertragen wurde, versuchte man sonst wohl noch eine Latwerge, etwa wie R₂₇₇, oder Decocte mit Extract und Tinctur zugleich, oder — in 3facher Dose der China — einen kalten Aufguss, mit einem aromatischen Wasser oder mit Wein bereitet; jetzt giebt man in solchem Falle lieber die Alkaloïde. Wo es, z. B. bei börsartigen, concomitirten Fiebern, auf schnelle Tügung der Anfälle ankam, reichte man sonst wohl das Pulver nur einige Stunden vor dem Anfall in mehreren steigenden Gaben; jetzt zweckmässiger die Alkaloïde. Eben so verdienen jetzt die Alkaloïde den Vorzug, wo bei Quotidianen die Apyrexien für den Gebrauch der Rinde zu kurz sind. — Bei hartnäckigen Wechselfiebern, wo man sonst zu zusammengesetzten Chinamixturen seine Zuflucht nahm, jetzt die Alkaloïde (oder Arsenik u. a. Mittel). HORN empfiehlt für diesen Fall, den letzten 2–3 Gaben Chinapulver 20–30 Tropfen einer aus *Ol. Caryophyll.*, 2, *Tinct. Opii simpl.* 3, *Aether sulph.* 6 bestehenden Mischung zuzusetzen. — Wo bei den verschiedenen im Obigen angedeuteten Fällen die Alkaloïde allein nicht ausreichen wollen, setzt man ihnen bisweilen noch etwas China in Substanz oder (häufiger) Opium (auch wohl *Morphium acet.*), Belladonna, Eisenpräparate p. p. zu. — Für leichtere Fälle und wo der Eintritt des Anfalls zu einer bestimm-

ten Zeit geschieht, dürfte die ökonomische Methode neuerer Ärzte nachahmenswerth seyn, die Rinde (oder eine entsprechende Quantität schwefels. Chinina, s. den Artikel) bloss kurz vor dem Anfall in nicht beträchtlichen Gaben zu geben; so z. B. nach NASSE: 1 Stunde vor dem Anfall $\frac{1}{4}$ Drachmen mit einem Paar Gran Zimmt od. dgl., und eine gleiche Dose in dem Augenblick, wo das erste Frösteln empfunden wird; danach bleibt in der Regel der nächste Anfall aus, doch soll man Sicherheits halber vor demselben das Verfahren noch einmal wiederholen. Andre Ärzte empfehlen ähnliche oder etwas grössere (BERNDT kleinere) Dosen in ähnlicher Art zu reichen, oder das Verfahren mehr als 2mal zu wiederholen. Keinen besondern Beifall scheint das von RICHTER, SUFFERT u. A. empfohlene Verfahren zu finden, wonach im Paroxysmus selbst (und zum Theil auch vor und nach demselben) ein Paar Dosen gereicht werden. Doch theilen wir unten die ähnliche Vorschrift von SINOGOWITZ mit. — Die flüssigen Auszüge der China dienen jetzt hauptsächlich nur für andre Krankheiten, ausgenommen etwa Auszüge mit Säuren, worin die Alkaloides in reicherm Maasse enthalten sind, wie wir deren ein Paar unter diesem Artikel und unter *Cort. Chin. regiae* aufführen (Ry 282, 294).] In der Regel, um die Verdauung zu unterstützen, mit Zusatz von Gewürzen, Ölzuckern, aromat. Tincturen oder Äther. [Diese Mittel sind zugleich Geschmacksorigentien, und zwar in der Regel bessere als Syrupe (unter denen hier der *Syr. Zingib.* noch am ersten passt). Überhaupt aber ist die Bitterkeit der China eine den meisten Kranken nicht unangenehme; man macht deshalb auch nur selten, bei Leckerzungen, Kindern, Damen, von den bald anzugebenden wohlgeschmeckenderen Formen — Morsellen, Schokolade u. s. w. — Gebrauch.]

In Pulver [sehr fein gepulvert. Ausser den gewöhnlichen aromatischen oder ätherisch-ölgigen Zusätzen sucht man es auch noch durch mancherlei andre Hilfsmittel den Verdauungsorganen erträglicher zu machen: nach Umständen eröffnende oder anhaltende Zusätze od. Nebenmittel; wenn es bei empfindlichen Personen gleich nach dem Verschlucken Magendrücken, Übelkeit, Erbrechen erregt, kleine Gaben Hoffmannstropfen vorher oder gleich hinterher genommen. Soll es in chronischen Krankheiten in kleinen Dosen unhaltend gebraucht werden, so kann man es Morgens und Nachmittags (doch nicht gleich nach dem Essen) im Kaffee nehmen lassen. U. s. w. — Ry 1033 (*Tart. stibiat.*). — BAGLIV's u. SELLE's Fieberpulver: Scr. 1 mit *Ammon. muriat. ferrugin.* (vgl. den Artikel) Gr. 2 und 1 Gran Zimmt, 4-5mal tägl.], Morsellen, Pillen [Ry 32 (*Acid. phosphor.*)], Bissen, Latwerge [Ry 277, 278; 100 (*Ammon. muriat. dep.*)], Schütteltränken [auf 1 Unze wenigstens 8-10 Unzen Flüssigkeit, am besten Wein; z. B. nach NEUMANN 1 Unze Rinde mit etwas Zimmt od. Ingwer, fein gepulvert, in 8 Unzen weissen Franzweins, binnen 8 Stunden *ad libitum* zu verbrauchen, und zwar, wenn man bestimmt den Eintritt des Anfalls vorherweist, in den nächsten 8 Stunden vor demselben, sonst sogleich nach Beendigung des Anfalls. Rines ganz ähnlichen Schütteltranka, doch aus *China regia* u. Rothwein, bedient sich SINOGOWITZ, ein Drittel zu Anfang der Fieberhitze, das 2te $\frac{1}{4}$ St. darauf, das 3te wieder nach $\frac{1}{4}$ St. zu nehmen.]; endlich in Aufgüssen u. Abkochungen [stets gröblich gepulvert. — HERMSTÄDT's Rath, zum Ausziehen der China etwas Wein oder *Acet. concentr.* (Dr. $\frac{1}{2}$ auf jede Unze der Rinde) zu nehmen, ist sehr beachtungswerth. — Besonders gut vertragen werden die Aufgüsse (Dr. 4-6 auf Unc. 6, 2stündl. 1-2 Essl.), namentlich die kalten; der kalte wässrige Aufguss ist bei gleicher Verdaulich-

keit wirksamer als das kalt bereitete Extract; auch der kalte weinige Aufguss, mit weissem Franzwein, ist beliebt. — Die Abkochung (Unc. 1 mit Unc. 12 od. 16 auf Unc. 8, 2stündl. 1-2 Essl.) ist zwar tonisch und zusammenziehend, aber auch (durch stärkeren Gerbstoff- und Harzgehalt) weit schwerverdaulicher als die Aufgüsse; sie bekommt deshalb oft weniger gut, und vielleicht ist dies die Ursache, weshalb manche Praktiker von ihr behaupten, sie besitze weniger von den eigenthümlichen Heilkräften der China (ein chemischer Grund dafür lässt sich nicht absehen) und sey deshalb eher als andere Präparate durch wohlfeilere Mittel zu ersetzen. Sie trübt sich beim Erkalten stark (durch Absatz von Gerbstoff-Stärkmehl, Chinarothe-Cinchonin oder-Chinin, einer fetten Materie und etwas Harz) und muss deshalb, damit das sich Ausscheidende dem Kranken nicht verloren gehe, heiss colirt (vgl. I. S. 156) und beim Gebrauch umgeschüttelt werden. Mehrere früher vorgeschlagene Weisen, dieser Trübung abzuhelfen, beeinträchtigten die Wirkung; beachtungswerth scheint nur noch der Vorschlag, Salmiak (etwa Scr. 1 auf 1 Unze der Rinde) *sub finem coctionis* zuzusetzen: dieser macht die Abkochung etwas klarer, indem er die Auflösung der harzigen Theile begünstigt. Durch einen Zusatz von *Spir. nitrico-aeth.*, wenn dieser, wie gewöhnlich, etwas sauer reagirt, wird die Abkochung schmutzig grün. — Ry 279-283; 920 (*Rad. Serpent. Virg.*); 1036 (*Tart. stibiat.*). Verb. m. *Jich. Iod. s.l.* S. 288. — Das *Infus. Chinae c. Magnes. usta* PH. HANN. (China Unel 1, Magn. Dr. 2, Aq. destill. Unc. 12; 24 St. macerirt, dann filtrirt; es soll zu 2 Esslöffeln 2stündl. bei Kranken, welche die Rinde weder in Substanz, noch in Abkochung, noch im heissen Aufguss vertragen, gegeben werden, selbst als Fiebermittel) ist eine wenig wirksame, theure (die angegebene Quantität kostet 22 Mgr.), wohl nur noch bei Wenigen beliebte Vorschrift. Das *Vinum Chinae martiatum* derselben Pharmacopöe, eine schwärzliche Tinte, ist noch weniger empfehlenswerth (und durch Verbindungen der Alkaloide oder Alkaloidsalze mit Eisentincturen, jede Einzelgabe in weissem Franz- oder spanischem Wein genommen, wohl zu ersetzen)].

Seltenere Darreichungsformen sind: Chinaschokolade [Ry 284], Chinakaffee [des Morgens 1-2 Theelöffel grüßlichen Chinapulvers mit einem Zusatz von Kaffee (die Hälfte od. gleiche Theile), wie Kaffee zubereitet, mit vielem Zucker und Milch]. Chinabier s. unt. *Cort. Chin. reg.*

Ausserl. gepulvert zu Zahnpulvern [Ry 286; 220, 221 (*Carbo ppt.*)], Zahnlatwergen [Ry 287], Zahnfleischlatwergen [ein Beispiel I. S. 303], Cataplasmen [bei Gangrän, Decubitus u. s. w. — mit Campher, Arnica, Kamillen, Weingeist, Terpenthinöl u. dgl. — Ry 288], Salben [Ry 289], Streupulvern [hier wohl oft durch Kohle, Kamillen, Campher p.p. zu ersetzen. — Ry 155 (*Bals. Peruv.*), 208 (*Camph.*)]; infundirt oder abgekocht [und in mannigfaltigen Verbindungen mit Auszügen von *Hb. Scordii*, *Salv.*, *Rut.*, *Flör. Chamom. vulg.*, *Arnic.*, mit Campherspiritus, Myrrhentinctur u. dgl.] zu Mund- u. Gurgelwässern [Ry 285], Zahntincturen [Ry 117], Klystieren [selten; etwa die (im Verhältniss zur innerlichen) 3fache Gabe; damit es nicht zu rasch ausgeleert werde, etwa mit Scr. $\frac{1}{2}$ Opiumtinctur. — Ry 195 (*Camph.*)], auch wohl anderen Einspritzungen [wenn aber diese nur sehr

kurze Zeit in der Hölle verbleiben, ist es um die, ihre Wirkung nicht so rasch entfaltende China schade, und wohlfeilere Mittel thun wohl dasselbe]; zu Waschungen [selten und aus dem unter Einspritzungen angegebenen Grunde nicht recht passend. — Man hat wohl bei Reichen in (anhaltenden) Fiebern den ganzen Körper mit einem Chinaabud waschen lassen], Fomentationen [zu Augenbähungen wohl ein weiniges Infusum, Dr. 2-4 auf Unc. 4], Bädern [gegen Wechselfieber zarter Kinder tägl. 3 Unzen mit $1\frac{1}{2}$ Quart Wasser gelinde gekocht, die Colatur zum Bade: STIEBEL. — Zu stärkenden Bädern L. 1, wenn es der Kranke bezahlen kann], Verbandwässern.

Man wendet auch wohl das Chinapulver zur Ausfüllung von Leinwandsäckchen statt der Pessarieu an, doch thut hier Eichenrindenpulver, etwa noch mit Kamillenblumenpulver verbunden, gewiss dasselbe. — China - Gürtel und Kamisöler, China - Breiumschläge oder Fussbäder zur Heilung von Wechselfiebern, oder China - Kissen (wie Kräuterkissen) als Prophylacticum gegen Cholera, anzuwenden, ist unnütze Verschwendung.

Vgl. auch die Formeln unter *Cort. Chin. regius*.

277.

Ry *Pulv. subtiliss. Cort. Chin. fusc. Dr. 6*
— *Rad. Valer. min.*

Extr. Aurant. Cortic. ana Dr. 1

Syr. — — q. s.

ut f. *Electuar. D. S.* Stündl., umgerührt, 1 Theelöffel. (S. oben S. 129 Z. 17, 16 v. u.) RICHTER.

278.

Ry *Pulv. subtiliss. Cort. Chin. fusc. Unc. 1*
— *Rad. Valer. min. Unc. $\frac{1}{2}$*

— *Cass. cinnam. Scr. 1*

Mell. despum. q. s.

ut f. *Electuar. D. S.* Auf 4mal, umgerührt, zu nehmen. (Bei regelmäßig verlaufenden mit nervösen Zufällen begleiteten Wechselfiebern.) BRERA.

279.

Ry *Cort. Chin. fusc. gross. pulv. Unc. 1*
Cass. cinnam. gross. pulv. Dr. 1
Aq. comm. q. s.

macera, subinde terendo, per 36 horas; Colat. fortiter expr. Um. 9 adde

Spir. sulph. aeth. Dr. 1.

M. D. S. 2stündl. $1\frac{1}{2}$ Essl.

280.

Ry *Cort. Chinae fusc. Unc. $1\frac{1}{2}$*

Ligni Quassiae Unc. 1

Cassiae cinnam. Dr. 2.

Gross. pulv. M. D. S. Mit 1 Quart weissen Franzweins zu übergiesen, 3fters umzuschütteln, nach 48 St. durchzusiehen und auszupressen; 3mal tägl. 1 Weinglas.

281.

Ry *Cort. Chin. fusc. gross. pulv. Unc. $1\frac{1}{2}$*
Flaved. Cort. Aurant. Curassav. conc. Unc. $\frac{1}{2}$

Vini Gallici albi L. 2.

Digere per 6 horas. Colat. D. S. 4mal tägl. $\frac{1}{2}$ Weinglas.

282.

Ry *Cort. Chin. fusc. gross. pulv. Unc. 1*
Aceti concentr. Dr. $\frac{1}{2}$

coque c. Aq. comm. L. 1 ad Colat. Unc. 8, cui refriger. adde

Syr. Zingib. Unc. 1.

M. D. S. 2stündl., umgeschüttelt, 1-2 Essl.

283.

Ry *Cort. Chin. fusc. gross. pulv. Unc. 1*
coque c. Aq. comm. L. 1, sub fin. coct. addendo

Rad. Valer. min.

— *Angelic. ana Dr. 2*

ad Colat. Unc. 7, cui refriger. adde

Spir. acetico-aeth. Dr. 1

Syr. Zingib. Unc. 1.

M. D. S. 2stündl., umgeschüttelt, 1 Essl.

284.

R. Sem. Cacao leviter tosti et excort.
Unc. 3Cort. Chin. fusci Unc. $1\frac{1}{2}$

Sacch. albi Unc. 4

Balsami Peruviani Dr. $\frac{1}{2}$.M. f. Pulv. D. S. Chinascokolade,
2 Essl. voll mit 3 Tassen Wasser oder
Milch zu kochen. NIEMANN.

285.

R. Cort. Chin. fusci gross. pulv. Unc. $\frac{1}{2}$
coque c. Aq. comm. Unc. $7\frac{1}{2}$ ad Co-
lat. Unc. 4, cui refrigerat. adde

Tinct. Myrrhae Dr. 1

Spir. Cochlear. Dr. 2

Mellis rosati Unc. $\frac{1}{2}$.M. D. S. Mundwasser. (Bei brandiger
Halsentzündung eines Kindes umgeschüt-
telt einzuspritzen.) WENDT.

286.

R. Cort. Chinae fusci Dr. 6

† Ligni Santali rubri Dr. 2

Ol. Caryophyllor.

— Bergamott. ana Gtt. 3.

M. f. Pulv. subtilis. D. in scatula.
S. Zahnpulver. (HUFELAND.)

287.

R. Cort. Chin. fusci Dr. 2

Rad. Irid. Flor. Dr. 1

Myrrhae

Sang. Draconis ana Dr. $\frac{1}{2}$.

Subtilisq. pulveratis adde

Ol. Caryophyllor. Gtt. 6

— Cass. cinnam. Gtt. 3

Mell. rosati q. s.

ut f. Electuar. D. in pyxide alba. S.
Zahnlutwerge.

288.

R. Camphorae c. Spir. V. trit. Dr. $1\frac{1}{2}$

Cort. Chin. fusci sublt. pulv.

Carbonis ppt. ana Unc. 1

Ol. Terebinth. rst. q. s.

ut f. Cataplasma. D. S. Umgerührt
einen Theil davon auf die kranke Stelle
zu legen. (Bei Gangrän, Decubitus.)

BERENDS.

289.

R. Camphorae c. Spir. V. trit.

Myrrhae pulv. ana Dr. 1-2

Cort. Chin. fusci pulv.

Carbon. ppt.

† Ungt. de Styrace*) ana Dr. 6

Olei Terebinth. rst. q. s.

ut f. Ungt. D. S. Verbandsalbe (für
faulige u. brandige Geschwüre).

RUST.

*) q. R. 995; hier aber auch wohl durch
Ungt. Elemi mit etwas Bals. Peruv. zu
ersetzen.

Cortex Chinae regius. China regia s. Calisaya.

Cortex regius. — Cort. Chinae flavus. China flava. [Die beiden letzten Benennungen vermeidet man zweckmässig, da sie eine Verwechslung mit anderen Sorten zulassen.] Königschinarinde. [Während die unter der Benennung Cort. Chin. fuscus s. Peruvians umlaufenden Sorten hauptsächlich nur Cinchonin enthalten, enthält die China regia hauptsächlich Chinin; überhaupt ist ihr Alkaloidgehalt der beträchtlichste unter allen Chinasorten und ihr Gehalt an Chinarothe geringer als bei den anderen officinellen. Sie verdient deshalb als Fiebermittel und als Amarum den Vorzug vor der braunen, ist auch leichter assimilirbar. (Übrigens die Hauptbestandtheile wie bei der vorigen.) — 1 Unze cont. $4\frac{1}{2}$, gr. pulv. $4\frac{3}{4}$, sublt. pulv. $5\frac{1}{2}$ Sgr.] Cave wie bei der vorigen.

Innerl. wie die vorige. [Pulver: R. 290, 291; 97 (Ammon. mur.

dep.); vgl. *Hb. Bellad.* — *Pulv. Chinae reg. c. Cinnamomo s. Pulv. febrifugus* PH. MIL.: China Dr. $\frac{1}{2}$, Zimmtcassie Gr. 5, p. dosi. — Morsellen: ein Beispiel I. 8. 230. — Latwergen: Ry 292; 1044 (*Tereb.*). — Schütteltrank v. SINOLOWITZ s. S. 130. — Decocts: Ry 293, 294; 894 (*Roob de LAFFECTEUR*). — *Decoct. Cort. Chin.* PH. P.: 1 mit 16 auf 8; *Decoct. Cort. Chin.* PH. MIL. hat dasselbe Verhältniss, lässt aber zwischen *China regia* und *fusca* die Wahl. — In Berlin lässt Dr. A. SACHS ein Chinabier als Geheimmittel bereiten, welches, zu 1-2 Flaschen tägl. gebraucht, leichter zu vertragen, auch wohlschmeckender und wohlfeiler seyn soll als das *Decoct*; vgl. HUFELAND u. OSANN *Journ.* Bd. 70. St. 3. S. 120.]

Ausserl. wie die vorige.

Vgl. auch die Formeln unter *Cort. Chin. fusc.*

290.

Ry *Cort. Chin. regii* Dr. 6

Elaeos. Aurant. Cort. Dr. 3

Tinct. Opii croc. Gtt. 24.

M. f. *Pulv. subtiliss. Div.* in 12 part. aeq. D. in charta cerata. S. In der Apyrexie 2stündl. 1 Pulver. (Gegen einfach nervöse Wechselfieber.)

BERENDS.

291.

Ry *Opii* Gr. 1

Tartari stibiati Gr. 2

Cort. Chin. regii Unc. 1.

M. f. *Pulv. subtiliss. Div.* in 4 part. aeq. D. S. 2stündl. 1 Pulv. (Bei perniciosen Fiebern. — Italienische Spitalformel. — Freilich schwer zu schlucken.)

292.

Ry *Cort. Chin. regii subtiliss. pulv.*

Unc. $\frac{1}{4}$

Rad. Calami decorticat. pulv. Dr. $\frac{1}{2}$

Oxymell. scillit. Unc. $\frac{1}{2}$

Succi Junip. inspiss. Dr. 2

Aq. comm. q. s.

ut f. *Electuar.* D. S. Alle 3-2 St., umgerührt, 1 Theelöffel. (Gegen Wassersucht nach Wechselfieber.)

G. A. RICHTER.

293.

Ry *Cort. Chin. reg. gross. pulv.* Unc. 1

coque c. *Aq. comm. q. s.* per $\frac{1}{4}$ hor. ad Colat. Unc. 8, cui terendo admisce

Sacch. albiss. Dr. 3

Tartari depur. Dr. 2-3

Cort. Chin. reg. subtiliss. pulv. Dr. 3.

Tandem adde

Spir. muriatico-aeth. Dr. $1\frac{1}{2}$.

M. D. S. In der fieberfreien Zeit alle 2 St., umgeschüttelt, 1 Essl.

WENTZKE (nach P. FRANK).

294.

Ry *Cort. Chinae regii cont.* Unc. 1.

In vas fictile immissae affunde

Aq. comm. fervid. Ung. 4

Acidi muriatici Dr. 2.

Bene mixta macera per noctem. Tum adde

Aq. comm. fervid. Unc. 20

et coque leniter ad Colat. Unc. 8. D. —

In der Apyrexie halb oder ganz zu verbrauchen.

Decoct. Chin. reg. c. Acido muriat.

PH. MIL.

Enthalte ungefähr 15 Gran salzsauren Chinins. Ist aber übel zu nehmen (da gar kein Corrigens dabei — man könnte etwa noch 2 Unzen *Syr. Cort. Aurant.* oder 1 Unze *Syr. simpl.* und 2 Dr. *Tinct. aromat.* zusetzen), greift auch nach G. A. RICHTER leicht den Magen an (wohl hauptsächlich durch die Salzsäure; man könnte deshalb weniger Säure nehmen: 2 Scrupel derselben reichen zur vollkommenen Ausziehung der Alkaloide hin); dürfte also nicht in allen Fällen die directe Darreichung des (im Preussischen nicht officinellen) salzs. Chinins ersetzen.

Cortex Chinae ruber. Rothe Chinarinde. [Sie enthält beide Alkaloide in ungefähr gleichem Verhältnisse, steht im Ganzen an Alkaloidgehalt der Huanuo nach, übertrifft jedoch die übrigen unter den Benennungen *China fusca* oder *Cort. Peruvianus* umlaufenden Sorten. Sie enthält auch weit mehr Chinarothe als alle andern officinellen Sorten, wird dadurch besonders adstringirend und schwerverdaulich und deshalb, da es uns an wohlfeileren Adstringentien nicht fehlt, selten gebraucht. — 1 Drachme cont. 2 Sgr., sub^{t.} pulv. 2½ Sgr.] Wie *Cort. Chin. fuscus*. [Gepulvert, mit 2 Theilen Schnupftaback, wie gewöhnlichen Taback zu schnupfen: RICHET bei Gesichtsschmerz. — R_x 295.]

295.

R_x *Cort. Chin. rubri subtiliss. pulv.* Dr. 1
Ol. Amygdal. Dr. 2
 † *Medullae Bovis liquefact. et colatas* Dr. 6
tere usque ad perfect. refrigerat., sub

*fin. addendo**Ol. Bergamott.* Gtt. 6*Bals. Peruv.* Gtt. 20.*D. in olla alba. S. Pomade.* (Gegen das Ausfallen der Haare.)

AUBERGIER.

* ***Cortex Citri.*** Citronenschale. [Hauptbestandtheile: äther. Öl und Bitterstoff. — 1 Unze conc. 1½ Sgr.] *Cave* Salzbilder; salzsaur. Eisen, schwefels. Eisenoxydul.

Innerl., von dem unkräftigen inneren weissen Mark befreit, *Flavado Corticis Citri*, zu Scr. 1-2, wie *Flavado Cort. Aurant.*, doch selten. — Die eingemachten Schalen, *Citronat*, *Corticis Citri conditi* [vom Apotheker oder vom Conditor od. Pfefferküchler zu entnehmen], diätetisch, auch wohl in Morsellen [I. S. 229].

Auch wohl äusserl. als Rubefaciens [das Gelbe von frischen Citronen recht fein abgeschnitten u. mit der inneren Seite auf Schläfe od. Backe gelegt — bei Kopfschmerz, Zahnschmerz].

* ***Cortex Geoffroae Surinamensis.*** Geoffröen-, Kohlbaum- od. Wurm-Rinde (von Surinam). [Hauptbestandtheil Surinamin (Sub-Alkaloïd). — 1 Unze conc. 2½, sub^{t.} pulv. 3 Sgr.] *Cave* Eisen-, Blei- u. Kupfer-Salze, salzsaur. Gold, salpetersaur. Silber; eisengrünenden Gerbstoff [doch wird man nicht leicht wegen zu vermeidender Verbindungen in Versuchung kommen, da, etwa aromatische Zusätze aufgenommen, kaum Verbindungen beliebt sind].

Innerl. zu Scr. ½ - Dr. ½ einigemal tägl. In Pulver u. pulveraufnehmenden Formen [selten, weil sie in diesen Formen leicht zu sehr purgirt]; meist in Abkochung [Unc. 1 mit Unc. 12 auf Unc. 7, zur Colatur etwa 1 Unze *Mel despum.*, 2stündl. 1-2 Essl. (Kindern verhältnissmässig weniger, doch, wie bei allen Wurmmitteln, nicht um so viel weniger als bei andern Mitteln): G. A. RICHTER. Oder eine etwas grössere Gabe nur einmal tägl.: Dr. 3 (mit Unc. 12) auf Unc. 8, dazu *Aq. Flor. Aurant.* Unc. 1, Morgens nüchtern auf einmal oder doch rasch hinter einander (für Erwachsene): VOLTELEN].

Aüsserl. zu Klystieren [etwa Unc. 1 mit L. 1 auf L. $\frac{1}{2}$ gekocht, dazu Mell. comm. Unc. 1; — Kindern weniger].

Cortex Hippocastani. Rosskastanienrinde. [Hauptbestandtheile: Gerbstoff und bitterer Extractivstoff. — 1 Unze conc. 1 Sgr., gr. pulv. $1\frac{1}{2}$, sub. pulv. $1\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerl. zu Scr. $\frac{1}{2}$ -Dr. $\frac{1}{2}$, mehrmals tägl.; in Pulver [unangenehm zu nehmen; also nur etwa bei Wechselfiebern. Z. B. nach HUFELAND stündl. Scr. $\frac{1}{2}$ mit 3 Gran Ingwer oder Pulv. aromat., so dass Unc. $\frac{1}{2}$ -1 in der Apyrexie verbraucht werden (wenn es den Magen beschwert, etwas Tinct. Absinth. oder Wein; erregt es Erbrechen, 1 Tropfen Tinct. Opii croc. zusetzen).] oder pulveraufnehmenden Formen [R_y 296]; in Abkochung [in der Regel 1 Unze mit Unc. 16 oder 12 auf die Hälfte gekocht, 2stündl. 1 Essl. — R_y 297. — Die Abkochung schillert; Säuren, Salzbilder heben das Schillern auf, Alkalien erhöhen es].

Aüsserl. wie Cort. Salicis (doch seltner).

296.

R_y Cort. Hippocast. sub. pulv. Unc. $\frac{1}{2}$
Rad. Calami decortic. pulv. Dr. $\frac{1}{2}$
Succi Junip. inspiss. Unc. 3.
M. f. Electuar. D. S. Alle 2-1 St., umgerührt, 1 Theelöffel. (Bei Wassersucht nach Wechselfieber.) SINOWITZ.
Die Latwerge wird sehr dünn; etwas weniger Roob (Unc. 2) wäre wohl passender.

297.

R_y Cort. Hippocast. gross. pulv. Unc. $1\frac{1}{2}$
coque c. Aq. comm. Unc. 18 ad Colat.
Unc. 9, cui refrigerat. adde
Spir. sulph. aeth. Dr. 1-2
Syr. Cort. Aurant. Unc. 1.
M. D. S. In der Apyrexie zu verbrauchen.

VOIGTEL,

Cortex Mezerei. Seidelbastrinde. Kellerhals-, Pfefferstrauch-Rinde. [Hauptbestandtheile: ein durch Beimischung eines äther. Öls scharfes Harz und ein in Wasser schwer, in Alkohol u. Äther leicht auflöslicher Bitterstoff (Seidelbastbitter, Daphnin). — 1 Unze $1\frac{1}{2}$, conc. $1\frac{2}{3}$, sub. pulv. $2\frac{2}{3}$ Sgr.]

Innerl. in Abkochung [Dr. $\frac{1}{2}$ -1-2 auf den Tag: meist in Pütsenform, etwa mit Unc. 16 auf L. 1 gekocht, 4mal tägl. 1 Tasse; man corrigirt die Abkochung durch Glycyrrhiza, entweder indem man doppelt so viel Rad. Glycyrrh. als Seidelbast sub fin. coct. zusetzen lässt, oder (namentlich wenn die Abkochung im Hause des Kranken bereitet wird) durch Succ. Glycyrrh. dep.; gern setzt man auch schleimige u. bitter gewürzhafte Dinge zu. — R_y 298; 898 (Rad. Sarsapar.)].

Aüsserl. als Exutorium in Substanz [entweder die frische Rinde, oder die trockene in Wasser oder Essig aufgeweicht; die Rinde der dicken Äste ist kräftiger. Man reibt die Hautstelle mit in Essig getauchtem Flanell roth, legt dann ein Stück Rinde, etwa 1-2 Zoll u. $\frac{1}{2}$ Zoll breit, auf, und befestigt es mit einer Binde oder mit Heftpflaster; man erneuert es 2mal tägl., bis sich (gewöhnlich am 2ten, 3ten Tage) die Oberhaut ablöst, dann aber (ohne vorheriges Reiben) nur etwa alle 2 Tage, und nun nicht mehr zu lange, weil sonst wohl böse Geschwüre entstehen; wünscht man daher eine lange anhaltende Reizung, so wech-

selt man von Zeit zu Zeit die Stelle. Die entstandene Absonderung der Haut leitet man — befördernd oder mässigend — nach allgemeinen Regeln. — Selten wendet man Seidelbaststreifen zum Einbringen statt eines Haarseils an, weil dies leicht schlechte Eiterung macht.], auch als Streupulver [mit etwas Essig, Meerzwiebelassig oder Cantharidentinctur befeuchtet; so besonders zur Wiederherstellung unterdrückter abnormer Hautsecretionen, namentlich auch der *Intertrigines*, „Fratten“, der Kinder. Man kann das befeuchtete Streupulver etwa mit Baumwolle auflegen u. diese gehörig befestigen. — Selten als reizendes Einstreupulver in Geschwüre, z. B. zur Unterhaltung von durch Blasenpflaster erzeugten künstlichen Geschwüren]. In geringerem Grade epispastisch wirken **Auszüge** [am kräftigsten noch ein geistiges Digestionsinfusum; doch sind Abkochungen, etwa Dr. 2 - Unc. $\frac{1}{2}$ mit Unc. 8 auf Unc. 6, als Umschlag, z. B. bei Knochengeschwülsten, Gichtknoten u. dgl., gebräuchlicher], Cataplasmen [zur Abkochung Semmelkrume *q. s.* zugesetzt], Salben [Ry 299. — Seidelbastpulver mit *Liq. Ammon. caust.* ana und 4 Theilen Schweinefett: BECK zur Bildung einer eiternden Fläche, namentlich um vom Auge abzuleiten.]. Selten als Gurgelwasser [Dr. 1-2 mit L. 1 auf L. $\frac{1}{2}$ gekocht], zu Injectionen [Verbindung m. *Liq. Ammon. caust.* s. dort].

298.

Ry *Cort. Mezer.* Dr. 2 - Unc. $\frac{1}{2}$
Rad. Bardan. Unc. 1
coque c. Aq. comm. L. 4 *ad Colat.* L. 3,
sub fin. coct. addendo
Stipt. Dulcam.
Hb. Millefol.
Rad. Glycyrrh. ana Unc. $\frac{1}{2}$.
Colat. D. S. 3-4 mal tägl. 1 Tasse.

299.

Ry *Adipis suilli* Dr. 5
Cerae flavae Dr. $\frac{1}{4}$.
Liquefactis addo

Cort. Mezer. incisi et pauillo Aq.
humectati Dr. 2.

Coque usq. ad humoris evaporationem,
cola et cum refrixerint, tere exactis-
sime. D. — PH. GALL.
 Zum Offenhalten von künstlichen Geschwüren, zumal wo Canthariden leicht Strangurie machen; nöthigenfalls noch durch Dr. $\frac{1}{2}$ Euphorbium zu verstärken. — Die PH. GALL. schreibt zu ihrer Salbe (*Pomade de Garou*) eigentlich die Rinde von *Daphne Gnidium* vor; doch darf man unbedenklich die Seidelbastrinde substituiren.

Cortex Nucum Juglandis viridis. *Putamen Nucum Juglandum.* Grüne Wallnussfchale. [Hauptbestandtheil: ein eigenthümlicher, scharf-bitterer und adstringirender Extractivstoff (Wallnussbitter). — 1 Unze conc. 1 Sgr.] *Cave* Salzbilder, Metallsalze; thier. Leim, Eiweiss, Kleber, Stärkmehl. — Innerl. in Abkochung [Unc. $\frac{1}{2}$ - 1 mit Unc. 9 auf Unc. 6, tägl. zu verbrauchen. — Ry 893 (*Decoct. POLLINI*)]. — Äusserl. abgekocht zu Umschlägen, Verbandwässern.

Cortex Pomi Granati. *Cortex Granatorum. Mallicorium.* Granatäpfelschale. [Hauptbestandtheile Gerbestoff und bitterer Extractivstoff. — 1 Unze conc. 1 Sgr.]

Innerl. zu Scr. $\frac{1}{2}$ - Dr. $\frac{1}{2}$ mehrmals tägl., in Pulver und pulveraufnehmenden Formen, häufiger in Abkochung [Unc. 4 mit Unc. 12-16 auf Unc. 8, 2ständl. 1-2 Essl.; etwa noch mit Zusatz von Rothwein od. dgl.].

Aüsserl. zu Zahnpulvern, Zahn- u. Zahnfleisch-Latwergen; abgekocht [wie zum innerlichen Gebrauch] zu Mund- u. Gurgelwässern, Fomentationen u. dgl.

Cortices Pomorum Aurantii. *Cortex Aurantiorum.* Pomeranzenschalen. Orangenschalen. — Man verordnet sie immer von dem unkräftigen inneren weissen Mark befreit: *C. P. A. a parte interiore alba mundati*, oder kürzer: *Flavedo Cort. Aurant.* [Hauptbestandtheile: äther. Öl und bitterer Extractivstoff. — Die besten sind die Curassavischen, *C. A. Curassavienses*, doch ist der Unterschied nicht so bedeutend, dass man nicht bei Armen immer die gewöhnlichen wählen sollte. — *Flaved.* 1 Unze conc. 4, pulv. $4\frac{5}{8}$ Sgr.; *Curassav.* $1\frac{1}{2}$ Sgr. mehr.] *Cave* empfindlichere Metallsalze [Sublimat, salpetersaures Silber u. s. w.], salzsaures Eisenoxyd.

Innerl. zu Gr. 15-30 einigemal tägl. In Pulver [Ry 300; 614 (*Kali tartar.*), 662 (*Magnes. carbon.*), 888 (*Rad. Salep*)], Morsellen [Ry 401 (*Fab. Pichurim*)], Bissen, Latwerge [Ry 301], Aufguss [Dr. 4-6 auf den Tag. — Auch wohl als Thee, Dr. 2-3 auf eben so viel Tassen. Häufig auch in kaltem weinigen oder wässerigen Aufguss, etwa Unc. 1- $1\frac{1}{2}$ 24 St. macerirt, die Colatur von L. 1 viermal tägl. zu $\frac{1}{2}$ Weinglas. — Ry 302, 303; 273 (*Cort. Cascarill.*), 281 (*Cort. Chin. fusc.*), 837 (*Rad. Colombo*), 842 (*Rad. Galang.*), 843, 844 (*Rad. Gent. rubr.*), 847 (*Rad. Helen.*), 862, 872 (*Rad. Ipecac.*), 885 (*Rad. Rhei*)]. Pomeranzen-Molken [s. I. S. 318 u. Ry 976]. — Diätetisch als eingemachte (überzuckerte) Pomeranzenschalen († *Conditum s. Confectio Corticum Aurantior.* 1 Unze 38hl.), vom Apotheker oder vom Conditor, Pfefferküchler zu entnehmen.

300.

Ry *Caryophyllor.* Gr. 5

Cardam. minor.

Nuc. moschat. ana Dr. $\frac{1}{2}$

Cass. cinnam. Dr. 1

Flaved. Cort. Aurant. Curassav. Dr. 2

Sacch. albi Dr. 3.

M. f. Pulv. D. in vitro. S. Einen Theelöffel voll auf in Wein geweichtem Zwieback zu nehmen. (Bei torpider Magenschwäche.)

301.

Ry *Pulv. Flaved. Cort. Aurant.* Unc. $\frac{1}{2}$

— *subtiliss. Cort. Salic.* Dr. 2

Syr. Cort. Aurant. q. s.

ut f. *Electuar. molle. D. S.* In der Stieberfreien Zeit zu verbrauchen; umgerührt.

RICHTER.

302.

Ry *Flaved. Cort. Aurant.*

Ligni Quassiae ana Unc. $1\frac{1}{2}$

Canellae albae Dr. 2.

Conc. M. f. Spec. D. S. Tägl. den 6ten Theil, mit 3 Tassen kochenden Wassers übergossen, nach 1 St. durchgeseiht, zu verbrauchen.

303.

Ry *Flaved. Cort. Aurant.* Unc. 1
Hb. *Menthaspip.*

Flor. Chamom. vulg. ana Unc. $\frac{1}{2}$.
Conc. M. f. Spec. D. S. Thee auf 4 Tage.

+ *Cortex Pruni Padi.* Traubenkirschen-, Ahlkirschen- od. Faulbaum-Rinde. [Hauptbestandtheile: blausäurehaltiges äther. Öl, eisengrünender Gerbstoff und bitterer Extractivstoff. — 1 Unze *conc.* $1\frac{1}{2}$ Sgr., *subt. pulv.* 2 Sgr.] Innerl. zu Gr. 8–15, einigemal tägl.; in Pulver [so namentlich gegen Wechselfieber], Aufguss, Infuso-Decoct [gewöhnlich so: 1 Unze mit *Spir. V. rst.* Unc. 2, Wasser Unc. 5 digerirt, colirt; der Rückstand mit 8 Unzen Wasser zur Colatur von Unc. 4 gekocht; die beiden Colaturen vermischt; 2stündl. $\frac{1}{2}$ –1 Essl.].

Cortex Quassiae. Quassiarinde. [Hauptbestandtheil bitterer Extractivstoff, mehr als im *Lign. Quass.*; überhaupt enthält sie mehr im Wasser lösliche (darunter auch schwach-narkotische) Theile als dieses, auch etwas gewürzhaften Stoff; es dürfte also wohl unrichtig seyn, dass man sie seltener als das Holz anwendet. — 1 Unze *conc.* $1\frac{1}{2}$, *subt. pulv.* $1\frac{5}{8}$ Sgr.] *Cave* empfindlichere Metallsalze [von Quecksilber, Silber, Gold, Blei], salzsaures Eisenoxyd. — Innerl. in etwas geringeren Gaben, aber in gleicher Art wie *Lign. Quass.*

Cortex Quercus. Eichenrinde. [Hauptbestandtheile: Gerbstoff und Bitterstoff. — 1 Unze *gr. pulv.* 1 Sgr., *subt. pulv.* $1\frac{1}{8}$ Sgr.] *Cave* besonders Metallsalze [mit sanctionirten Ausnahmen, z. B. Ry 7, 8], thier. Leim.

Innerl. selten in Pulver u. pulveraufnehmenden Formen zu Scr. $\frac{1}{2}$ –1 mehrmals tägl., lieber in Abkochung [etwa Dr. 6 oder Unc. 1 mit Unc. 12 auf Unc. 6, 2stündl. 1 Essl.].

Aüßerl. gepulvert zu Zahnpulvern, Schnupfpulvern [Ry 73 (*Alum.*)], Streupulvern [bei Brand — doch hier wohl meist andern Mitteln (China, aromatische Kräuter, Kamillen, Campher etc.) nachzusetzen], zum Ausfüllen von Beuteln statt der Pessarien [etwa noch mit *Flor. Chamom. vulg.*], u. s. w.; häufiger abgekocht [etwa Unc. 1 mit Unc. 12–16 auf Unc. 6–8, oft noch mit Zusatz von etwas Geistigem, Campherspiritus, Rothwein od. dgl. — *Decoct. Querc.* PH. MIL.: Unc. 2 mit L. 2 auf L. 1.] zu Mund- u. Gurgelwässern [Ry 304], Klystieren [Ry 880 (*Rad. Ratanh.*)] u. a. Injectionen [Ry 305], Waschungen [selten], Bähungen [Ry 174 (*Bulbi Allii sat.*)], Bädern [L. $\frac{1}{2}$ –1, mit einigen Quart Wasser stark abgekocht. — Wohlfeiler ist Gerberlohe, aber in grösserer Quantität anzuwenden.], Verbandwässern [Ry 305], Salben [Ry 7, 8 (*Acet. plumb.*)], Dämpfen [3–4 mal tägl. 20 Minuten lang die Dämpfe von Lohbrühe einathmen: ELLIOTSON gegen Lungen sucht].

304.

R_x Cort. Querc. gross. pulv. Unc. $\frac{1}{2}$
coque c. Aq. comm. Unc. 8 ad Colat.
Unc. $4\frac{1}{2}$, cui refrigerat. addo

Spir. camphorati

Mell. rosati ana Dr. 6.

M. D. S. Zum Einspritzen, stark umgeschüttelt, (Gegen brandige Kräune bei Kindern.)

WENDT.

305.

R_x Cort. Querc. gross. pulv. Unc. 1
coque c. Aq. comm. L. 4, sub fin. coct.
addendo

Flor. Chamom. vulg. Unc. $\frac{1}{4}$

ad Colat. Unc. 6, cui refrigerat. addo
Tinct. Myrrh. Dr. 2.

M. D. S. Zum äusserlichen Gebrauch, umgeschüttelt (als Verbandwasser, zu Einspritzungen u. s. w. — Wird oft die China ersetzen können).

† *Cortex Radicum Granatorum.* Granatzelrinde. [Hauptbestandtheile: Gerbe- und Bitterstoff. — 1 Unze cont. 5, pulv. 7 Mgr.] Cave Mineralsäuren; Alkalien; Alaun, Metallsalze; thier. Leim.

Innerl. zu Dr. $\frac{1}{2}$ -1, stündl. oder halbstündl. In Pulver [selten], Abkochung [Unc. 2 mit Wasser L. 2 auf L. 1 gekocht (nach Einigen noch zuvor 12-24 Stunden macerirt oder einige Stunden digerirt, was aber wohl überflüssig), dazu etwa noch Syr. Menth. Unc. 1, und diese Quantität in 3-4 Portionen, in Zwischenräumen von 1 oder $\frac{1}{2}$ St., an einem Morgen verbraucht (nachdem etwa am Tage zuvor schmale Kost und einige Dosen Ricinusöl genommen). Durch Erbrechen, welches wohl auf die erste, auch wohl noch die 2te, Dose, dann aber nicht mehr, erfolge, soll man sich nicht irre machen lassen. Recht zuverlässig nur, wenn kurz zuvor Kübrwurmer abgegangen], am zweckmässigsten wohl im kalten Aufguss [welcher nach DUBLANC jun. am besten extrahirt].

Cortex Salicis. Weidenrinde. [Hauptbestandtheile: Salicin und Gerbestoff. — 1 Unze conc. $\frac{2}{3}$, gr. pulv. 1, subst. pulv. $1\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerl. zu Scr. 1-Dr. $\frac{1}{2}$ mehrmals tägl.; in Pulver [das jedoch seiner Leichtigkeit und Lockerheit wegen unangenehm zu nehmen ist] oder pulveraufnehmenden Formen [Latwerge: R_x 301 (Cort. Pom. Aurant.)]; häufiger in flüssigen Auszügen, und zwar weniger zweckmässig in Aufguss als in Abkochung [Unc. 1 mit Unc. 9-12 auf Unc. 6, 2stündl. 1-2 Essl.] oder Decocto-Ebullition, Infuso-Decoct [R_x 306; diese Vorschrift ist, weil eine so grosse Quantität Substanz angesetzt ist, ausnahmsweise (vgl. I. S. 162-63) etwas wohlfeiler als wenn man eine Decocto-Ebullition mit doppelter Quantität der Substanz daraus machte].

Äusserl. zu Zahnpulvern [R_x 307], Straupulvern [R_x 308]; abgekocht [wie zum innerlichen Gebrauch] zu Mund- u. Gurgelwässern, Einspritzungen, Umschlägen, Bädern [L. $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$, mit 2-6 Quart Wasser auf die Hälfte eingekocht], Verbandwässern, u. s. w.

306.

R_x Cort. Salic. inc. Unc. 4

Spir. Frumenti Unc. 8

Aq. comm. Unc. 16.

Digere per 12 horas; cola; corticem remanentem coque c. Aq. comm. Unc. 30 ad Colat. Unc. 15. Colaturas misce („es werden etwa 10 Tassen seyn“). D. S. Tassenweise zwischen 2 Wechselfieberanfällen zu verbrauchen.

BREMER.

307.

Ry *Cort. Salicis*
Carbon. ppt. ana Unc. $\frac{1}{2}$
Extr. Myrrhae Dr. 2
Bals. Peruv. Scr. $\frac{1}{2}$

Cortex Simarubae. Simaruba- od. Ruhr-Rinde.

[Hauptbestandtheile: Bitterstoff (ein schwach narkotischer) und Schleim. — 1 Unze conc. $2\frac{1}{2}$, sublt. pulv. $2\frac{3}{8}$ Sgr.] *Cave* Säuren, besonders Mineralsäuren; Metallsalze.

Innerl. zu Scr. $\frac{1}{2}$ –1 alle 3 (–2) St.; in Pulver [ungern] u. pulveraufnehmenden Formen; häufiger in Aufguss [Dieser ist wenig schleimig, mehr bloss bitter. Unc. $\frac{1}{2}$ –1 auf Unc. 6, 2stündl. 1 Essl.] und besonders in Abkochung [Unc. $\frac{1}{2}$ mit Unc. 12 auf Unc. 8, 2stündl. 1–2 Essl. Nicht gern viel concentrirter, weil sie sonst unangenehm schleimig wird. — Ry309].

Selten äusserl. zu Klystieren [etwa Unc. $\frac{1}{2}$ mit Unc. 8–12 auf Unc. 4–6 gekocht], (Einspritzungen).

309.

Ry *Cort. Simarub. Unc. $\frac{1}{2}$*
Lichen. Isld. Unc. 1
coque c. Aq. comm. L. $1\frac{1}{2}$ ad Colat.
L. 1, cui refriger. adde

Tinct. aromat. Unc. $\frac{1}{2}$ Syr. Conf. Aurant. Unc. $1\frac{1}{2}$.

M. D. S. 4mal tägl., umgeschüttelt,
2 Essl. VOGEL.

Cortex Ulmi interior. Innere Ulmenrinde; Rüsterrinde.

[Hauptbestandtheile: Schleim und Gerbstoff. — 1 Unze conc. 1, sublt. pulv. $1\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerl. zu 1–2 Unzen tägl. in Abkochung [nicht zu lange gekocht, sonst wird sie zu schleimig und unangenehm; also mit 12, höchstens 16 Theilen Wasser auf 8. — Ry 834 (Rad. Caric. aren.)].

Äusserl. abgekocht [die Abkochung oft noch etwas concentrirter als zum inneren Gebrauch, Unc. 1 mit Unc. 9–10 auf Unc. 5–6] zu Gurgelwässern, Einspritzungen, Waschungen [vgl. Vitriol. alb.], Umschlägen, Bädern [etwa L. 1 mit $2\frac{1}{2}$ Quas Wasser auf $1\frac{1}{2}$], etc.

+ **Creosotum.**

Kreosot. [Farblose, unangenehm riechende, den empyreumatischen Ölen ähnliche, ziemlich ätzende, Flüssigkeit. — Mit Alcohol, Schwefel- und Essig-Äther, concentr. Essigsäure, Steinöl in jedem Verhältnisse zu

verbinden. Löst auch Iod, Alkaloide, Campher, äther. Öle, fette Öle u. Fette, auch etwas Schwefel und Phosphor etc., auf. — 1 Tropfen $\frac{2}{3}$ Mgr., 1 scrup. 8, 1 Drachme 20 Mgr.] *Sol.* 80; die Verbindung mit so viel Wasser heisst vorzugsweise Kreosotwasser, doch werden auch wohl schwächere Auflösungen [wie die, eine Zeitlang gepriesene, *Aqua Binelli* eine zu seyn scheint] so genannt; siedend Wasser 23 $\frac{9}{17}$. [Nach MITSCHERLICH sen. soll das Kr. durch Wasser partiell zersetzt werden.] — *Cave* [mit noch festzustellenden Ausnahmen] Salpetersäure, concentr. Schwefelsäure; Chlor, Brom; kaustische Alkalien u. Erden [wenigstens auf längere Zeit]; Quecksilberoxyd; salpetersaures u. essigs. Quecksilber; salpeters. Silber; salzs. Gold; *Cupr. acet.* und *sulphurico-ammoniat.*; Harze; Eiweiss.

Innerl. zu 1–2 Tropfen (u. mehr), mehrmals tägl. [man rechne 150 Tropfen auf die Drachme]; in Pillen [so gab es z. B. BERNDT in einem Falle von *Diabetes mellit.*, anfangs zu 8 Tr., allmählig bis zu 24, auf den Tag, (mit der ROLLOschen Fleischdiät), mit Erfolg], Mixturen [sehr stark verdünnt]. Als Geruchscorrigens etwa *Aether acet.* od. *sulphur.*, *Ol. Macidis*.

Ausserl. bisweilen pur, häufiger verdünnt. Zu Pinselsäften [10 Tropfen bis Scr. 1 auf 1 Unze Honig od. Syrup], Zahnpulvern [10–20 Tropfen auf 1 Unze], Zahnpillen [nur 5–6 Tr. (die keiner Subaction bedürfen) auf Dr. 1], antodontalgischen Zahnlatwergen [relat. Dose wie bei den Zahnpillen], Zahnfleischlatwergen [auch nur in geringer Quantität, ohne Subaction], Zahntincturen [z. B. Dr. 1 mit *Spir. F. rftiss.* Unc. 2; hiervon so viel in kaltes Wasser zu tröpfeln, dass dieses sich trübt und einen piquanten Geschmack annimmt; damit die Zähne zu bürsten und (freilich unangenehm) den Mund auszuspülen: BUCHNER gegen üblen Geruch von hohlen Zähnen und um der Caries Schranken zu setzen]; auch pur in schmerzende Zähne [mit einem Pinsel oder auf Baumwolle] oder [gegen Zahnschmerzen u. a. rheumat. Affectionen] ins Ohr [1–2 Tr. auf Baumwolle]. Zu Einspritzungen in verschiedene Höhlen [meistens stark verdünnt]. Auf die Haut in Einreibungen [selten pur, meist nur eine mässige Anzahl Tropfen auf $\frac{1}{4}$ Unze Öl oder Fett. — 5–20 Tropfen auf $\frac{1}{2}$ Unze Olivenöl, 2–3mal tägl. auf die kranken Stellen einzureiben: CORNELIANI bei chronischen Flechten und veralteter, nicht durch Störungen im Assimilationssystem erzeugter Krätze; in hartnäckigen Fällen zugleich innerliche Mittel, auch Schwefelräucherungen. (Ob die Methode gefahrlos?)], Umschlägen [3–15 Tropfen auf jede Unze Wasser; z. B. das Kreosotwasser (d. h. etwa 15 Tropfen auf die Unze) zum Fomentiren bei *Impetigo sparsa* und Krätze: WOLFF], Waschungen [etwas stärker als in den Umschlägen]. Auf Wunden als Stypticum [etwa das Kreosotwasser; mit Charpie aufgelegt; freilich unzuverlässig]. Auf Geschwüre in Salben [bis zu Dr. 1 auf $\frac{1}{2}$ Unze Fett], Verbandwässern [etwa das Kreosot-

wasser; doch auch oft noch verdünnter], oder (sonamentlich auf Condylome) aufzupinseln [verdünnt oder pur]. — Zu Einathmungen [ein Bogen Papier mit Kreosot bestrichen, in der Nähe des Kranken aufgehängt].

Creta alba. Weisse Kreide. [Hauptsächlich aus kohlensaurem Kalk bestehend.] Im Nothfall als Hausmittel, wenn man nicht gleich etwas Besseres zur Hand hat, bei Vergiftungen durch Säuren, gepulvert oder geschabt, theelöffelweise.

Crocus. [Der Zusatz *orientalis* ist gegenwärtig unpassend.] Safran. [Hauptbestandtheile: äther. Öl und färbender Extractivstoff (Polychroit). Der Safran wird durch Schwefelsäure dunkelblau, dann braun, zuletzt (bei concentrirter Säure, durch Verkohlung) braunschwarz (so in Ry 43), durch Salpetersäure grün, dann in andere Farben übergehend, gefärbt. — 1 Drachme 5, subtpulv. $5\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerl. zu Gr. 5-20, mehrmals tägl. In Pulver [Ry 167 (*Borax*), 624 (*Lap. Canceri*), 633 (*Magn. carb.*)], Zuckerwerkformen [Bspl. I. S. 236; Ry 845 (*Rad. Glycyrrh.*), 1014 (*Sulph. stib. rub.*)], Pillen [Ry 310; 58 (*Aloë luc.*), 484 (*Hb. Sabin.*)], Bissen [Ry 446 (*Galb. dap.*)], Latwerge [Ry 667 (*Magn. carb.*)], Aufguss [Ry 311; 929 (*Rad. Valer. min.*)]. Zum Conspargiren [I. S. 186].

Ausserl. [wo er nur das Unangenehme hat, die Haut für eine Weile zu färben] zu Augenbähungen [infundirt, etwa Dr. 1-2 auf Unc. 4. — Ry 312], besonders aber zu Cataplasmen [als schmerzstillender Zusatz, besonders zu kleinen, feinen Cataplasmen, z. B. für die Augen — zu grösseren zieht man (schon des Preises wegen) meist *Hb. Conii macul.* oder *Fol. Hyoscy.* vor — scrupelweise; z. B. 4 Loth Semmel mit Milch zum Brei gekocht, gegen Ende des Kochens $\frac{1}{3}$ od. $\frac{1}{2}$ Quentchen Safran zugesetzt, den Brei mässig warm übergelegt: bekanntes Hausmittel. — Ry 817 (*Poma acidula*)]; gepulvert zu Pflastern [officinell: *Empl. oxycroceum* und *Empl. de Galbano crocat.*], auch endermatisch [nur einmal, zu Gr. 6, mit anscheinendem Erfolge, versucht].

310.

Ry *Croci pulver.*

Myrrhae —

Sulph. depur. ana Dr. 1

Fell. Tauri insp. q. s.

ut f. *Pilulas* 150. *Consp. Pulv. Croci.*

D. in vitro. S. 1-2 mal tägl. 12. (Bei Unterleibstockungen, unterdrückter Menstruation.)

G. A. RICHTER.

311.

Ry *Croci Scr. 8*

Flor. Aurant. Unc. $\frac{1}{2}$

— *Chamom. vulg. Unc. 1 $\frac{1}{2}$.*

Conc. M. f. Species. D. in vitro. S. Rinnen gehäuftes Esslöffel voll mit 3 Tassen Wasser anzubrühen. (Ein feines Nervinum.)

BERENDS.

312.

Ry *Croci Dr. 2*

Opti pulver. Gr. 8

Aq. comm. ferv. q. s.

Digere per horam. Liquori colato et

filtrato Unc. 4 *adde*

Mucil. Cydonior. Unc. $\frac{1}{2}$.

M. D. S. Lauwarm mit Lappchen über die Augen zu schlagen. JADELOT.

Cubebae. *Piper caudatum*. Cubeben; Schwanzpfeffer. [Hauptbestandtheile: äther. Öl und scharfes Harz. — 1 Unze $2\frac{1}{2}$, gr. pulv. $3\frac{1}{8}$, subf. pulv. $3\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerl. zu Dr. $\frac{1}{2}$ -2(-4) einigemal tägl., in Pulver [Ry 313, 314. — Im Charité-Krankenhaus zu Berlin gegen *Gonorrhoea secundar.* gewöhnlich in folgender Art: von einem Pulver aus Cubeben und Zucker ana Unc. 1 nimmt der Kranke früh gegen 7 Uhr die Hälfte in $\frac{1}{4}$ Quart wärmer Milch auf einmal, pausirt darauf bis zum Mittag, und nimmt dann von Zeit zu Zeit eine Messerspitze voll, bis gegen 7 Uhr Abends das ganze Pulver verbraucht ist. Nun eine Pause von 2 Tagen, wo der Kranke keine Arznei, nur viel dünnes Getränk zu sich nimmt. Dann am 4ten Tage wie am 1ten. Am 5ten u. 6ten Tage wieder Pause. Am 7ten wieder wie am ersten (sollte auch schon nach der 1ten od. 2ten Gabe der Ausfluss aufgehört haben). Am 8ten ein Laxans aus Calomel u. Jalape. Ist hierdurch das Übel nicht gehoben, so wirken die Cubeben im vorliegenden Fall überhaupt nicht.], Bissen oder (kleinere, nur adjuvirende Gaben) in Pillen [Ry 140, 142 (*Bals. Copaiv.*), 157 (*Bals. Tolut.*)], Latwerge [Ry 144 (*Bals. Copaiv.*)]. Auch wohl überzuckert, *Confectio Cubebarum* [in vielen Apotheken zu finden; doch in dieser Form meist nur kleinere, mehr diätetische Gaben, da das Zerkäuen grösserer Portionen noch unangenehmer als das Einnehmen von Pulvern seyn würde]. Oft in Verbindung oder gleichzeitig mit allerlei symptomatischen Corrigentien [wie z. B. denen in Ry 313, 314; oder auch anderen] je nach etwanigen unangenehmen Nebenwirkungen.

Selten äusserl. [Ry 315.], ausser etwa als Zusatz zu aromatischen Species [nach einigen Pharmacopöen, z. B. der PH. HANN.].

313.

Ry *Rad. Ipecac.* Gr. $\frac{1}{4}$

Cubeborum Dr. $\frac{1}{2}$ -1

Ol. Menth. pip. Gtt. $\frac{1}{2}$.

M. f. Pulv. Disp. tales nr. —. *D. in charta cerata. S.* 4mal tägl. 1 Pulver.

(SCHMIDT.)

314.

Ry *Extr. Conii macul.* Gr. $\frac{1}{4}$

Concharum ppt. Gr. 5

Cubeborum Dr. $\frac{1}{2}$ -1.

M. f. Pulv. Disp. tales nr. —. *D. in charta cerata. S.* 4mal tägl. 1 Pulver. (SCHMIDT.)

315.

Ry *Cubeb. contus.* Unc. $\frac{1}{2}$

Aq. comm. fervid. Unc. 8

repose ad refrigerat. In Colat. solve

Extr. Belladonn. Scr. $\frac{1}{2}$.

D. — (Zu Injectionen gegen Leukorrhöe. — Engl. Spitalformel.)

† **Cucumeres.** Gurken. — Ausser diätetischem Gebrauch auch der [hauptsächlich Zucker, viele Salze und etwas äther. Öl enthaltende] ausgepresste Saft der unreifen, grünen Gurken, anfangs etwa zu 1 Tasse tägl., in ein Paar Portionen, besonders des Morgens; all-

mählig wohl, wenn es vertragen wird, bis zu $\frac{1}{2}$ Quart tägl., auf mehrere Portionen, früh u. Nachmittags, vertheilt. [Die Gurken werden in Scheiben geschnitten, etwas Kochsalz darauf gestreut, so dass nachher der Saft nur so eben ein wenig nach Salz schmeckt; dies eine Zeitlang stehen gelassen, dann in einem leinenen Tuche ausgepresst. Eine recht grosse Gurke giebt ungefähr 1 Tasse Saft.] — Der ausgepresste Saft auch wohl äusserlich [etwa mit Milch, oder mit wirksameren Mitteln (*Kali sulphurat.*, *Alaun p.p.*) verbunden, als Cosmeticum, gegen Sommersprossen].

Cuprum. Venus. Aes. Kupfer, metallisches. — Kommt nicht leicht noch in Magistralformeln vor, ausser vielleicht noch als Kupferfeile in folgender Formel:

316.

Ry *Cupri limati* Scr. 1*Liq. Ammon. caust.* Unc. $\frac{1}{2}$.*Digere leni cal. in vase clauso per triduum. Filtra infundibulo clauso. D.*

S. 3mal tägl. 4-10 Tropfen mit Heferschleim. (*Tinctura Veneris volatilis*. — Als Diureticum u. Nervinum.) *

***Cuprum aceticum. Viride Aeris crystallisatum. Aerugo crystallisata s. destillata. Flores Viridis Aeris. Acetas cupricus cum Aqua.** Krystallisirter od. gereinigter od. destillirter Grünspan. Neutrales essigsaures Kupfer. [1 Unze $3\frac{1}{2}$ Sgr.] *Sol.* 14; siedend Wasser 5. — *Cave* wie bei *Aerugo*.

Innerl. (≠) zu Gr. $\frac{1}{4}$ -1, einigemal tägl.; in Pulver oder besser in Auflösung, oder in Bissen, Pillen [doch auch in den beiden letzteren immer aufgelöst; bei den Pillen hat man dann nur zu vermeiden, dass die Einzelgabe zu voluminös werde, indem man entweder das Salz in heissem Wasser auflösen lässt oder ein stark bindendes Pflanzenpulver mit als Constituens gebraucht, nicht etwa *Succ. Glycyrrh. dep.* allein, der zu wenig Wasser bindet. — Ry 317].

Äusserl. zu Injectionen [Gr. 2-5 auf Unc. 1], Augenwaschungen u. -Bähungen [Gr. 4-8 auf Unc. 4. — *Cave* Quitten- und Althäen-Schleim].

317.

Ry *Cupri acetici* Gr. 15*solvo in Aq. destill. fervidae q. s.; adde**Opü pulv.* Gr. 5

Succi Glycyrrh. dep. Dr. 1
Pulv. Rad. Glycyrrh. glabr. q. s.
ut f. Pilulae 180. *Consop. Pulv. Cass. cinnam. D. S.* 3mal tägl. 3-12.

Cuprum aluminatum. Lapis divinus s. ophthalmicus. Göttlicher Stein; Augenstein; Wundstein; Kupferalaun. [*Aerugo, Kali nitr. dep., Alum. ana* 16, geschmolzen; dazu *Camphor. trit.* 1. — 1 Unze $3\frac{1}{2}$ Sgr.] *Sol.* 20. — *Cave* [mit el-

nigen durch Erfahrung sanctionirten Ausnahmen; z. B. R_x 318, 320] Metallsalze; Gerbstoff, Eiweiss, Quittenschleim.

Nur äusserl., aufgelöst [umgeschüttelt], zu Augenwässern [zu Augen-Waschwässern und -Bähungen Gr. 5-Scr. 1 auf Unc. 4. R_x 318. — Zu Augentropfwässern Gr. 1-4 auf Unc. $\frac{1}{2}$. R_x 319, 320], seltner zu adstringirenden Gurgelwässern od. Injectionen in die Nase [SCHÖNLEIN — z. B. bei schleimigen od. eiterigen Ausflüssen, bei Residuen von Anginen; — in diesen Formen etwas concentrirter, Gr. 5-15 auf Unc. 1, meist mit schleimigem od. narkotischem Zusatz. — R_x 321] oder auch wohl in andere Höhlen.

318.

R_y Cupri aluminati Gr. 8-12

solve in

Aq. dest. Unc. $4\frac{1}{2}$

adde

Aceti plumbici Gtt. 12-20

Tinct. Opii crocat. Scr. 1-Dr. 1.

M. D. S. Augenwasser, umgeschüttelt mit Lappchen überzuschlagen. (Gegen torpide Augentzündungen; z. B. im letzten Stadium der Tripper-Augentzündung.)

BENEDICT.

319.

R_y Cupri aluminati Gr. 5.

Ammon. muriat. depur. Gr. $2\frac{1}{2}$

solve in

Aq. destill. Unc. 1.

D. S. Augentropfwasser, umgeschüttelt.

RICHTER.

320.

R_y Cupri aluminati Gr. 3-4

solve in

Aq. Sambuci Unc. 1

adde

Tinct. Opii simpl. Gtt. 12

Aceti plumbici Gtt. 5.

M. D. S. Umgeschüttelt als Augentropfwasser (z. B. zur Vernarbung von Hornhautgeschwüren).

RUST.

321.

R_y Cupri aluminati Dr. 1

solve in

Decocti Rad. Alth. (Dr. $1\frac{1}{2}$) Unc. 6

adde

Tinct. Opii simpl. Dr. 1

Mellis rosati Unc. 1.

M. D. S. Gurgelwasser, umgeschüttelt.

Cuprum sulphurico-ammoniatum. *Cuprum ammoniacale s. ammoniatum. Ammoniaetum Cupri. Sulphas triammonico-cupricus.* Kupferammonium; Kupfersalmiak. Schwefelsaures Ammoniakkupfer. [1 Drachme 38gr.] Sol. $1\frac{1}{2}$. — *Cave* [mit durch Erfahrung sanctionirten Ausnahmen] Alkalien u. alkalische Erden, Säuren, Salze, Schwefelmetalle; Gerbstoff, Zucker, Manna, Honig, Eiweiss, Weingeist, viel Wasser [tritt es mit mehr Wasser in Berührung als zu seiner Auflösung erforderlich, so zersetzt es sich (es scheidet sich basisch schwefelsaures Kupferoxyd aus)]; deshalb darf man es wenigstens innerlich nicht in flüssiger Form geben]; Aq. comm.; Luft.

Innerl. (*ad Grana duo!*) zu Gr. $\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{4}$, rasch steigend bis zu Gr. 2-3, zwei- bis drei-mal tägl., nur in Bissen u. Pillen [aber in diesen zweckmässig immer aufgelöst; die Pillen in einem wohlverschlossenen

Glas zu verabreichen. Ry 322. — *Pilulae coeruleae s. e. Cupro sulph. ammon.* PH. SLESV.: C. s. a. Gr. 16, *Mic. Panis albi* Scr. 4, *Liq. Ammon. const.* q. s.; daraus 64 Pillen. (Eine mehrfach unzweckmässige Composition, deren Benennung auch zur Verwechslung mit den, besonders in England und Nordamerika gebräuchlichen, ebenfalls „blaue Pillen“ genannten Quecksilberpillen Veranlassung geben kann.)].

Äusserl. [wo man sich eher die Zersetzung durch das Wasser gefallen lässt] bisweilen zu Gurgelwässern [etwa Gr. 1-3 auf jede Unze Wasser], Injectionen [Gr. 1 auf 1 Unze Rosenwasser: LAGNEAU gegen Nächstrippe (der Harnröhre wegen muss filtrirt werden; ob dann viel Wirksames übrig Meiben wird??). — Dr. $\frac{1}{4}$ auf jede Unze Wasser: SANDRAS zu Injectionen in die Vagina].

322.

Ry *Cupri sulphurico-ammon.* Dr. $\frac{1}{2}$

solvo in

Aq. destill. q. s.

adde

Succi Glycyrrh. dep. Dr. 1

Pulv. Rad. Glycyrrh. q. s.

ut f. *Pilulae* 120. *Consp. Pulv. Cass. cinnam. D. in vitro bene clauso. S. 2-3mal tägl. 1-8 (Gr. $\frac{1}{4}$ -2).*

Cuprum sulphuricum. Vitriolum de Cypro s. coeruleum s. Veneris. Sulphas cupricus cum Aqua. Kupfervitriol; blauer, cyprischer od. spanischer Vitriol. Blaustein. Schwefelsaures Kupfer. [1 Unze $2\frac{2}{3}$ Sgr. Zum äusserlichen Gebrauch darf man oft das *C. s. venale* (1 Unze $1\frac{1}{6}$, *pulv.* $1\frac{1}{2}$ Sgr.) wählen.] *Sol.* 4; siedend Wasser 2. — *Cave* [mit durch Erfahrung sanctionirten Ausnahmen] Salzsäure, Blausäure, arsenichte Säure; Alkalien; Salze; Seifen; Phosphor; Gerbstoff, Zucker, Manna, Honig, Eiweiss, Schleime [doch nimmt man es mit dem Mimosenschleim nicht so genau], Weingeist; Gefässe von Eisen, Zink, Blei.

Innerl. (*ad Grana duo*!) zu Gr. $\frac{1}{4}$ - 1; 2-3mal tägl. Als Brechmittel [wo man jedoch meist das *Zinc. sulphur.* vorzieht] zu Gr. 6-12, in mehrere, etwa 4, Dosen abgetheilt, alle 10-15 Minuten eine. [Bei der Darreichung als Brechmittel werden in der Regel ähnliche diätetische u. a. Anordnungen zu treffen seyn, wie wir sie bei *Rad. Ipecac.* angeben.] Nicht gern in Pulver [schon deshalb, weil es sich, wie alle krystallinischen, nicht zerfallenen Salze, nicht recht fein pulvern lässt; doch hat man es in neuester Zeit öfters gegen Croup so gereicht, und zwar oft in verhältnissmässig, für das kindliche Alter, grossen Dosen, die denn auch öfters Erbrechen bewirken; bisweilen giebt man es auch absichtlich den Kindern zu einem Paar Gran als Brechmittel; DROSTE u. A. z. B. geben zuerst eine Brechen erregende Dose, dann alle 2-18 St. Gr. $\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{2}$. — Gegen hartnäckigen Durchfall 2mal tägl. Gr. $\frac{1}{2}$ mit *Sacch. Lactis* (besser Süssholz- oder einem andern Pflanzen-Pulver) Scr. 1: ELLIOTSON.], lieber in Auflösung [namentlich als Brechmittel] oder — die kleineren Gaben — in Pillen [aber auch in diesen zweckmässig immer aufgelöst. — Ry 323, 324].

Äusserl. in Substanz als Ätzmittel [etwas angefeuchtet. —

Z. B. um Feigwarzen oder wildes Fleisch wegzubeizen, oder (VERNECKE) im Beginn der contagiösen Ophthalmie auf die *Conjunctiva palpebrarum* applicirt, um das Übel im Entstehen zu vernichten]; sonst in Mund- u. Gurgelwässern [Scr. $\frac{1}{2}$ -Dr. $\frac{1}{2}$ auf Unc. 6. — Ry 325], Pinselsäften [Gr. 4-8 auf Unc. 1, etwa *Mucil. Gm. Mim.*], Injectionen [für die Schleimhäute Gr. 1-3 auf Unc. 1; — so auch z. B. bei Epistaxis in die Nase zu ziehen. — Für alte callöse Fisteln viel stärker: Dr. 1-2 auf Unc. 1.], Augewässern [zu Augen-Waschungen u. Bähungen Gr. 4-8 auf Unc. 4; zu Augentropfwässern Gr. 1-3 auf Unc. $\frac{1}{2}$], Augensalben [Gr. 2-8 auf Dr. 2; in der Regel zweckmässig aufgelöst, weil es sich nicht recht fein pulvern lässt. — Ry 326] u. a. Salben, Streupulvern [Ry 327], Verbandwässern [z. B. Scr. $\frac{1}{2}$ auf Unc. 3: RICHTER zum Verband warziger, unempfindlicher Schanker mit callösen Rändern. — Dr. 1 mit eben so viel Alaun auf Unc. 3: FRICKE zum Verband schwammiger primärer Schanker (mit über die Oberhaut erhabenem schwammigen rothblauen Grunde ohne Ränder u. ohne Entzündung)], Bähungen [vgl. *Acid. sulphur. crud.*], Waschwässern [z. B. Gr. 2 auf Unc. 1 bei *Gutta rosacea*].

*

323.

Ry *Cupri sulphurici* Scr. $\frac{1}{2}$

solve in

Aq. destill. ferridae Scr. 1

adde

Opti pulv. Gr. 2*Succi Glycyrrh. dep.* Scr. 1*Rad. Calami pulv. q. s.*ut f. *Pilulae* 40. *Consp. D. S.* 2mal

tägl. 1-4.

324.

Ry *Cupri sulphurici* Gr. 6

solve in

Aq. destill. q. s.

adde

Rad. Calami pulv. Dr. 2*Extr. Glycyrrh. q. s.*ut f. *Pilulae* 90. *Consp. D.* — In der Apyrexie des Weichselfiebers 3-4mal

4-7.

(ADAIR.

325.

Ry *Cupri sulphurici* Gr. 15-30

solve in

Infusi Hb. Salv. (Unc. $\frac{1}{2}$) Unc. 6

adde

*Tinct. Myrrhae**Tinct. Catechu* ana Dr. 1— *Pimpinell.* Dr. 6

antea cum

Mell. flavi Dr. 6mixta. *M. D. S.* Umgeschüttelt, stündlich damit den Mund auszuspülen, dann auszuspülen. (Bei hartnäckigem Speichelfluss. — Unchemisch zusammengesetzt, doch kräftig wirkend.) KOPF.

326.

Ry *Cupri sulphurici* in *Aq. destill. q. s.*

soluti

† *Tutias ppt.* *) ana Gr. 5*Camphorae c. paucillo Ol. Oliv. trit.*

Gr. 2

† *Butyri recent. insulsi* Dr. 2.*F. l. s. Ungt. ophthalm. M. exactiss.**D. in olla alba. S.* Jeden Abend einer Linse gross mit dem Finger zwischen die Wimpern einzureiben. (Bei Psorophthalmie.)

RUSZ.

*) Vgl. *Zinc. oxydat.*

Einer ganz ähnlichen Salbe, nur mit 3 Gran Tutia, bedient sich WELLER zu gleichem Zweck.

327.

R₂ *Cypri sulphurici* Unc. $\frac{1}{2}$
Kino Dr. 3
Gm. Mimos. Uno. 2.

M. f. Pulv. D. S. Streupulver. — *Cito.*
 (Bei parenchymatösen Blutungen.)

G. A. RICHTER.

★★ *Decoctum Zittmanni fortius* [12 Unzen Sarsaparille mit 24 Quart Wasser 24 St. digerirt; dann nach Hinzufügung von 1 $\frac{1}{2}$ Unzen *Sacchar. aluminat.*, $\frac{1}{2}$ Unze Calomel, 1 Drachme Zinnober — sämmtlich in ein Leinwandbeutelchen gebunden — bis auf 8 Quart eingekocht; gegen Ende des Kochens $\frac{1}{2}$ Unze Anis, eben so viel Fenchel, 3 Unzen Senna, 1 $\frac{1}{2}$ Unzen Süßholz hinzugehan; die ausgepresste Colatur noch einmal decantirt. — 1 Med. Pf. 8 $\frac{1}{8}$, 1 Quart 15 $\frac{1}{2}$, 8 Quart 124 Sgr.] und

★★ *Decoctum Zittmanni mitius* [zu den von der vorigen Abkochung zurückgebliebenen Species noch 6 Unzen Sarsaparille hinzugehan, mit 24 Quart auf 8 Quart eingekocht; gegen Ende des Kochens Citronenschale, Zimtcassie, Cardamom u. Süßholz, von jedem 3 Drachmen, hinzugeset; die ausgepresste Colatur noch einmal decantirt. — 1 Med. Pf. 4 $\frac{3}{4}$, 1 Quart 6 $\frac{3}{4}$, 8 Quart 53 $\frac{1}{2}$ Sgr.]. Beide werden zugleich angewandt, und zwar im Charité-Krankenhaus zu Berlin nach folgender Vorschrift: Am 1ten Tage ein Laxans, etwa aus Calomel u. Jalape. (Dies soll jeden 5ten Tag wiederholt werden; da indess das Decoct selbst in der Regel stark laxirt, so wird die Wiederholung wohl von der Häufigkeit der Stühle abhängen.) Am 2ten Tage Morgens $\frac{1}{2}$ Quart starkes Decoct, erwärmt, im Bette, in welchem der Kranke auch den Schweiß abwartet; Nachmittags 1 Quart schwaches Decoct, kalt; Abends vor Schlafengehn wieder $\frac{1}{2}$ Quart starkes Decoct, diesmal auch kalt. So wird 8 Tage lang fortgefahren, wo dann die oben angesetzte Quantität, 8 Quart von jedem Decoct, verbraucht ist. Nun ruht der Kranke 6 - 8 Tage aus, und wendet dann, wenn er noch nicht geheilt ist, die ganze Kur zum 2ten Mal an. — Diät dabei sehr eingeschränkt: nur dünne Suppen, wenig mageres, gebratenes Fleisch, und weisses Brod mit wenig frischer Butter. — Im Sommer thut man besser, statt 8 jedesmal nur 4 Quart von jedem Decoct vorrätbig bereiten zu lassen.

ELAEOSACCHARA. Ölzucker. Innige Gemenge von äther. Öl mit gepulvertem Zucker. Zucker macht die äther. Öle in grösserem Verhältniss, als sie es sonst sind, mit Wasser dauernd mengbar (I. S. 179 Z. 3). Man bedient sich deshalb der *Elaeosacchara*, um mässige Gaben ätherischer Öle mit wässerigen Flüssigkeiten zu verbinden, ohne dazu eines umständlicheren Emulgirens [durch Reiben mit einem der gewöhnlichen Emulgentien] zu bedürfen; aber man setzt sie auch zu Pulvern [selten zu anderen trocknen oder weichen Formen, weil in diesem der Zuckerzusatz in der Regel überflüssig wäre] als Constituentien oder Corripientien, oder giebt auch die äther. Öle pur in dieser Form. — Man kann sämmtliche äther. Öle in dieser Form verordnen. Schreibt man dem Apotheker das Verhältniss nicht ausdrücklich vor, so nimmt er 1 Tropfen auf jeden Scrupel Zucker; sonst aber kann man auch

weniger oder mehr, selbst doppelt so viel nehmen; doch wird man von denjenigen, deren Geschmack brennend scharf ist [wir haben bei den einzelnen darauf aufmerksam gemacht] nicht leicht mehr, oft aber weniger als das officinelle Verhältniss nehmen. [Wenn man weniger oder mehr nehmen will, braucht man nur die Quantität des Öls in Parenthese zu bestimmen, z. B. Ry *Elaeosacch. Junip.* (Gtt. 6) Unc. 1. Im ersteren Falle (bei weniger Öl) zu schreiben: Ry *Elaeos. Junip.* Dr. 2, *Sacch. albiss.* Dr. 6, wäre nicht bloss umständlicher, sondern auch insofern unnatürlicher, als der Apotheker die Ölzucker nicht vorrätig hält, sondern immer *ex tempore* bereitet.] — Hier sey noch bemerkt, dass die Ph. Bor. mit *Elaeosacch. Cinnamomi* den aus *Ol. Cassiae cinnamom.* [nicht *Ol. Cinnam. acuti*], mit *Elaeosacch. Chamomillae* den aus *Ol. Chamomill. citratum* [es ist dies zwar nicht ausdrücklich ausgesprochen, geht aber aus dem Preise unzweideutig hervor] bereiteten Ölzucker bezeichnet, und dass die Ph. Slesv. und Hann. ein *Elaeos. Flavedinis Citri*, die Ph. Austr. auch ein *Elaeos. Aurantior.*, durch Reiben von Zucker an Citronen oder Pomeranzen [minder zweckmässig] zu bereiten erlauben. [Nur eigentlich führt das *Elaeosacch. Macis* Ph. Austr., ein Pulver aus 1 *Macis*, 2 1/4 Zucker, seine Benennung.]

Electuarium e Senna s. lenitivum. Eröffnende Latwerge. [Fol. Senn. 9, Sem. Anist stell. 1, Pulpa Tamar. 16, Zucker 32, sehr concentrirte Feigenabkochung (16 mit 96 auf 48, u. die Colatur auf 24 eingedampft) 24. — Die Drachme enthält ungefähr 6 1/2 Gran Senna. — 1 Unze 2 1/2 Sgr. — Eine zweckmässige Variante für die Hospitalpraxis ist Ry 328, auch Ry 433; in der Privatpraxis bei ganz Armen dagegen würde man auch diese beiden Formeln noch durch Composition im Hause darstellen lassen.]

Als eigentliches Abführmittel Unc. 1/2 - 1 auf einmal oder in einem Paar Portionen rasch hinter einander [selten ist noch mehr nöthig]; als gelind eröffnendes Mittel theelöffelweise. Pur oder auch in componirteren Latwergen [Ry 329, 330], Schüttelmixturen [Ry 331]. (Zu Klystieren passender einen Sennaauflguss.)

328.

Ry Fol. Sennae pulv. Dr. 1 1/2
Tart. depur. Dr. 1/2
Pulpa Prunor. dep. Unc. 1 1/2
Syr. communis Unc. 1/2.
M. D. —
Elect. e Senna s. lenitiv. Rh. Mil.

329.

Ry Natri sulph. depur. sicci Unc. 1/2
Elect. e Senna Unc. 1
Syr. Rubi Id. q. s.

ut f. Electuar. D. S. Stündl., umgerührt, 2 Theelöffel. (Vgl. Ry 735.)

330.

Ry Elix. Propr. Paracelsi Dr. 1/2
Pulv. Rad. Jalap. Dr. 1
Elect. e Senna Unc. 1.
M. D. S. Morgens, umgerührt, 1 Theelöffel. (Bei habitueller Hartleibigkeit ein gewöhnliches Abführmittel von
HEIM.

331.

Ry *Acidi tartar.* Scr. 2
Sacch. albi. Unc. 1
 solve in
Aq. Flor. Aurant. Unc. 2
 addo

Aether. acet. Scr. $\frac{1}{2}$
Elect. e Senna Dr. 6-10.
M. D. S. Umgeschüttelt esslöffelweisp.
 (Abführmittel für sensible Personen, Frauen.)
 HEIM.

* *Electuarium Theriaca s. theriacale. Theriaca Andromachi.* Theriak. [Opium (in Mallaga aufgelöst), *Ferr. sulph. cryst.*, Wurzeln, Myrrhe, *Cardam. min.* ana 1, Zimtcassie, *Rad. Zedoar.*, *Scillae*, *Valer. min.* ana 2, *Rad. Serpentar. Virg.* 4, *Rad. Angel.* 6, *Mel despum.* 72. — Die Unze enthält beinahe 5 Gran Opium. — 1 Unze 2 $\frac{1}{2}$ Sgr.]

Selten noch innerl., zu Scr. 4-Dr. 1 einigemal tägl. Wenn man es geben will, so geschehe dies wenigstens (nicht pur, sondern) in Bissen [mit Zusatz eines schleimigen Pflanzenpulvers, etwa *Rad. Alth.*, q.s.], weil man nur so im Stande ist, die Dose gehörig zu bestimmen; aber man setze doch ja nicht zu diesem *Compositissimum* noch andere wirksame Mittel zu.

Selten auch noch äusserl., statt eines Pflasters oder künstlichen Balsams zum Auflegen [vgl. z. B. *Rad. Bellad.*] oder (nicht recht passend) Einreiben, wohl noch mit Zusatz von ätherischen Ölen od. dgl.; zu Klystieren [Unc. $\frac{1}{2}$, als Schüttelmixtur]; u. s. w.

Elemi. Resina Elemi. Elemiharz. [1 Unze 3 $\frac{1}{2}$ Sgr.] Vgl. *Resinae*. — Nur noch äusserl., zu Salben [offic.: *Ungt. Elemi*. — Ry 995 (*Styrax liquid.*)], seltner als Zusatz zu Pflastern.

ELIXIRIA. Elixire. In dem allgemeinen Artikel: *Tincturae* haben wir auch auf einige der folgenden Elixire Rücksicht genommen. — Man wird es in der Regel vermeiden, diese, meistens sehr componirten Mittel noch weiter zu componiren, schon deshalb weil man gar zu viel zu caviren hätte. Für einige derselben, die eine Säure oder ein Salz enthalten, würde besonders das *Cave* dieser Stoffe gelten. — Die meisten Elixire, namentlich aber die, welche Extracte enthalten, müssen umgeschüttelt werden.

* *Elixir ad longam Vitam.* Lebenselixir. [Eine zum Mißbrauch verleitende Benennung! — *Aloë luc.* 15, *Bolet. Loric.*, *Rad. Rhei*, *Zedoar.*, *Gentian.*, *Galang.*, *Myrrha*, *Elect. Theriac.* ana 4, *Croc.* 3, Zucker 48, auf Franzbranntwein 576. — Eine Drachme enthält ungefähr 1 $\frac{1}{2}$ Gran Aloë. — 1 Unze 3 $\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl., etwa zu $\frac{1}{4}$ - 1 Theelöffel, 2-3 mal tägl.

** *Elixir amarum.* [Extr. *Trifol.*, Extr. *Aurant.* Cort., ana

Unc. $\frac{1}{2}$, *Aq. Ment. pip.*, *Spir. V. rst.* ana Unc. 4, *Spir. sulph. aeth.* Dr. 2. — 1 Unze $2\frac{1}{2}$ Sgr. — Eine zweckmässige, nicht überladene, Composition, die oft magistrale Formeln entbehrlich macht.] Etwa 3-4 mal tägl. $\frac{1}{2}$ -1 Essl., pur. [Der entsprechenden Benennungen wegen führen wir hier folgende Vorschriften der PH. MIL. auf. *Elixir amarum*: *Extr. Absinth.* oder *Gentian.* oder *Trifolii* Unc. $\frac{1}{2}$, *Aq. Ment. pip.* Unc. 8, *Tinct. Calami* oder *Aurant. Pomor. immat.* Dr. 2. (3-4 mal tägl. 1 Essl. — Sonderbar, dass eine Officialvorschrift einem solchen Variiren mit den Ingredientien Raum lässt; der Verschreibende muss jedesmal einen die Wahl bezeichnenden Zusatz machen, z. B. *cum Extr. Gentian. et Tinct. Calami paratum*, p.p. — *Elixir amarum concentratum* (1 Unze $4\frac{1}{2}$ Sgr.): *Extr. Absinth.* oder *Trifol.* Unc. 4, mit eben so viel Wasser verdünnt, *Tinct. Aurant. Pom. immat.* Unc. 2, *Elaeosacch. Ment. pip.* (Gtt. 24) Unc. $\frac{1}{2}$. Von diesem, für sich nicht wohl zu nehmenden, Elixir 1 Unze mit 6 Unzen Wasser bilde das *Elix. amarum ordinarium* (welches etwa 3 stündl. zu 1 Essl. genommen werden mag und durch die Beimischung von Pfefferminzöl besser zu nehmen seyn wird als das schlechtweg sogenannte *Elix. amarum*).]

+ *Elixir aperitivum Clauderi* PH. SLESV. [Aloë, Myrrhe ana 4, Safran 2, *Kali carbon.* 8 mit *Aq. Sambuct* 60 digerirt. — 1 Unze 8 Sbl.] Innerl. wie *Elix. Propriet. Paracelsi*.

Elixir Aurantium compositum. Loco Elixiris visceralis Hoffmanni. [Flaved. Cort. *Aurant.* $5\frac{1}{2}$, *Pom. Aurant. immat.*, *Cass. cinnam.* ana $2\frac{3}{4}$ (zusammen also $10\frac{3}{4}$), nebst *Kali carb.* $1\frac{1}{2}$, in Malagawein macerirt; zur Colatur von ungefähr 60 *Extr. Absinth.*, *Cascarill.*, *Gentian.*, *Trifol.* ana $1\frac{1}{2}$ (zusammen also $5\frac{1}{2}$), *Ol. Cort. Citri* $\frac{1}{2}$, *Spir. sulph. aeth.* $2\frac{3}{4}$. — Demnach enthält eine Drachme ungefähr von $10\frac{3}{4}$ Gran bitter-aromatischer Substanzen den kalten Auszug, ausserdem $5\frac{1}{2}$ Gran bitterer Extracte, ungefähr $\frac{1}{2}$ Tropfen ätherischen Öls und 5 Tropfen *Spir. sulph. äth.* — 1 Unze 5 Sgr. — Die PH. HANN. hat ausser dieser Composition auch noch ein *Elix. viscerales Hoffmanni* (1 Unze 6 Mgr.) aus *Extr. Card. bened.*, *Cascar.*, *Centaur. min.*, *Gentian.*, *Myrrh.* ana 1, Malagawein 96, *Tinct. Cort. Aurant.* 32; dazu etwa noch *Kali acet.* 2, dann ist's *Elix. viscerales Kleinii* (1 Unze $6\frac{1}{2}$ Mgr.). — *Elixir viscerales* PH. F. (1 Unze $2\frac{1}{2}$ Sgr.), aus *Extr. Absinth.*, *Gentian.*, *Cent. min.*, *Trifol.* ana $3\frac{1}{2}$ — zusammen also $13\frac{1}{2}$ — in *Aq. aromat.* PH. F. 60, mit *Tinct. aromat.* PH. F. $3\frac{1}{2}$, ist ein brauchbarer Stellvertreter für die Armenpraxis. — Alle diese Compositionen können in gleicher Gabe gereicht werden.]

Innerl. zu Dr. 1-2 (1-2 Theelöffel), 1-3 mal tägl.; in der Regel pur, selten in Mixturen [vgl. *Tinct. Valerian. üther.*].

* *Elixir Proprietatis Paracelsi.* [Aloë u. Myrrhe ana $4\frac{8}{13}$, Safran $2\frac{1}{13}$, mit verdünnter Schwefelsäure $4\frac{8}{13}$, *Spir. V. rst.* $55\frac{1}{13}$ (zusammen 60 Flüssigkeit) digerirt. — 1 Unze $5\frac{8}{13}$ Sgr.] Innerl. zu 1 Theelöffel einigemal tägl., pur (die Einzelgaben in schleimigem Vehikel) oder allenfalls in Mixturen [Dr. 1-2 auf den Tag. — R_x 112 (*Aq. foet. antihyster.*)]. — Latwerge: R_x 330 (*Elect. e Senna*).

† *Elixir Proprietatis cum Rheo* PH. HANN. [Aloë 5, Myrrhe 1 $\frac{1}{2}$, Safran $\frac{5}{8}$, Rheum 3 $\frac{1}{2}$, mit Malagawein 53 $\frac{1}{2}$, Salzsäure (etwa um $\frac{1}{3}$ stärker als die der PH. BOR.) 6 $\frac{2}{3}$ (zusammen also 60 Flüssigkeit) digerirt. — 1 Unze 8 Mgr.] Wie das vorige.

† *Elixir Proprietatis sine Acido* PH. HANN. [Aloë, Myrrhe, Safran ana 2 $\frac{1}{2}$, Kalk tartar. 8 $\frac{1}{2}$, mit Spir. V. rst. 40, Aq. destill. 20 digerirt. — 1 Unze 6 Mgr.] In gleichen oder etwas grösseren Gaben wie die beiden vorigen.

Elixir e Succo Glycyrrhizae. Loco Elixiris pectoralis (Regis Daniae). Brustelixir. [Liq. Ammon. anis. u. Succ. Glycyrrh. dep. ana 1, Aq. Foenic. 3. — 1 Unze 2 8gr. — Viel schwächer als *Elix. e Succo Liquir.* (*Elix. pectorale*) PH. MIL. (1 Unze $\frac{2}{3}$ 8gr.): concentrirte Süßholzwassauflösung (vgl. Succ. Glycyrrh. dep.) 1, Aq. comm. 2, Liq. Ammon. anis. $\frac{3}{4}$; esslöffelweise einigemal tägl. zu geben.] Innerl. theelöffelweise, öfters tägl., pur oder allenfalls in Mixturen.

† *Emetina (pura).* [Unpassend] *Extractum Ipecacuanhae.* Emetin. Brechstoff. Brechwurzel-Alkaloid. [In kaltem Wasser sehr schwer löslich, leicht in Alcohol, nicht in Äther. — Fast geschmacklos. Bildet mit Säuren Salze, die, in Wasser meistens leicht löslich, sehr bitter und scharf schmecken, übrigens dem Emetin ähnlich wirken sollen. — $\frac{1}{4}$ Gran soll die brechen-erregende Kraft von Scr. 1 - Dr. $\frac{1}{4}$ Ipecacuanha haben. — Ein häufig dargestelltes unreines Emetin ist viel schwächer, auch wegen weniger sich gleich bleibender Wirkung nicht empfehlenswerth.] *Cave* Salzbilder; Iod- und Brom-Kalium; Metallsalze; Gerbstoff.

Innerl. [nur als Brechmittel, denn es scheint die sonstigen arzneilichen Kräfte der Ipecac. nicht zu besitzen] etwa zu Gr. $\frac{1}{4}$ oder $\frac{1}{16}$, und nöthigenfalls noch ein Paar Dosen von Gr. $\frac{1}{16}$ bald hintereinander; in Pulver [nach PROLLIUS mit seinem gleichen Gewicht Weinsäure (wodurch sich beim Anrühren des Pulvers mit Wasser (leicht lösliches) saures weinsteinsäures Emetin bildet) und etwas Zucker] oder Auflösung [etwa in Wasser mit einem geringen Zusatz von Weinsäure oder Essig und mit Syrup]. (Mehrere von MAGENDIE u. A. mitgetheilte Formeln sind nicht zu empfehlen.)

EMPLASTRA. Pflaster.

Ausser den I. §. 158. erwähnten stark abweichenden officinellen Pflastern variiren die anderen innerhalb der durch die von uns (ebend.) gegebene Definition gesteckten Grenzen noch sehr merklich. Man kann in dieser Hinsicht die übrigen officinellen Pflaster der Preuss. Pharmak. etwa in 4 Gruppen ordnen, welche bei mittlerer Temperatur folgende Consistenzunterschiede zeigen:

1. Die festesten, sprödesten; nicht knetbar, in Stangen gerollt noch sehr leicht brechend: *Empl. Ceruss., consolidans, Hydrarg., Litharg. simpl., oxycroceum.*

2. Etwas knetbar, in Stangen schon etwas biegsam: *Empl. adhüsiv., Canthar. perpet., Ammoniacy, Litharg. comp., (Cerat. Resin. Burg.).*

3. Leicht knetbar, in Stangen sehr biegsam: *Empl. foetid., fusc., de Galb. crocat., saponat.*

4. Sehr leicht knetbar; in Stangen ziemlich biegsam, doch wegen Bröcklichkeit [nicht wie die Gruppen 1. u. 2., wegen Sprödigkeit] bisweilen brechend: *Empl. aromat., Canthar. ordinari., Conii, Hyosc., Meliloti.* [Die Bröcklichkeit rührt bei diesen Pflastern von der beträchtlichen Quantität Pulver, welche sie enthalten, her. Das *Empl. aromat.* enthält zwar nur die Pulver von *Olibanum* und *Benzoe*, von denen man glauben könnte, dass sie sich in der Pflastergrundlage auflösen müssten; sie thun dies aber, weil sie in zu grosser Quantität und erst, wenn die Grundlage halb erhalten ist, zugesetzt werden, nicht, sondern bleiben als Pulver in der Masse.]

Die zweite und dritte Gruppe sind als die normalsten rücksichtlich der Consistenz zu betrachten, kleben auch, namentlich die zweite [vgl. I. S. 268], am besten. Nur die 4te und 3te [im Sommer auch noch die 2te] Gruppe lassen sich kalt streichen, nur die 4te kalt [durch bloßes Malaxiren] mit andern Pflastern oder mit Zusätzen mischen.

Emplastrum adhäsivum. Heftpflaster; Klebepflaster. [*Empl. Litharg. simpl. 2, Terebinth. cocta 1. — 1 Unze 2 ½ Sgr.*] Man nimmt es im Sommer lieber alt als frisch. [Meist findet man es in den Apotheken vorrätig gestrichen und zwar — mittelst einer eigenen Maschine (die sich nur zum Streichen grösserer Pflaster, von der Grösse eines halben oder ganzen Papierbogens, nicht der kleineren Pflaster, wie sie gewöhnlich magistral verordnet werden, anwenden lässt) — besser, als man es mit einem Spatel streichen kann.]

Emplastrum adhäsivum Anglicum. *Empl. Anglicanum s. glutinosum.* Englisches (Heft-) Pflaster. [Taffel (schwarzer, rother od. weisser) auf Einer Seite mit einer concentr. Auflösung von Hausenblase überzogen, auf der Rückseite mit Benzoeäctinctur bestrichen. — Trocken; bekannt genug. — 1 Quadrat-Zoll ½ Sgr. (in grösserer Quantität, ohne Receipt entnommen, viel wohlfeiler).] Man befeuchtet es auf der überzogenen, glänzenderen Seite und drückt es so lange an, bis es klebt.

† ***Emplastrum adhäsivum cum Oleo Lini*** Ph. SLESV. [Zerriebenes Bleiweiss 2 mit Leinöl 1 unter Zutropfen von Wasser gekocht. — 1 Unze 4 Sbl., in *Int. ext.* 1 Bogen 12 Sbl.] Brauchbar, wo das gewöhnliche Heftpflaster zu reizend ist.

Emplastrum Ammoniacy. Ammoniakpflaster.

[Einhält ausser dem Ammoniak noch Galbanum, Terpenthin u. *Resina Pini Burg.* — 1 Unze $3\frac{1}{2}$ Sgr.] (Über andre Ammoniakpflaster vgl. *Ammoniacy. dep.*)

Emplastrum aromaticum. Loco Emplastri stomachici s. de Labdano. [Einhält Terpenthin, Weihrauch, Benzö, Muskatnuss-, Pfefferminz- u. Würznelken-Öl u. s. w. — 1 Unze $4\frac{1}{8}$ Sgr.]

Emplastrum Cantharidum (vesicatorium) ordinarium. Gewöhnliches Spanischfliegen- od. Blasen-Pflaster. [Gröblich zerriebene Canthariden 2, Wachs 4, Terpenthin, Baumöl ana 1. — 1 Unze 5 Sgr.] Man streicht es mässig dick auf Leder oder Leinwand, meist nur von der Grösse eines Viergroschenstücks bis zu der eines (französischen) Kartenblatts oder einer Hohlhand, doch auch bisweilen viel grösser [am auffallendsten nach LALUETTE bei Wasserschnecken, vgl. *Tinct. Canthar.*], und befestigt es durch Heftpflaster [I. S. 268]. Soll es die Haut nur röthen, so sind dazu in der Regel 2–4 St. [bei Kindern, zarten Personen weniger; bei Torpor, namentlich der Haut, mehr], soll es Blasen ziehen, in der Regel 8–12 St. erforderlich. Sicherer und schneller wird die Wirkung [und man hat nebenbei den Vortheil, dass die Epidermis sich nicht an das Pflaster beim Abnehmen anhängt], wenn man die Oberfläche des Pflasters mit in fettes Öl getauchter feiner Leinwand oder feinem Löschpapier bedeckt [nur darf des Öls nicht so viel seyn, dass es nebenbei fliessen und die Rührung oder Blasenziehung in weiterem Umfange, als man beabsichtigt, bewirken kann]. — Wo das Pflaster bloss röthen sollte, wäscht man nach dem Abnehmen wohl, um die Nachwirkung zu vermeiden, die Stelle mit lauem Wasser (nicht etwa mit Öl) ab. Wenn es eine Blase ziehen soll, so legt man es, wo der Krankheitsfall so lange zu warten erlaubt, oft gern am Abend, damit sich die Blase über Nacht bilde und der Kranke den leichten Schmerz verschlafe. Wenn es eine Blase (oder mehrere) gezogen hat, so nimmt man es behutsam ab und macht, wenn man die Heilung der wunden Stelle zulassen will, bloss in den untern Theil der Blase einen Einschnitt, dass das Serum herauslaufen kann, lässt übrigens das Häutchen der Blase darauf sitzen, und legt als Hausmittel ein Kohlblatt oder ein Lappchen dünn mit Talg oder *Ol. Cacao* [weniger zweckmässig Fett oder Salben; diese dringen zu leicht in die Leinwand ein, die dann austrocknet, und beim Erneuern des Verbandes wird leicht die Oberhaut mit abgezogen] bestrichen auf [von nordamerikanischen Ärzten ist neuerlich empfohlen worden, kerdächte Baumwolle, $\frac{1}{4}$ Zoll dick oder noch dicker, aufzulegen (wie bei Verbren-

nungen); es soll sich danach binnen 2 Tagen eine neue Epidermis bilden, und diese Art des Verbandes besonders im Nacken, bei bettlägerigen Kranken, vorthellhaft seyn]. Will man dagegen die Eiterung unterhalten, so nimmt man das ganze Blasen-Häutchen, zuerst am oberen, dann am unteren Umfange vorsichtig mit Pincoette und Scheere weg, und verbindet mit [je nachdem man zartere oder derbere Constitutionen, grössere oder geringere Neigung zur Eiterung vor sich hat] mehr oder weniger reizenden Salben [Ungt. basil., Elemi, Terebinth., Canthar. u. s. w.]. Das etwa später nöthige Austrocknen, überhaupt die spätere Behandlung der Stelle nach allgemeinen Regeln. — Zu einer mehr allgemeinen Wirkung [z. B. um eine abnorme Excretion zu ersetzen] legt man es in den Nacken, zwischen die Schulterblätter [wo jedoch, bei einiger Disposition, namentlich bei alten Leuten, leicht Furunkeln u. selbst Carbunkeln davon entstehen sollen], auf die Waden oder Deltamuskeln; zu örtlicher Wirkung in der Regel dem kranken Theil möglichst nahe, wo nicht lebhaftere Entzündung oder grössere Reizbarkeit desselben (z. B. des Auges) eine solche Nähe verbietet. [Für das Auge z. B. nur selten in die Augenbrauengegend, meist hinter's Ohr oder zwischen Unterkieferwinkel und Zitzenfortsatz, auch wohl noch entfernter: in den Nacken. — Bei Halsentzündungen meist in Form von Streifen um den Hals, doch auch wohl in der gewöhnlichen breiteren Form mehr bloss auf den Kehlkopf. — Bei *Ischias nervosa Cotunnii* wiederholtes Auflegen von schmalen, dem Lauf des ischiadischen Nerven folgenden Streifen, oder auch von einem 6 Zoll langen, 4 Zoll breiten Pflaster quer von der Kniekehle über den Kopf des Wadenbeins abwärts nach dem Schienbein hin; ziehen sich die Schmerzen an andere Stellen, so suche man sie auch dort durch Blasenpflaster zu vertreiben.] — Selten wird man es bei sensiblen Personen, bei Kindern nöthig finden, die Wirkung des Cantharidenpflasters zu mildern, indem man es etwa mit Melilotenpflaster vermischt, oder es über feinem Flor, Nesseltuch, auflegt [einfacher ist es wohl, das Pflaster kleiner zu machen oder weniger lange liegen zu lassen]; bisweilen setzt man wohl, namentlich zu grossen Blasenpflastern, um Strangurie zu verhüten, etwas Campher zu [etwa $\frac{1}{15}$ - $\frac{1}{10}$; auch wohl etwas Opium, Schwefelsäure od. Salpetersäure hat man zu dem Ende empfohlen; alle diese Mittel sind indess höchst unzuverlässig]. Bisweilen dagegen [doch wohl selten, wenn man das Pflaster mit Öl applicirt hat (s. oben), denn selbst altes, unkräftig gewordenes Pflaster pflegt auf diese Weise gut zu ziehen] muss man die Wirkung des Spanischfliegenpflasters noch verstärken, indem man die Stelle vorher mit Flanell und Essig roth reibt, oder dem Pflaster noch mehr Cantharidenpulverzusetzen lässt, oder es vor dem Auflegen mit etwas von dem (gröblichen) Pulver bestreut. Will man eine raschere Einwirkung, so lege man auf die vorher rothgeriebene Stelle einen Teig von Roggenmehl u. Essig, mit Cantharidenpulver gleichmässig bestreut [dieses Pulver etwa noch mit fettem Öl ein wenig besprengt], oder [ganz besonders rasch wir-

kend] einen Teig aus Senfpulver 2, Cantharidenpulver 1 und heissem Wasser *q. s.*, passend befestigt auf [oder auch sogenannte Wentsaelsalben, s. B. R. 530]. Bei Erscheinungen von Reizung der Harnorgane Abnehmen des Pflasters, Abwaschen der Stelle mit Wasser, und nöthigenfalls die im Anhang: Vergiftungen, angegebene Behandlung.

VEIEL's u. A. Verfahren gegen veraltete Fussgeschwüre: ein dickgestrichenes Blasenpflaster auflegen, welches den Umfang des Geschwürs noch um 1 Zoll überragt, auch die misstarbigen Hautstellen noch bedeckt; 24 St. liegen lassen (trotz Schmerzen, vermehrtem Harnabgang u. s. w.); dann 4 Tage lang halbtündl. das Geschwür mit einer lauen Auflösung von weissem Vitriol in Pfefferminzwasser (Gr. 1 auf Unc. 1) anfeuchten; dann Wiederholung des Verfahrens. Dabei Ruhe, Bettlage, einfache Kost und eine Tisane von Sarsaparille, Senna u. Anis. — RENAUD legt auf Bubonen, ohne Rücksicht auf die Art oder Dauer derselben, ein Vesicator; vom folgenden Tage an wird mit in eine Auflösung von Sublimat (Scr. 1 auf Unc. 1) getauchter Charpie verbunden; wenn dies die Eiterung nicht mehr unterhält, Erneuerung des Verfahrens.

Emplastrum Cantharidum (vesicatorium) perpetuum s. Janini. Anhaltendes od. Janinsches Spanischfliegen- od. Blasen-Pflaster. [Cantharidenpulver 1 auf 15 einer Pflastermasse aus Wachs (8), Harz (3), Talg (2) und Terpenthin (2). — 1 Unze $3\frac{1}{2}$ Sgr. — Theurer (ohne Vorzug) ist *Empl. Canth. perpet.* PH. P. (aus *Empl. Canth. ord. 1*, *Empl. citrin.* PH. P. 3): 1 Unze $4\frac{1}{2}$ Sgr.] Man gebraucht dieses mildere Cantharidenpflaster entweder so, dass man es, sobald eine dadurch excoriirte Stelle trocken werden will, immer von neuem auflegt — so Wochen oder Monate lang; oder — wohl meist zweckmässiger — so, dass man es, gut befestigt, möglichst lange ungewechselt liegen, und das Serum immer unten aussickern lässt.

Emplastrum Cerussae s. album coctum. Bleiweisspflaster. [*Cerussa* 7, *Lithargyr.* 1, Baumöl $4\frac{1}{2}$. — 1 Unze $2\frac{1}{2}$ Sgr.]

Emplastrum Conii s. de Cicuta. Schierlingspflaster. [*Hb. Conii macul.* 1, Wachs 1, *Colophon.* u. Baumöl *ana* $\frac{1}{2}$. — 1 Unze $2\frac{1}{2}$ Sgr. — Zu 3 Theilen dieses Pflasters noch 1 *Ammoniac. depur.* mit *Terebinth. laric. q. s.* geschmolzen, giebt das *Empl. Conii c. Ammoniac.* PH. SLESV. (1 Unze 6 Sbl.)]

* *Emplastrum consolidans.* Heilpflaster. [*Empl. Ceruss.* u. *Empl. Litharg. simpl.* *ana*, mit Zusatz von *Lap. calaminar.*, *Oliban.* u. *Mastix.* — 1 Unze $3\frac{1}{2}$ Sgr.]

Emplastrum foetidum. Empl. resolvens. [*Ammoniacum* 6, *Asa foet.* 2, spanische Seife 1. — 1 Unze $5\frac{1}{2}$ Sgr.]

Emplastrum fuscum s. nigrum s. Noricum s. Minii adustum s. Matris. Braunes, schwarzes, Nürnberger, Mutter- od. Mennig-Pflaster. [Mennige, Baumöl und Wachs mit ein wenig Campher. — 1 Unze $2\frac{1}{2}$ Sgr.] — 8 Theile davon mit 5 Theilen Baumöl bei gelindem Feuer gemischt geben das *Unguentum fuscum* (*Ungt. de la Mère*) PH. HANN. (1 Unze 3 Mgr.; 4 Unzen 10 Mgr.).

Ähnlich componirt, aber reicher an Blei und Campher, ist Ry 332. — Ähnlich ist ferner ein von SIEMERLING zur Heilung chronischer Fussgeschwüre empfohlenes und dem fuscum vorgezogenes Pflaster: weisses Wachs 1 Loth geschmolzen, dazu $\frac{1}{4}$ Pf. Baumöl, worunter schon 4 Loth Mennige gerührt; unter beständigem Umrühren auf Kohlen gekocht, bis die Masse dick wird und von einem Eisen, worauf man einige Tropfen fallen lässt, abspringt; vom Feuer genommen und noch *Bals. Peruv.* Dr. 2 dazu; — vor der Anwendung dieses Pflasters Betupfen der callösen Ränder und der ganzen Geschwürsfläche mit Höllestein; dann 1-2 Zoll breite Pflasterstreifen (auf Leinwand) so umgeführt, dass immer ein Streifen den vorhergehenden um $\frac{1}{2}$ Zoll deckt; eine einfache Comresse darüber; Fuss und Unterschenkel in eine *dobra ascendens*; Ruhe des Beins. Bei späteren Verbänden nur ab und zu einmal mit Höllestein betupfen. Wo die Geschwüre keine callösen Ränder, doch schlechte Granulationen zeigen, ein Plumaceau mit folgender Mischung getränkt: *Tinct. Aloë*, *Tinct. Myrrh.* ana Dr. 2, *Bals. Peruv.* Dr. 1- $1\frac{1}{2}$; darüber dann die Pflasterstreifen. Passende innerliche Behandlung; bisweilen eine Fontanelle.

332.

Ry *Ceras flavas*
Sebi ovilli ana Dr. 2
Cetacei Scr. $\frac{1}{2}$
Equatis et semirefrigeratis adde
Pulv. subtiliss. Minii Dr. 1
— — *Cerussae* Dr. 2

Camphorae Gr. 15

antea in

Olei Olivar. Dr. 1

soluta. M. f. Emplastr. D. —

Empl. defensivum rubrum PH.
HANN. (1 Unze 3 Mgr.)

***Emplastrum de Galbano crocatum.** [Aus Galbanum, Terpenthin, Crocus, Meliloten- und einfachem Bleiglätte-Pflaster u. s. w. — 1 Unze $6\frac{1}{2}$ Sgr.]

333.

Ry *Empl. de Galb. croc.* Unc. $\frac{1}{2}$
lenissimo calore emollitas adde
Opii pulv., c. paux. Aq. in pullem
redacti
Camphorae trit. ana Gr. 45.
M. f. Emplastr. D. — Auf Leder gestrichen aufzulegen. (Bei Frostbeulen zweiten Grades.) RUST.

lenissimo calore emollitas adde

Opii pulv., c. paux. Aq. in pullem
redacti

Ammon. carbon. pyro-ol. pulv. ana
Gr. 15

Camphorae trit. Dr. $\frac{1}{2}$

Ol. Cajeputi Gtt. 20.

M. f. Emplastr. D. — Auf Leder gestrichen auf die Magengegend zu legen. (Gegen das Erbrechen bei der Seckkrankheit empfohlen.)

334.

Ry *Empl. de Galb. croc.* Unc. $\frac{1}{2}$

Emplastrum Hydrargyri s. mercuriale. Queck-

silberpflaster. [Enthält ungefähr $\frac{1}{2}$ Hydrarg. depur., $\frac{1}{16}$ Terebinthi comm. — 1 Unze 5 Sgr.] Auf Leder anzuwenden.

335.

R₃ Empl. Hydrargyri Unc. $\frac{1}{2}$
leni calore emollitas addo

Opⁱ pulv., c. paux. Aq. in pultem
reducti

Camphorae trit. ana Gr. 15.

M. f. Emplastr. D. — (Bei allerlei
chronischen Verhärtungen u. s. w.)

RUST.

Mit nur 10 Gran Opium u. Campher;
RIEKEN gegen weisse Geschwulst.

Emplastrum Hyoscyami. Bilsenkrautpflaster.

[Bereitet wie Empl. Conii. — 1 Unze 2 $\frac{1}{2}$ Sgr.] — Unc. $\frac{1}{2}$ mit Empl. opiat. Scr. 1,
Abends auf beide Schläfen zu legen: gegen Schlaflosigkeit nervöser Kranken em-
pfohlen.

**Emplastrum Lithargyri (s. Diachylon) com-
positum s. gummosum s. cum Gummatis.** Zusammenge-
setztes Bleiglätte- oder Diachylon-Pflaster. [Das fol-
gende mit Ammoniak, Galbanum u. Terpenthin. — 1 Unze 3 $\frac{1}{2}$ Sgr.]

**Emplastrum Lithargyri (s. Diachylon) sim-
plex.** Einfaches Bleiglätte- oder Diachylon-Pfla-
ster. [1 Unze 2 $\frac{1}{2}$ Sgr.]. Seltener für sich gebraucht, als zur magisträlen
Bereitung zusammengesetzter Pflaster [vgl. I. S. 260. — Beispiel: R₃ 200].

Emplastrum Meliloti. Steinkleeblattpflaster.
[Bereitet wie Empl. Conii. — 1 Unze 2 $\frac{1}{2}$ Sgr.]

Emplastrum opiatum s. cephalicum. Opium-
pflaster. [Opium, Elemi, Baumöl ana 1, Benzoe 2, Mastix, Weihrauch ana 4,
Terpenthin 6. — Consistenz ungewöhnlich fest (I. S. 158). — 1 Unze 6 $\frac{3}{4}$ Sgr.]

****Emplastrum oxycroceum.** [Aus Terpenthin, Ammo-
niak, Galbanum, Crocus, Mastix, Myrrhe, Weihrauch, Colophonum u. s. w. —
1 Unze 7 Sgr.]

Emplastrum saponatum s. miraculosum. Seifen-
pflaster. [Aus Sapo Hispan. alb., Campher, Empl. Litharg. simpl. etc. —
1 Unze 3 Sgr.]

Emplastrum (nigrum) sulphuratum. Schwefel-
pflaster. [Colophonum 18, Myrrhe, Asphalt, Ammoniak, Galbanum, Sagapen
ana 4, Terpenthin 6, Ol. Lini sulphurat., Ol. Terebinth. ana 8, Campher 12
etwas Baumöl aufgelöst, 1 $\frac{1}{2}$. — Salbenweich. — 1 Unze 3 $\frac{3}{4}$ Sgr.]

Euphorbium. Euphorbium; Euphorbienharz.
[1 Unze 1 $\frac{1}{2}$, gr. pulv. 2 $\frac{1}{2}$, subf. pulv. 3 Sgr.] Vgl. Gummiresinae.
Nur noch äußerl. (=), selten in Schnupfpulvern. [nicht

par; immer heftig reizend, oft selbstgefährlich; wohl zu entbehren], als Streupulver [bei *Caries*], häufiger zu Pflastern [Man kann es ihnen gepulvert zusetzen oder durch Schmelzen damit verbinden. Um bloss andere harzige und gummiharzige Pflaster mehr zu schärfen, setzt man ihnen auf 1 Unze etwa Dr. $\frac{1}{4}$ - 1 *Euphorb.* zu. — Ry 971 (*Sem. Sinap.*), 1042 (*Tart. stibiat.*). — *Empl. Euphorbii* PH. AUSTR. enthält *Cantharidespulver* 2 (Hauptbestandtheil; deshalb ist die Benennung der Composition unpassend, weil mancher Praktiker den Inhalt vergiess und dann wohl erst durch die unerwartete Wirkung daran erinnert wird), *Euphorb.* 1, *Mastix* und *Terpenthin* *ana* 4.], Salben [gepulvert. Als reizende Verbandsalbe, um z. B. die *Cantharidenalbe* behufs der Unterhaltung eines künstlichen Geschwürs zu ersetzen, Dr. $\frac{1}{4}$ - 1 auf 1 Unze Fett oder Königs- od. Terpenthin-Salbe].

EXTRACTA. Dickauszüge. [Vgl. I. S. 27-28.]

Ausser den Präparaten, welche diesen Namen führen, gehören hieher auch die Roobs und der *Succus Glycyrrhizae depur.*

Nach dem Grade der Eindickung unterscheidet man bei den Extracten 4 Hauptstufen der Consistenz [die gelegentlich auch zur Bezeichnung der Consistenz von anderen Stoffen gebraucht werden]: 1) die *Mel-lago-Consistenz* [die eines frischen Honigs oder eines dicken Syrups], 2) die gewöhnlichste oder vorzugsweise so genannte *Extract-Consistenz*; 3) die *Pillen-* und 4) die *trockene Consistenz*.

Die Extracte sind in Wasser [*Extr. Filic. äther.* und \dagger *Cinae äther.* ausgenommen] und wässrigem Weingeist [z. B. *Wels*] leicht löslich, in Alcohol und Äther meistens unauflöslich; nur diejenigen, bei welchen der Auszug ganz mit Alcohol oder Äther bereitet wird [z. B. *Extr. Nuc. Fomic. spirituos.*, die oben genannten beiden], lösen sich auch immer ganz, die, wo er zum Theil mit Alcohol bereitet wird, zum Theil, in dem entsprechenden Menstruum auf.

Über die im Allgemeinen zu meidenden Verbindungen vgl. I. S. 35 *sub* 7. u. S. 36 *sub* 13. Bei mehreren bitteren Extracten [besonders denen von *Absinthium*, *Cardus bened.*, *Centaurea*, *enih.*, *Fumar.*, *Marrub.*, *Taraxac.*, *Trifol.*] hat man, wenigstens im Sommer, die Verbindung mit *Salmiak* oder anderen Ammonium-Präparaten zu vermeiden, weil sich leicht durch Wechselwirkung zwischen denselben in diesen Extracten besonders reichlich enthaltenen Salzen und den Ammonium-Präparaten etwas kautistisches oder kohlen-saures Ammonium erzeugt, dessen Geruch dem Kranken die Arznei verdächtig macht. Bei *Extr. Aloës Acidæ sulph. correct.*, \dagger *Extr. Elaterii*, *Extr. Ferri pomat.* (u. \dagger *cydoniat.*) und *Extr. Myrrhae* geben wir besondere *Cave's* an; für alle übrigen einzelnen Extracte müssen wir auf die *Cave's* der Substanzen verweisen.

Rücksichtlich der Dose nimmt man im Allgemeinen an,

dass sich die Wirkung der Extracte zu der ihrer Substanzen wie 2 zu 1 verhalte, dass man also die Extracte in halb so grosser Dosis als die Substanzen zu geben habe. Es erleidet jedoch diese Regel mannigfache Abweichungen bei den einzelnen; namentlich haben die bis zur Pillenconsistenz eingedickten oder gar trocken dargestellten Extracte wohl oft eine noch grössere quantitative Wirkung [falls nicht durch den Process der Extractbereitung manche in der Substanz wirksamen Stoffe aus ihnen ganz ausgeschlossen worden — Beispiele: *Extr. Opii, Myrrhae*], sind also in noch geringerer Dose zu geben; und das Entgegengesetzte gilt von den in Mellago-Consistenz dargestellten. — Das Genauere indess bei den einzelnen. Leider lassen sich nur für manche (und gerade besonders wirksame) Extracte die Dosen immer nur etwas unbestimmt angeben; bei diesen haben wir vorsichtshalber eine etwas geringe Dosis angesetzt, aber den Zusatz „steigend“ gemacht. [Nirgends ist zwischen Mittel und Mittel ein grösserer Unterschied als bei den Extracten. Nicht genug, dass, um ihre Wirkung in verschiedenen Fällen ungleich zu machen, hier dieselben Einflüsse concurriren, wie bei den pflanzlichen Stoffen selbst (vgl. I. S. 81 - 82); so kommt hier auch noch ganz besonders die Verschiedenheit in der Bereitung, Eindickung (vgl. I. S. 243), Aufbewahrung, das Alter der Extracte u. s. w. in Betracht, und es ist, selbst bei vorzüglichen Vorschriften einer Pharmakopöe und strengster Befolgung derselben, doch nicht zu erwarten, dass die Extracte in allen Oeficinen zu jeder Zeit ganz gleich kräftig seya, dieselbe Menge Pulver behufs der Pillenbildung binden werden u. s. w. Es bleibt also die quantitative Wirkung der Extracte immer mehr oder weniger unsicher; *hinc illae lacrymae*, dass man nirgends häufiger als bei den Extracten auf der einen Seite über Unwirksamkeit, auf der andern über leicht nachtheilige, giftige Wirkungen klagen hört. Die Ärzte sollten aber diese Unsicherheit nicht noch vermehren, indem sie z. B. bei Pillenmassen mit dem beliebigen *sunt Pilulae pond. ris Granorum duorum* endigen, statt die Zahl anzugeben, oder indem sie, worauf wir noch einmal zurückkommen, wirksame Extracte zu ihrer eignen Substanz mit einem *q. s.* hinzusetzen.]

Man wendet die Extracte hauptsächlich in folgenden Arzneiformen an:

I. In Pulvern. Die trocken vorrätigen Extracte in diese Form zu bringen, hat keine Schwierigkeit [der *Succ. Glycyrrh. dop.* ist bereits ein Pulver], nur ziehen sie gern Feuchtigkeit aus der Luft an, backen zusammen, u. man darf sie deshalb in der Regel nicht pur in Pulver verordnen. [Extracte magistral trocken darstellen zu lassen, ist nicht rathsam. Das Schierlings- und Rilsenkraut-Extract lässt die Ph. SLESV., um die Ärzte hier dieser Versuchung zu überheben, officinell (neben den gewöhnlichen Präparaten von Pillenconsistenz) trocken darstellen, wo man dann sicher ist, dass es mit der nöthigen Vorsicht geschehe.] Extracte von Pillen- oder Extract-Consistenz dürfen nur in geringer Quantität [vgl. d. Tabelle I. S. 206] in Pulver aufgenommen werden. [Oft Wachspapier nöthig und nur auf klir-

zere Zeit zu verordnen erlaubt, vgl. I. S. 209.] — Die Extracte von Mella-
go-Consistenz bleiben von der Pulverform gänzlich ausgeschlossen.

2. In Trochisken [nur manche Extracte, vgl. I. S. 234], bei
denen man dann in der Regel das Dörren wird zu vermeiden haben.

3. Zu Pillen und Bissen [vgl. I. §. 138., d. Tabelle auf S. 243,
und S. 244 sub 2. u. 3.] eignen sich alle Extracte sehr gut; für die mei-
sten ist sogar diese Form die beliebteste; nur die Extracte von Mel-
lago-Consistenz kann man in derselben in der Regel nicht in voller
Dose, sondern nur als Adjuvantien oder Constituentien anwenden.
[Manche Ärzte pflegen, wenn sie von etwas wirksameren Stoffen (z. B. *Gratiola*,
Conium macul., *Hyosc.*) die Extracte mit ihrer eigenen Substanz in Verbindung
geben, nur von dem Einen die Dose zu bestimmen und das Andere mit *q. s.* hinzu-
zufügen. Aber wie es überall tadelnswürth ist, differente Constituentien mit *q. s.*
anzusetzen, so auch hier. Man soll also die Quantität beider Ingredientien bestimmt
angeben und alsdann, wenn man sicher ist, dass das eine von beiden im Ueber-
schuss sey, irgend ein indifferentes Constituens mit *q. s.* hinzufügen, — wenn
man nicht sicher ist, sich nach I. §. 143. helfen.]

4. In Latwergen zum innerlichen Gebrauch darf
man die stärker wirkenden Extracte der Unsicherheit der Partialgabe
wegen [falls nicht etwa die Latwerge bloss auf 1 oder 2 Einzelgaben berechnet
ist] nicht aufnehmen, und auch die meisten übrigen vermeidet man
ihres üblen Geschmacks wegen in der Regel; nur als Nebenbestand-
theil setzt man wohl das *Extr. Jugland. Nucum* oder ein oder das
andere bittere Extract zu anthelminthischen, ein kalt bereitetes Chi-
na-Extract zu stärkenden u. a. Latwergen, oder wendet das süß und
nicht unangenehm schmeckende *Extr. Graminis liquidum* als
Constituens an. — In Latwergen zum äusserlichen Gebrauch
kann man Extracte von jeder Consistenz unbedenklich aufnehmen.
— Über die Quantitätsverhältnisse vgl. I. S. 297 sub 5.

5. In Pflastern — selten, weil sie [mit Ausnahme der trocknen
Extracte, — die man aber auch nicht oft anzuwenden versucht seyn wird, da
Opium und Myrrhe zu Pflastern weit besser in Substanz passen] die Bearbei-
tung [des Pflasters etwas umständlich machen, und hauptsächlich,
weil sie in dieser Form nicht genügend von der Haut aufgenommen
werden. Quantitätsverhältnisse s. I. S. 260.

6. In Salben, vgl. I. S. 277, 278.

7. In flüssiger Form. Mankann fast alle, innerlich und äus-
serlich, in wässriger [vgl. jedoch S. 160] oder [Verdaulichkeit u. Haltbarkeit
befördernd] weiniger Auflösung geben, pur oder in Mixturen. Wenn die
Flüssigkeit nicht dicklich werden soll, so überschreite man nicht die
I. S. 326 angegebenen Verhältnisse. — Es ist dem Arzt nicht selten
wichtig zu wissen, mit welcher Farbe sich ein Extract im Wasser

auflöst, und ob klar oder trübe, — theils um dadurch gelegentlich einmal den Apotheker controlliren zu können [wobei man übrigens mit seinem Urtheil sehr vorsichtig seyn mag; namentlich bewirken Zusätze zu der sonst klaren Extractlösung oft einen Niederschlag, vgl. z. B. den Art. *Extr. Glycyrrhiz.*], theils und hauptsächlich, um sehr delicates Kranken, wenn eine Wahl zulässig ist, lieber ein durch sein Ansehn weniger abschreckendes Medicament zu reichen, bisweilen auch, um in Augenwässern eine trübe Extractauflösung als einigermassen mechanisch reizend zu meiden. Die meisten Extracte lösen sich mehr oder weniger braun (in verschiedenen Nüancen) und mehr oder weniger trübe auf; bei denjenigen, die davon eine Ausnahme machen, haben wir es, sowohl in der S. 164–166 gegebenen Übersicht als später bei den einzelnen, immer besonders angemerkt. Trübe Extractauflösungen müssen immer umgeschüttelt werden. — Dem Geschmack sagen die Auflösungen der meisten Extracte schlecht zu; am erträglichsten schmecken noch die rein bitteren und gewürzhalt bitteren; man verbessert den Geschmack dadurch einigermassen, dass man zum Menstruum ein aromatisches Wasser [z. B. Orangenblüthwasser, bei bitteren Extracten *Aq. Cinnam. simplex* od. *vinosa*, *Menth. pip.* od. *Menth. pip. vinosa*] wählt, oder eine kleine Quantität eines Äthers, ätherischen Spiritus oder einer aromatischen Tinctur der Auflösung zusetzt; Syrupe dagegen verschlechtern in der Regel nur den Geschmack, namentlich bei den bitteren Extracten; nur der (aus dem destillirten Wasser, nicht wie viele andere aromatischen Syrupe aus Aufgüssen bereite) *Syr. Flor. Aurant.* oder auch der *Syr. Bals. Peruv.* corrigirt noch am ersten bei nauseaß schmeckenden, z. B. *Extr. Chamomill. vulg.*, *Extr. Conii macul.* u. a. (falls deren Quantität nicht gross ist, denn sonst sind diese Syrupe zu schwach und Äther, *Elaeosacch. Menth. pip.* od. dgl. vorzuziehen), und stark gewürzhafte oder mit Wein bereitete Syrupe, wie *Syr. Cinnam.*, *Zingib.*, *Cort. Aurant.*, bei mässig bitteren (z. B. China-) Extracten. Extracte, die schon in sehr kleinen Dosen wirksam sind, z. B. die meisten narkotischen, giebt man oft, in allerlei wässerigen, weinigen (oder — wenn sie sich darin auflösen — geistigen) Flüssigkeiten [die oft mitwirkend seyn können, z. B. *Aq. Laurocer.*, *Vin. stibiat.*] aufgelöst, in Tropfen, in welcher Weise ihr schlechter Geschmack weniger lästig wird als in voluminöseren Arzneien. — Zu Lecksäften setzt man die Extracte, des Geschmackes wegen, nicht gern, am öftersten noch das *Extr. Hyosc.* oder andere narkotische [die bei der geringen Quantität, in welcher man sie aufnimmt, nicht so stark vorschmecken] oder das *Extr. Glycyrrhiz.*; doch darf man bei Kindern in dieser Hinsicht fast weniger ängstlich seyn, als bei Erwachsenen, weil man bei ihnen noch eher einen schlechten Geschmack durch einen starken Zusatz von Süßigkeit verdecken kann.

**Übersicht der
Extracte der preussischen Pharmakopöe
in Hinsicht auf ihre Bereitung und ihre wichtigsten äusseren
Eigenschaften.**

Diejenigen Extracte, bei welchen nicht ausdrücklich das Gegentheil angegeben ist, können sich braun und trübe auf.

Mit einem * bezeichnen wir auch hier (wie sonst bei den Anfängen der Artikel) die im 2ten Theil der Pharmakopöe enthaltenen, *quae praesto esse non debent*.

I.

Extracte von Mellago-Consistenz.

1. Die Substanz durch Kochen ausgezogen; der Auszug durch Decantiren u. Colliren gereinigt, dann eingedickt.

Succus Juniperi inspissatus. (Roob Junip.)

2. Wiederholte Maceration der Substanzen. Der Auszug durch wiederholtes abwechselndes Eindicken, Verdünnen und Filtriren geklärt.

Extr. Chinae fuscae frigide paratum. Auflösung klar.

— *Chinae regiae frigide paratum. Aufl. klar.*

— *Kalerianae. Aufl. klar.*

3. Aus den unter Zusetzen von Wasser zerstampften frischen Substanzen der Saft ausgepresst, u. s. w. (Im Winter Bereitung wie bei II. 2.)

Extr. Graminis liquidum. (Mellago Gram.) Aufl. klar.

Taraxaci liquidum. (Mellago Tarax.) Aufl. klar.

4. Aus dem käuflichen Präparat durch Auflösen; Coliren u. Wiedereindicken bereitet.

Succus Dauci inspissatus depuratus. (Roob D. depurat.)

— *Sambuci inspissatus depuratus. (Roob S. depurat.)*
Aufl. klar.

II.

Extracte von der vorzugsweise so genannten Extraotdioke.

1. Die Substanzen durch wiederholtes Kochen ausgezogen, u. s. w.

Extr. Cuscarillae.

— *Chinae fuscae.*

— *Chinae regiae.*

— *Guajaci Ligni.*

*Extr. Nucis Vomicae. Aufl. weiss-
grünlich.*

— *Quassiae Ligni.*

— *Salicis.*

2. Die Substanzen durch zweimaliges Infundiren mit heissem Wasser ausgezogen, u. s. w.

Extr. Absinthii.

— *Cardui benedicti.*

— *Centaurei minoris.*

— *Channomillae vulgaris.*

— *Dulcamarae.*

— *Fumariae.*

— *Gentianae.*

* *Extr. Glycyrrhizae. Aufl. klar.*

* — *Marrubii.*

* — *Millefolii.*

* — *Scillae. Aufl. klar.*

* — *Taraxaci Radicis. Aufl.
klar.*

— *Trifolii.*

3. Die Substanzen durch Digeriren, zuerst mit Weingeist, dann mit heissem Wasser, ausgezogen, aus dem letzteren Auszuge durch Zusetzen von Weingeist, Decantiren und Filtriren die eiweissstoffigen Theile entfernt, die beiden Auszüge vermischt, u. s. w.

Extr. Aconiti. Aufl. grünlich.

— *Angelicae.*

— *Arnicae Radicis.*

— *Aurantiorum Corticum.*

Aufl. klar.

— *Belladonnae (Herbae).*

Aufl. grünlich.

— *Calami.*

Extr. Chinae spirituosum.

— *Colocyntidis.*

— *Colombo.*

— *Helenii.*

— *Hellebori nigri.*

— *Levistici.*

— *Pimpinellae.* Aufl. klar.

— *Senegae.*

4. Die Substanz wiederholt mit höchst rectificirtem Weingeist digerirt, u. s. w.
Extr. Nucum Vomicae spirituosum.

5. Die Substanz wiederholt mit Schwefeläther macerirt, u. s. w.

* *Extr. Filicis aethereum.*

6. Eisen mit Apfelsaft digerirt, u. s. w.

Extr. Ferri pomatum. Aufl. schwarz, klar.

III.

Extracte von Pillenconsistenz.

1. Extraction wie bei II. 2.

Extr. Graminis.

— *Rhei.*

2. Die frischen Kräuter mit Zusatz von wenig Wasser zerstoßen und ausgepresst, der Saft durch Erhitzen und Coliren von den Faeces [den weniger wirksamen Theilen: Eiweißstoff, Amylum] gereinigt. Dann die Faeces und das ausgepresste Kraut noch mit höchst rectificirtem Weingeist digerirt, durch Destillation der Weingeist entfernt. Die beiden Flüssigkeiten, zur Honigdicke eingedampft, werden mit einander vereinigt und ferner eingedickt. — Alle diese Extracte heißen auch *Succi inspissati.*

Extr. Aconiti Herbae recentis.

Aufl. grünlich.

— *Belladonnae Hb. rec.* Aufl.

grünlich.

* — *Calendulae.* Aufl. grün.

— *Chelidonii.* Aufl. grünlich.

— *Conii maculati* (Aus dem vor

der Blüthe gesammelten

Kraut). Aufl. grünlich.

Extr. Digitalis. Aufl. grünlich.

— *Gratiolae.* Aufl. grünlich.

— *Hyoscyami.* Aufl. grünlich.

— *Lactucae virosae.*

* — *Pulsatillae.*

* — *Stramonii Herbae.* Aufl.

grün.

* — *Vitis Pampinorum.* Aufl.

grün.

3. Unerse Nüsse zerstoßen und ausgepresst, u. s. w.

Extr. Juglandis Nucum.

4. 5. Eigenthümliche Bereitungen.

* *Extr. Aloës Acido sulphurico correctum.*

— *Rhei compositum.*

IV.

Trockene Extracte.

A. Leicht zu pulvern.

1. Extraction wie bei II. 1.

* *Extr. Ligni Campechiani.*

* — *Ratanhuae.*

3. Durch Maceration der gepulverten Substanz bereitet.

Extr. Aloës.

Extr. Opii.

— *Myrrhae.*

3. Käuflich, aus den frischen Wurzeln bereitet.

* *Extr. Ratanhae (venule s. exoticum).*

B. Bereits gepulvert.

4. Aus dem käuflichen Präparat durch Auflösen, Colliren und Wiedereindicken bereitet.

Succus Glycyrrhizae depuratus.

Pharmakodynamische Übersicht sämmlicher von uns aufgenommenen Extracte.

(Die eingeklammerten Abkürzungen: M., E., P. und T. bezeichnen Mollago-, Extract-, Pillen- und trockene Consistenz.)

Narkotisch: *Extr. Opii* (T.), † *Papav. albi* PH. HANN. (T.), *Nuc. Vom.* (E.), *Nuc. Vom. spirit.* (E.), *Bellad.* (E.), *Bellad. Hb. reh.* (P.), *Stramon. Hb.* (P.), † *Stramon. Sem.* PH. HANN. (T.), *Hyosc.* (P.), † *Hyosc. Sem.* PH. HANN. (T.), *Lactuc. vir.* (P.), † *Lactuc. Scariol.* PH. AUST. (E.), *Dulcam.* (E.)

Rxcitirend: *Extr. Arnicae Radic.* (E.), *Valer.* (M.), *Angelic.* (E.), *Calami* (E.), *Chamom. vulg.* (E.), † *Lupuli* PH. HANN. (E.), † *Cinae aether.* PH. SLESV. Anhg. (E.), † *Cubebae.* PH. SLESV. Anhg. (E.)

Tonisch: *Extr. Chinae fusc.* (E.), *Chin. fusc. frigide par.* (M.), *Chinae regiae* (E.), *Chin. reg. frig. par.* (M.), *Chin. spirituos.* (E.), *Cascarill.* (E.), † *Lupuli* PH. HANN. (E.), *Millefol.* (E.), † *Millefol. frig. par.* PH. HANN. (E.), *Aurant. Cortic.* (E.), † *Aurant. Pomor. immat.* PH. SLESV. Anhg. (E.), † *Chamomill. frig. par.* PH. HANN. (E.), † *Rubiae* PH. SLESV. Anhg. (E.), *Ferri pomat.* (E.), † *Ferri cydoniat.* PH. SLESV. (E.)

Bitter: *Extr. Quass. Ligni* (E.), *Gentian.* (E.), *Centaur. min.* (E.), *Card. bened.* (E.), *Trifol.* (E.), † *Trifol. liquid.* PH. HANN. (M.), *Absinth.* (E.)

Schleimig-bitter: *Extr. Colombo* (E.)

Auflösend-bitter: *Extr. Taraxaci liquid.* (M.), *Tarax. Rad.* (E.), *Fumar.* (E.), *Marrub.* (E.), † *Cichorei* PH. AUST. (M.), *Rhei* (P.), *Seneg.* (E.), † *Saponar.* PH. SLESV., HANN. (E.), † *Saponar. Hb.* PH. AUST. (E.), † *Rubiae* PH. SLESV. Anhg. (E.)

Auflösend: (ausser den vorigen) *Extr. Graminis* (P.), *Graminis liquid.* (M.); auch viele narkotische und narkotisch-scharfe.

Adstringirend: *Extr. Ratanh.* (T.), † *Tormentill.* PH. AUST. (E.), † *Salv.* PH. AUST. (E.)

Bitter-adstringirend: *Extr. Salicis* (E.), *Ligni Campech.* (T.), † *Rubiae* PH. SLESV. Anhg. (E.), † *Uvae Urni* PH. SLESV. Anhg. (E.)

Auflösend-adstringirend: *Extr. Juglandis Nucum* (P.), † *Rob Nucum* PH. SLESV. (M.), *Calendul.* (P.)

Säuerlich-adstringirend: *Extr. Vitis Pampinor.* (P.)

Balsamisch: *Extr. Myrrhae* (T.)

Scharf: *Extr. Hellebori nigri* (E.), *Gratiol.* (P.), † *Elaterii* PH. HANN. (T.), *Guajaci Ligni* (E.), *Scillae* (E.), *Seneg.* (E.)

Narkotisch-scharf: *Extr. Conii macul.* (P.), *Aconiti* (E.), *Acon. Hb. rec.* (P.), † *Nicotian.* PH. HANN. (P.), *Digital.* (P.), † *Pulsatill.* (P.), *Chelidoni.* (P.), † *Toxicodendri* PH. SLESV. Anhg. (E.)

Gewürzhaft-scharf: *Extr. Pimpinell.* (E.), *Helen.* (E.), *Levis.* (E.).

Stärkend: die bittern, tonischen, etc.

Stomachisch: *Extr. Calami* (E.), *Aurantior. Cortic.* (E.), † *Aurant.*

Pom. immat. PH. SLESV. Anhg. (E.), † *Cubeb.* PH. SLESV. Anhg. (E.), † *M.*

puli PH. HANN. (E.), † *Chamom. frig. par.* PH. HANN. (E.), die bitteren etc.

Carminativ: *Extr. Calami* (E.), *Chamom. vulg.* (E.), † *Chamom. frig. par.* PH. HANN. (E.), *Millefol.* (E.), † *Millef. frig. par.* PH. HANN. (E.), etc.

Alterirend: *Extr. Valer.* (M.), *Chamom. vulg.* (E.), † *Chamom. frig. par.* PH. HANN. (E.), narkotische, scharfe.

Expectorirend: *Extr. Seneg.* (E.), *Helen.* (E.), *Scillae* (E.), *Marrub.* (E.), *Lactuc. vir.* (P.), *Glycyrrhiz.* (E.), *Succ. Glycyrrh. dep.* (T.), *Succ. Dauci insp. dep.* (M.)

Diaphoretisch: *Extr. Guaj. Ligni* (E.), *Aconiti* (E.), *Acon. Hb. rec.* (P.), *Succ. Samb. insp. dep.* (M.), u. a.

Diuretisch: *Extr. Scill.* (E.), *Digital.* (P.), † *Elater.* PH. HANN. (T.), † *U. Ursi* PH. SLESV. Anhg. (E.), *Succ. Junip. insp.* (M.), *Levis.* (E.), *Guaj. Ligni* (E.), *Seneg.* (E.)

Drastisch: *Extr. Aloës* (T.), *Aloës Acido sulph. correct.* (P.), *Colocynth.* (E.), † *Colocynth. comp.* PH. HANN. (P.), † *Elater.* PH. HANN. (T.), *Gratiol.* (P.), *Hellob. nigri* (E.), *Rhei comp.* (P.), † *Sehnas* PH. P.

Anthelminthisch: *Extr. Filicis æther.* (E.), † *Cinae æther.* PH. SLESV. Anhg. (E.), † *Tanacet.* PH. SLESV. (E.), *Absinth.* (E.), *Jugland. Nucum* (P.), † *Rob. Nucum* PH. SLESV. (M.), *Succ. Dauci insp. dep.* (M.), u. a.

Emmenagog: mehrere narkotische, tonische, drastische, alterirende, *Extr. Seneg.* (E.), u. a.

Besonders in different, und deshalb am häufigsten zu Constituentien von Pillen- u. Bissen-Massengewählt: *Extr. Glycyrrh.* (E.), *Succ. Glycyrrh. dep.* (T.), *Extr. Graminis* (P.), *Graminis liquid.* (M.), *Taraxaci liquid.* (M.), *Taraxaci Radic.* (E.). Sonst aber auch zu diesem Zweck *Extr. Dulcam.* (E.), verschiedene Bittere u. s. w., und wo das Constituens mitwirken soll, alle.

Extractum Absinthii. Wermuth-Extract. [Extractconsistenz. — 1 Drachme $\frac{5}{8}$ Sgr. — Aufmerksamkeit verdient das *Extr. Absinth. concentratum* von LEONARDI, vgl. DIERBACH in Heidelb. klin. Annot. Bd. 9. 8.571.] Innerl. zu Scr. $\frac{1}{4}$ - Dr. $\frac{1}{4}$ mehrmals tägl. (Dr. 1-2 auf den Tag), in Pillen, Mixturen [z. B. Ry 336; 376 (*Extr. Hellob. nigri*), 714 (*Natr. carb. depur.*)].

336.

Ry *Extr. Absinthii* Unc. $\frac{1}{4}$

solue in

Aq. Ment. pip. Unc. 4

adde

Tinct. Cort. Aurant. Dr. 2.*M. D. S.* 2-3 mal tägl., umgeschüttelt,

1 Essl.

AUGUSTIN.

Extractum Aconiti. Eisenhütleinextract. [Extractconsistenz. — Auflösung grünlich. — 1 Drachme 2 $\frac{3}{8}$ Sgr.]

Innerl. zu Gr. 1, einigemal tägl. (allmählig steigend bis zu Gr. 10 u. mehr). In Pulver [nur die kleineren Dosen. — Ry 337], Pillen u. Bissen [z. B. Scr. 1 mit *Hb. Acon.* Scr. $\frac{1}{2}$ u. *Rad. Glycyrrh.* q. s. zu 30 Pillen gemacht, davon 3mal tägl. Eine, 2 od. mehr. — Scr. 1 mit *Pulo.*

Ipecac. opiat. Scr. 2 u. *Mell. despum.* q. s. zu 20 Pillen 4 2stündl. Eine: BREHA gegen nächtliche syphilit. Knochenschmerzen. (Besser wohl ein Paar stärkere Dosen bloß Abends.) — Ry 338; 179 (*Calcar. sulphurata*); 367 (*Extr. Coni mac.*), 692 (*Morphium acet.*), Mixturen [z. B. Dr. $\frac{1}{2}$ in $\frac{1}{2}$ Unze *Vinum stibiat.*, *Vin. Colchici*, *Liq. Ammon. succin.*, *Aq. Laurocer.* od. dgl., davon 3-4mal tägl. 10 Tropfen (ungefähr 1 Gran) u. allmählig mehr. — Ry 339, 340; 191 (*Camp.*)].

Äusserl. zu Pflastern [ein Beispiel I. S. 265], Einreibungen [v. AMMON lässt es bei arthrit. Ophthalmie mit Opium (in der Regel 10-15 Gran Extract mit 8 Gran Opium), mittelst Speichel, sowohl in die Schläfengegend als um das ganze Auge herum einreiben, und besonders die Schläfe- und Jochbein-Gegend oft und lange damit reiben].

337.

Ry *Sulph. stibiat. aurant.* Gr. 3
Rad. Senegae
Succi Glycyrrh. dep. ana Dr. 1
Extr. Aconiti Gr. 12.
M. f. Pulv. Div. in 12 part. aeq. D.
 in charta cerata. S. 2stündl. 1 Pulver.
 REMER.

338.

Ry *Stibii sulphurati nigri laevig.*
Resin. Guaj. nat. ana Dr. 2
Extr. Aconiti Gr. 15-30
Extr. Card. bened. q. s.
 ut f. *Pilulae* 120. *Consp. Pulv. Cass.*
cinnam. D. S. 3mal tägl. 6.

339.

Ry *Extr. Aconiti* Dr. $\frac{1}{2}$
 solve in
Liq. Saponis stibiat. Unc. $\frac{1}{2}$
 adde
Tinct. Guajaci ammon. Dr. 2.
 D. S. Ungeschüttelt, 3mal tägl. 15
 (und allmählig mehr) Tropfen in Ha-
 fers Schleim.

340.

Ry *Extr. Aconiti* Gr. 6-12
 solve in
Inf. Rad. Valer. min. (Unc. $\frac{1}{2}$) Unc. 6
 adde
Liq. Ammon. acet. Unc. 1
Syr. Croci Unc. $\frac{1}{2}$.
M. D. S. 2stündl., ungeschüttelt, 1 Essl.

Extractum Aconiti Herbae recentis. *Succus inspissatus* * *Aconiti*. [Pillenconsistenz. Auflösung grünlich. — 1 Drachme $2\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. in etwa um $\frac{1}{2}$ kleineren Dosen als das vorige, allmählig steigend, in denselben Formen.

Extractum Aloës. [Trocken. — 1 Drachme $\frac{2}{3}$ Sgr.]

Innerl. als Reizmittel zu Gr. 1-2, 2-3mal tägl.; als gelind eröffnendes Mittel Gr. 2-5 auf einmal; als stärkeres Abführmittel Gr. 5-15-20 auf einige Portionen vertheilt, bald hinter einander. In Pillen od. Bissen [z. B. mit *Chinium sulphur.* ana Scr. $\frac{1}{2}$ und Wasser q. s. zu 10 Pillen, davon 1 vor Schlafengehn: PITSCHAFT bei Trägheit des Dickdarms und bei mangelnder Gallenabsonderung als leichtes und sicheres (?). *Ecoproticum.* — Ry 341; 952 (*Sapo jalapin.*)]; saltnr, des schlechten Geschmacks wegen, in Pulvern od. Mixturen.

*) Die Benennung *Succ. inspiss.* ist synonym für mehrere Extracte, vgl. I. S. 28.

Äusserl. zu Klystieren [Gr. 3-6 od. mehr], Augensalben [Gr. 2-5 auf Dr. 2], Augensäften [zu Augenbähungen Gr. 5-20 auf Unc. 4; zu Augentropfensäften Gr. 2-6 auf Unc. $\frac{1}{4}$. — Ry 171 (Borax)], Verbandwässern [selten; Dr. 1-2 auf Unc. 6]; auch endermatisch [wie Aloë, doch nach A. L. RICHTER ebenfalls sehr unzuverlässig].

341.

Ry *Ferri pulv.* Gr. 15
Extr. Aloës pulv. Dr. 1
 — *Rhei comp.* Dr. $\frac{1}{2}$.
M. f. c. Spir. V. rfi. paucillo Pilul.

las 45. Cons. D. — Etwa 2-3 Stück
 1-2mal tägl. (um fortdauernd ohne
 Schwächung gelind zu eröffnen).

Pilulas aperientes PH. SLESV.
 (1 Drachme 6 Shl.)

****Extractum Aloës Acido sulphurico correctum.***

[*Extr. Aloës* 8 in *Aq. destill.* q. s. gelöst, concentrirte Schwefelsäure 1 tropfenweis zugesetzt, zur Pillenconsistenz abgedampft. — 1 Drachme $1\frac{1}{3}$ Sgr.] *Cave:* Die Schwefelsäure zieht Feuchtigkeit aus der Luft an, dadurch wird die Masse weicher; deshalb sind Pillen *in vitro bene clauso* zu verabreichen. — Innerl. in ein wenig höhern Gaben als das vorige.

342.

Ry *Extr. Aloës Ac. sulph. corr.* Dr. $\frac{1}{2}$
Pulv. Rad. Jalap. Gr. 8.
M. f. l. a. Pilulas 20. *Cons. D.* in
vitro bene clauso. S. Abends 1-3.
 (HEIM's gewöhnliche abführende Pillen. Wo Pillen nicht zusagen, bedient er sich dafür der folgenden Formel.)

Gm. Mimos. pulv. ana Gr. 5.
M. f. l. a. Pilulas 20. *Cons. D.* in *vitro bene clauso. S.* Morgens und Abends 1-2.
 (Purgirpillen für Hypochondristen.)
 HEIM.

343.

Ry *Extr. Aloës Ac. sulph. corr.* Dr. $\frac{1}{2}$.
Tere in mortar. c.
Syr. Bals. Peruv. Unc. 1
adde

Tinct. Colocynth. Dr. 1.
M. D. S. Abends $\frac{1}{2}$ -1 Theelöffel, umgeschüttelt. HEIM.

344.

Ry *Extr. Aloës Ac. sulph. corr.* Dr. $\frac{1}{2}$
Castorei pulv.

345.

Ry *Extr. Aloës A. s. corr.* Dr. $\frac{1}{2}$
Gutti pulv. Gr. 6.

M. f. Pilulas 18. *Cons. D.* in *vitro bene clauso. S.* Abends 1-3. (HEIM's stärker abführende Pillen.)

346.

Ry *Pulv. Rad. Ipecacuanh.* Scr. $\frac{1}{2}$
Extr. Aloës A. s. corr. Dr. 1
Ol. Menth. piper. Gtt. 5.

M. f. Pilulas 30. *Cons. Pulv. Rad. Liquir. D.* in *vitro bene cl. S.* Morgens u. Abends eine Pille. (Bei Asthma.)
 (HEIM.)

Extractum Angelicae. Engelwurzelextract. [Extractconsistenz. — 1 Drachme $2\frac{1}{3}$ Sgr.] Innerl. [hauptsächlich nur in chronischen Unterleibskrankheiten] zu Gr. 5-15 einigemal tägl.

† ***Extractum Arnicae Florum*** PH. AUSTR. [Durch wiederholtes Abkochen (wohl nicht zweckmässig, indem das äther. Öl dadurch verloren geht) bereitet. — Extractconsistenz.] Etwa wie das folgende.

Extractum Arnicae Radicis. Wohlverleihwurzelextract. [Extractconsistenz. — 1 Drachme 2 Sgr.] Innerl. zu Gr. 8–15 mehrmals tägl.

Extractum Aurantiorum Corticum. Pomeranzenschalenextract. [Extractconsistenz. Auflösung klar. — 1 Drachme $1\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. zu Scr. 1–2 mehrmals tägl. (Dr. 1–2 auf den Tag); in Bissen, Latwergen [Ry 277 (*Cort. Chin. fusc.*)], Mixturen, Elixiren [officinell *Elixir amarum*],

+ ***Extractum Aurantior. Pomorum immaturor.***
PH. SLESV. Anhg. [Durch wiederholtes leichtes Abkochen bereitet. — Extractconsistenz. — 1 Unze 12 Sbl.] Innerl. wie das vorhergehende.

Extractum Belladonnae (Herbae). Tollkirschenkrautextract. [Extractconsistenz. Auflösung grünlich. — 1 Drachme $2\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerl. (*ad Grana duo!*) zu Gr. $\frac{1}{4}$ –2 (u. allmählig mehr), 2–3 mal tägl., in den gewöhnlichen Formen; als Prophylacticum gegen Scharlach gewöhnlich in Auflösung und in sehr kleinen Gaben [z. B. nach PITSCHAFT Ry 347; noch schwächer nach BERNDT: Gr. 1 in *Aq. Cinnam. vinos.* Unc. $\frac{1}{2}$, davon Kindern von 1 Jahr früh u. Abends 2–3 Tropfen (kaum $\frac{1}{20}$ – $\frac{1}{8}$ Gran), ältern Kindern auf jedes Jahr 1 Tropfen mehr, 12 Tropfen als die höchste Gabe; — nach SERLO von derselben Auflösung 3 mal tägl. so viele Tropfen als das Kind Jahre zählt (und zwar so lange als ein Scharlachkranker in der Nähe ist, oder, wo kein Kranker in der Nähe, doch 14 Tage lang; dann 14 Tage lang nur Morgens u. Abends, u. 14 Tage nur Morgens; darauf nach einer Pause von einigen Wochen wieder 14 Tage 3 mal, 14 Tage 2 mal und 14 Tage 1 mal tägl.; so abwechselnd bis zur Beendigung der Epidemie); — nach HUFELAND: Gr. 1 in Scr. 8 mit etwas Weingeist versetzten Wassers, 2 mal tägl. so viel Tropfen als Jahre; nach HUFELAND muss wenigstens 8 Tage lang der Gebrauch gemacht sein, um dem Organismus die Immunität gegen die Ansteckung zu geben, und dann muss das Mittel fortgesetzt werden, so lange eine Ansteckung möglich ist. — Andre, z. B. G. A. RICHTER, schlagen das Pulver der Wurzel, 1–3 mal tägl. zu Gr. $\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{2}$ nach Verschiedenheit des Alters — also schon merklich grössere Gaben, vor (ob ohne Nachtheil?)); sonst etwa in *Aq. Laurocer.* oder andern wirksamen Menstruis oder einem aromatischen Wasser od. dgl. aufgelöst [z. B. Gr. 4 in *Aq. Laurocer.* od. *Amygdal. amar.* Unc. $\frac{1}{2}$, 3–4 mal tägl. 30 Tropfen: HUFELAND bei hartnäckigen Krämpfen, besonders des Schlundes, Magens u. Darmcanals, bei Dysphagie, chronischem Erbrechen, selbst anfangenden Magenverhärtungen, auch bei Gemüthskrankheiten (*Liquor Bellad. cyanicus* PH. P.). — Ry 348, 349. Verb. mit *Tinct. Iodi* s. dort].

Ausserl. [vgl. das folgende] zu Zahnpillen [Ry 788 (*Opium*)], Zahnlatwergen [Ry 789 (*Opium*)], Injectionen [Ry 315 (*Cubeb.*)], Augensalben [s. unten Einreibesalben], Augenwässern [Zur Er-

weiterung der Pupille behufs der Unterpuchung des Auges oder (2 St. vorher lauwarm einzutropfen) der Staaroperation etwa Gr. 2-3 auf Dr. 1. Sonst zu Augentropfwässern ein Paar Gran, doch auch bis zu Scr. 1, auf Unc. $\frac{1}{2}$; — z. B. Gr. 1 in *Aq. Opii* Dr. 2, 2-3mal tägl. einzutropfen: RUST, um bei chronischem Verlauf einer Augenentzündung Verschliessung der Pupille zu verhüten; — Gr. 5 auf *Aq. comm.* Dr. 2: FISCHER zu ähnlichem Behuf in acuten Fällen. — Zu Augenbähungen etwa Scr. 1 - Dr. 1 auf Unc. 4.], Pflastern [R₃ 350], Einreibesalben und Linimenten [z. B. Gr. 15 auf Schweinfett Unc. $\frac{1}{2}$: DUBLA zum Einreiben in Nieren- und Harnröhren-Gegend bei Steinkoliken. — Gr. 12 auf *Ungt. rosat.* Unc. $\frac{1}{2}$, halbstündl. einer Bohne gross in den Muttermund eingerieben, nebst Umschlägen von *Hb. Bellad.* auf den Unterleib u. Einspritzungen von Belladonna: MANDT bei einer sehr schwierigen Geburt wegen krampfhafter Verengerung des Muttermundes. Stärker nach CHAUSSIER: Dr. 1 auf Unc. $\frac{1}{2}$, in den Muttermund einzureiben, wenn Rigidität desselben die Geburt verzögert (daneben Belladonna-Einspritzungen). Weniger zweckmässig ist es wohl, nach CONQUEST in solchen Fällen Dr. $\frac{1}{2}$ unvermischt in den Muttermund einzureiben, weil sich das zähe Extract so nicht gut einreiben lässt; lieber mit Wasser ana. — Dr. $\frac{1}{2}$ („mit etwas Eigelb“) auf *Ol. Hyosc. coct.* Unc. 1, erwärmt einzureiben: MOST bei zu reducirenden eingeklemmten Brüchen. FRÄNKEL lässt zu gleichem Zweck 1 auf 16 Fett in Bruchgeschwulst und Unterleib einreiben, französische Ärzte das Extract bloss mit etwas Wasser verdünnt. — Unc. $\frac{1}{4}$ mit *Liq. Ammon. acet.* Dr. 2, davon $\frac{1}{2}$ - 1 Theelöffel einzureiben: BLASIUS als ein vorzügliches Mittel zur Beförderung der Aufsaugung. — Zu Einreibungen ums Auge Gr. 6-24 auf Dr. 2; z. B. Gr. 12 mit weissem Präcipitat Gr. 5 auf Fett Dr. 1, davon 2mal tägl. mit einem Haarpinsel auf die äussere Fläche der Augenlider und ihre Umgebungen sanft einzureiben: FISCHER bei scroful. Lichtscheu u. Augenliederkrampf. — Man lässt es auch wohl mit Speichel einreiben; so z. B. ums Auge (1 oder ein Paar Gran jedesmal — JÜNGKEN); bei Prosopalgie auf die leidende Stelle; bei Keuchhusten nach PIEPER einigemal tägl., zumal Abends, in die Magengegend, Kindern von $\frac{1}{2}$ Jahr 1 $\frac{1}{2}$ Gran, älteren mehr.], Umschlägen [R₃ 351]; auch endermatisch.

347.

R₃ Extr. Belladonn. Gr. 1

solve in

Aq. Flor. Aur. (od. *Foenic.*) Unc. 4
adde*Spir. Vini* rst. Dr. 1*Syr. simpl.* Unc. $\frac{1}{2}$.

M. D. S. Älteren Kindern 1 Theelöffel (ungefähr $\frac{1}{8}$ Gran), jüngeren $\frac{1}{2}$ Theelöffel, umgeschüttelt, Morgens u. Abends. (Als Prophylacticum gegen Scharlach, s. oben.) PITSCHAFT.

348.

R₃ Extr. Belladonnae Scr. $\frac{1}{2}$ — *Cratolae* Dr. 2

solve in

Aq. Laurocer. Unc. 1.

D. S. 3mal tägl., umgeschüttelt, 30 Tropfen u. mehr. (Bei Melancholie u. Manie.) HUFELAND.

349.

R₃ Extr. Belladonnae— *Hyoscyami* ana Gr. 3*Oxymell. scillit.* Unc. $\frac{1}{2}$ *Syr. Alth.* Unc. 2.

Solve. D. S. 2stündl., umgeschüttelt, 1 Theelöffel. (Bei Keuchhusten eines 8jährigen Kindes.)

350.

R₃ *Cerae flavae* Unc. 1

Terebinth. comm. Dr. 1½.
Leni igne liquatis malaxando adm.
Extr. Belladonn. Dr. 2.
R. l. a. Emplastr. D.

351.

Ry *Extr. Belladonn.* Dr. 2

solve in

Aq. Laurocerasi Unc. 4

adde

Aether. sulphur. Dr. 1.

M. D. S. Umgeschüttelt zum Umschlagen (gegen Neuralgien), auch zum Einreiben (bei rheumatischen u. gichtischen Schmerzen).
 ROUX.

Extractum Belladonnae Herbae recentis. [Pillenconsistenz. Auflösung grünlich. — 1 Drachme 2½ Sgr.] Innerl. (*ad Grana duo!*) zu Gr. ¼-1, u. allmählig mehr, 2-3mal tägl. — Äusserl. noch wenig versucht, dürfte aber meist dem vorigen vorzuziehen seyn.

Extractum Calami. Kalmusextract. [Extractconsistenz. — 1 Drachme 2½ Sgr.] Innerl. zu Scr. ¼ - Dr. ½, einigemal tägl.

* **Extractum Calendulae.** Ringelblumenextract. [*Ex Hb. rec. c. Floribus.* — Pillenconsistenz. Auflösung grün. — 1 Drachme 2½ Sgr.] Innerl. zu Gr. 8-16, allmählig bis zu Dr. ¼ (u. mehr), 2-4mal tägl.; in Pillen [Ry 352; 405 (*Ferr. oxydat. fusc.*)], Mixturen. — Äusserl. zu Verbandwässern [Ry 353], Salben [mit ein wenig Wasser zum Brei angerührt; auch wohl als Zusatz zu Fett-Salben].

352.

Ry *Hydrarg. muriat. mitis* Scr. ½
Sulph. stib. aurant. Scr. 1
Extr. Calendulae
 — *Conii macul.* ana Dr. 2.
M. f. Pilulae pond. Gr. 2. (nr. 135).
Consp. Pulo. Cass. cinnam. D. S. 3mal
 tägl. 5. (Zertheilend, z. B. bei allerlei
 chronischen Verhärtungen.) RUST.

353.

Ry *Extr. Calendulae*
 — *Chamomill. vulg.* ana Dr. 2
 solve in
Aq. Laurocerasi Unc. 2
 adde
Tinct. Opii simpl. Dr. 1.
M. D. S. Verbandwasser, umgeschüttelt. (Bei Krebsgeschwüren ein Lieblingemittel von RUST.

Extractum Cardui benedicti. Cardobenedictenextract. [Extractconsistenz. — 1 Drachme 1 Sgr.]

Innerl. zu Scr. ¼-1 mehrmals tägl. (Dr. 1-1½ auf den Tag); in Pillen [Ry 338 (*Extr. Acon.*), 611 (*Kali sulphuric. dep.*)], Bissen [namentlich auch als Constituens von Brechbissen. Ry 869 (*Rad. Ipecac.*)], Latwergen [ungern, des höchst widrigen Geschmacks wegen; ausser als Constituens von Brechlatwergen; Ry 870 (*Rad. Ipecacuanh.*)], Mixturen [wo jedoch ätherische, gewürzhafte od. a. Geschmacks corrigentien höchst nöthig. — Ry 115 (*Aq. Laurocer.* — in dieser Formel ist die *Aq. Laurocer.* Hauptmittel u. hauptsächlichstes Geschmacks corrigens zugleich), 575 (*Kali acet.*)].

Extractum Cascarillae. Cascarilleextract. [Extractconsistenz. — 1 Drachme $2\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. zu Scr. $\frac{1}{2}$ –1 einigemal tägl. In Pillen, Mixturen [R_x 354; 276 (*Cort. Cascar.*)]. — Äusserl. zu Zahnfleischlatwergen.

354.

R_x *Extr. Cascarillae*
— *Colombo ana* Dr. $1\frac{1}{2}$
solve in
Aq. Menth. pip. Unc. 5

addo

Tinct. Cinnam. Dr. 2
Syr. Cort. Aurant. Unc. 1.
M. D. S. 2stündl., umgeschüttelt, 1 Essl.
(Bei Diarrhöen.) VOGEL.

Extractum Centaurii minoris. Tausendgüldenkrautextract. [Extractconsistenz. — 1 Drachme $1\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. zu Scr. $\frac{1}{2}$ –1 mehrmals tägl. (etwa Dr. 1 auf den Tag), in Pillen, Bissen, häufiger in Mixturen [R_x 106 (*Amygdal. amar.*)].

Extractum Chamomillae vulgaris. Kamillenextract. [Extractconsistenz. — 1 Drachme $1\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. zu Scr. $\frac{1}{2}$ –Dr. $\frac{1}{2}$ mehrmals tägl. In Pillen od. Bissen [R_x 355; 96 (*Ammon. muriat. dep.*)], Mixturen [R_x 356, 357]. — Äusserl. zu Pinselsäften [R_x 512 (*Hydr. mur. corr.*)], Verbandwässern [R_x 353 (*Extr. Calend.*)], etc.

355.

R_x *Extr. Chamom. vulg.* Dr. 2
Ol. Chamom. simpl. Gtt. 12
Pulv. Flor. Chamom. vulg. q. s.
ut f. *Pilulae* 120. *Consp. Pulv. Chamomillae. D. in vitro. S.* 4mal tägl. 8–10.
(Theuer.)

M. D. S. 2stündl., umgeschüttelt, 1 Essl.
(Bei Durchfällen u. Ruhren.)
G. A. RICHTER.

356.

R_x *Extr. Chamomill. vulg.*
Gm. Mimos. electi ana Dr. 2
solve in
Aq. Chamom. Unc. 5
addo
Syr. Capit. Papav. Unc. $\frac{1}{2}$.

357.
R_x *Extr. Chamomill. vulg.*
Gm. Mimos. electi ana Dr. 2
solve in
Aq. Chamom. Unc. 5
addo
Pulpae Tamarindor.
Syr. Chamom. ana Unc. 1.
M. D. S. Umgeschüttelt esslöffelweise.
(Bei galligen Ruhren u. Durchfällen.)
JAHN.

+ ***Extractum Chamomillae frigide paratum*** PH. HANN. [Extractconsistenz. Auflösung klar. — 1 Drachme 3 Mgr., 1 Unze 20 Mgr.] Innerl. in etwas grösserer Dose als das vorige.

Extractum Chelidonii. Schöllkrautextract. [*Hb. rec.* — Pillenconsistenz. Auflösung grünlich. — 1 Drachme $2\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. zu Gr. 5–15 (u. allmählig mehr) einigemal tägl.; in Pillen [R_x 358],

Bissen [R_x 403 (*Fel Tauri insp.*)], Mixturen [gern mit aromatischem Zusatz. — R_x 620 (*Kali tartar.*), 1023 (*Tart. boraxat.*)]. — Äusserl. entbehrlich.

358.

R_x *Ammoniaci depur.* Dr. 1½
Saponis medicati Dr. 1

Extr. Chelidonii Dr. 1½.

M. f. c. Spir. V. rfiti pauzillo Pül-
las 120. *Consp. Pulv. Sem. Foenic. D.*
S. 3mal tägl. 12. SCHUBARTH.

Extractum Chinae fuscae. Braun-Chinarinden-extract. [Aus der Abkochung bereitet, entspricht also wohl dieser in der Wirkung. — Extractconsistenz. — 1 Drachme 5 ½ Sgr.] Innerl. zu Scr. ½ - Dr. ½ mehrmals tägl. (Dr. 1-2 auf den Tag), in Pillen od. Bissen [z. B. Scr. ½ mit *Cort. Chin. fusc. q. s.* zu Bissen gemacht, solcher Dosen einige tägl.], Mixturen [R_x 359]. — Äusserl. zu Mundwässern [R_x 360], Pomaden [R_x 361] etc.

359.

R_x *Extr. Chinae fuscae* Dr. 2-4
solve in

Aq. Cinnam. simpl. Unc. 2
adde

Spir. sulph. aeth. Dr. 1.
M. D. S. 4mal tägl., umgeschüttelt, ½ Essl.

D. S. Umgeschüttelt einzuspritzen (gegen brandige Halsentzündung bei Kindern.) WENDT.

361.

R_x ½ *Medullae Bovis* Unc. ½.
Leni igne liquatas, colatas et semire-
frigeratas adm.

Extr. Chin. fusc. Dr. ½

Ol. Rosarum Gtt. 2

— *Bergamottae* Gtt. 8.

M. f. Ungt. D. in pyxide alba. S.
Pomade. (Zur Beförderung des Wach-
 sens, zur Verhütung des Ausfallens der
 Haare.)

360.

R_x *Camphorae trit.* Gr. 6
Gm. Mimosae pulv. Dr. ½

terendo sensim misce c.

Aq. Salviae Unc. 8
ut f. Emuls., in qua solve

Extr. Chin. fusc. Dr. 3.

Extractum Chinae fuscae frigide paratum.

[Die kalt bereiteten Chinaextracte gehören zu den unwirksameren Präparaten: sie enthalten von den Alkaloiden und vom Gerbstoff nur Spuren, ihre Färbung rührt vom Extractabsatz her. — Mellagoconsistenz. Auflösung klar. — 1 Drachme 10 ½ Sgr.] Innerl. in etwas grösserer Dose als das vorige. [R_x 362-364; 53 (*Aeth. sulphur.*)]. — Einen Pinselsaft s. R_x 983 (*Spir. muriat. aeth.*)

362.

R_x *Pulp. Tamarind.* Unc. 2
Extr. Chin. fusc. frig. par. Dr. 2
Elaeosacch. Citri Dr. 6
Aether. acetici Scr. 1.

M. f. Electur. D. in pyxide episto-
mio subereo clausa. S. 2stündl. 1 Thee-

löffel. (Nach den Anfällen der Meläna.)
 SUNDELIN.

363.

R_x *Extr. Chinae fusc. frig. par.* Dr. 2
Aq. Flor. Aurant. Unc. 2
Syr. Cinnam. Unc. 1

Aether. acetici Gtt. 10.
M. D. S. 3mal. tägl. 1 Essl.

364.

R_y *Gm. Mimos. electi* Dr. 3
solvo in
Aq. destillatae Unc. 3

Aq. Florum Aurantii Unc. 2
adde

Aether. acetici Dr. $\frac{1}{2}$
Extr. Chin. fusc. frig. par. Dr. 3
Syr. Cort. Aurant. Unc. 1.
M. D. S. Stündl. 1 Essl. (Gegen asthenisches Blutbrechen.) SUNDELIN.

Extractum Chinae regiae. Königschinarinden-extract. [1 Drachme $2\frac{5}{8}$ Sgr.] Wie *Extr. Chin. fuscae*.

Extractum Chinae regiae frigide paratum.
 [1 Drachme 7 Sgr.] Wie *Extr. Chin. fusc. frig. par.*

Extractum Chinae spirituosum. Geistiges Chinaextract. [Aus einem kalten geistigen und einem warmen wässerigen Aufguss bereitet; besonders kräftig. — Extractconsistenz. — 1 Drachme $4\frac{1}{8}$ Sgr.] Innerl. zu Gr. 5–15 mehrmals tägl. (Dr. $\frac{1}{2}$ – $1\frac{1}{2}$ auf den Tag. — Äusserl. wie *Extr. Chin. fuscae*. Eine Zahnfleischlatwerge; L. 8. 303.

+ *Extractum Cichorei liquidum* PH. AUSTR. [Aus Kraut und Wurzel. — Mellagoconsistenz.] Wie *Extr. Tarax. liq.*

+ *Extractum Cinae aethereum* PH. SLESV. Anhg. *Extr. Cin. resinosum.* Ätherisches Zittwersamenextract. [Wie *Extr. Filic. äther.* bereitet. — Extractconsistenz. — 1 Drachme 16 Sbl.] Innerl. zu Scr. 1 in zwei Portionen kurz hinter einander; etwa nach SCHUPMANN in Wein aufgelöst, am Morgen, nüchtern; darauf 1 Tasse schwarzen Kaffees, bis zum Mittag keine Speisen, dann eine dünne Suppe; — für Kinder etwa mit *Syr. Amygdal.*

Extractum Colocynthis. Koloquintenextract. [Extractconsistenz. — 1 Drachme $9\frac{5}{8}$ Sgr.] Innerl. als Reizmittel zu Gr. $\frac{1}{2}$ – $\frac{1}{4}$; als gelindes Purgans zu Gr. 2–4; als drastisches (kaum noch gebräuchlich) zu Gr. 4–10. [Pillen: R_y 56 (*Aloë luc.*)] — Äusserl. (selten) zu Klystieren [R_y 365].

365.

R_y *Extr. Colocynthis* Scr. 1
Natri muriat. Dr. 3
solvo in
Inf. Flor. Chamomill. vulg. Unc. 5
adde
Extr. Gram. liq. Unc. $1\frac{1}{2}$.

M. D. S. Umgeschüttelt zum Klystier. (Heftig reizend, ausleerend: bei Coma, Stupor u. a. Gehirnaffectationen von örtlichen Verletzungen; auch bei der sogenannten serösen Apoplexie. — Nach ABERNETHY von SUNDELIN verbessert.)

+ *Extractum Colocynthis compositum* PH. HANN.

[*Pulpa Coloc.* 3 mit *Spir. V. rst.* digerirt, zur Colatur Aloë 6, Scammonium 2; im Dampfbade eingedickt, mit Zusatz von *Extr. Rhei* 1. — Pillenconsistenz. — 1 Drachme 9 Mgr. — Das gleichnamige Präparat in PH. SLESV. Anhg. (1 Drachme 16 Shl.) unterscheidet sich nur durch Extractconsistenz, ist also in etwas grösserer Gabe zu reichen.]

Innerl. als Drasticum zu Gr. 4-8-12; in Pillen [bisweilen mit Calomel oder, um Leibschmerzen zu verhüten, mit einer Kleinigkeit äther. Öls, namentlich Kamillenöls].

Ein sehr ähnliches Präparat ist endermatisch angewandt worden [von W. W. GERHARD, als Purgans, zu Scr. 1, nöthigenfalls wiederholt].

Extractum Colombo. Kolomboextract. [Extractconsistenz. — 1 Drachme 6 Sgr.] Innerl. zu Scr. $\frac{1}{2}$ -1 einigemal tägl.; in Pillen [R₂₀ (*Acid. muriat.*)], Mixturen [R₃₆₆; 354 (*Extr. Cassiarill.*)].

366.

R₃₆₆ *Extr. Colombo* Dr. 2

solve in

Aq. Cinnamomi simpl. Unc. 2

adde

Spir. sulph. aeth. Dr. 1*Tinct. Rhei aquosae* Unc. 1.*M. D. S.* 3mal tägl., umgeschüttelt,

1 Essl.

RICHTER.

Extractum Conii maculati s. Cicutae. Schierlingsextract. [*Hb. rec.* — Pillenconsistenz. Auflösung grünlich. — 1 Drachme 2 $\frac{1}{2}$ Sgr. — Das *siccatum* der PH. SLESV., s. S. 161 Z. 6 v. u. (1 Drachme 3 Shl.), in etwas geringeren Dosen.]

Innerl. zu Gr. 1-2, 2-3mal tägl., rasch steigend. In Pulver [R₃₁₄ (*Cubeb.*)], Pillen od. Bissen [z. B. Dr. 1 mit *Hb. Conii macul.* Gr. 15, daraus 36 Pillen; anfangs eine, später allmählig mehr, *p. dosi.* — R₃₆₇; 216 (\dagger *Carbo Carnis*), 352 (*Extr. Calend.*)], Mixturen [z. B. Dr. $\frac{1}{2}$ in *Aq. Laurocer.* Unc. $\frac{1}{2}$ gelöst, zu 8-16, allmählig mehr, Tropfen *p. dosi.* — R₃₆₈; 159, 160 (*Baryta muriat.*), 175 (*Calcar. muriat.*)].

Ausserl. zu Pinselsäften [R₅₁₂ (*Hydr. mur. corr.*)], Augewässern [Zu Augenbähungen Scr. 2-Dr. 2 auf Unc. 4. — Zu Augentropfwässern etwa Scr. $\frac{1}{2}$ -1 auf Unc. $\frac{1}{2}$. R₉₃ (*Ammon. carb. pyro-ol.*)], Augensalben [Scr. $\frac{1}{2}$ -Dr. $\frac{1}{2}$, mit ein wenig Wasser zum Brei angerührt, auf 2 Dr. Fett] u. a. Salben [R₁₂₆ (b)]; auch wohl, auf Leder gestrichen, in Pflasterform; auch endermatisch versucht.

367.

R₃₆₇ *Asae foet. depuratae**Resin. Guajaci nativae ana* Dr. 1*Hydrarg. muriat. mitis* Gr. 15*Extr. Aconiti* Dr. $\frac{1}{2}$ *Extr. Con. macul.* Dr. 1.*M. f. c. Spir. V. rst. pauxillo Pila-**lae* Gr. 2 [lieber 120]. *Consp. Pulv.**Rad. Irid. Flor. D. in vitro. S.* Früh u.

Abends 5-10. (Gegen Gesichtsschmerz.)

JAHN.

368.

R₃₆₈ *Extr. Conii macul.* Scr. 2

solve in

Aq. Foeniculi Unc. 2

adde

Tinct. Opii benzoic. Unc. $\frac{1}{2}$.

M. D. S. Theelöffelweise, umgeschüttelt. (Bei Keuchhusten.)

G. A. RICHTER.

† *Extractum Cubeburum* PH. SLESY. Anhg. [Nach der DUBLANCschen Vorschrift bereitet, recht vollständig die wirksamen Bestandtheile (äther. Öl und Harz) enthaltend. — Extractconsistenz. — 1 Drachme 4 Sbl.] Innerl. zu Scr. $\frac{1}{2}$ –1 (u. mehr), einigemal tägl.; in Bissen, Mixturen.

Extractum Digitalis. Fingerhutextract. [Hb. rec. — Pillenconsistenz. Auflösung grünlich. — 1 Drachme 2 $\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. zu Gr. $\frac{1}{2}$, steigend bis zu Gr. 1–2 (u. mehr), einigemal tägl. [z. B. in Liq. Kali acet.; s. dort]. — Wäre wohl endermatisch zu versuchen.

Extractum Dulcamarae. Bittersüßextract. [Extractconsistenz. — 1 Drachme 1 $\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. zu Scr. $\frac{1}{2}$ –1 (u. mehr), einigemal tägl.; in Bissen od. Pillen [Ry 369; 17 (*Acid. benz.*), 181 (*Calcar. sulphurata*), 560 (*Hydrarg. stibiato-sulph.*), 601 (*Kali sulphurat.*), 859 (*Rad. Ipecac.*), 941 (*Res. Guaj. nat.*)], Latwerge [Ry 448 (*Grapt.*)], Mixturen [Ry 370; 115 (*Aq. Laurocer.*)].

369.

Ry *Stibii sulphurati nigri laevig.*
Stipit. Dulcamar. pulv. ana Dr. 2
Extr. Dulcamarae Unc. $\frac{1}{2}$
Pulv. Sem. Carvi q. s.
at f. Boli 30. Cons. Pulv. Sem. Carvi.
D. S. 3mal tägl. 2.

Extr. Dulcamarae Gr. 15–20

solve in

Aq. Foenic. Unc. 1 $\frac{1}{2}$

adde

Vini stibiat. Dr. $\frac{1}{2}$ *Syr. Alth. Dr. 3.*

M. D. S. 2stündl., umgeschüttelt, 1 Theelöffel. (Bei Keuchhusten eines etwa 1jährigen Kindes.) OSANN.

370.

Ry *Kali tartarici* Gr. 45

† *Extractum Elaterii* PH. HANN., PH. SLESY. Anhg. *Elaterium (nigrum)*. Eselskürbis-Extract od. -Saft. [Der Saft der *Poma Elaterii* (*Fructus Momordicae*; *Cucumeres asini*) eingedickt. Hauptbestandtheil: ein in Wasser unlösliches, stark abführendes u. brechen-erregendes Subalkaloid (Elaterin). — Trocken. — 1 Drachme 24 Mgr.; nach der Schlesw. Hohl. Taxe nur 8 Sbl. (!) *Cave* concentrirte Mineralsäuren [besonders Salpetersäure]; Salzbilder; Metallsalze; Gerbstoff.

Innerl. als Reizmittel zu Gr. $\frac{1}{16}$ – $\frac{1}{4}$, 2–3 mal tägl.; als Purgans zu Gr. $\frac{1}{4}$ –1, einigemal hinter einander. In Pulver [z. B. Gr. $\frac{1}{2}$ (mit Zucker) viertelstündl., bis Purgiren erfolgt; BRANDE bei Wassersucht; — Gr. $\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{2}$, 2–3 mal tägl.: HEINEKEN bei Wassersucht mit Torpidität der Harnwerkzeuge u. des Darmcanals], Pillen, Mixturen [stark umzuschütteln, weil das Elaterin in Wasser unausfälllich].

Die endermatische Methode, hat W.W. GERHARD und A.L. RICHTER nur ungünstige Resultate gegeben.

† *Extractum Ferri (Martis) cydoniatum* PH. SLESV.

Mit Quittensaft bereitetes Eisenextract. [Nicht sehr wesentlich vom folgenden verschieden, da der Saft der Quitten, *Cydonia*, *Fructus Cydoniae*, hauptsächlich Äpfelsäure enthält. — Extractconsistenz, Auflösung klar. — 1 Drachme 28M.] Cautelen u. Gebrauch wie beim folgenden.

Extractum Ferri pomatum. Extr. Martis c. Succo

Pomorum. Extr. Malatis Ferri. Äpfelsaures Eisenextract. [Aus äpfelsaurem Eisenoxyduloxyd; Zucker, Schleim u. a. extractiven Theilen bestehend. — Extractconsistenz. (Wird an der Luft weicher, doch langsam.) Auflösung schwarz, klar. — 1 Drachme 1½ Sgr.] *Cave* Säuren; kohlen saure, phosphors., blaue, hydrothions. Alkalien, bernsteins. Ammonium; Seifen; Metallsalze [besonders Quecksilbersalze, salpeters. Silber, salzs. Gold, essigs. Blei, *Cupr. sulphurico-ammoniat.*]; Kalkwasser; in flüssigen Formen Gerbstoff.

Innerl. zu Gr. 5-10 einigemal tägl., in Pillen [Ry 408 (*Ferr. oxydul. nig.*), 444 (*Galban. dep.*)] oder Mixturen [zu diesen jedoch häufiger die *Tinct. F. p.*]

* *Extractum Filicis aethereum s. resinum. Oleum Filicis Maris.* Ätherisches Farrnkrautwurzelextract. Farrnkrautöl. [Mit Schwefeläther nach PESCHIER's Methode dargestellt. Ist ein fettes, Harz und etwas Extract enthaltendes, Öl von widerlich scharfem Geschmack, mit Wasser natürlich nur durch Emulgiren zu verbinden. — Extractconsistenz. — 1 Scrupel 6½ Sgr.]

Innerl. zu Scr. 1 (— Dr. ½) in einem Paar Portionen kurz hinter einander, in Tröchisken [Ry 536 (*Hydr. mur. mita*)], Pillen [z. B. Scr. 1 mit *Pulv. Rad. Filic. q. s.* zu 20 Pillen gemacht, u. diese in 2 Portionen binnen ½ St. vor dem Schlafengehn, nachdem vorher nichts zu Abend gegessen, eingenommen, am Morgen darauf ein leichtes Abfuhrmittel: PESCHIER gegen den Breiten Bandwurm (*Bothriocephalus*). Gegen *Taenia Solium* soll man ausserdem noch ½ St. nach den angegebenen Pillen ein Klystier aus Dr. ½ des *Extr. Fil. aeth.* mit ½ Unze Amylam und 12 Unz. Wasser (zweckmässiger wohl: ½ Dr. Extract durch ½ Unze *Gaz. Mimos.* mit 3 Unzen Wasser emulgirt). geben. — Ry 751. a. (*Ol. Erison.*)]; Mixturen [etwa bloss mit einem Syrup, oder (KAHLEIS) in Emulsion, mit Eigelb (oder Gummi), *Aq. Flor. Aurant.* u. Zucker]. — In einer Gallerte: Ry 840 (*Rad. Filic.*).

Extractum Fumariae.

Erdrauchextract. [Extractconsistenz. — 1 Drachme 1½ Sgr.] Innerl. zu Scr. 1-Dr. ½ mehrmals tägl. (Dr. 1-2 auf den Tag); in Pillen od. Bissen, Mixturen [wo aber ätherische od. ägl. Geschmacks corrigentien höchst nöthig. — Ry 956 (*Sapo medic.*)].

Extractum Gentianae. Enzianextract. [Extractconsistenz. Auflösung klar. — 1 Drachme 1 Sgr.] Innerl. zu Scr. $\frac{1}{2}$ - Dr. $\frac{1}{2}$ einigemal tägl. (etwa Dr. 1-2 auf den Tag); in Pillen od. Bissen [Ry 409 (*Ferr. oxydul. nigr.*), 414, 415 (*Ferr. sulph. cryst.*)], Mixturen [Ry 371, 372; 710 (*Natr. carb. acidul.*)].

371.

Ry Extr. Gentianae Dr. 2
solve in

Vini Hispanici Unc. 4

adde

Tinct. Cortic. Aurant. Dr. 2.

M. D. S. 2stündl. 1 Essl.

REIL.

372.

Ry Extr. Gentianae Dr. 2-4
solve in

Aq. Cinnam. simpl. Unc. 6

adde

Spir. sulphurico-aether. Dr. 1.

M. D. S. 2stündl. 1 Essl.

* **Extractum Glycyrrhizae s. Liquiritiae.** Süßholz- od. Liquiritienextract. [Aus *Rad. Glyc. glabrae* durch wiederholtes Infundiren bereitet. — Extractconsistenz. Die Auflösung soll nach der Angabe der Pharmakopöe klar seyn; ZIER (*Annalen d. Pharmac.* Bd. 4. 1832. S. 36 ff.) hat aber nachgewiesen, dass dies bei vorschriftsmässiger Bereitung und überhaupt bei einem guten Extract nicht möglich ist. — Es enthält weit mehr Glycyrrhizin, und dieses zu einem kleineren Theile verändert, als der *Succus Glycyrrhiz. depur.*, hat einen reineren Lakritzen-Geruch und Geschmack, versüsst mehr als 2mal so stark (kommt also als Corrigenz verhältnissmässig wohlfeiler), und wirkt als Heilmittel kräftiger. Es erzeugt aber auch mit vielen Salzen (z. B. Salmiak, phosphor. Natron, Boraxweinstein, Borax, salz. Baryt, schwefels. Chinin) und mit den Säuren stärkere Niederschläge (die übrigens die Wirkung oft nicht beeinträchtigen dürften) als der *Succus Glycyrrhiz. dep.*, und zersetzt Metallsalze schneller und vollständiger. — 1 Drachme 1 Sgr.]

Innerl. scrupelweise öfters tägl. In Pillen, Bissen, Mixturen.

Ausserl. zu Einspritzungen [selten. Mit *Gm. Mimosa elect.* und Zucker in Wasser aufgelöst: MARQUART beim Tripper].

Extractum Graminis. Queckenextract. [Pillenconsistenz. — 1 Drachme $\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. zu einigen Drachmen tägl.; in Bissen, Pillen [in den letzteren meist nur als Constituens]. (Für flüssige Formen ist immer das folgende vorzuziehen)

Extractum Graminis liquidum. *Mellago Graminis.* Quecken-Honigsaft od.-Dicksaft. [Auflösung klar. — Sonst pflegte die *Mellago Graminis*, wie die *Mellago Taraxaci*, zu Ende des Sommers gewöhnlich schon sauer zu seyn, und man musste darauf, wollte man vorsichtig seyn, sogar beim Verschreiben Rücksicht nehmen. Durch die jetzige Vorschrift der preuss. Pharmakopöe aber, wonach dieselbe für die kältere Jahreszeit von neuem und anders bereitet wird, ist diesem Uebelstande abgeholfen. — 1 Unze 3 Sgr.]

Innerl. ein Paar Unzen tägl.; pur [selten; thee- u. esslöffelweise] oder in Mixturen [Ry 475 (*Hb. Ledī palustr.*), 617 (*Kali tartar.*)], Latwergen [zu diesen oft auch als Constituens]. — Zu Pillen od. Bissen nur etwa als Constituens; vgl. S. 162.

Ausserl. bisweilen zu Klystieren [Unc. 1-2. — Ry 365 (*Extr. Colocynth.*)].

Extractum Gratiolae. Gottesgadenkrautextract. [*Hb. rec.* — Pillenconsistenz. Auflösung grünlich. — 1 Drachme $2\frac{1}{3}$ Sgr.]

Innerl. zu Gr. 2-4 u. steigend mehr, einigemal tägl., bis vermehrte Darmausleerungen eintreten; als Purgans etwa Gr. 10-15 auf einmal. In Pillen [z. B. Dr. 1 mit *Hb. Gratiol.* Gr. 15, f. l. a. *Pilulae* 36, 1-2 Stück (u. mehr) p. dosi. Ry 906 (*Rad. Scill.*), 957 (*Sapo stibiat.*)], Mixturen [z. B. bei Geisteskrankheiten oft passend in *Aq. Laurcer.* aufgelöst; sonst in einem aromatischen Wasser, mit etwas Hoffmannstropfen od. dgl. — Ry 348 (*Extr. Belladonnæ*)].

Extractum Guajaci Ligni. Franzosenholzextract. [Extractconsistenz. — 1 Drachme $3\frac{1}{4}$ Sgr.] Innerl. zu Scr. $\frac{1}{4}$ - Dr. $\frac{1}{4}$ einigemal tägl.

Extractum Helenii. Alantextract. [Extractconsistenz. — 1 Drachme $2\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. zu Scr. $\frac{1}{4}$ - Dr. $\frac{1}{4}$ mehrmals tägl.; in Pillen [Ry 81 (*Ammoniac. depur.*), 860 (*Rad. Ipecac.*)], Mixturen [Ry 373].

373.

Ry *Extr. Helenii* Dr. 2
— *Glycyrrhiz.* Dr. 1
solvo in

Aq. Foenic. Unc. 4

addo

Liq. Ammonii anisati Dr. 2.

M. D. S. 4 mal tägl., umgeschüttelt,
1 Essl.

Extractum Hellebori nigri. Schwarznieswurzextract. [Extractconsistenz. — 1 Drachme $3\frac{1}{8}$ Sgr.] Innerl. zu Gr. 2-10, einigemal tägl., in Pillen [Ry 374, 375], Mixturen [etwa in einem aromatischen Wasser. — Ry 376. — Dr. $\frac{1}{2}$ in *Tinct. Ferri tartar.* Unc. 1, zu 20-60 Tropfen (Gr. 1-3) einigemal tägl.: *Tinctura Martis helleborata*].

374.

Ry *Extr. Helleb. nigri*
— *Myrrhas ana* Dr. $\frac{1}{2}$
Pulv. Hb. Card. bened. q. s.
ut f. *Pilulae* 30. *Consp. Pulv. Cass. cinnam.* D. S. 2 mal tägl. 2-3. (Gegen Wassersucht, Amenorrhöe etc.)
Pilulae tonicae BACHERI.

375.

Ry *Ammoniaci depur.*
Rad. Rhei pulv.
Extr. Helleb. nigri ana Dr. 1
— *Glycyrrhiz. q. s.*
ut f. *Pilulae* 90. *Consp. Pulv. Rad. Irid. Flor. D. S.* 3 mal tägl. 5.

376.

Ry *Ammon. muriat. dep.**Extr. Hellebori nigri* ana Dr. 2— *Absinthii* Dr. 1

solbe in

Aq. Menth. pip. Unc. 5.

D. S. 2stündl., umgeschüttelt, 1 Essl.
(Gegen Quartanleber; diese verschwin-
den darauf meist beim 3ten od. 4ten An-
fall, und mit ihnen die Fieber-Kachexie
und-Physkonien.)

BERNDT.

Extractum Hyoscyami. Bilsenkrautextract. [*Hb.*

rec. — Pillenconsistenz. Auflösung grünlich. — 1 Drachme 3 Sgr. — Das *sic-
catum* der PH. SLESV., s. 8. 161 Z. 6 v. u. (1 Drachme 4 Shl.), in etwas gerin-
geren Dosen.]

Innerl. zu Gr. $\frac{1}{2}$ - 1 - 2 u. allmählig mehr; mehrmals tägl. In
Pulver [Ry 534 (*Hydrarg. muriat. mite*), 1097 (*Zinc. oxyd.*); vgl. auch
Sem. Phellandr.], Trochisken, Pillen od. Bissen [Ry 377, 378;
693 (*Morphium acet.*), 703 (*Myrrha*). — *Pilulae sedativae* PH. P.
(1 Drachme 2 $\frac{1}{2}$ Sgr.) enthalten *Extr.* und *Fol. Hyosc.* ana, daraus eingranige Pil-
len (diese Masse bedarf aber noch eines Zusatzes von Flüssigkeit, den der Apothek-
er verschieden wählen kann, und die Formel laborirt deshalb an Unbestimmtheit
der Dose; passender also Ry 377)], Mixturen [z. B. *Scr. $\frac{1}{2}$ in Vin. stibiat.*
Unc. $\frac{1}{2}$ aufgelöst, zu 15 - 30 Tropfen (Gr. $\frac{1}{2}$ - 1), oder in *Aq. Laurocerasi* Dr. 2
aufgelöst zu 7 - 14 Tropfen. — Ry 177 (*Calcar. muriat.*), 597 (*Kali nitr. dep.*),
1031 (*Tart. natronat.*)], selbst [des schlechten Geschmacks und Ansehns unge-
achtet] in Lecksäften [Ry 349 (*Extr. Belladonnae*)] und Emulsio-
nen [denen es zwar ausser dem schlechten Geschmack auch eine sehr widrige,
schmutzige Farbe erteilt. — Ry 189 (*Camph.*), 745 (*Ol. camphorat.*), 598
Kali nitr. dep.), 732 (*Natr. sulph. dep. cryst.*)].

Ausserl. zu Zahnpillen [Ry 788 (*Op.*)], Zahnlatwergen,
Klystieren [Gr. 1 - 3 und allmählig mehr; vgl. *Amylum*], Augenwäs-
sern [Zu Augenbähungen *Scr. 1 - Dr. 1* auf *Unc. 4.* Ry 541 (*Hydrarg.*
mar. mite). — Zu Augentropfwässern Gr. 5 - 30 auf *Unc. $\frac{1}{2}$* ; zur Un-
tersuchung des Auges Gr. 5 auf *Dr. 1.*], Augensalben [*Scr. $\frac{1}{2}$ - 1* (nicht
mehr, damit die Salbenconsistenz nicht leide), mit ein wenig Wasser zum Brei an-
gestossen, auf 2 Dr. Fett. — Ry 1081 (*Ungt. Hydr. cin.*). — Gr. 12 - 20 auf
Butter Dr. 2; 3mal tägl. einer starken Erbse gross in die Gegend des Foramen
supraorbitale einzureiben: WUTZER gegen scroful. Lichtscheu.] u. a. Sal-
ben, Pflastern [eine Formel: L. 8. 265]; auch endermatisch
[vgl. *Aq. Laurocer.*].

377.

Ry *Pulv. Fol. Hyoscyami**Extr. Hyosc.* ana Gr. 15— *Glycyrrhiz. q. s.*

et f. *Pilulae* 30. *Consp. Sem. Lycop.*
pod. D. in vitro. S. Alle 2-1 St. 1 Pille
(u. mehr).

378.

Ry *Opü pulv. Gr. 2**Hb. Digital. pulv.**Rad. Ipecac.* — ana Gr. 5*Extr. Hyoscyami* Dr. $\frac{1}{2}$.

M. f. c. Mucilag. Gm. Min. pauceilla
Pilulae 30. *Consp. Sem. Lycop. D.*
in vitro. S. 3etündl. 1 Pille. (Gegen
Krampfhusten.) (HEIM.)

+ *Extractum Hyoscyami e Seminibus* PH. HANN. Bilsensamenextract. [Trocken. — 1 Gran $\frac{1}{4}$, 10 Gran 2 Mgr.] Innerl., zu Gr. $\frac{1}{4}$ -1 (u. allmählig mehr), und äusserl. in ähnlichen Formen wie das vorige.

Extractum Juglandis Nucum. Wallnusseextract. [Pillenconsistenz. — 1 Drachme $1\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. zu Scr. $\frac{1}{2}$ -1, mehrmals tägl. (Dr. 1- $1\frac{1}{2}$ auf den Tag); in Pillen od. Bissen [R₁₀₉₉ (Zinc. oxyd.)], Mixturen [R₉₃₁ (Rad. Valer. min.)]. — Äusserl. zu Gurgelwässern [etwa Unc. $\frac{1}{2}$ auf Unc. 6], Salben [R₇₇₁ (Ol. Tanac.)], Verbandwässern [Dr. 2-4 auf Unc. 6, etwa eines Decoct. Cort. Salic. od. dgl.].

+ *Extractum Lactucæ Scariolæ s. sylvestris* PH. AUSTR. Wild-Lattig-Extract. [Extractconsistenz.] Innerl. in etwas grösseren Gaben wie das folgende.

Extractum Lactucæ virosæ. Giftlattigextract. [Hb. rec. — Pillenconsistenz. Auflösung grünlich. — 1 Drachme $2\frac{5}{8}$ Sgr.] Innerl. zu Gr. 2-5 (u. mehr), mehrmals tägl. In Pulver [R₃₇₉. — 2stündl. Gr. $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ mit Sacch. Lact. Scr. $\frac{1}{2}$: GUMPRECHT gegen Keuchbusten.], Pillen [z. B. Scr. 1 mit Asae foet. dep. Dr. 1 (und etwas Weingeist oder Gummischleim) zu 30 Pillen, 3mal tägl. 3-4: SUNDELIN gegen schleimiges Asthma], Mixturen [z. B. in 8 Theilen Aq. Laurocer., zu 16-20 Tropfen (ungefähr 2 Gran). — Linctus: R₁₀₁₃ (Sulph. stib. aur.)].

379.

R₃₇₉ Hb. Digitalis purpurea Gr. $\frac{1}{2}$
 Extr. Lactucæ virosæ Gr. 2

Sacchari albi Gr. 12.
 M. f. Pulv. Disp. tal. dos. nr. 12. D.
 S. 2stündl. 1 Pulver. (Bei Brustwassersuchten.) HUFELAND.

Extractum Levistici. Liebstöckelextract. [Extractconsistenz. — 1 Drachme $2\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. zu Scr. 1 einigemal tägl.; in Pillen od. Bissen [R₄₆₆ (Hb. Digit.), 1043 (Tereb.)], Mixturen.

* *Extractum Ligni Campechiani.* Campechenholzextract. [Trocken. — 1 Drachme $1\frac{2}{3}$ Sgr.] Innerl. zu Scr. $\frac{1}{4}$ -1, mehrmals tägl., in Trochisken, Pillen od. Bissen [R₄₀ (Acid. sulph. dilut.)], Mixturen [z. B. in 8 Theilen Rothwein, $\frac{1}{4}$ -6mal tägl. 2 Theelöffel. — R₃₈₀]. — Äusserl. zu Zahnfleischlatwergen [R₇₁ (Alum.)] u. s. w.

380.

R₃₈₀ Cort. Simarub. Unc. $\frac{1}{4}$

coque c. Aq. comm. L. 1 ad Colat. L. $\frac{1}{2}$,
 in qua solve

Extr. Ligni Campech. Dr. 2.
Syr. Capit. Papav. Dr. 6.

M. D. S. 2stündl., umgeschüttelt, 1 Essl.
 FRITZE.

† *Extractum Lupuli* PH. HANN. Hopfenextract.
 [Extractconsistenz. — 1 Drachme 3, 1 Unze 20 Mgr.] Innerl. zu Gr. 15-20,
 mehrmals tägl. [Dr. 1 in 6 Unz. Wasser (der Autor hat *Aq. Lupuli*, die
 aber nicht mehr officinell) mit 2 Dr. † *Tinct. Lupuli Strobil.*, 3-4 mal tägl.
 1 Essl.: STIEGLITZ gegen Dyspepsie hysterischer.]

* *Extractum Marrubii.* Andornextract. [Extract-
 consistenz. — 1 Drachme 1 Sgr.] Innerl. zu Scr. $\frac{1}{2}$ -1, mehrmals tägl.

Extractum Millefolii. Schafgarbenextract. [Ex-
 tractconsistenz. — 1 Drachme 1 Sgr.] Innerl. zu Gr. 15-30, mehrmals
 tägl. (Dr. 1-2 auf den Tag). [Bissen: Ry 446 (*Galban. dep.*)]

† *Extractum Millefolii frigide paratum* PH. HANN.
 [Extractconsistenz. — 1 Drachme 3, 1 Unze 20 Mgr.] Innerl. wie das
 vorige.

Extractum Myrrhae. Myrrhenextract. [Trocken.
 — 1 Drachme $1\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave* concentr. Mineralsäuren [besonders Salpe-
 tersäure]; Weinsteinssäure; Salzbilder; kaust. Alkalien; salzsaures
 Gold, salpeters. Silber, Quecksilber-, Blei- u. Kupfer-Salze.

Innerl. zu Gr. 5-20, einigemal tägl.; in Pulver [mit 3 Thei-
 len *Sacch. Lactis*: FR. HOFFMANN's Myrrhenzucker für Schleimschwindsüch-
 tige], Pillen od. Bissen [Ry 59 (*Aloë luc.*), 374 (*Extr. Helleb. nigri*),
 416 (*Ferr. sulph. cryst.*)], Mixturen [Ry 381].

Ausserl. zu Pinselsäften [Ry 382], Zahnpulvern
 Ry 307 (*Cort. Salic.*), 392 (*Extr. Ratanh.*)], Zahnfleischlatwergen
 [2 Beispiele I. S. 303], Augengewässern [Zu Augenbähungen (selten, nur
 etwa als Zusatz) Scr. 1-Dr. 1 auf Unc. 4. — Zu Augenpinselwässern Gr. 5-20
 auf Dr. 2].

381.

Ry *Extr. Myrrhae Dr. 1.*
Sacchari Lactis Unc. $\frac{1}{2}$
solve in
Inf. Sem. Phellandr. (Unc. $\frac{1}{2}$) Unc. 6.
D. S. 2stündl., umgeschüttelt, 1 Essl.

382.

Ry *Extr. Myrrhae pulv. Dr. 1*
Mellis rosati Unc. 1
Spir. muriat. aether. Dr. 1.
M. D. —
Linim. gingivale mundificans BIST.
 FULB.

† *Extractum Nicotianae* PH. HANN. Tabacksex-
 tract. [Pillenconsistenz. — 1 Drachme 2 Mgr. — Das von PH. SLESV.
 Anbg. (1 Drachme 2 Sbl.) hat Extractconsistenz.] Innerl. zu Gr. $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$;
 3-4mal tägl.

Extractum Nucis Vomicae. Krähenaugenextract. [Extractconsistenz. Auflösung grünlich. — 1 Drachme 1 Sgr.]

Innerl. (*ad Grana duo!*) zu Gr. $\frac{1}{2}$ –1 (allmählig steigend bis zu Gr. 5), 2–4 mal tägl. In Pulver, Pillen, Mixturen [bei Ruhren, Diarrhöen, oft in Emulsionen oder schleimigen Mixturen. Ry 383. — Gr. 1–2 in 2 Dr. Wasser gelöst; hier von 4stündl. säugenden Kindern 2–3 Tropfen, älteren Kindern mehr (bis zu 12 od. 15 Tropfen): SCHWARZ als „Spesificum“ bei Mastdarmvorfall. (Bei nicht mehr säugenden Kindern Sorge man für leichtverdauliche Speisen, verhüte starkes Schreien. Hat der Vorfall schon mehrere Tage gedauert, werden noch einige Gran *Extr. Ratanh.* damit verbunden. Nach Hebung des Übels, die gewöhnlich schon am 2ten Tage erfolgt, werden die Mittel noch zur Sicherheit 8 Tage lang 2 mal tägl. in kleineren Gaben fortgebraucht.)].

Ausserl. zu Klystieren [Gr. 1–3, allmählig auch wohl mehr; z. B. mit Dr. 1–2 Amylum, vgl. S. 48, oder in einer Auflösung von *Gm. Mimos.*].

383.

Ry *Extr. Nucis Vomicae* Scr. $\frac{1}{2}$

solve in

Aq. Sambuci Unc. 6

adde

Mucilag. Gm. Mimosae

Syr. Alth. (od. *Amygdal.*) ana Unc. 1.

M. D. S. Alle 2–1 St., umgeschüttelt,

1 Essl. (Bei Ruhr.) HUFELAND.

Extractum Nucum Vomicarum spirituosum.

Geistiges Krähenaugenextract. [Durch grössere Reichhaltigkeit an *Strychnin*- u. *Brucin*-Salzen wirksamer als das vorhergehende. Extractconsistenz. — 1 Drachme $12\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. (*ad Grana duo!*) zu Gr. $\frac{1}{2}$ –1 (allmählig bis zu Gr. 2 oder 3); anfangs nur 1–2 mal, später 3–4 mal tägl. In Pulver [Ry 384], Pillen, Auflösung [nicht gern in wässriger, sondern in geistiger, in Wein, Tincturen u. dgl. — Ry 385]. — Ausserl. [selten] aufgelöst zu Einreibungen, p.p.

384.

Ry *Bismuthi nitr. praecip.*

Extr. Nuc. Vomic. spirit. ana Gr. $\frac{1}{2}$

Magnes. carbon. Gr. 3

Sacchari albi Gr. 15

Ol. Menth. pip. Gtt. 2.

M. f. Pulv. Disp. tal. dos. nr. 12. D.

in charta cerata. *S.* 3stündl. 1 Pul-

ver. (Gegen Magenkrampf bei einem

schwächlichen Subject.) (VOGT.

385.

Ry *Extr. Nuc. Vomic. spirit.* Gr. 6–12

solve in

Tinct. Colocynth. Dr. 1

— *Pimpinell.* Dr. 3.

D. S. 2–3 mal tägl. 30 Tropfen

($\frac{1}{2}$ –1 Gran Extract) mit *Arnica*thee.

(Bei Lähmungen, namentlich der untern

Extremitäten.)

Extractum Opii (aquozum). Opiumextract. [Das

Wasser nimmt aus dem Opium vorzüglich essigsaures u. meconsaures Morphin, den meisten braunen Farbstoff, das Gummi u. Kalisalze auf, und lässt etwas Morphin, das meiste Narcotin und die Harze zurück. — Trocken. — 1 Drachme 8 Sgr.]

Innerl. (*ad Grana duo!*) in etwa $1\frac{1}{2}$ mal so grossen Gaben als *Opium*; in den gewöhnlichen Formen [Ry 838 (*Rad. Colombo*)].

Äusserl. zu Mund- u. Gurgelwässern [z. B. Dr. $\frac{1}{2}$ - 1 auf Unc. 6 Wasser, mit *Spir. V. rftiss.* Unc. $\frac{1}{2}$: *Gargarisma sedativum* SWEDIAUR, bei hartnäckigen, schmerzhaften Geschwüren im Mund u. Rachen, bei Zahnschmerz, rheumatischem Ohrschmerz, Kopfschmerz], Zahnpillen, Zahn- u. Zahnfleisch-Latwergen, Klystieren [doppelt so viel als zum innerlichen Gebrauch; oft mit *Amylum*, vgl. den Artikel; z. B. Gr. $\frac{1}{8}$ mit *Amylum*, Morgens u. Abends oder selbst alle 5-4 St.: CRUVEILHIER bei Gastro- u. Enteromalacie] u. a. Injektionen [Ry 386-389; 4 (*Acet. plumb.*), 1093 (*Vitriol. alb.*)], Augengewässern [Zu Augenbähungen Gr. 5-30 auf Unc. 4. — Zu Augentropfwässern Gr. 2-8 auf Unc. $\frac{1}{2}$. Ry 171 (*Borax*)], Augensalben [meist nur als Zusatz zu andern Mitteln, Gr. 2-6 auf Dr. 2. Ry 554 (*Hydr. oxyd. rubr. ppt.*)] u. a. Salben [z. B. 1 auf 8 Fett: *Ungt. sedativum* SWEDIAUR. — Ry 722 (*Natr. carb. dep. sicc.*)], Linimenten [z. B. gepulvert mittelst Speichel ums Auge einzureiben, etwa noch in Verbindung mit *Hydrarg. muriat. mita* (vgl. den Artikel)], Fomentationen; zur Infusion in die Venen [Scr. 1 in 2 Unz. Wasser: DUBREUIL bei Tetanus].

386.

Ry Extr. Opü Gr. 3

solve in

Aq. destill. Unc. 2

adde

Mucil. Cydonior. Unc. 1.

D. S. Mehrmals tägl. erwärmt einzuspritzen. (Als schmerzstillend bei heftiger Gonorrhöe.)

WENDT.

387.

Ry Extr. Opü Gr. 8

solve in

Aq. destill. Unc. 4

adde

Mucil. Gm. Mimos. Unc. $\frac{1}{2}$

Aceti plumbici Gtt. 8.

M. D. S. Umgeschüttelt 2mal tägl. einzuspritzen. (Bei inveterirter Gonorrhöe secundar.)

RUST.

Statt des Bleiessigs zweckmässiger ein Paar Gran Bleizucker, wodurch der Niederschlag vermieden wird.

388.

Ry Extr. Opü Gr. 15

solve in

Aq. destill. Unc. 1 $\frac{1}{2}$

adde

Aque oxymuriat. Dr. $\frac{1}{2}$.

M. D. S. 2mal tägl., umgeschüttelt, einzuspritzen. (Bei Geschwüren der Harnröhre.)

BIETT.

Das Chlorwasser wirkt unter Bildung von Salzsäure zersetzend auf das Opium; doch ist die gute Wirkung der Vorschrift gewiss genügend erprobt.

389.

Ry Extr. Opü Dr. 1

solve in

Aq. Rosar. Unc. 8

adde

Mucil. Cydonior. Unc. 1

Aceti plumbici Scr. 1.

M. D. S. Umgeschüttelt einzuspritzen. (Bei hartnäckigem Fluor albus.)

RICHTER.

Statt des Quittenschleims und Bleiessigs zweckmässiger Gummischleim und Bleizucker; vgl. d. Anm. zu Ry 387.

+ *Extractum Papaveris albi* PH. HANN. Mohnkopffextract. [Trochen. — 1 Gran $\frac{1}{8}$, 10 Gran 1 Mgr., 1 Drachme $4\frac{1}{2}$ Mgr.] Innerl. zu Gr. 1-2, ein Paar Mal tägl.

Extractum Pimpinellae. Bibernellextract. [Extractconsistenz. Auflösung klar. — 1 Drachme 3 Sgr.] Innerl. zu Gr. 5-15 einigemal tägl. [Pillen: R_y 445 (*Galban. depur.*), 903-905 (*Rad. Scill.*)]

* **Extractum Pulsatillae.** Küchenschellenextract. [*Hb. rec.* — Pillenconsistenz. — 1 Drachme 2½ Sgr.] Innerl. anfangs etwa zu Gr. 1, ein Paar Mal tägl.; später allmählig bis zu Gr. 4 u. mehr einigemal. In Pulver [Gegen Keuchhusten der Kinder Gr. ½ - 1 mit Milchsucker: SEIDLER. — Gegen falschen Schwindel früh u. Abends Gr. ⅔ mit Zucker: LÜWENHARD.], Pillen, Latwerge [in der Regel der Unbestimmtheit der Dose wegen nicht rathsam. — R_y 448 (*Graphit.*)], Auflösung [z. B. Dr. ½ in Dr. 2 *Vin. stibiat.*, zu 6 bis (allmählig) 24 Tropfen].

Extractum Quassiae Ligni. Bitterholzextract. [Extractconsistenz. — 1 Drachme 4½ Sgr.] Innerl. zu Gr. 5-15, einigemal tägl. (Scr. 1 - Dr. 1 auf den Tag); der ungemeinen Bitterkeit wegen lieber in Pillen od. Bissen [z. B. Dr. 2 mit *Flaved. Cort. Aurant. pulv. q. s.* zu 90 Pillen, 3mal tägl. 10. — R_y 602 (*Kali sulphurat.*)] als in Mixturen [mit gewürzhaftem oder ätherischem Geschmacks corrigens].

* **Extractum Ratanhae.** [Ist doppelt vorhanden, in Brasilien aus den frischen Wurzeln, und vom Apotheker aus den trockenen bereitet; das erstere, welches man etwa durch den Zusatz *venale* od. *exoticum* bezeichnen kann, ist kräftiger und zugleich wohlfeiler, aber auch bisweilen durch Beimischung verwandter Stoffe adulterirt; man zieht es deshalb zum äusserlichen Gebrauch, zum innerlichen dagegen das vom Apotheker bereitete („*Extr. Ratanh.*“ schlechweg, ohne Zusatz), vor. — Beide trocken. — 1 Drachme resp. 1½ und 3½ Sgr.]

Innerl. zu Scr. 1-2 mehrmals tägl., in Bissen, Mixturen [vgl. *Hb. Digital.*].

Äusserl. zu Mund- u. Gurgelwässern [R_y 390; 489 (*Hb. Salo.*)], Pinselsäften [R_y 391], Zahnpulvern [R_y 392], Zahn-Pillen u. -Latwergen, Zahnfleischlatwergen [eine Formel I. S. 303], Zahntincturen, Klystieren u. a. Injektionen [R_y 393], Schnupfpulvern [R_y 73 (*Alum.*)]; als Zusatz zu Pflastern u. Salben [Augensalbe: R_y 502 (*Hydrarg. ammon. mur.*)].

390.

R_y *Extr. Ratanhae venalis* Unc. ½
solve in

Aq. Salviae Unc. 6

adde

Spir. Cochlear. Unc. 1½.

M. D. S. Umgeschüttelt zum Ausspülen des Mundes (bei lockerem Zahnfleisch).

VOGT.

391.

R_y *Extr. Ratanhae venalis* Dr. ½
solve in

Aq. Rosar. Unc. 1½

adde

Tinct. Opii simpl. Gtt. 10-15.

M. D. S. Umgeschüttelt, das Zahnfleisch mittelst eines Leinwandpinsels damit zu bestreichen. (Gegen Mercurial-

salivation.)

RENARD.

392.

Ry *Extr. Ratanh. venal.* Dr. 1-2— *Myrrhae* Dr. 1*Rad. Irid. Flor.* Dr. 6*Ol. Cass. cinnam.* Gtt. 2— *Myrrhae* Gtt. 10*Bals. Peruv.* Scr. $\frac{1}{2}$.*M. f. Pulv. subtiliss. D. in vitro. S.*

Zahnpulver. LOCKSTÄDT.

393.

Ry *Rad. Ratanh. gross. pulv.* Dr. 10*coque. c. Aq. comm. L. 3 ad Colat. L. 1,**in qua solve**Extr. Ratanh. venal.* Unc. $\frac{1}{2}$ *et refriger. adde**Tinct. Catechu*† *Tinct. Kino* ana Dr. $1\frac{1}{2}$.

M. D. — (Abends beim Schlafengehen und nach dem Urinlassen mittelst eines passend zugeschnittenen Schwammes einzubringen — bei Leukorrhöe, bei Erschlaffung u. Vorfall der Vagina.)

KOPP.

Besser nur $1\frac{1}{2}$, höchstens 2, Med. Pf.

Wasser aufgegossen, zumal da die Sub-

stanz gröblich gepulvert genommen wer-

den soll. Überhaupt aber wäre es einfacher,

wohlfeiler und gewiss nicht minder

wirksam, statt der Ratanha-Abkochung

ein Paar Drachmen Extract mehr zu

nehmen.

Extractum Rhei. Rhabarberextract. [Pillenconsistenz. — 1 Drachme $4\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerl. zu Gr. 5-15 einigemal tägl.,

in Pillen, Bissen [Ry 952 (*Sapo jalap.*)], Mixturen [z. B. in4 Theilen *Liq. Kali acst.* gelöst, 3mal tägl. 60 Tropfen: SCHUBARTH].

Extractum Rhei compositum. Loco Extracti

catholici et panchymagogi. [*Extr. Rhei* 3, *Extr. Aloë*s, *Sapo jalap.**pin.* ana 1. — Pillenconsistenz. — 1 Drachme $4\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. als Reiz-

mittel zu Gr. 2-6 einigemal tägl.; als Purgans zu Gr. 10-20 auf ein-

mal oder ein Paar Mal hinter einander. Nur in Pillen od. Bissen

[Ry 341 (*Extr. Aloë*s)].

† *Extractum Rubiae* (*Tinctorum*) PH. SLESV. Anbg.

[Extractconsistenz. — 1 Drachme 3 Sbl.] Innerl. etwa zu Gr. 15-30, ein-

igemal tägl.

Extractum Salicis. Weidenrindenextract. [Extract-

consistenz. — 1 Drachme $1\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. zu Scr. $\frac{1}{2}$ -Dr. $\frac{1}{2}$ mehrmals tägl.

† *Extractum Salviae* PH. AUSTR. [Extractconsistenz.] In-

nerl. etwa zu Scr. $\frac{1}{2}$ -1, einigemal tägl. — Äusserl. zu Mund-

u. Gurgelwässern.

† *Extractum Saponariae Herbae* PH. AUSTR. Sei-

fenkrautextract. [Extractconsistenz.] Innerl. wie das folgende.

† *Extractum Saponariae (Radici)* PH. HANN., SLESV.

Seifenwurzelextract. [Extractconsistenz. — 1 Drachme 1 Mgr.,

1 Unze 6 Mgr.] Innerl. etwa zu Scr. $\frac{1}{2}$ -1, einigemal tägl.

***Extractum Scillae.** Meerzwiebelextract. [Extractconsistenz, Auflösung klar. — 1 Drachme $\frac{5}{8}$ Sgr.] Innerl. zu Gr. $\frac{1}{2}$ - 1, allmählig steigend bis zu Gr. 4, einigemal tägl.; des schlechten Geschmacks wegen in der Regel nur in Pillen od. Bissen [Ry 394, 395]. — Äusserl. zu Linimenten [Ry 777 (Ol. Tereb.)]; endermatisch [zu einigen Gran, vorsichtig steigend bis zu Gr. 10' (— und mehr?), bei Empfindlichen in Salbenform].

394.

Ry *Pulv. Rad. Scillae*
— *Cass. cinnam.*
Extr. Scillae ana Scr. 1
— *Glycyrrh. q. s.*
ut f. *Pilulae* 60. *Consp. Sem. Lycop.*
D. S. 4mal tägl. 1 - 2.

395.

Ry *Extr. Scillae* Scr. 1
Pulv. subtiliss. Cantharidum Gr. 5
— *Flor. Chamom. vulg. q. s.*
ut f. *Pilulae* 30. *Consp. Pulv. Cass. cinnam. D. S.* 3mal tägl. eine Pille in Hafererschleim.

Extractum Senegae. Senega-Extract. [Extractconsistenz. — 1 Drachme $2\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. zu Gr. 5 - 15, einigemal tägl.

396.

Ry *Ammoniaci depur.* Dr. 2
Sulphur. stibiati aurant. Gr. 6

Extr. Senegae Dr. 2
Pulv. Rad. Irid. Flor. q. s.
ut f. *Pilulae* 120. *Consp. Pulv. Rad. Irid. Flor. D. S.* 3mal tägl. 10.

+ **Extractum Sennae** PH. P. [1 Drachme $2\frac{1}{2}$ Sgr. Bereitungsangabe fehlt!] Obsolet.

***Extractum Stramonii Herbae.** Stechapfelkrautextract. [Hb. rec. — Pillenconsistenz. Auflösung grün. — 1 Drachme $2\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerl. zu Gr. $\frac{1}{2}$ - 1, 2-3mal tägl., u. vorsichtig steigend mehr. Äusserl. zu Zahnpillen, Zahnlatwergen, Augewässern [zu Augenbähungen Scr. $\frac{1}{2}$ - 2 auf Unc. 4. Zu Tropfwässern Gr. 2-8 auf Unc. $\frac{1}{2}$], Salben, Einreibungen [Dr. $\frac{1}{2}$ („durch Eigelb suspendirt“) in 4 Unz. Olivenöl, früh u. Abends einzureiben: NAFFEL gegen chronische Rheumatismen]; auch endermatisch [W. W. GERHARD applicirte einmal Gr. 10 auf das Perinäum] u. zur Infusion in die Venen [PERCY und LAURENT injicirten bei Tetanischen 24 Gran (?) in $\frac{1}{2}$ Unze Wasser mit gutem Erfolge].

+ **Extractum Stramonii e Seminibus** PH. HANN. [Trocken. — 1 Gran $\frac{1}{4}$, 10 Gran 2 Mgr.] Innerl. zu Gr. $\frac{1}{4}$ - 1, 2-3mal tägl.

+ **Extractum Tanacetii** PH. SLESV. [Ex Hb. et Summitatib. — Extractconsistenz. — 1 Unze 12 Shl.] Innerl. etwa zu Scr. $\frac{1}{2}$ - 1, einigemal tägl.; etwa in Pillen, in Verbindung mit dem äther. Öl.

Extractum Taraxaci liquidum. *Mellago Tara-*

raci. Löwenzahn-Honigsaft od.-Dicksaft. [Auflösung klar. — Über die Eigenschaft, leicht sauer zu werden, vgl. *Extr. Gram. liq.* — 1 Unze $3\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerl. zu Unc. 1- $1\frac{1}{2}$ auf den Tag, pur [selten —; theelöffelweise] oder in Mixturen [Ry 397; 612 (*Kali sulphur. dep.*), 617 (*Kali tartar.*), 1022 (*Tartar. ammoniat.*), 1023 (*Tart. boraxat.*)]. Zu Pillen od. Bissen nur etwa als Constituens, vgl. S. 162.

Ausserl. zu Visoeralklystieren [etwa Unc. 1; häufiger jedoch eine Abkochung des Krauts oder der Wurzel].

397.

Ry *Extr. Taraxaci liquidi* Unc. 2
Aq. Menthae pipertae Unc. 6

Mellis despumati Unc. 1.*M. D. S.* 3tündl. 2 Essl.

G. A. RICHTER.

**Extractum Taraxaci Radicis.* Löwenzahnwurzelextract. [Extractconsistenz. Auflösung klar. — 1 Drachme 1 Sgr.] Innerl. zu Dr. 4-6 auf den Tag.

† *Extractum Tormentillae* PH. AUSTR. [Extractconsistenz.] Innerl. zu Gr. 5-15 mehrmals tägl. — Äusserl. zu ähnlichen Applicationen wie *Rad. Torment.*

† *Extractum (Rhois) Toxicodendri* PH. SLESV. Anhg. [Pillenconsistenz. — 1 Drachme 8 Sht.] Innerl. in etwas geringeren Dosen als *Fol. Toxicod.*: die Unsicherheit der Wirkung ist hier fest noch grösser.

Extractum Trifolii. Fieberklee-Extract. [Extractconsistenz. — 1 Drachme 1 Sgr.] Innerl. zu Scr. $\frac{1}{4}$ -1, einigemal tägl. [Pillen: Ry 704 (*Myrrha*).]

† *Extractum Trifolii liquidum* PH. HANN. *Mellago Trifolii.* [1 Unze 4 Mgr., 4 Unz. 12 Mgr.] Innerl. zu Dr. $\frac{1}{2}$ -1, einigemal tägl.

† *Extractum Uvae Ursi* PH. SLESV. Anhg. [Extractconsistenz. — 1 Drachme 2 Sht.] Innerl. etwa zu Scr. $\frac{1}{2}$ -Dr. $\frac{1}{4}$, einigemal tägl.

Extractum Valerianae (frigide paratum). Baldrianextract. [Ein ziemlich unkräftiges Präparat. — Mellagoconsistenz. Auflösung klar. — 1 Drachme $1\frac{1}{8}$ Sgr.] Innerl. zu Scr. 1-2, mehrmals tägl.

398.

Ry *Extr. Valerianae* Unc. $\frac{1}{4}$
Aq. Cinnam. simpl. Unc. 2

Spir. sulphurico-aether. Dr. $\frac{1}{2}$.*M. D. S.* 3mal tägl. 1 Essl.

399.

R_x *Elaeosacch. Valerianae* Dr. 2
 solve in
Aq. Chamomillae Unc. 6

adde

Extr. Valerianae Dr. 6
Syr. Capitem Papav. Unc. 1.
M. D. S. 3stündl. 1 Essl. RICHTER.

***Extractum Vitis Pampinorum.** Weinranken-
 extract. [Aus dem frischen Saft bereitet. — Pillenconsistenz. Auflösung grün.
 — 1 Drachme 2½ Sgr.] Innerl. zu Dr. (1-) 2-3 auf den Tag. [Dr. 2 in *Aq.*
Rubi Id. Unc. 6, alle 2 St. 1 Essl.: KLOSE gegen Epilepsie. — R_x 400.] — Äus-
 serl. zu Waschungen [z. B. 1 auf 24 Wasser: gegen Sommerflecke].

400.

R_x *Extr. Vitis Pampinor.* Dr. 4-6
Sacch. albissimi Unc. ½
 solve in

Aq. comm. Unc. 6.
D., S. 2stündl., umgeschüttelt, 1 Essl.
 (Bei Arthrocace, wo keine recht be-
 stimmte Causalfindication, besonders bei
 häufigen Nervenzufällen.) RUST.

Fabae albae. Weisse Bohnen. [Hauptbestandtheile:
 Stärkmehl und Legumin. — 1 Unze *pulv.* ¾ Sgr.] Gepulvert (Bohnen-
 mehl, *Farina Fabarum*) zu indifferenten trockenen Umschlä-
 gen, Streupulvern [I. S. 223].

***Fabae Pichurim (Pechurim) majores** [1 Unze 3, *subt.*
pulv. 4½ Sgr.] und ***F. P. minores** [1 Unze 1½, *subt. pulv.* 2½ Sgr.].
 Grosse u. kleine Pichurim-, Muscaten- od. brasi-
 lianische Bohnen. Die grossen auch: Sassafrasnüsse.
 [Hauptbestandtheile: äther. und fettes Öl; nächst dem Weichharz, Gummi, Stärk-
 mehl.]

Innerl. zu Scr. ¼-1, einigemal tägl.; in Pulver, Morsel-
 len [Den meisten, doch nicht allen Leuten ist ihr Geschmack angenehm; man
 lasse also, ehe man theure Morsellen verschreibt, erst zum Versuch Bohnen kauen,
 was man auch wohl sonst — namentlich Morgens nüchtern — thun lässt, etwa
 1 Bohne (von der kleinern Sorte) jedesmal. — R_x 401], seltener im Auf-
 guss [etwa als Thee, Dr. ¼-1 auf 2 Tassen].

401.

R_x *Sacch. albi* Unc. 6
coque c. Aq. comm. q. s. ad consi-
stent. tabulandi, adde

Pulv. Flav. Cort. Aurant. Curass.
 — *Fabar. Pichurim min. ana* Dr. 3.
F. l. a. Morsuli nr. 30. D. in scatula.
S. 3mal tägl. 1 Stück.

***Farina Hordei.** Gerstenmehl. — Selten zum arzneili-
 chen Gebrauch — ausser in dem folgenden Präparat und etwa einmal zu Cata-
 plasmen, wozu jedoch *Farina Secalis* gebräuchlicher.

***Farina Hordei praeparata.** *Hordeum ppt. Amy-*
lum Hordei. Präparirtes Gerstenmehl. Gerstenkraft-

mehl. [1 Unze $\frac{1}{2}$ Sgr.] Man lässt davon Morgens nüchtern und Abends statt der Mahlzeit 1-2 Essl., mit 1 Pf. (Kuh-, Ziegen- od. Eselinnen-) Milch oder dünner, nicht fetter, Fleischbrühe über Kohlenfeuer unter beständigem Umrühren zum Brei gemacht (nicht eigentlich gekocht) und mit Candiszucker, auch wohl ein wenig Zimmt, versetzt, genießen. (Fette, saure u. blähende Speisen dabei zu vermeiden.)

**Farina Secalis.* Roggenmehl. [1 Unze $\frac{1}{2}$ Sgr.] Arzneilich etwa nur zu trockenen Umschlägen [I. S. 201], zu Cataplasmen [vgl. I. S. 304; — z. B. mit Honig: Hausmittel bei Furunkeln u. dgl. — So auch zur Bereitung des officinellen *Sinapismus.*], als Streupulver [I. S. 223].

Fel Tauri (recens). Bilis bovina. Ochsen-galle. [Hauptbestandtheile: Harz (scheint der wirksamste Bestandth. zu seyn), Zucker (Picromel), extractiver Farbstoff, Cholsäure, Taurin (Gallen-Asparagin), ein eigenthümliches Fett und Salze. — In Wasser auflöslich mit klarer Auflösung; mit fetten Ölen ziemlich vollkommen mengbar, doch trennt sich das Gemenge wieder, man lasse also dgl. vor der Application umrühren oder umschütteln. — Mellagoconsistenz. — 1 bis 4 Unzen 4 Sgr.] *Cave* wie bei der folgenden. Auch verordne man sie, als dem Verderben sehr ausgesetzt, nicht auf längere Zeit.

Innerl. zu Dr. 2-4 mehrmals tägl. [wo man fehlende menschliche Galle dadurch ersetzen will, besonders immer 1 St. nach der Mahlzeit]; in Mixturen [des ekelhaften Geschmacks halber mit Zimmt- oder Pfefferminz-Wasser, auch wohl mit einem kleinen Zusatz von *Spir. sulph. aeth.*, oder beim Einnehmen mit etwas Malaga od. Madera versetzt. — Ry 402]. Bisweilen als Pillenconstituens.

Ausserl. zu Linimenten u. Salben [namentlich auch wohl als Vehikel — wo man sich von einem animalischen Vehikel Vortheil verspricht (vgl. I. S. 66) — zum Einreiben pulveriger Substanzen, weniger ekelhaft als Speichel und bequemer, leichter zu haben, als Magensaft. — Ry 202 (*Camph.*), 725 (*Natr. muriat.*)]; verdünnt zu Klystieren [etwa Unc. $\frac{1}{2}$ - 1 als Zusatz zu Visceralklystieren] u. a. Einspritzungen [vgl. Ry 156], als Augentropfwasser.

402.

Ry *Natri muriatici* Unc. $\frac{1}{2}$ *Fell. Tauri recentis* Unc. 2

solvo in

Aq. Cerasor. Unc. 4

adde

Spir. sulphurico-aether. Scr. 2.*M. D. S.* 2stündl. 1 Essl. VoGT.

Fel Tauri inspissatum. Extractum Fellis. Eingedickte Ochsen-galle. [Extractconsistenz. Auflösung klar. — 1 Drachme $1\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave* Säuren [besonders Salpetersäure], Alkalien, (Metallsalze); innerlich in flüssiger Form Aloë [a. S. 35 Z. 1].

Innerl. zu Scr. $\frac{1}{2}$ – Dr. $\frac{1}{2}$ einigemal tägl.; des üblen Geschmacks wegen lieber in Pillen [Ry 133 (*Asa foet.*), 180 (*Calcar. sulphurata*), 340 (*Crocus*), 882 (*Rad. Rhei*)] oder [der voluminösen Gaben wegen meist zweckmässiger] in Bissen [Ry 403. Vgl. auch *Rad. Colombo.*] als in Mixturen [Geschmackscorrigentien wie bei der vorigen].

Äusserl. zu Klystieren [zu Visceralklystieren etwa ein Zusatz von Dr. 2–4. — Anthelminthisch: Ry 404. Vgl. *Hb. Gratiol.*], Augenwässern [Zu Tropfwässern Dr. $\frac{1}{2}$ –1 (der Consistenz wegen nicht mehr) auf Unc. $\frac{1}{2}$. Ry 93 (*Ammon. carb. pyro-ol.*). — Zu Pinselwässern auch concentrirt.], Augensalben [die nach den Vorschriften der Autoren meist so dünn ausfallen, dass man sie „Augenlinimente“ nennen kann; z.B. Ry 94 (*Ammon. carb. pyro-ol.*), oder mit Nussöl zu gleichen Theilen: gegen Hornhautflecke aufzuspinseln.] u. a. Salben [Ry 61 (*Aloë luc.*), 771 (*Ol. Tanac.*)]. Zu Linimenten meist lieber die vorige.

403.

Ry *Asae foet. depur.* Dr. 1
Pulv. Rad. Rhei Gr. 36
Ol. Foeniculi Ott. 12
Extr. Chelidon. Dr. 1
Fell. Tauri inspiss. Unc. $\frac{1}{4}$
Pulv. Sem. Foenic. q. s.
 ut f. *Boli* 48. *Consp. Pulv. Sem. Foenic.* D. S. 6mal tägl. 2.

404.

Ry *Fell. Tauri insp.*
Elaeos. Absinth. ana Str. 3
Mellis commun. Dr. 6
 solve in
Inf. Hb. Absinth. (Unc. $\frac{1}{2}$) Unc. 5.
 D. S. Zu 2 Klystieren, umgeschüttelt.
 (Für ein Kind bei Askariden.)
 SUNDELIN.

+ *Fermentum Cerevisiae.* Bierhefe. [Fault leicht.] *Cave* mineralische Substanzen; Weingeist. — Innerl. esslöffelweise [die Stärke variirt sehr, deshalb ist die Dose nicht genau zu bestimmen], pur [sehr unangenehm] oder in Mixturen [umgeschüttelt. — Z.B. 2 Unzen mit 1 Unze *Mel despum.* u. 8 Unzen Wasser, stündl. 2 Essl.: WINDISCH gegen Scorbut]. — Hefensyrup [aus Hefe u. Zucker; widerlich, schwach bitter schmeckend; purgirend; mit Wasser vermischt sich trübend, leicht in geistige Gährung übergehend]. — Äusserl. zu Umschlägen, Katalpasmen [z. B. mit geriebenen Kartoffeln und Mehl, warm aufgelegt (auf scorbutische Geschwüre): NEUMANN. — Mit rohem Honig zu gleichen Theilen und der nöthigen Menge Roggenmehl: SUNDELIN, auf brandige Geschwüre].

+ *Ferrum muriaticum oxydatum s. rubrum.* *Ferrum muriaticum* [schlechtweg, wie zwar oft auch das folgende Präparat genannt wird] *s. permuriaticum.* *Sal Martis muriaticum.* *Bichlororetum* od. *Sesquichloreretum Ferri.* Rothes salzsaures Eisen. Salzsaures Eisenoxyd. [Zerfliesst. — 1 Drachme 1 $\frac{1}{2}$ Mgr.] *Sol.* 1 $\frac{1}{2}$, auch leicht auflöslich in Weingeist u. Äther. — *Cave* Weinstein-säure, Hydrothionsäure; reine, kohlensaure, blausaure, bernsteins.,

phosphors., hydrothions. Alkalien [Schwefellebern]; salpetersaures Silber u. Quecksilberoxydul, essigs. Blei; Borax; Seifen; Gerbestoff. — Und

Ferrum muriaticum oxydulatum. Ferrum muriaticum [s. S. 192]. *Chloretum Ferri*. Grünes salzsaures Eisen. Salzsaures Eisenoxydul. [Zerfliesst. — 1 Drachme $1\frac{1}{2}$ Sgr.] *Sol.* 1; auch auflöslich in Weingeist. — *Cave* wie beim vorigen [wenn auch einige der oben aufgeführten Stoffe mit den Eisenoxydsalzen keine Niederschläge bilden, so müssen sie doch auch hier ausgeschlossen werden, weil durch den Sauerstoff der atmosph. Luft das salzs. Eisenoxydul sehr bald partiell in Oxydsalz umgewandelt wird]; ausserdem Chlor; *Aurum muriat.*

Innerl. [wir vereinigen beide Präparate, da sie dynamisch wohl kaum verschieden sind, und die Autoren sie oft nicht unterscheiden] zu Gr. 2-5 (und mehr) einigemal tägl., nur in Auflösungen [wässerigen und geistigen, z. B. Dr. $\frac{1}{2}$ in *Aq. Cinnam. vinos.* Unc. $\frac{1}{2}$, zu 16-40 Tropfen. Oder bei beginnender Magenerweichung der Kinder nach v. POMMER in Schleim, in verhältnissmässig etwas grösseren Gaben].

Selten äusserl., z. B. als Gurgelwasser [Dr. 2 in *Aq. comm.* Unc. 6 mit *Mell. rosati* Unc. 1: FISCHER bei sehr um sich fressenden Rachenankern].

(Vgl. *Liquor* und *Tinctura Ferri mur. oxydati* und *oxydul.*)

Ferrum oxydatum fuscum. Ferrum carbonicum s. subcarbonicum. Crocus Martis aperitivus. Hydras ferricus. Braunes Eisenoxyd; eröffnender Eisensafran; kohlenaures Eisen. [Die Benennung „kohlenaures Eisen, *Ferr. carbon.*“ ist nur halb richtig; das Präparat ist Eisenoxydhydrat mit wenig kohlensaurem Eisenoxydul, welches letztere sich überdies leicht unter Entweichung der Kohlensäure zersetzt. — Sehr feines Pulver. — 1 Drachme $1\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave* Säuren; Salzbilder.

Innerl. zu Gr. 3-10 [die Engländer geben es, namentlich bei Neuralgien u. a. Nervenkrankheiten, scrupel- u. drachmenweise, ja bisweilen unzenweise! Auch KOPF giebt es bei passiven Hämorrhagien, namentlich Metrorrhagien, bei Leukorrhöe, bösartigen Verhärtungen u. Geschwüren, Flechten-Kachexie u. s. w. gewöhnlich zu 1 Scr., 2-3mal tägl., 1-1 $\frac{1}{2}$ St. nach dem Essen, längere Zeit hindurch; bei heftigen Neuralgien auch noch grössere Gaben.] 3-4mal tägl.; in Pulver [z. B. Gr. 4 mit *Elaeos. Macid.* Scr. $\frac{1}{2}$, 2-4mal tägl.: RUST bei Krebsgeschwüren. — † *Carbon. Carnis* Gr. 2 mit *Ferr. ox. f.* Gr. 4 u. eben so viel Zucker, 3-4mal tägl. (u. allmählig grössere Gaben): CLARUS bei angehender Hypertrophie der Ovarien u. des Uterus. — Ry 247 (*Chinium sulph.*)], Pillen [Ry 405], u. s. w.

Äusserl. wohl als Streupulver, oder mit wenig Wasser zum Brei gemacht [bei krebigen Geschwüren: CARMICHAEL].

405.

Ry *Ferri oxydati fusci*
Hb. Calendul. pulv.
Extr. Calendul. ana Dr. 1.

M. f. c. Mucilag. Gm. Mim. q. s. Pilulæ 90. Cons. Pulv. Cass. cinnam. D. S. 3mal tägl. 5-8. (Bei Krebsgeschwüren eine Lieblingsformel von

RUST.

Ferrum oxydatum rubrum. Crocus Martis adstringens. Oxydum ferricum. Roth's (chemisch reines) Eisenoxyd; adstringirender Eisensafran. [Sehr feines Pulver. — 1 Drachme 2 Sgr.] *Cave Säuren; Salzbilder.* — Innerl. wie das vorige. — Äusserl. in dem GRIFFITHSchen Schnupfpulver, Ry 74.

Ferrum oxydulatum nigrum. Aethiops martialis. Oxydum ferrosus. Schwarzes Eisenoxydul. Eisenmohr. [Sehr feines Pulver. — 1 Drachme 2½ Sgr.] *Cave Säuren; Salzbilder.* — Innerl. zu Gr. 2-10 einigemal tägl., in Pulvern [Ry 406], Trochisken [Ry 407], Pillen [Ry 408], Bissen [Ry 409; 59 (*Aloë luc.*)].

406.

Ry *Ferri oxydul. nigri*
Cass. cinnam. ana Gr. 4
Sacch. albi Scr. ½.
M. f. Pulv. Disp. tales nr. 12. D. S. 3-4mal tägl. 1 Pulver.

Oder dieselben Mittel in Trochisken:

407.

Ry *Ferri oxydul. nigri*
Cass. cinnam. ana Dr. 2
Sacch. albi Unc. 1½
Mucil. Gm. Tragac. q. s.
ut f. Trochisci nr. 60, Pulv. Cass. cinnam. conspergendi, torrendi. D. S. 3-4mal tägl. 2.

408.

Ry *Ferri oxydul. nigri*
Extr. Ferri pomati ana Dr. 1
Rad. Calami pulv. q. s.
ut f. Pilulæ 60. Cons. Pulv. Rad. Calami. D. S. 3mal tägl. 2.

409.

Ry *Ferri oxydul. nigri Gr. 12*
Pulv. Rad. Rhei Scr. 1
— Sem. Foenic. Dr. 1
Extr. Gentian. q. s.
ut f. Bolli 12. Cons. Pulv. Sem. Foenic. D. S. 3mal tägl. 2 Stück.

+ *Ferrum phosphoricum. Phosphas ferricus (Ferri).* Phosphorsaures Eisen (-Oxyd). [Unlöslich in Wasser; leichtlöslich in Säuren.] *Cave* wie bei *Ferr. muriat. oxydat.* [phosphors. Natrium, versteht sich, ausgenommen]. — Innerl. zu einigen Gran [bei englischen Ärzten mitunter bis zu Dr. ½], einigemal tägl., in Pulver, Pillen u. s. w.

Ferrum pulveratum s. alcoholisatum s. purum limatum. Limatura Martis praeeparata. Fila s. Ramenta

Ferri praeparata. Alcohol Martis. Gepulvertes (metallisches) Eisen. Präparirte Eisenfeile. [Sehr feines Pulver. — 1 Drachme $1\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave* Säuren; Salzbilder; Kupfer-, Zink-, Bleisalze; (Schwefel, der Schwefelwasserstoffgas-Blähungen wegen, während sonst das gepulverte Eisen nur Wasserstoffgas entwickelt); bei der Bereitung von Eisenweinen gerbestoffhaltige Dinge.

Innerl. zu Gr. 2-6, einigemal tägl.; gern mit Absorbentien. In Pulvern [Ry 410. — Mit *Rad. Rhei* ana Gr. 5, Zucker (besser Ölzucker), Gr. 10, Einmal (später 2-3mal) tägl.: BAGLIVI, STRACK u. A. gegen Scrofulen, Rhachitis.], Pillen od. Bissen [Ry 411; 32 (*Acid. phosph.*), 56, 57 (*Aloë luc.*), 134 (*Asa foet.*), 341 (*Extr. Aloës*), 602 (*Kali sulphurat.*)], Latwergen [die aber etwas steif zu halten sind; vgl. I. S. 293 sub 2) u. S. 205]; zur Bereitung von Eisenweinen [vgl. *Vinum ferruginos.* — Ry 828 (*Rad. Armorac.*)].

410.

Ry *Ferri pulverati* Gr. 1
Cass. cinnamom. Gr. 2
Magnes. carbon. Gr. 5
Sacch. albi Scr. 1.
M. f. Pulv. Disp. tales nr. 6. D. S.
 Früh und Abends ein halbes Pulver. (Bei
 Psödatrophie, Rhachitis. — Etwa für ein
 Kind von 1 Jahr berechnet.)

Pulvis antatrophicus PH. P.

411.

Ry *Asae foet. dep.* Dr. $1\frac{1}{2}$
Ferri pulverati Dr. $\frac{1}{2}$
Ol. Tanaceti Gtt. 10
Extr. Absinth. q. s.
 ut f. *Pilulae* 90. *Consp. Pulv. Cass.*
cinnam. D. in vitro. S. 3mal tägl. 6.
 (Anthelminthisch.)

Ferrum sulphuricum crystallisatum. Vitriolum Martis (factitium). Sal Martis [die PH. SLESV. führt diese Benennung als Synonym bei *Ferr. muriat. oxydat.* auf]. *Sulphas ferrosus c. Aqua.* Eisenvitriol; grüner Vitriol. Schwefelsaures Eisenoxydul. [Grüne Krystalle, an der Luft in ein gelbes Pulver zerfallend. — 1 Unze $1\frac{1}{3}$ Sgr. Zum äusserlichen Gebrauch darf oft das *Ferr. sulph. venale* (1 Unze $\frac{1}{3}$ Sgr.) substituirt werden.] *Sol. 2.* — *Cave* wie bei *Ferrum muriat. oxydulat.*

Innerl. zu Gr. 1-4 [bei *Helminthiasis*, im Verhältniss zum Alter, in doppelter Menge] einigemal tägl.; in Pulver [Ry 412; 246 (*Chinium sulph.*), 962 (*Sem. Cin.*). — 1 mit *Flor. Tanac.* u. *Sem. Cinas* ana 3: *Pulv. vermifugus* PH. SLESV. Anhg. (1 Drachme 1 Shl.), als officinelle Composition nicht zu loben, da bei solchen Benennungen die Praktiker leicht das Hauptmittel der Composition vergessen, und man ja die gedachten Stoffe bequem magistral in dem jedesmal passendsten Verhältniss und mit dem etwa nöthigen Geschmacks-Corrigens (oder (Pillen-) Constituens p.p. verbinden kann.], Zuckerwerkformen [so namentlich anthelminthische Compositionen für Kinder. — Ry 413], Pillen od. Bissen [Ry 414-416], Latwerge [nicht gern.

der unbestimmten Dose wegen], flüssiger Form [Ry 417; 705 (*Myrrha*). — Als ein die verschickten eisenhaltigen Mineralwässer ersetzendes, wohlfeileres, vielleicht selbst noch wirksameres Mittel empfiehlt MEUKER, ein Pulver aus *Ferr. sulph. cryst.* Gr. 2½, Zucker Scr. 1, und ein zweites Pulver aus *Natr. carb. acidul.* Gr. 2½, Zucker Dr. 1, jedes in einem Paar Essl. Wassers aufzulösen und die beiden Auflösungen vermischt während des Brausens schnell zu trinken. Man erhält dadurch kohlensaures Eisenoxydul (reichlich Gr. 1) in kohlensaurem Wasser gelöst, mit etwas Glaubersalz u. unzersetztem kohlensauren Natron].

Ausserl. zu Injectionen [für die Harnröhre etwa Gr. 2-5 auf Unc. 1. Ry 72 (*Alum.*). — Für die Vagina etwa Gr. 5-20 auf Unc. 1. — Bei Nasenpolypen noch stärker, selbst wohl bis zu Dr. 1 auf Unc. 1], Augenwässern [zu Bähungen Gr. 5-15 auf Unc. 4; zu Tropfwässern Gr. 1-4 auf Unc. ½], Augenpulvern [Gr. 5-15 auf Dr. 2. — Ry 992 (*Stann. rasp.*)], Bädern [Unc. 1-2. — HIMLY lässt Unc. 1½-2 im Bade auflösen, u. dann, während der Kranke darin ist, *Kali carbon. crud.* Dr. 3-4 dazusetzen; das Bad ist nun freilich kein Eisenvitriolbad mehr, denn es entsteht *Ferr. oxydat. fuscum*, welches, im Wasser unauf löslich, eine Zeitlang in demselben suspendirt bleibt und das Bad roth färbt. — Ein den natürlichen Eisenbädern ziemlich ähnliches, kohlensaures Eisenoxydul, Kohlensäure und schwefelsaures Kali enthaltendes Bad erhält man nach folgender Vorschrift von DÖBEREINER: Zu 200-250 Maass Flusswasser in einer Badewanne setzt man eine Auflösung von Scr. 26 frisch krystallisirten Eisenvitriols in wenig heissem Wasser und Scr. 19 concentrirte Schwefelsäure, und rührt das Ganze um. Dann setzt man eine Auflösung von Scr. 42 *Kali carbon. o Cin. clav.* in wenig heissem Wasser, ebenfalls unter Umrühren, zu, erwärmt nun durch Zugiessen von heissem Wasser das Bad hinlänglich, und lässt es sogleich gebrauchen. — Hat man Quellwasser, welches viel kohlensauren Kalk enthält (durch einen Ueberschuss von Kohlensäure aufgelöst — „hartes“ Wasser), so bereitet man nach DÖBEREINER sehr einfach und wohlfeil ein Stahlwasser, indem man frisch krystallisirten Eisenvitriol darin auflöst, so viel, dass auf jedes Pfund Wasser 1-2 Gran kommen (auf das ganze Bad etwa 1-2 Unzen; es entsteht Gyps und kohlensaures Eisenoxydul; beide bleiben, das letztere durch den Ueberschuss von Kohlensäure, aufgelöst).], Waschungen, Umschlägen [z. B. 1 auf 12: CARMICHAEL bei noch nicht aufgebrochenem Krebs. — Ry 526 (*Hydr. mur. corr.*)], Streupulvern [z. B. bei Blutungen].

412.

Ry *Ferri sulphur. cryst.* Dr. ½
Pulv. gummosi Dr. 2
Ol. Cass. cinnam. Gtt. 6.
M. f. Pulv. Div. in 12 part. aeq. D.
in charta cer. S. 3mal tägl. 1 Pulver.

413.

Ry *Ferri sulphur. cryst. pulv.* Dr. 1½
Pulv. Sem. Cinac Dr. 3
 — *Sacch. albi* Unc. 1½
Mucil. Gm. Tragac. q. s.
ut f. Trochisci nr. 60. D. S. 3mal

tägl. 2 Stück. (Für ein Kind von 8 Jahren.)

414.

Ry *Pulv. Ferri sulphur. cryst.*
 — *Catechu*
 — *Terebinth. coct. ana* Dr. 1
Ext. Gentian. q. s.
ut f. Pilulae 120. Consp. Pulv. Cass. cinn. D. S. 3mal tägl. 3-6. (Gegen Gonorrhöa secundaria.)

HENSCHEL.

Noch stärker sind die folgenden Pillen:

415.

Ry *Ferri sulphur. cryst. pulv.*
Kino pulv.
Rad. Gentian. pulv.
Extr. Gentian. ana Dr. 1½
Terebinth. laric. Dr. 3
Rad. Althaeae pulv. q. s.
 ut f. *Pilulae 270. Consp. D. S. 4mal*
egl. 10. (Gegen Gonorrhoea secundaria.) (WALCH.)

416.

Ry *Galbani depur.*
Extr. Myrrhae pulv. ana Dr. 3
Ferri sulphur. cryst. pulv. Dr. 1
Extr. Cort. Aurant. q. s.
 ut f. *Pilulae 210. Consp. Pulv. Cass. cinam. D. in vitro. S. Alle 3 St. 6*
 und mehr. („Rotho-Backen-Pillen“, bei Chlorose mit Amenorrhoe.) (KÄMPF.)

417.

Ry *Ferri sulphur. cryst. Scr. 1*
Kali carbon. e Tart. Gr. 25
solve in
Aq. Menth. crisp. Unc. 8
adde
Myrrhae pulv. Dr. 1
antea cum
Sacch. albi Unc. ½
contritam. M. D. S. Umgeschüttelt 4mal
tägl. 1-2 Essl. (Es bildet sich kohlen-
saures Eisenoxydul (nach und nach in Ei-
senoxydhydrat übergehend) und schwe-
felsaures Kali, doch der guten Wirkung
unbeschadet oder sie wohl gerade bedin-
gend. — Besonders gegen die colloqua-
tiven Schweisse im letzten Stadium der
Schwindeucht.)
Mixtura anthectica GRIFFITHII.

Flores Arnicae. Wohlverleihblumen. [Hauptbestandtheile: Extractivstoff, scharfes Harz, äther. Öl und eisengrüner Gerbstoff. — 1 Unze conc. 1 Sgr., gr. pulv. 1½, subt. pulv. 1½ Sgr.] *Cave* Eisenoxydsalze, *Argent. nitr., Aur. muriat., Plumb. acet.*

Innerl. zu Gr. 5-15, mehrmals tägl. In Pulver [nicht gern: vgl. I. 8. 210 sub c.], Bissen, Latwerge; in der Regel im Aufguss [Dr. 1-4 - Unc. 1 auf Unc. 6, 2stündl. 1 Essl. Man fängt — wo man Zeit dazu hat — gern versuchsweise niedrig an und steigt rasch, weil das Mittel manchmal unerwartet heftig wirkt. Manche Ärzte lieben einen einhüllenden (den kratzenden Geschmack mildernden) Zusatz von etwas Schleimigem. — Ry 418, 419; 928 (*Rad. Valer. min.*). — Dr. 2 auf Unc. 8 Colatur: *Inf. Arnic. PH. MIL.* — Man giebt sie auch wohl zum Theeaufguss in *Species*, aber dann doch wenigstens in die Partialquantitäten dispensirt; etwa Morgens u. Abends Dr. ½-1 mit einem Zusatz von halb so viel *Rad. Glycyrrh.* oder von doppelt so viel *Spec. ad Inf. pect.*, auf ein Paar Tassen.] oder in Ebullition [Ry 272 (*Cort. Angustur.*)].

Ausserl. als Niesepulver; infundirt zu Klystieren [etwa Dr. 2; namentlich auch zu Visceralklystieren, vgl. *Rad. Valer. min.*], Augenbähungen [etwa Dr. 2 auf Unc. 4. Ry 257 (*Chlor. Calcar.*). — Mit *Hb. Rorismar. ana Scr. 4* und Rothwein zur Colatur von Unc. 4 infundirt: ROSAS zu lauen Bähungen bei Ecchymom der Augenlider.] u. a. Bähungen [in concentrirtem Aufguss, wässrigem oder geistigem. Ry 206 (*Camph.*)], Dämpfen [z. B. Dämpfe aus einem Arnica-Aufguss mit grob gestossenem Salmiak einzuathmen: ECOARD bei Croup].

418.

R_x *Flor. Arnicae* Dr. 6
Aq. comm. fervid. q. s.
digere per ½ horam. Colat. Unc. 6 re-
frigerata fiat cum
Camphorae trit. Scr. 1
Mucilag. Gm. Mimos. Unc. 1
l. a. Emulsio. D. S. Umgeschüttelt
2stündl. 1 Essl. HORN.

419.

R_x *Flor. Arnicae* Unc. ½
Aq. comm. fervid. q. s.
digere per ½ horam. Colat. Unc. 6 re-
frigerat. adde
Aether. sulphur. Dr. 1
Liq. Ammon. succin. Dr. 2.
M. D. S. Stündl. 1 Essl. (In typhösen
Fiebern.) HORN.

Flores Aurantii s. Naphae. Pomeranzen- od. Orangen-Blüthen. [Hauptbestandtheil: äther. Öl. — 1 Unze conc. 5½ Sgr.]
Cave Eisenoxydsalze. — Innerl. im Aufguss [meist nur als Thee, Dr. 1–2 auf 2 Tassen, ein Paar Mal tägl. — R_x 311 (Croc.).]

+ **Flores Calendulae.** Ringel- od. Todten-Blumen. [Hauptbestandtheile: bitterer Extractivstoff, Calendulin (ein dem Kleber ähnlicher Stoff), Kali- und Kalk-Salze. — 1 Unze conc. 2½, sub. pulv. 3½ Sgr.]
Cave empfindliche Metallsalze; in flüssiger Form auch Eisenoxydsalze, Gerbstoff. — Innerl. zu Scr. 1–2, einigemal tägl.; in Pulver, pulveraufnehmenden Formen, Aufguss [namentlich wässerig-winigem Digestionsaufguss], Abkochung [eine concentrirtere geseht bisweilen in der Kälte zur Gallerte].

+ **Flores Cassiae. Clavelli Cinnamomi.** Zimtblüthen. [1 Unze 2½ Sgr.] Wie *Cassia cinnamom.*

Flores Chamomillae Romanae. Römische od. edle Kamillen. [Hauptbestandth. wie bei *Flor. Chamom. vulgar.* — 1 Unze conc. 2 Sgr.] Innerl. im Aufguss [dieser wird durch Eisenoxydsalze stark dunkelgrau], auch wohl äusserl., wie *Flor. Chamom. vulgaris*, doch in etwas geringeren Gaben.

Flores Chamomillae vulgaris. Gemeine Kamillen. [Hauptbestandtheile: äther. Öl u. bitterer Extractivstoff. — 1 Unze conc. 1½, gr. pulv. 1½, sub. pulv. 1½ Sgr.]

Innerl. zu Scr. 1–Dr. 1 mehrmals tägl. In Pulver u. pulveraufnehmenden Formen [selten und nur etwa bei Wechselfiebern, weil das Pulver stark aufquillt und deshalb sowohl für sich als auch in Latwergen und selbst Schüttelmixturen unangenehm zu nehmen ist, auch bisweilen Erbrechen oder Durchfall erregt (weshalb man wohl kleine Gaben Opium zusetzt). Es wird auch wohl durch das Extract, etwa noch mit einem geringen Zusatz des (reinen oder citrobenölhaltigen) äther. Öls, meist entbehrlich. — R_x 96 (*Ammon. muriat. dep.*)]; in der Regel im Aufguss [als Vehikel anderer Arzneien meist nur Dr. 3–4, doch auch Unc. 1, auf Unc. 6, 2stündl. 1 Essl. — *Inf. Chamom. vulg. PH. MIL.*: Unc. ½ auf 8 Unz. Colatur. — Für sich in der Regel als Thee, Dr. 2–4 auf

2-3 Tassen. — Zur Unterstützung der Brechmittel: vgl. *Rad. Ipecac.* — Ry 311 (*Crocus*), 930 (*Rad. Valer. min.*). — Eisenoxydsalze färben oder fällen den Aufguss braun oder schwarzgrau].

Äusserl. machen die Kamillen viele andere theurere, aromatische, bitter-aromatische, etc. Mittel entbehrlich, oft selbst die China. — Zerschnitten zu Kräuterkissen [vgl. I. S. 199], als Zusatz zu Kataplasmen. Gepulvert zu Streupulvern [Ry 208 (*Camph.*)], zum Ausfüllen von Beuteln statt der Pessarien [vgl. S. 132]. Infundirt zu Gurgelwässern [etwa Unc. $\frac{1}{2}$ auf Unc. 6, mit Zusatz von Wein, Essig od. dgl.], Klystieren [Unc. $\frac{1}{2}$ - 1. — Nicht bloss zu Visceralklystieren (vgl. *Rad. Valer. min.*), sondern auch fast zu jedem einfachen Hausklystier nimmt man Kamillentheee; die Quantität des Wassers zum Aufguss ist nach dem Zweck des Klysters verschieden. Vgl. *Ol. Lini.* — Ry 923 (*Rad. Tarax.*), 934 (*Rad. Valer. min.*)] u. a. Injectionen, Augewässern [Ry 257 (*Chlor. Calcar.*)], Bädern [L. 1-2; pur — wenn der Geruch nicht widerlich ist — oder mit andern aromatischen Kräutern], allgemeinen u. örtlichen Dampfbädern [vgl. *Flor. Sambuci.* — Ry 424 (*Fol. Hyosc.*)]. — Man benutzt auch den Dampf zum Einathmen, Bähungen u. Verbandwässern [meist in ziemlich concentrirtem Aufguss, 1 auf 6. — Ry 12 (*Acet. plumb.*), 305 (*Cort. Querc.*)], u. s. w.

Flores Convallariae majalis s. Lilii convallii. Maiblumen. [1 Unze $2\frac{1}{2}$, sub. pulv. $3\frac{1}{2}$ Sgr.] Nur noch zu Schnupfpulvern [officinell: *Pulv. sternutatorius*].

+ *Flores Farfarae.* Huflattigblumen. [1 Unze 2 Shl.] Wie *Folia Farfarae*.

Flores Granati. Balaustia. Flores Balaustiorum. Granatblumen. [Hauptbestandtheile: eisenblauer Gerbstoff und bitterer Extractivstoff. — 1 Unze conc. 4 Sgr.]

Wohl nur noch zu Gurgelwässern [etwa Unc. $\frac{1}{2}$ - 1 mit Unc. 12 auf Unc. 8 gekocht, mit Zusatz von Rothwein, Tincturen od. dgl. Will man sie als Species verschreiben, und etwas Schleimiges dazusetzen, so wählt man wohl, damit ein Paar schöne Farben zusammenkommen, *Flor. Malv. arbor.*].

Flores Lavandulae s. Spicae. Lavendelblumen. Spiege. [Hauptbestandth. äther. Öl. — 1 Unze $\frac{5}{8}$, conc. $1\frac{1}{8}$, sub. pulv. $1\frac{1}{2}$ Sgr.]. Nur äusserl., zu Kräutersäckchen [offic. *Spec. aromat.*], zu wohlriechenden Räucher-Species und Pulvern [offic. *Spec. ad suffiand.*]; infundirt zu Umschlägen [offic. *Spec. aromat., ad Foment., resolventes*], Bädern [L. 2 u. mehr].

Flores Malvae arboreae oder [nicht bezeichnend genug]

rubrae. Stockrosen. Rosenpappelblumen. [Hauptbestandtheile Schleim u. färbender Extractivstoff. — Der Auszug wird durch *Acet. plumbic.* dunkelgrün, durch *Plumb. acet.* blaugrün, durch salzsaures Eisenoxyd violett, durch Alkalien grün, durch Säuren roth. — 1 Unze conc. $1\frac{2}{3}$ Sgr.] Wie *Flores Malvae vulgaris*, [Namentlich sind sie zu Gurgelwässern beliebt — vgl. *Flor. Granati* und Ry 876 (*Rad. Pimpinell.*) —, und ihrer (meistens) schönen Farbe wegen zu *Species*.]

Flores Malvae vulgaris s. silvestris. Malvenblüthen. [Hauptbestandtheil Schleim. — Der Auszug wird durch *Acet. plumbic.* grünlichgelb, durch *Plumb. acet.* dunkelgrün, durch salz. Eisenoxyd braun. — 1 Unze conc. $2\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerl. in Abkochung [Dr. 2-6 mit Unc. 9 auf Unc. 6, zu Esslöffeln od. halben Tassen] oder doch Ebullition, seltener im Aufguss.

Ausserl. [meist in concentrirter Abkochung: Unc. $4-1\frac{1}{2}$ mit Unc. 9 auf Unc. 6] zu Mund- u. Gurgelwässern, Einspritzungen, Bähungen [zu Augenbähungen doch weniger concentrirt. — Ry 420], Kataplasmen, u. s. w.

420.

Ry *Flor. Malv. vulg.* Dr. 2
ebulliant per 5 Minutas c. Aq. comm.
q. s. Colat. Unc. 6 refrigeratae adde
Spir. camphorati Gtt. 6.
M. D. — Mehrmals tägl. in der lau erwärmten u. umgeschüttelten Flüssig-

keit das Auge zu baden, auch Compressen damit überzuschlagen. (Bei *Hypopyon* u. s. w.)

JANIN.

Das lauwarme Wasser dürfte an der Wirkung dieses berühmten erweichenden Augenfoments wohl den meisten Antheil haben.

† *Flores Meliloti citrinae*. [1 Unze 2 Shl.] Wie *Herba Melil.*

Flores Millefolii. Schaafgarbenblumen. [Hauptbestandtheile: äther. Öl, bitterer Extractivstoff, Gerbestoff. — 1 Unze conc. 1 Sgr.] Innerl. zu Unc. $\frac{1}{2}-1$ tägl., in Aufguss [Ry 491 (*Hb. Trifol. fibr.*)]. Als Thee Dr. 2-4 auf 2-3 Tassen] oder leichter Abkochung [wenn es weniger um das äther. Öl zu thun ist. — Ry 474 (*Hb. Fumar.*)]. — Ausserl. zu Visceralklystieren [vgl. *Rad. Valerian. min.*], Bädern [L. 2, doch selten allein].

Flores Rhoeados. Flores Papaveris Rhoeados s. erratici. Klatsch-, Klapper- od. Korn-Rosen. Feldmohnblumenblätter. [Hauptbestandtheile: rother extract. Farbstoff (durch salzsaures Eisenoxyd in Violette od. Braune verdunkelt, durch Bleiessig blaugrau, durch Bleiszucker dunkelviolet) und (?) Morphinum. — 1 Unze conc. $2\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. als Theeaufguss [Dr. 2-3 auf eben so viel Tassen; der Aufguss ist schön

roth]; oder der schön rothen Farbe wegen als verzierender Zusatz in Species oder Morsellen [z. B. R. 1014].

Flores Rosarum rubrarum. Rothe Rosenblumenblätter. Essig- od. Damascener Rosen. [Hauptbestandtheile: äther. Öl und Gerbestoff. — Der Auszug wird durch Bleiessig orangefarb, durch Bleizucker gelb. — 1 Unze conc. 5 Sgr.] Bisweilen als schön färbender Zusatz in Species [namentlich zu gelind adstringirenden Gurgelwässern] oder Morsellen.

Flores Sambuci. Flieder- od. Hollunder-Blumen. [Es ist merkwürdig, wie die Benennungen Flieder und Hollunder durch einander laufen; in manchen Gegenden Deutschlands nennt das Volk *Sambucus nigra* Hollunder, und *Syringa vulgaris* Flieder, in andern umgekehrt. — Hauptbestandtheil: äther. Öl. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$, conc. $1\frac{1}{3}$, gr. pulv $1\frac{2}{3}$, sub. pulv. $1\frac{5}{8}$ Sgr.]

Innerl. im Aufguss [Als Vehikel anderer diaphoretischen Arzneien Dr. 4–6 auf Unc. 6. (Inf. Samb. PH. MIL: Unc. $\frac{1}{2}$ auf Unc. 8.) Will man sie aber als Hauptmittel geben, so lasse man den Aufguss nicht in der Apotheke bereiten, denn nur, so lange er noch heiss ist, wirkt er recht kräftig. Man nehme Dr. 2–6 auf 2–3 Tassen, und lasse diese Portion etwa vor Schlafengehn rasch hinter einander verbrauchen (oder auch wohl die doppelte Portion den Tag über als warmes Getränk); hält man den Fliederthee allein für nicht kräftig genug, so kann sich der Kranke selbst etwas Rum (wo dieser erlaubt ist), oder Citronensaft, oder $\frac{1}{2}$ –1 Drachme *Vinum stibiat.*, oder $\frac{1}{2}$ Unze *Liq. Ammon. acet.*, 1 Unze *Roos Sambuci* od. dgl. zusetzen. Oder man benutzt auch den auf diese Weise bereiteten Fliederthee als Unterstützungsmittel kräftigerer, nur einmal, etwa vor Schlafengehn zu reichenden Diaphoretica, z. B. einer Dosis Doverschen Pulvers, Campher od. dgl.].

Ausserl. zu Kräuterkissen, Streupulvern [selten. — Mit Weizenkleie ana: *Pulv. ad Erysipelas* PH. MIL. — 6 mit *Bol. Armen.* 3, Kreide $1\frac{1}{2}$, Weizenkleie 16: *Pulv. Samb. compositus s. ad Erysip.* PH. SLESY. Anhg. (1 Unze 2 Sbl.) — Diese beiden Pulver gehören zu den I. S. 223 sub a) erwähnten.]; infundirt [meist noch concentrirter als zum innerlichen Gebrauch] zu Mund- u. Gurgelwässern [hier gern mit Milch infundirt, „Fliedermilch“. — Officinell: *Spec. ad Gargarisma*], Bähungen, Bädern [L. 1–3], auch; Dampfbädern [allgemeinen u. örtlichen. Sie ersetzen hier, etwa noch mit Kamillenblumen, eine Menge theurerer Mittel vollkommen.], u. s. w.

Flores Sulphuris. Schwefelblumen. [1 Unze $\frac{2}{3}$ Sgr.] Höchstens ausserl., doch auch hier wird ihnen mit Recht *Sulphur depur.* vorgezogen.

Flores Tanacetii. Rainfarn- od. Wurmfarne-Blumen. [Hauptbestandtheile: äther. Öl, bitterer Extractivstoff, Gerbestoff. — 1 Unze conc. 1 Sgr.] Innerl. zu Scr. 1–2 einigemal tägl. In Pul-

ver, Latwerge; Aufguss [tägl. Unc. $\frac{1}{2}$ - 1 auf Unc. 3-6; auch wohl mit Milch bereitet]. — Äusserl. zu Kräuterkissen, zu Klystieren [wie *Sem. Cinae*]. (Ins Bett gelegt gegen Flöhe u. Wanzen.)

+ *Flores Tiliae*. Lindenblüthen. [Hauptbestandtheile: äther. Öl und Gerbestoff. — 1 Unze conc. $1\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. im Aufguss [als Thee, *ad libitum*].

Flores Verbasci. Wollkrautblumen. [Hauptbestandtheile: Schleim, Zucker und (?) äther. Öl. — 1 Unze conc. 2 Sgr.] Innerl. infundirt oder leicht abgekocht als (schleimiger) Thee *ad libitum* [der Thee muss aber durch ein feines Sehtuch gegossen werden, um die kleinen Haare von den Stanbfäden abzusondern]. — Äusserl. eben so als Zusatz zu Visceralklystieren [vgl. *Rad. Valer. min.*].

Flores Violarum. Veilchenblumen. Märzveilchen. [Hauptbestandtheile: Violin (dem Kmetin ähnlich), äther. Öl und blauer extractiver Farbestoff, der durch Säuren geröthet, durch Alkalien gegrünt wird. — 1 Unze conc. 6 Mgr.] Ber (meistens) schönen Farbe und des Geruchs wegen theils als Zusatz (in geringer Menge) zu Species.

Folia Aurantii. Pomeranzen- od. Orangen-Blätter [Hauptbestandtheile: äther. Öl und bitterer Extractivstoff. — 1 Unze conc. $1\frac{1}{2}$, *subt. pulv.* $2\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. zu Scr. 1 - Dr. 1 einigemal tägl.; in Pulver [Ry 925 (*Rad. Valer. min.*)], Latwerge, Aufguss [tägl. Unc. 1 - $1\frac{1}{2}$ auf Unc. 6-12. Als Thee Dr. 2-4 auf 2-3 Tassen. — Ry 421; 1091 (*Fisc. alb.*). Vgl. *Rad. Valer. min.*. — Eisenoxydsalze färben den Aufguss stark dunkelbraun].

421.

Ry *Rad. Valerianae min.* Unc. $\frac{1}{2}$
Fol. Aurantii Unc. 1

Hb. Melissa Unc. 2.
Conc. M. f. Spec. D. S. Morgens u.
Abends 1 - 2 Easl. zum Aufguss.

+ *Folia Bucco s. Buccae s. Buchu s. Diosmas crenatae*. Bucco- od. Buchu-Blätter. [Hauptbestandtheile: äther. Öl und gewürzhaft-bitterer Extractivstoff. — 1 Unze conc. $2\frac{3}{4}$ Sgr.] Innerl. im Aufguss [z. B. Unc. $\frac{1}{2}$ auf Unc. 12, 2stündl. $\frac{1}{2}$ Tasse; von Holländern u. Engländern bei Harnröhren-Stricturen —, Unc. $\frac{1}{2}$ auf Unc. 4, stündl. 1 Easl., aus Riga gegen Cholera empfohlen].

Folia Farfarae. Huflattigblätter. [Hauptbestandtheile: Schleim, Gerbestoff, bitterer Extractivstoff (wenig), Salze. — 1 Unze conc. $\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. in Aufguss oder leichter Abkochung [tägl. Unc. 1 - 2 mit L. 2 auf L. $1\frac{1}{2}$, tassenweise; als Thee in geringerer Menge], oder auch der frische Saft [im Mai; zu einigen Unzen tägl. Ry 481 (*Hb. Milfol.*)]. — Diesen hat man auch wohl zum Verband scrofulöser Geschwüre benutzt]. Landleute rauchen die Blätter statt Tabacks beim Husten.

Folia Hyoscyami. Bilsenkraut. [Hauptbestandtheil: Hyoscyamin (Alkaloid). — 1 Unze conc. $1\frac{1}{2}$, gr. pulv. $1\frac{3}{4}$, subf. pulv. 2 Sgr.] Cave Alkalien; Salzbilder [besonders Iod]; Aurum muriat., Argent. nitr., Quecksilbersalze; Gerbstoff.

Innerl. zu Gr. 1-4 u. allmählig mehr (in bedeutenden Nervenkrankheiten selbst sogleich zu Gr. 4-8), mehrmals tägl.; in Pulver, Pillen [Ry 377 (Extr. Hyosc.)], selten im Aufguss.

Ausserl. zu Klystieren [etwa Dr. $\frac{1}{2}$, mit Milch infundirt] u. a. Einspritzungen, Augenwässern [Zu Augenbähungen Dr. 2-4 zu 4 Unz. Colatur infundirt. Zu Augentropfwässern Scr. 1- Dr. 1 auf Unc. $\frac{1}{2}$. Zur Untersuchung des Auges etwa Dr. $\frac{1}{2}$ auf Unc. $\frac{1}{2}$, davon einige Tropfen laueinzufüssen, auch wohl noch ein damit befeuchtetes Läppchen $\frac{1}{2}$ St. lang überzulegen; nach 1 St. oder früher erfolgt die Erweiterung der Pupille.], Bädern [selten; etwa wie Hb. Conii macul.; doch in etwas geringerer Dose], Bähungen, Kataplasmen [wie Hb. Conii macul. — Ry 422, 423; 817 (Poma acid.)], Salben [die PH. HASS. lässt ein Ungt. Hyosc. nach derselben Vorschrift wie das Ungt. Digitalis (vgl. Hb. Digital.) bereiten; eben so, doch in der Regel aus dem frischen Kraut, die PH. SLESV. (1 Unze 3 Shl.). Auch das Ungt. populeum (Pappelsalbe) der PH. SLESV. (1 Unze 4 Shl.) gehört hierher: frische Pappelknospen (Gemmae Populi, nur hierzu officinell) 1 zerstoßen, mit Fett 2 zusammengerieben, so bis zum Sommer aufbewahrt, dann zerstoßenes frisches Bilsenkraut $\frac{1}{2}$ dazu, bis zum Verschwinden der Feuchtigkeit gekocht, colirt.], Dämpfen [Ry 424], Räucherungen. — Die frischen Blätter zerquetscht auf schmerzhaft und entzündete Theile gelegt.

422.

Ry Fol. Hyoscyami
Hb. Conii macul. ana Unc. 1
Sem. Lini Unc. 4.

M. f. Pulv. grossiusc. D. — Die Hälfte od. den dritten Theil mit kochender Milch zu einem dicken Brei zu machen.

423.

Ry Ammoniaci depur. Unc. 1
Fol. Hyoscyami conc.
Hb. Conii macul. conc. ana Unc. 2
Aq. comm. fervidae q. s.

ut f. Cataplasma. D. S. Gewärmt zum Umschlag. (SUNDELIN.)

424.

Ry Fol. Hyoscyami conc.
Flor. Chamom. vulg. conc.
† Furfur. triticeae ana Unc. $1\frac{1}{2}$
Camphorae rasae Dr. 1.

M. f. Spec. D. — Den 3ten Theil mit $\frac{2}{3}$ Quart heissen Wassers zu übergiesen, und mittelst eines Trichters die Dämpfe in das schmerzende Ohr zu leiten.

VOGT.

+ **Folia Ilicis Aquifolii.** Fol. Aquifolii s. Acrifolii s. Agrifolii. Stechpalmen- od. Hülsen-Blätter. [Hauptbestandtheil: bitterer Extractivstoff.] Innerl. zu Scr. 1-2, einigemal tägl. In Pulver, Aufguss [namentlich weinigem; z. B. Dr. 2-4 mit einigen Unzen Wein digerirt, dies kurz vor dem Fieberanfall zu verbrauchen], Abkochung [Unc. $\frac{1}{2}$ -1, leicht abgekocht, den Tag über zu verbrauchen].

† *Folia Lauri*. Lorbeerblätter. [Hauptbestandth. campherhaltiges äther. Öl. — 1 Unze 1 Shl.] Selten äusserl., infundirt, zu Umschlägen, Bädern.

Folia Lauro - Cerasi. Kirschlorbeerblätter. [Hauptbestandtheile: blausäurehaltiges äther. Öl, Gerbstoff und bitterer Extractivstoff. — 1 Unze conc. $3\frac{1}{2}$ Sgr.] Sind nur frisch recht wirksam, und kommen deshalb nur äusserst selten in der Receptur vor; etwa [mit Wasser, Milch, (Wein)] infundirt zu Injectionen, Bähungen, Verbandwässern [R_x 425] p. p.

425.

R_x *Fol. Lauro-Cer. recent.* Unc. 1
Aq. comm. bullient. L. $\frac{1}{2}$
repono ad refrigerat. Colatur. addo

Mell. despum. Unc. 1.

M. D. S. Feine Leinwand od. Charpie damit befeuchtet aufzulegen. (Auf böseartige, schmerzhaftige Geschwüre, namentlich Lippenkrebs.) CHERTON.

Folia Malvae. Pappelkraut. Käsepappelkraut. Gänse-, Hasen-, Feld-, rothe wilde Pappel. Katzenkäse. [Hauptbestandtheil Schleim. — Der Auszug wird durch Eisenoxydsalze mit brauner Farbe getrübt. — 1 Unze conc. 1 Sgr.] Innerl. u. äusserl. in Abkochungen [die etwa 3mal so concentrirt zu machen als von *Rad. Alh.*], Cataplasmen [R_x 462 (*Hb. Conii mac.*)].

Folia Nicotianae. Herba Tabaci. Tabacksblätter. [Hauptbestandtheile: Nicotin (Alkaloid) und Tabackscampher (Nicotianin). — 1 Unze conc. $1\frac{1}{2}$, gr. pulv. 2 Sgr.]

Innerl. (≠) selten in Substanz, zu $\frac{1}{2}$ - 2 Gran *p. dosi*; eher schon im Aufguss [R_x 426-428. — Scr. $\frac{1}{2}$ - 1 zur Colat. von Unc. 4 infundirt, stündl. 1 Essl.: PITSCHAFT gegen krankhafte Pollutionen (daneben kalte Waschungen des Nackens und Hinterhaupts und das nächtliche Tragen einer Bleiplatte auf dem Hinterhaupt; Beseitigung der Ursachen)].

Äusserl. zu Klystieren [Scr. $\frac{1}{2}$ - 1; in dringenderen Fällen Dr. $\frac{1}{2}$ - 1; infundirt, oder wenn man es rasch haben will, ebullirt; in der Regel mit wenig Wasser; nur wo es mehr ausleerend wirken soll, mit viel Wasser, 2-4 Tassen, auch wohl noch mit einem — im Hause des Kranken zu machenden — Zusatz von Öl, Salz od. dgl. R_x 429. — Die Tabacksrauchklystiere kann man, wenn man nicht einen der eigens dazu angegebenen Apparate zur Hand hat, auf folgende Weise instituiren. Man füllt eine Tabackspfeife mit Taback, zündet diesen an, bringt die (durch einen elastischen Schlauch biegsame) Spitze der Pfeife, mit Öl bestrichen, vorsichtig und nicht tief in den Mastdarm, setzt nun den leeren Kopf einer zweiten Pfeife auf den gefüllten Kopf, umwickelt die Ränder der beiden Köpfe möglichst luftdicht mit feuchtem Lüscherpapier od. dgl., und bläst durch das Rohr der 2ten Pfeife den Rauch in den Mastdarm — einige Minuten lang, oder länger, wenn es der Kranke erträgt. Oder man füllt auch einen entleerten kleinen Blasebalg, der nur eine passende, nicht verletzende, Spitze haben muss, durch sein Luftloch mit dem Dampf aus einer Tabackspfeife an, verschliesst dann das

Luftloch so gut als möglich, und entleert ihn in den Mastdarm. Man nimmt zu diesen Rauchklystieren gewöhnlichen Rauchtack, den man sonst, der Beizen wegen, zu den andern Applicationsarten nicht nehmen darf. (Es sey hier gelegentlich daran erinnert, dass nach RUST Tabacksrauchklystiere bei krampfhafter Einklemmung von Hernien, Klystiere von einem Tabacksaufguss dagegen bei Koth einklemmung passen; vgl. dessen *Magazin*, Bd. 29. S. 211, ff.) — Manche alte Tabacksraucher schlucken bisweilen den Rauch aus der Pfeife Minuten od. Viertelstunden lang von oben hinunter, um sich Leibesöffnung zu verschaffen; doch ist das keinem Ungewöhnten zur Nachahmung zu empfehlen, denn fürchterliches Erbrechen würde meist die erste Folge davon seyn.], Augenwässern [zu Augentropfwässern *Scr.* 1–2 zur Colatur von Unc. $\frac{1}{2}$ infundirt. — Selten zu Augenwaschwässern: Ry 430.], Kataplasmen [Um Kinnladen und Hals ein Umschlag von weich gekochten Blättern gelegt, zugleich 3stündl. ein Bad mit Zusatz von einer saturirten Tabacksabkochung, halbstündl. eine Bähung von Kinnladen, Hals und Brust mit einer solchen Abkochung, und 2mal tägl. ein Tabacksklystier: ANDERSON bei *Tetanus u. Trismus traumaticus*], Bädern [z. B. L. $\frac{1}{2}$, infundirt, zu einem warmen Bade: HAUFF in einem Falle von falschen Wehen. (Scheint eine starke Dose!) — Vgl. oben Kataplasmen.], Bähungen [z. B. auf die Magengegend zu legen, Dr. 2 auf Unc. 8. — Unc. 2 mit Unc. 32 leicht abgekocht: im Hospital *St. Louis* zu Paris unter der Benennung „*Aqua Nicotian.*“ gegen Krätze gebraucht. — Gegen *Tinea capitis* empfiehlt MARRYAT eine Ebullition von Unc. 2 auf Unc. 15 mit *Liq. Kali carbon.* Dr. 1; damit, nachdem die Haare abgeschoren, die grindigen Stellen zu fomentiren, und zugleich früh u. Abends von einer Salbe aus 1–2 Drachmen Calomel auf 1 Unze Fett etwas einzureiben.], Waschungen [Unc. $\frac{1}{2}$ –2 auf Unc. 8–12. — Ry 465 (*Hb. Conii mac.*)], Einreibungen [Ry 777 (*Ol. Tereb.*)], Streupulvern [I. S. 223 *sub b*]. Als blutstillendes Mittel gebraucht man eine concentrirte Ebullition [nöthigenfalls auch wohl von gebeiztem Tack] oder [im Nothfall] die (durchgeseichte) schmutzige empyreumatische Flüssigkeit aus den Pfeifen-Abgüssen [vielleicht wäre es der Mühe werth, statt dieser ein sauberes Präparat in den Officinen zu halten]. Zu Räucherungen [z. B. bei Gicht; etwa, um sie wohlfeiler zu machen, mit von Tabacksfabrikanten entnommenen unverarbeiteten Blättern]. — Ein brennendes Cigaro statt einer Moxa empfiehlt DERMOTT bei Gesichtsschmerz; man halte das glühende Ende einen Augenblick auf der Stelle, wo man dem Ursprunge des betheiligten Nerven am nächsten ist, so dass nur eine starke Röthung, wie nach einem Blasenpflaster, welches unvollständig gewirkt hat, entsteht.

426.

Ry *Fol. Nicotian.* Dr. 2

Aq. comm. feroid. Unc. 3.

Digera per horam in Balneo Mariae, dein exprime Unc. 2, *et haec Colaturae refrigerat. addo*

Spir. Vini rfi. Unc. 1.

M. D. S. 2mal tägl. 40–80 Tropfen,

und allmählig mit 5–10 Tropfen bis auf 200 gestiegen. (Bei Wassersucht und Dysurie.) (FOWLER.)

Ein Geschmacks corrigens ist sehr nöthig, am passendsten wohl *Blacosacch. Amygdal. amar.* (Gtt. 2) Dr. 2. — Einer ähnlichen Vorschrist bedient sich KOPF bei Dysurie: 1 Dr. $\frac{1}{4}$ St. lang zur Colat. von 1 $\frac{1}{2}$ Unz. digerirt, dazu *Spir.*

V. rst. Dr. 2, zu 25 Tropfen (u. steigend mehr) 4mal tägl.

427.

R_x *Fol. Nicotian.* Scr. 1
Aq. comm. feroid. q. s.
repose ad refrigerat. Colat. Unc. 6
adde

Syr. Amygdal. Unc. 1.
M. D. — Stündl., umgeschüttelt, 1 grossen Theelöffel (für Kind. v. 1-2 Jahren) oder 2 Theelöffel (für ältere) oder 1 Essl. (für 8-10jährige). (Gegen Keuchhusten.) PITSCHAFT.

428.

R_x *Fol. Nicotian.* Dr. 3
Rad. Rhei Dr. 2.
Ebulliant c. Aq. comm. q. s. ad Colat. Unc. 8, *D. S.* Stündl. 1 starken Essl. (In verzweifelten Fällen von Bruch-einklemmung. Die erste Dose wird wohl meist weggebrochen, aber die folgenden nicht.) RICHTER.
 Auch hier fehlt es an einem Geschmacks-

corrigens; etwa *Elaeosacch. Amygdal. amar.* (Gtt. 1) Unc. $\frac{1}{2}$.

429.

R_x *Fol. Nicotian.* Dr. 1
Rad. Valer. min. Unc. $\frac{1}{2}$.
Ebulliant c. Aq. comm. q. s. ad Colatur. Unc. 6, *cui adde*
Aceti Unc. 2.
M. D. S. Zu 2 Klystieren. (Bei Ohnmachten, Scheintod.)

430.

R_x *Fol. Nicotian.*
Hb. Borismar.
 — *Salviae ana* Scr. 4
Aloës lucid. pulv. Scr. $\frac{1}{2}$
Vini Gallici albi Unc. 4.
Digere per Nychthemer. in Baln. Arenae; Colaturam expr. filtra. D. S. Mehrmals tägl. das Augensied damit zu waschen. (Gegen verhärtete Geschwülste der Augenlieder und Gerstenkörner.)

JANIN.

**Folia Plantaginis majoris (recentia).* Wegerichod. Wegebreit-Blätter. [1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr.]

Nur der ausgepresste Saft der frischen Blätter [Mai bis September] wird benutzt, und zwar gegenwärtig wohl nur noch äusserl., als Verbandmittel [für Geschwüre; nach RUST in der Wirkung — merkwürdig genug — der Auflösung des Hellensteins sehr ähnlich]. Als Hausmittel legt man wohl die frischen Blätter bei Hautentzündungen und leichten Wunden auf. Man benutzt auch wohl die — nicht officinelle — frische Wurzel (ein Stück davon, abgewaschen, von den Fasern befreit, passend zugeschnitten, an einen Faden befestigt, möglichst tief in den Gehörgang gebracht, und sobald sie nicht mehr brennt, erneuert) gegen rheumatische Zahnschmerzen.

**Folia Rhododendri chrysanthi.* Sibirische Schneerosenblätter. Gichtrose. [Hauptbestandtheile: bitterer Extractivstoff und Gerbstoff. — 1 Unze conc. $4\frac{1}{2}$, *subt. pulv.* $5\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. zu Gr. 5-10 (später bis zu Gr. 20 u. mehr), 2-4mal tägl.; in Pulver. [CLARUS gegen Gicht: des Morgens 2 Dosen, jede von Scr. $\frac{1}{2}$ mit *Flavosacch. Citri* Scr. 1], Bissen; Aufguss od. Ebullition [Dr. 1-2 u. mehr auf den Tag. — R_x 431]. — Äusserl. entbehrlich.

431.

Ebulliant semel. Colaturae adde

Tinct. aromaticae Dr. 1.

M. D. S. 3stündl. 1 Essl.

Ry Fol. Rhodod. chrys. Dr. 2

Aq. comm. ferv. Unc. 4.

AUGUSTIN.

Folia Sennae. Sennesblätter. [Hauptbestandtheile: ein drastischer bitterer Extractivstoff (Kathartin) und dickliches äther. Öl. — Die Senna erregt gern Leibkrämpfe, besonders in Abkochung, nächst dem im Digestionsaufguss, in Ebullition und in Substanz, am wenigsten im gewöhnlichen, durch Heiss-aufgiessen und Maceriren bereiteten) Aufguss. Am sichersten soll man es verhüten, wenn man die Senna 24 St. mit Weingeist macerirt oder digerirt, dann abwäscht und wieder trocknet; doch wirkt sie dann auch schwächer, so dass man $1\frac{1}{2}$ -2mal so viel nehmen muss. Auf diese Weise behandelte Senna ist das Hauptingrediens des eine Zeitlang als Digestivmittel beliebt gewesen St. Germain-Thees, welcher ausserdem (wohl nicht wesentlich) Flor. Samb., römischen Fenchel, Anis und Weinsteinrahm enthält. Jeder Apotheker wird gern auf den Wunsch des Arztes mit Weingeist präparirte Senna vorrätig halten. Fälschlich hielt man sonst die kurzen Blattstiele für die Ursache des Leibwehs, und verordnete deshalb ohne Noth *F. S. sine stipitibus*. — 1 Unze conc. $3\frac{5}{8}$, gr. pulv. $4\frac{1}{8}$, sub. pulv. $4\frac{3}{4}$ Sgr.] Cave reine u. kohlensaure Alkalien, Kalkwasser; Eisen-salze; Gerbstoff.

Innerl. als Reizmittel Gr. 5-10 einigemal tägl. [so namentlich in „Brustpulvern“, vgl. *Pulv. Glycyrrh. comp.*]; — als gelind eröffnendes Mittel, einige Zeit lang zu gebrauchen, Gr. 10-20, 1-2mal tägl.; — als ordentliches Abführmittel Dr. $\frac{1}{2}$ -1 (od. den Aufguss von Dr. 2-4) auf einmal oder in ein Paar Portionen rasch hinter einander [Vorsicht halber mag man doch noch etwas mehr in Bereitschaft halten, obwohl die Senna sonst ein sehr sicheres Purgans ist]. In Pulver [obwohl sie in Substanz eher als im Aufguss Leibweh erregt. (So indess namentlich auch bei Armen.) Ry 432], Bissen od. Pillen [z.B. Dr. 1 mit *Extr. Tarax. liq. q. s.* zu 30 Pillen (wovon 5-8 gewöhnlich zur Wirkung hinreichen sollen): *Pilulae purgantes mites* PH. P.], Latwerge [Officinell: *Elect. e Senna*; wohlfeiler Ry 433. — Ry 434]; besonders gern in Aufguss [namentlich gern die grössern, eigentlich purgirenden Gaben. Officinell: *Infus. Sennae comp.*; doch lässt man, da dies mit Recht in der Regel nicht vorrätig gehalten wird (nur die PH. GLESV. und AUSTR. lassen es vorrätig halten), auch oft einfache oder zusammengesetzte Aufgüsse *ex tempore* bereiten. Dr. 2-4 auf Unc. 4, die Hälfte oder das Ganze auf einmal; dazu oft noch Zusätze von gelinder od. stärker abführenden Salzen, von Manna; zur Verhütung von Bauchgrimmen u. Blähungen kann man etwas Gewürzhaftes mit infundiren lassen, was zugleich als Geschmacks-correctans dient; ausserdem wohl zu diesem Behuf *Elaeos. Citri, Syr. Flor. Aurant.* od. dgl. Wo man ökonomisiren muss, mag sich der Kranke den Aufguss selbst bereiten, etwas Bittersalz od. dgl. darin auflösen, zur Geschmacks-Verbesserung etwa Kümmel oder etwas Kaffee mit infundiren, oder den Aufguss mit Pflaumenbrühe (diese ist namentlich auch bei Kindern ein gutes Vehikel) nehmen. Man verschreibt deshalb die Senna zum Infundiren im Hause wohl in Speciesform (noch wohlfeiler kommt der Kranke weg, wenn er sie ohne Recept groschenweise

in der Apotheke kauft), z. B. Ry 438 (das mehr nur zu einem gelinden Eröffnen bestimmt ist); vgl. *Natr. sulph. dep. cryst.* — Bei habitueller Verstopfung Abends Dr. $\frac{1}{2}$ (od. mehr) mit kaltem Wasser zu übergießen, die Nacht verdeckt stehen zu lassen, mit der Colatur den Morgenkaffee zu bereiten: COHEN u. A. — Ry 435-438; 450. a., 476 (*Hb. Ledi pal.*), auch wohl in Ebullition [die jedoch keine Vorzüge hat. — Ry 895 (*Rad. Sarsapar.*). — Längeres Kochen ist ganz verwerflich, s. oben].

Äusserl. zu Klystieren [Unc. $\frac{1}{2}$ (u. mehr) infundirt; mit Zusatz von Salzen, Öl, Sauerhonig od. dgl. — Ry 439, 440].

432.

Ry *Fol. Sennae* Unc. $\frac{1}{2}$
Flaved. Cort. Aurant.
Sem. Carvi ana Dr. 2
Sacch. albi Dr. 6.

M. f. *Pulv. D. S.* 2stündl. 1 Theelöffel. KAUSCH.

433.

Ry *Tartari depurati*
Fol. Sennae pulv. ana Dr. 2
Sem. Foenic. — *Ser.* 4
Pulpae Prunor. depur. Unc. 2
Syr. commun. q. s.

ut f. *Electuar. D. S.* Stündl., umgerührt, 2 Theelöffel. (Ein „*Electuarium lenitium*“ für Arme.)

G. A. RICHTER.

Vgl. Ry 328.

434.

Ry *Fol. Sennae* Dr. $1\frac{1}{2}$
Rad. Rhei Gr. 15
— *Sarsaparill.* Dr. 3
Ligni Guajaci Dr. 1
— *Sassafras*
Sem. Anisi vulg. ana Gr. $7\frac{1}{2}$.

Pulveratis adde

Mell. despum. Dr. 18.

M. D. S. 2mal tägl., umgerührt, 1 Theelöffel. (Bei fieberlosen Hautausschlägen.)

Electuar. mundificans PH. HANN.

435.

Ry *Fol. Sennae* Unc. $\frac{1}{2}$
Flor. Chamomill. vulg. Dr. 2
infunde Aq. comm. ferv. q. s. ad Colat. Unc. 4, cui adde

Syr. Menthae Unc. 1.

M. D. S. Stündl. $\frac{1}{2}$ Tasse.

LOCKSTAEDT.

436.

Ry *Fol. Sennae* Dr. 2
Rad. Rhei Dr. 1
infunde Aq. comm. ferv. q. s. ad Colat. Unc. $4\frac{1}{2}$, in qua solve
Magnes. sulphur. dep. Unc. $\frac{1}{2}$
Elaeosacch. Maaid. (Gtt. 6) Unc. 1.
M. D. S. Stündl. $\frac{1}{2}$ Tasse.

437.

Ry *Fol. Sennae* Dr. 2
Aq. comm. ferv. Unc. 6.
Digere etc. per horam, Colat. adde
Tartari boraxati Unc. $\frac{1}{2}$
Pulpae Cassiae Dr. 6
Syr. Mannae Unc. 1.

Solve. D. S. Umgeschüttelt auf 3 mal in kurzen Zwischenräumen zu nehmen.

VOGEL.

Statt des Digestions-Infusum lieber ein gewöhnliches mit etwas mehr Senna.

438.

Ry *Fol. Sennae* Dr. 3
Flaved. Cort. Aurant. Dr. 1
Hb. Menth. piper. Dr. 2
— *Trifolii fibr.* Unc. $\frac{1}{2}$.
Conc. M. f. Species. D. S. Einen reichlichen Essl. voll mit 3 Tassen Wasser angebrüht tägl. zu verbrauchen.

SUNDELIN.

439.

Ry *Magnes. sulphur. dep.*
Fol. Sennae ana Unc. $\frac{1}{2}$.

C. C. M. f. Species. D. — Mit einem Paar Tassen Wasser angebrüht, und mit einem Löffel voll Leinöl vermischt zum Klystier.

VOGT.

440.

Ry *Fol. Sennae* Dr. 3

Rad. Rhei Dr. $\frac{1}{2}$

Aq. comm. ferv. q. s.

digere per horam. In Colat. L. 1 solae

Natri sulph. crudi Unc. 1.

D. S. Zu 2 Klystieren.

VOGT.

† *Folia Theae.* Thee (chinesischer). [Hauptbestandtheile: äther. Öl, Gerbstoff, bitterer Extractivstoff. — Der über Russland kommende „schwarze“ Thee wird den übrigen Sorten vorgezogen.] Arzneilich etwa Dr. $\frac{1}{2}$ - 1 mit Unc. 8 infundirt, warm getrunken [bei Gewöhnten lässt sich keine Dose bestimmen]. — Selten äusserl. [Dr. 2 zur Colatur von Unc. 2 infundirt, mit Unc. 4 †Pyrmontener Wasser: v. GRÄFE gegen Atonie des Auges, chronisches Thränen, Disposition zu Entzündungen, als Waschwasser od. Umschlag].

* *Folia Toxicodendri.* *Fol. Rhois Toxicodendri s. radicans.* Giftsumach- od. Wurzelsumach-Blätter. [Hauptbestandtheile: eine scharf-giftige Substanz und Gerbstoff. — 1 Drachme conc. $\frac{3}{4}$, subf. pulv. $\frac{5}{8}$ Sgr.] Innerl. *Pulvis ad Grana sex!* — Die Gabe ist wegen Unsicherheit der Wirkung schwer zu bestimmen.) anfangs etwa zu Gr. $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$; allmählig wohl bis zu Scr. 1; 2-3mal tägl. In Pulver, Pillen; weniger zweckmässig wohl, als noch unsicherer, im Aufguss [Gr. 6, allmählig bis zu Dr. 1 (u. mehr) auf Unc. 6, 2-3mal tägl. 1 Essl.].

Folia Uvae Ursi. Bärentrauben- od. Sandbeer-Blätter. [Hauptbestandtheile: Gerbstoff und bitterer Extractivstoff. — 1 Unze conc. $1\frac{1}{8}$, subf. pulv. $1\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. zu Scr. 1-2, einigemal tägl.; in Pulver, Bissen, Latwerge, Abkochung [Unc. $\frac{1}{2}$ - 1 auf den Tag, etwa mit Unc. 9 auf Unc. 6 gekocht, zu halben Tassen. — Ry 441, 442]. — Äusserl. (selten) abgekocht zu Fomentationen, Einspritzungen.

441.

Ry *Fol. Uvae Ursi* Unc. 2
coq. c. *Aq. comm.* L. $1\frac{1}{2}$ ad Colat. L. 1,
in qua solve

Kali carbon. e Tart. Dr. 1-2.

R. S. 4mal tägl. $\frac{1}{2}$ Weinglas mit doppelt so viel Weissbier.

442.

Ry *Fol. Uvae Ursi* Unc. $\frac{1}{2}$

coq. c. *Aq. comm.* Unc. 16 ad Colat.

Unc. 7, cui adde

Tinct. Catechu

Syr. Zingib. ana Unc. $\frac{1}{2}$.

M. D. S. 2stündl., umgeschüttelt, 2 Essl.
(Gegen Gonorrhoea secundaria.)

(COOPER.)

Formicae. Ameisen. [Nur lebendig, im Sommer, anzuwenden. Hauptbestandtheile: Ameisensäure, äther. und fettes Öl. — Die Ameisensäure kann man, wenn die Jahreszeit keine Ameisen herbeizuschaffen erlaubt, leicht und

ziemlich wohlfeil künstlich (mittelst partieller Oxydation des Zuckers durch Braunstein u. Schwefelsäure, in der Hitze) darstellen lassen.] *Cave* Schwefelsäure; Basen; Salze mit schwächeren Säuren [z. B. kohlensaure], Salze edler Metalle.

Selten innerl. im Aufguss [1 Quartflasche halb mit Ameisen, halb mit Braantwein gefüllt, dazu noch *Rad. Bryon.*, *Rad. Filic.* ana Unc. $\frac{1}{2}$; nach hinlänglicher Maceration jeden Morgen 1 Essl.: RING bei Gicht].

Ausserl. zu Bädern [3-4 Maass zerquetscht in einen leinenen Sack gethan; dieser in einem grossen Topf mit siedendem Wasser angebrüht, und diesem Aufguss und den Sack selbst in das Bad gethan, worin der Sack noch mehrmals ausgedrückt wird. — Zu örtlichen Dampfbädern $\frac{1}{2}$ - 1 $\frac{1}{2}$ Maass zerquetscht, mit siedendem Wasser übergossen, die Dämpfe an den Theil geleitet], Bähungen [ebenfalls zerquetscht, mit Wasser infundirt]. Man applicirt sie auch bisweilen lebendig; oder man applicirt Mützen od. dgl., die man in einen Ameisenhaufen gesteckt und so von Ameisen-Säure u. Öl hat durchdringen lassen.

Fructus Capsici annui. Piper Hispanicum s. Turcicum s. Indicum. Spanischer, türkischer od. indischer Pfeffer (weniger heftig Cayennepfeffer). Beissbeerfrucht. [Hauptbestandtheil: sehr scharfes Weichharz (Capsicin). — 1 Unze 1 $\frac{1}{2}$ Sgr.]

Selten innerl., in Aufguss oder Ebullition [Scr. 1 - Dr. 1 auf den Tag. — Häufiger dafür die Tinctur]. Für pulveraufnehmende Formen das folgende Präparat.

Ausserl. gepulvert zur Schärfung von Sinapismen [wenn man es gerade im Hause zur Hand hat; liesse man den Senfteig in der Apotheke bereiten, so würde man auch, der rascheren Bereitung wegen, das folgende Präparat verschreiben]; infundirt zu Gurgelwässern [bei brandiger Bräune nach HEADLEY Dr. 2 - Unc. $\frac{1}{2}$ mit Dr. $\frac{1}{2}$ - 1 Kochsalz auf 3 Unzen kochenden Wassers u. eben so viel Weinessig. Sonst schwächer].

Fructus Capsici annui praeparatus. Präparirter spanischer Pfeffer. [*Fr. Caps. ann.* 5, *Gm. Mimos.* 1. — Feines Pulver. — 1 Unze 6 $\frac{3}{4}$ Sgr.]

Innerl. zu Gr. 2-6, ein Paar Mal tägl.; nicht gern, der bedeutenden Schärfe wegen, in Pulver [gegen böartige Wechselfieber empfahl BERGIUS ein Pulver aus 2 Gran sp. Pf. u. 13 Gran Lorbeeren beim Eintritt des Frostes, ein 2tes am folgenden fieberfreien Tage zu derselben Stunde, ein 3tes am 3ten Tage auf dieselbe Weise], besser in Pillen [Ry 975 (*Sem. Stramon.*)].

† *Fructus Hippocastani tost.* *Castaneae equinae tostae.* Geröstete Rosskastanien. [Hauptbestandtheile: Stärkemehl, bitterer Extractivstoff, Gerbstoff, Zucker, fettes Öl; alle diese durch das Rösten partiell, unter Bildung von empyreumat. Öl, verändert. — 1 Unze pulv. $\frac{2}{3}$ Sgr.] Innerl. in Abkochung [Unc. 1 - 1 $\frac{1}{2}$ mit 6 Tassen Wasser auf 3 gekocht, früh u. Abends die Hälfte: HUFELAND].

Fructus Mororum (recentes). Baccas Mori nigrae.

Mora. Maulbeeren. [Die Früchte reifen zu Ende August u. im September. — Hauptbestandtheile: oft dunkel-violetter Extractivstoff, Zucker, Schleim und Pflanzensäuren.] Ausser dem Syrup benutzt man auch, doch selten, den frisch ausgepressten Saft als kühlendes Getränk, zum [schmerzlindernden] Bepinseln von Aphthen, u. zur [häuslichen] Bereitung einer erfrischenden Gallerte [I. S. 285].

† *Fructus Prunorum. Pruna (domestica).* Pflaumen. Zwetschen. [Hauptbestandtheile: Zucker u. Pflanzensäuren.] Nur diätetisch.

† *Fuligo splendens.* Glanzruss. [Hauptsächlich durch Krescot u. a. Producte der trocknen Destillation wirksam. — 1 Unze gr. pulv. $\frac{1}{2}$ Sgr.] Nur mit organischen Substanzen zu verbinden.

Selten innerl.; zu Scr. $\frac{1}{2}$ - Dr. $\frac{1}{2}$ (u. mehr), einigemal tägl., in Pulver oder pulveraufnehmenden Formen.

Ausserl. zu Augenpulvern [mit Zucker oder par], Augen- u. anderen Salben [mit 2 Theilen Fett], Waschungen [z. B. 2 gute Hände voll gröblich gepulverten Russes mit 32 Unzen Wasser $\frac{1}{2}$ St. gekocht, mit der Colatur 4mal tägl. zu waschen (und in der Zwischenzeit etwa noch eine Rufsölbe, mit oder ohne *Extr. Bellad.*, anzuwenden): BLAUD u. A. gegen verschiedene chronische Hautkrankheiten und krebsartige Geschwüre]. — Das Russwasser, wie es sich in manchen Gegenden auf dem Lande in den bei den Öfen befindlichen Blasen bildet, gleichsam eine wässrige Russtinctur, wendet WEISENBERG zu Waschungen und Bädern als Schutz- (u. zum Theil selbst Heil-) Mittel gegen Ansteckung durch (chronische und acute) Exantheme p. p. an.

** *Fumigationes nitricae Smithianae.* Salpetersaure Räucherungen. Unter diesem Namen erhält man 1 Unze Salpeter u. 2 Drachmen concentr. Schwefelsäure, beides gesondert. Beim Gebrauch giesst man [in einem irdenen oder gläsernen Gefäss] die Schwefelsäure tropfenweise auf den Salpeter. [Man wende dabei keine erhöhte Temperatur an, weil sich sonst statt der weissen salpetersauren Dämpfe rothe salpetrigsaure von erstickendem Geruch entwickeln, die noch weit unerträglicher sind u. die Brust noch mehr angreifen als die Chlorräucherungen, während die salpetersauren viel erträglicher sind. In menschenleeren Räumen verdienen die Chlorräucherungen den Vorzug; in mit Kranken belegten oft die milderen salpetersauren, die man aber ebenfalls nur in solchem Maasse zu entwickeln hat, dass sich ein leicht säuerlicher Geruch im Zimmer verbreitet.]

** *Fumigationes oxymuriaticae s. Guyton-Morveauianae s. Chlorig.* GUYTON-MORVEAUSCHE, oxydirt-

salzsaure od. Chlor-Räucherungen. Unter diesem Namen erhält man jetzt die Materialien [Kochsalz Unc. 3, Braunstein Unc. 1, rohe concentrirte Schwefelsäure u. *Aq. comm.* ana Unc. 2] zu den bekannten Räucherungen schon vom Apotheker gemischt, in einem starken, wohlverschlossenen Gefässe. Gewöhnlich benutzt man diese Materialien zu einer stärkeren Entwicklung des Chlorgases [zu einer milderen (wie sie namentlich bei der Anwendung gegen Lungenkrankheiten rathsam) das *Chlor. Calcar.*, s. den Art.]. Will man sie in mit Kranken gefüllten Zimmern anwenden, so darf man nur die aus der Apotheke erhaltene Flasche (in grösseren Krankensälen mehrere solcher Flaschen, um der gleichmässigeren Vertheilung willen) geöffnet hinstellen, und wenn die Entwicklung des Chlorgases aufhört, etwas schütteln oder mit einem Stabe darin rühren. Dies wird meist hinreichen, um einen schwachen Chlor-Geruch im Zimmer zu bewirken — und weiter darf man die Entwicklung nicht treiben, nicht so weit, dass man das Chlorgas in Gestalt eines grüngelblichen Dampfes im Zimmer verbreitet sieht. Sollte es nicht hinreichen, so kann man die Mischung in einem flachen Gefässe hinsetzen oder selbst noch ein wenig erwärmen. Dabei müssen aber öfters die Fenster geöffnet werden, und wenn Brustkranke im Zimmer liegen, muss man das Mittel überhaupt sehr vorsichtig anwenden. — Will man menschenleere Räume durchräuchern, so setzt man die Mischung bei verschlossenen Fenstern u. Thüren in einem offenen Gefässe über glühenden Kohlen hin, und lüftet nach 12 od. 24 Stunden das Zimmer. Die oben angegebene Quantität reicht schon für ein grosses Zimmer aus. — Immer muss man bei den Räucherungen alle Metalle, alle mit vegetabilischen od. thierischen Farbstoffen gefärbten Dinge (Möbel- Ueberzüge, Tapeten, Gardinen), bei einem stärkeren Räuchern auch Zeuge von animalischem Ursprung (wollene, seidene), aus dem Zimmer entfernen, wenn sie nicht theils angegriffen, theils ausgebleicht werden sollen. — Man bedient sich auch der Chlorräucherungen, um Kleider, Mobilien, Papiere u. dgl., die auf Ansteckungsstoffe verdächtig sind, zu durchräuchern, doch ist hier rücksichtlich der Farbstoffe organischen Ursprungs und der animalischen Zeuge die eben gemachte Bemerkung zu beachten. Ueber die Art, wie die Chlorräucherungen zu diesem Behuf nach verschiedenen ansteckenden Krankheiten angewandt werden sollen, hat das Königl. Preuss. Polizeipräsidium unterm 14. November 1829 eine Verfügung erlassen, s. CASPER *krit. Repertor.* Bd. 24. Heft 2. — Auch Chlorgasbäder, das Chlor bei 110–115° F. (= 35–37° R.) mit Luft oder Wasserdämpfen hinreichend vermischt, in solcher Menge, dass eine stechende Empfindung auf der Haut entsteht, hat man, in gut schliessenden Apparaten (so dass die Respiration des Kranken nicht durch die Dämpfe angegriffen werden kann — man kann die Öffnungen etwa mit in eine Potaschlösung getauchten Tüchern verschliessen), $\frac{1}{2}$ St. u. länger dauernd, auf den ganzen Körper und auf einzelne Theile angewandt [WALLACE bei Leberleiden u. s. w.; vgl. G. A. RICHTER *ausführl. Arzneimittell.* Bd. 4. S. 96–98].

Wer, zu einem oder dem andern Behuf, die Entwicklung des Chlorgases besorgt, schütze sich gegen die Dämpfe dadurch einigermaßen, dass er einen Schluck Branntwein im Munde hält.

† *Furfur Amygdalarum*. Mandelkleie. [Der Rückstand von der Bereitung des Mandelöls. Hauptbestandtheile: Emulsin, Eiweiß, Schleim, wenig fettes Oel; in der aus bittern Mandeln bereiteten Kleie etwas Blausäure.] Man benutzt sie theils für sich, theils mit andern Mitteln in Verbindung als Waschpulver [zur Erweichung spröder Haut, oder für Personen, deren Haut keine Seife verträgt. — R₄₄₃].

443:

R₄₄₃ † *Furf. Amygdal.* Unc. 1
Sapon. Hispanici albi Dr. 2
Natri carbon. dep. sicci
Rad. Irid. Flor. ana Dr. 1
Ol. Bergamottae

Ol. Citri Cort. ana Gtt. 3.

M. f. Pulv. D. S. Präparirte Mandelkleie. — (Noch mehr reizend als der officinelle *Pulv. cosmet.*, und durch weit geringern Gehalt an Seife für manche sarte Haut erträglicher als der *Sapo aromat. pro Balneis*.)

† *Furfur Triticum s. triticeum*. Weizenkleie. [Hauptbestandtheile: Stärkmehl und Kleber. — 1 Unze $\frac{1}{3}$ Sgr.]

Äusserl. zu Klystieren [R₉₃₅ (*Rad. Valer. min.*)], warmen Umschlägen [theils trocken, theils mit heissem Wasser oder Essig zu einem dicken Brei gekocht — bei Koliken u. dgl.], Waschpulvern [bei rauher Haut, juckenden Ausschlägen; oder für Personen, deren Haut keine Seife verträgt — wo aber † *Furf. Amygdal.* noch angenehmer], seltener abgekocht zu Waschwässern; zu erweichenden Bädern [einige Pfund, bisweilen noch mit etwas Seife, in einen Beutel gebunden, in einem Kessel Wasser etwas gekocht, und die Abkochung nebst dem Beutel ins Bad gethan], trockenen warmen Fussbädern [etwa noch mit aromatischen Kräutern], etc.

Galbanum depuratum. Mutterharz. [Pulver. — 1 Unze 5 $\frac{1}{2}$ Sgr.] Vgl. *Gummiresinae*.

Innerl. zu Gr. 5–20 (–30) einigemal tägl. In Pillen [R₄₄₄, 445; 129 (*Asa foot. depur.*), 416 (*Ferr. sulphur. cryst.*), 704 (*Myrrha*)], Bissen [R₄₄₆], Latwerge [ungern, aus gleichem Grunde wie bei *Ammoniac. depur.*], Auflösungen, Emulsionen [so namentlich wohl bei Brustkrankheiten, mit Eigelb. — R₄₄₇; 956 (*Sapo medic.*)]. — Freilich in flüssiger Form sehr widerlich].

Äusserl. zu Klystieren [Dr. $\frac{1}{4}$ –1], Pflastern [wie *Ammoniac. depur.*, doch seltener als dieses], Umschlägen [subigirt oder durch Essig erweicht].

444.

R₄₄₄ *Galbani depur.* Dr. 2
Ol. Sabinas Gtt. 4–8–12
Extr. Ferri pomati Dr. 1 $\frac{1}{2}$
Rad. Valer. min. pulv. q. s.
ut f. Pilulae 120. *Consp. Pulv. Rad.*
Irid. Flor. D. in vitro. S. 3mal tägl. 10.
 LOCKSTADT.

445.

R₄₄₅ *Galbani depur.* Dr. 2
Sulph. stibiati aurant.
Pulv. Rad. Ipecacuanh.
 — — *Scillae ana* Scr. $\frac{1}{2}$
Extr. Pimpinell. Dr. 1.
M. f. c. Pulv. Rad. Glycyrrh. q. s.
Pilulae 210. *Consp. Pulv. Rad. Irid.*

Flor. D. in vitro. S. 3mal tägl. 5.
HEIM's „auflösende Galbanumpillen.“

446.

R_x *Galbani depurati*
Rad. Valerian. min. pulv.
Croci pulv. ana Dr. 1
Extr. Millefol. q. s.
ut f. *Boli ur. 24. Consp. Pulv. Croci.*
D. S. 3mal tägl. 2 Stück.

447.

R_x *Galbani depur. Dr. 1-2*
Füll. Ovi anisi
terendo semita misce c.
Syr. Bals. Peruv. Unc. 1
Aq. Foenic. Unc. 2½
ut f. *Emuls., cui addo*
Liq. Ammon. anis. Dr. 2.
M. D. S. 2stündl., umgeschüttelt, ½ Essl.

Gallae. Galläpfel. [Hauptbestandtheile: Gerbestoff u. Gallussäure. — 1 Unze *gr. pulv.* (so nehme man sie zu den Auszügen) 2½, *subt. pulv.* 3 Sgr.]

Innerl. zu Scr. ½-1, mehrmals tägl.; in Pulver [unangenehm] und pulverannehmenden Formen; häufiger in Aufguss oder Abkochung [Unc. ½-1 mit Unc. 9 auf Unc. 6, esslöffelweise; bei Vergiftungen (durch Brechweinstein, *Ipecac.* u. s. w.) darf man jedoch nicht so lange kochen lassen, dann etwa Unc. ½-1 mit L. 2 fünf Minuten lang gekocht, zu halben Tassen; vgl. den Artikel: Brechweinstein unter den Vergiftungen].

Ausserl. gepulvert zu Salben [z. B. 1 auf 8-4 Fett; gegen schlaife Hämorrhoidalknoten u. a. *Varices*; 1 auf 3 Fett; gegen Hernien kleiner Kinder], Streupulvern; extrahirt [in der Regel abgekocht, etwa Unc. 1 mit Unc. 9 auf Unc. 6, oft noch mit geistigem Zusatz, z. B. von Wein, Camphergeist, Myrrhentinctur od. dgl.] zu Mund- u. Gurgelwässern [etwa Unc. ½ mit Unc. 9 auf Unc. 6 gekocht, wohl mit Zusatz von *Tinct. Pimpinell.* od. dgl. und einer reichlichen Quantität süßen Safts], Injectionen [für die Harnröhre am besten infundirt], Bähungen [Dr. 6 mit 6 Unz. weissen Weins 24 St. digerirt, lässt STRAHL als Prophylacticum gegen Wundwerden der Brustwarzen vom 6ten Schwangerschaftsmonat ab 3-4mal tägl. mit einer leinenen Compresse umschlagen (um schwer vertilgbare Flecke in der Wäsche zu vermeiden, ist noch eine stärkere trockene Compresse darüber zu legen)].

Gas Acidi carbonici s. mephiticum s. sylvestre s. vinosum s. Musti s. Cretae s. calcareum. Aër fixus s. factitiu.
Acidum aëreum s. Cretæ. Spiritus sylvestris s. mineralis elasticus fontium. Kohlensaures Gas. Carbonsäure; Luftsäure; fixe Luft; Brunnengeist; Gährungsluft; Kreideluft; u. s. w. — Man entnimmt es (ausser etwa zu Klystieren; s. unten) nicht leicht fertig aus der Apotheke, sondern lässt es, auf verschiedene Weise, im Hause des Kranken *ex tempore* bereiten.

Um es auf den Magen anzuwenden, bedient man sich der verschiedenen Brausepulver [vgl. die Artikel: *Kali carbon. acidul.*, *Magnes. carbon.*, *Natr. carbon. acidulum*, *Natr. carbon. depur. siccum*, u. a.] oder der Säuerlinge [vgl. † *Aquae minerales* und † *Aq. carbonata*].

Um es mit atmosphärischer Luft gemischt (unvermischt wäre höchst gefährlich) einathmen zu lassen [in der Lungensucht, namentlich bei sehr übel riechendem Auswurf und andern colliquativen Erscheinungen im spätern Zeitraum der Krankheit; auch (SUNDELIN) bei trockenem Asthma, *Emphysema pulmonum* LAENNEC], entwickelt man es in der Regel aus gepulverter Kreide, die man vorsichtig, portionenweise [damit die Entwicklung des Gases nicht zu rasch vor sich gehe], in rohe, mit 5-6 Theilen Wasser verdünnte Schwefelsäure [in einem flachen Gefässe] schüttet. Über diesem Gemisch lässt man den Kranken von Zeit zu Zeit, je nachdem er es ertragen kann, einathmen. SUNDELIN macht aber darauf aufmerksam, dass bei diesem Verfahren die Schwefelsäure zum Theil von dem sich entwickelnden Gase mit fortgerissen und in die Lungen geführt werde, und dass deshalb eine Auflösung von Weinsteinssäure hier den Vorzug verdiene. Will man den Kranken fortwährend in einer mit Kohlensäure geschwängerten Atmosphäre erhalten, so kann man verdünnte Schwefelsäure [mit der man hier weniger ängstlich zu seyn braucht] in einem flachen Gefäss in seine Nähe, etwa unter sein Bett, setzen, und von Zeit zu Zeit, je nachdem es vertragen wird, gepulverte Kreide hinein schütten. Es kommt aber bei diesem Verfahren viel darauf an, wie hoch oder niedrig der Kranke liegt, denn da sich das kohlen saure Gas vermöge seiner specifischen Schwere grossentheils am Boden des Zimmers hält, so wirkt es, wenn der Kranke zu hoch liegt, zu wenig auf ihn ein; liegt er aber zu tief, so kann es zu stark einwirken, und selbst Asphyxie hervorrufen. Es lassen sich hierüber keine bestimmten Regeln geben, vielmehr bleibt die Anordnung der Lage in jedem einzelnen Fall Sache des Experimenta. — Auf eine mildere Weise, noch mehr durch atmosphärische Luft verdünnt, wendet man das kohlen saure Gas auf die Lungen an, indem man den Kranken in der Nähe von viel kohlen saures Gas entwickelnden Mineralquellen halbe und ganze Tage lang sich aufhalten lässt; noch milder in der Form der sogenannten Erdbäder, indem man den Lungensüchtigen beim Umackern eines Feldes, besonders eines gedüngten, hinter dem Pfluge hergehn, oder ihn auch wohl im Zimmer den aus einem mit frischer Erde gefüllten grossen Blumentopf aufsteigenden Dunst einziehen lässt. Gewissermassen gehört auch wohl der Aufenthalt in Kuhställen hieher, obwohl in diesen noch andre Gasarten, namentlich Ammoniumgas, thierische Effluvia u. s. w., mitwirken. Über die Anwendung dieses Mittels vgl. G. A. RICHTER *ausführl. Arzneimittell.* Bd. 4. S. 158, 159. Es sey mir aber erlaubt, hier darauf aufmerksam zu machen, dass ein sehr wichtiger Gewährsmann, SCHÖNLEIN, vor dem Missbrauch, alle Lungensüchtigen *promiscue* in den Kuhstall zu schicken, nachdrücklich warnt, und das Mittel nur bei Lungensuchten mit vieler entzündlichen Reizung, wo eine trockene, frische Luft, Bergluft z. B., nicht vertragen wird, — wie besonders oft bei durch Masern oder durch Anomalie der Menses hervorgerufener Lungenphthise —, angewandt wissen will. — Es sind eigne Maschinen erfunden worden (MUDGE, GIRTANNER), um die Kohlensäure in einem bestimmten Verhältnisse mit atmosphäri-

scher Luft gemengt einathmen zu lassen; doch hat die neueste Zeit ihren Gebrauch als zu anstrengend für die Respirationsorgane, daher nicht anhaltend anwendbar, auch durch die oben angegebenen Methoden überflüssig, verworfen.

Ausserdem wendet man die Kohlensäure äusserl. an: 1) In Klystieren [z. B. bei krebigen u. andern geschwägigen Leiden des Mastdarms. — Zu diesem Behuf könnte man wohl am bequemsten das fertige kohlensaure Gas in einer Flasche (oder in mehreren kleinen Flaschen, in jeder nur soviel als man auf Einmal anwenden will) aus der Apotheke kommen lassen, aus der geöffneten Flasche (aus der es bei seiner specifischen Schwere nicht so leicht entweicht) wie Wasser mittelst einer Spritze in kleinen Quantitäten einzeln, und so injiciren]. — 2) Als allgemeines od. örtliches Bad [zu den allgemeinen Bädern benutzt man theils die Ausdünstungen einiger natürlichen Mineralwässer, so z. B. in Meinberg und Eger (Polterbrunnen), wo jedoch ein wenig Schwefelwasserstoffgas dabei ist, in Cudowa u. s. w.; theils kann man zu dem Ende die Kohlensäure in irgend einem Räuherungskasten aus Kreide und Schwefelsäure entwickeln. Will man nicht bloss ein Bad von kohlensaurem Gase, sondern ein Wasserbad mit Kohlensäure anwenden, so kann man einige Unzen gepulverter Kreide ins Bad thun und dann eben soviel concentr. Schwefelsäure portionenweise, unter Umrühren, zusetzen. DÖBEREINER (*Anleit. z. Darstellg. d. kräft. Bäder. Jena 1816.*) schlägt ein Gährbad aus einem durch Hefen in Gährung gesetzten Malzaufguss vor, dessen sich der Kranke, während die Gährung am stärksten ist, bedienen soll, doch scheint dies umständlich ohne Vortheil. Bei allen allgemeinen Bädern mit Kohlensäure ist es rathsam, den Kopf des Kranken durch passende Vorrichtungen vor der Einwirkung des Gases zu schützen. — Zu örtlichen kohlensauren Bädern finden sich bei manchen Mineralbrunnen eigene Vorrichtungen, so z. B. in Meinberg Vorrichtungen zu Gas-Douchebädern, die auf die Augen, Ohren etc. angewandt werden können. Auch künstlich entwickelte Kohlensäure kann man mittelst eignen Apparate auf die Augen anwenden]. Sonst bedient man sich auch wohl natürlicher kohlensauren Wässer zu Augewaschwässern und Augenbähungen [so z. B. empfiehlt v. GRAËBE das Pyrmonter Wasser, etwa noch mit der Hälfte Rothwein od. Theeaufguss versetzt, auch wohl noch mit einem kleinen Zusatz von *Kau de Cologne*, als Waschmittel od. Umschlag gegen verschiedene atonische Zustände des Auges; vgl. † *Fol. Theae*]. — Endlich gehören noch hieher die Cataplasmen aus leicht gährenden Dingen [die man auf brandige und krebsartige Geschwüre oder gangränöse Stellen legt, und die ebenfalls wohl nur durch Entwicklung von Kohlensäure wirken; man benutzt dazu geschabte oder auf einem Reibeisen zerriebene Mohrrüben od. Runkelrüben, Sauerteig, Bierhefen, Weintrester, Sauerkohl, Honig, abgekochtes Mals, u. dgl.; etwa mehrere dieser Dinge in Verbindung, vgl. z. B. † *Ferment. Cerevis.*, *Malthum Hord.* Zur Bereitung in der Apotheke eignen sich diese Breiumschläge nicht].

† *Gas Acidi muriatici.* Salzsäures Gas. Man erhält es durch Übergiessen von Kochsalz mit einem Gemisch aus gleichen Theilen concentrirter Schwefelsäure und Wasser. Es wird, da es nicht nur die Respirationsorgane sehr stark, sondern auch leblose (anorganische u. organische) Substanzen, angreift, nur noch selten zu Durchräuherungen menschenleerer Räume u. mancher leblosen Sachen angewandt.

Gas Acidi muriatici oxygenati s. oxymuriatici s. Chlori. *Chlorum gasiforme.* Oxydirt-salzsaurer Gas; Chlorgas. Man entnimmt es nicht leicht fertig aus der Apotheke, sondern lässt es in Krankenzimmern aus den *Fumigationes oxymuriaticae* (vgl. den Artikel) *ex tempore* entwickeln, oder wenn man eine mehr allmähliche, schwächere Entwicklung vorzieht, aus Chlorkalk (vgl. *Chlorum Calcar.*).

+ **Gas Ammonii caustici.** Ammoniumgas. — Man benutzt es nur selten, als höchst eindringliches Riechmittel [doch ist der *Liq. Ammon. caust.*, besonders wenn man ihn noch ein wenig gewässert, dazu schon stark genug], oder [bei manchen Brustaffectionen, selbst Lungensuchten, besonders da, wo man mehr depressirend auf die Respirationsorgane wirken will: G. A. RICHTER, *Arzneimittell.* III. S. 338] zum Einathmen [zu diesem Behuf entwickelt man es (vorsichtig, nicht in zu grosser Quantität!) in den Krankenzimmern, indem man Salmiak in kochendem Wasser auflöst, und in die Auflösung ungelöschten Kalk in kleinen Portionen hineinwirft, worauf sich bald das Ammoniumgas im Zimmer verbreitet], oder zu partiellen Dampfbädern [gleiche Theile Salmiak u. Potasche, mit heissem Wasser übergossen, die Dämpfe durch eine Röhre an den kranken Theil geleitet: J. A. SCHMIDT]. (Bei Vergiftung durch Gasarten: s. im Anhang.)

+ **Gas hydrothionicum s. hydrosulphuratum.** *Acidum hydrothionicum.* *Aër hepaticus.* Schwefelwasserstoffgas; Schwefelleberluft; hepatische Luft. Hydrothionsäure.

Ausser dem natürlichen in den Exhalationen verschiedener Schwefelquellen, z. B. Eilsen's, Nenndorf's oder der Solfatarren Süd-Italiens, Siciliens, benutzt man auch das künstlich bereitete zu allgemeinen od. örtlichen Gasbädern in eignen [gut schliessenden!] Apparaten, auch wohl — sehr vorsichtig — mit atmosphärischer Luft gemischt, zum Einathmen. Man entwickelt es am besten aus Schwefeleisen [als Reagens in allen Apotheken zu finden], oder auch aus Schwefelkalium oder Schwefelcalcium, worauf man verdünnte Schwefelsäure in kleinen Portionen giesst; zum Einathmen am zweckmässigsten in einem offenen Topfe, den man in das Krankenzimmer stellt. (Bei Vergiftung durch Chlorgas: s. im Anhang.)

+ **Gas oxygenium.** *Aër dephlogisticatus s. vitalis.* Sauerstoffgas. Dephlogistisirte od. Lebens-Luft.

Am reinsten entwickelt man es aus (etwas angefeuchtetem) *Kali oxymuriat. depur.*, am wohlfeilsten aus gepulvertem *Mangan. oxydat. nativum*, durch Glühen. Um es einathmen zu lassen, wird es bei der Entwicklung aus diesen Substanzen kunstgemäss in Blasen gefüllt, aus denen man es durch eine mit einem Hahn versehene dünne Röhre langsam und in Absätzen gegen das Gesicht des Kranken

ausströmen lässt; oder noch besser (obwohl etwas kostspielig), man füllt das ganze Zimmer damit an. Bei Asphyxien — hier verdient das aus *Kali oxymuriat. dep.* bereite te den Vorzug — wird es wohl entweder ebenfalls aus solchen Blasen oder auch durch eigne künstliche Vorrichtungen (von COLBORNE u. GORCY) in die Lungen gebracht.

****Gelatina Salep.** Salepgallerte. [1 mit 96 auf 56 gekocht etc.] Tägl. einige Unzen. — Vgl. *Rad. Salep.*

Glandes Quercus tostae. Geröstete Eicheln. [Hauptbestandtheile: Gerbstoff und Stärkmehl, durch das Rösten partiell verändert, u. empyreumatisches Öl. — Gröbliches Pulver. — 1 Unze $\frac{2}{3}$ Sgr.] Nur als Eichelkaffee [für ein 8jähriges Kind $\frac{1}{2}$ –1 Essl., Morgens u. Nachmittags, etwa noch mit der Hälfte od. dem Drittheil Kaffee, wie Kaffee abgekocht, mit Milch u. Zucker] oder Eichelschokolade [hie u. da käuflich].

Globuli Tartari ferruginosi s. martiati. Globuli martiales. Eisenweinsteinkugeln; Stahlkugeln. [Werden an der Luft feucht. — 1 Unze $2\frac{2}{3}$, gr. pulv. $3\frac{1}{8}$ Sgr.] *Cave* Adstringentien. — Zu Bädern [Unc. 1–4, mit 1 Quart Wasser gekocht, dann dem (kühlen, später kalten) Bade beigemischt].

***Graphites. Plumbago.** Reissblei (rohes). [Besteht wesentlich nur aus Kohlenstoff, fast immer aber mit etwas Eisen, sehr gewöhnlich auch mit Beimengung anderer metallischen u. erdigen Stoffe. (Aus dem „fast“ geht hervor, dass die Benennung *Ferrum carbonatum* unpassend.) — Dem englischen Graphit giebt man den Vorzug vor andern. — 1 Drachme pulv. $\frac{1}{2}$ Mgr.] Und

***Graphites depuratus.** Gereinigtes Reissblei. [Die Reinigung geschieht durch Auskochen des sehr fein gepulverten rohen Graphits mit Wasser, dann Digeriren mit verdünnter Salpeter-Salz-Säure, Aussüssen mit Wasser und Wieder-trocknen. — 1 Drachme $2\frac{1}{8}$ Sgr. — Man hat zwar bisher meist den rohen Graphit versucht, an dessen Heilkräften vielleicht die Beimengungen Antheil haben mochten, doch scheint die PH. BOR., da sie zuerst eine sorgfältigere Reinigung vorschreibt, zu Versuchen mit dem gereinigten veranlassen zu wollen.]

Innerl. zu Gr. 15–30, 2–3mal tägl., auch wohl kleinere Dosen häufiger; in Pulver [selten. — Gegen *Lichen leproides* 2stündl. 5 Gran gereinigten Graphits mit eben so viel Zucker: v. HILDENBRAND], Pillen od. Bissen [etwa mit *Extr. Dulcam. q. s.*], Latwerge [Unc. 1 mit *Mell. despum. q. s.*, 2–3mal tägl. 1 Theelöffelchen: WEINHOLD gegen Flechten u. andere Hautkrankheiten. Bei sehr complicirten Flechtenkrankheiten (mit Krätze, Gicht, Syphilis) R. 448].

Ausserl. in Salben [1 auf 5–3 Fett, ein Paar Mal tägl. einzureiben: WEINHOLD. Sonst auch, und wohl passender, als Verbandsalbe.], (Pflastern).

448.

Ry *Hydrarg. oxydul. nigri* Scr. 1
Graphitis Anglicani
Sulphur. depurati
Stibii sulphur. nigri laevig. ana
 Unc. $\frac{1}{2}$
Hb. Viol. tricol. pulv.
Extr. Pulsatillae
Extr. Dulcamar. ana Dr. 2
Camphor. trit. (*Syrupo Cort. Aur.*

subigendae) Dr. 1

Syr. Cort. Aurant. q. s.

ut f. *Elect. spissius*. D. S. Umgerührt;
 in 8 Tagen zu verzehren. (Dabei etwa
 noch einen Holztrank oder ein anderes
 diaphoretisches Getränk.)

WEINHOLD.

Die Latwerge ist nicht tadelfrei, weil zu
 schwere Pulver und zu differente Dinge
 darin sind.

Gummi Mimosae s. Acaciae. Gummi Arabicum.

Mimosen- od. arabisches Gummi. [1 Unze $2\frac{5}{8}$, gr. pulv. $3\frac{1}{2}$,
 subf. pulv. $3\frac{5}{8}$ Sgr. — Gutes senegalisches Gummi, *Gm. Senegal*, ist
 praktisch nicht verschieden.] *Sol.* etwa 3 [doch lässt es sich auch mit einer
 geringern Menge Wasser (1 und noch weniger) zu einem gleichförmigen Schleim
 mischen; die in der PH. BOR. officinelle *Mucilago* hat das Verhältniss 1 : 3. Die
 Auflösungen des arab. Gummi müssen, wo die höchste Reinheit erfordert wird —
 wie namentlich bei der Application aufs Auge oder auf die Harnröhre mehr noch
 als zum innerlichen Gebrauch —, immer colirt werden, oder man mass *Gm. Mim.*
electum oder die (schon colirte) *Mucilago Gm. Mim.* vorschreiben]. — *Cave*:
 s. I. S. 36 sub 16.

Innerl. zu Dr. $\frac{1}{2}$ –1 mehrmals tägl. [Gegen Wechselfieber (sehr
 unsicher) etwa Unc. 1 tägl.]. Nicht gern in Pulver [Wenigstens nicht gern
 die grösseren Gaben u. nicht gern pur, weil das Pulver beim Anrühren mit Was-
 ser klebrig wird und sich in Klümpchen zusammenballt. — Ry 835 (*Rad. Caryo-*
phyllat. — Selten auch in pulveraufnehmenden Formen; in Morsellen höchstens in
 untergeordneter Quantität: Ry 1014 (*Sulph. stib. rub.*)], lieber in Auflö-
 sungen, Mixturen [in der Regel nur 1 auf 8–6 Wasser, weil die Flü-
 sigkeit sonst schon etwas unangenehm zähe wird. — Ry 68 (*Alumen*), 266 (*Con-*
chas ppt.), 356, 357 (*Extr. Chamom. vulg.*), 1018 (*Syr. Amygd.*). — Soll es
 zu flüssigen Auszügen kommen, so thut man in der Regel wohl, es erst nach dem
 Coliren, oder doch gegen das Ende des Kochens, des Digerirens, zuzusetzen, weil
 es sich sonst zuerst auflösen, und das Wasser verhindern würde, die andern Sub-
 stanzen gehörig zu extrahiren. — Selten setzt man es zu Elixiren und nur in gerin-
 ger Menge, weil sie sonst leicht zu dick werden.], auch in Emulsionen
 [Ry 959 (*Sem. Cannab.*), 108 (Paste zur Mandelemuls.). — Besonders oft aber
 dient es in dieser Form nur als Emulgens: I. S. 178 ff.]. Auch wohl als Pil-
 lenconstituens [doch selten zweckmässig: I. S. 241, 243 (Tab.), 253
 sub 2)]. — Gummibonbons der Conditoren.

Ausserl. zu Streupulvern [seltner pur als (zum Blutstillen) mit
 adstringirenden u. a. Mitteln verbunden. — Ry 155 (*Bals. Peruv.*), 327 (*Cupr.*
sulphur.); vgl. auch *Alumen*, *Colophon.*], auch wohl gepulvert zu wässe-
 rigen Salben, um sie consistenter zu machen [z. B. Ry 531; — vgl.
 jedoch I. S. 171.]; aufgelöst zu Mund- u. Gurgelwässern,
 Klystieren [die Consistenz der officinellen *Mucilago* (1 auf 3) wird hier in

der Regel die passendste, und ein geringes Volumen des ganzen Klysters zweckmässig seyn, namentlich, wo man den Mimosenschleim — was freilich selten — als Hauptmittel anwendet; wo er nur Unterstützungsmittel seyn soll, nimmt man freilich oft weniger.] u. a. Einspritzungen [vgl. *Extr. Glycyrrh.*], Augenwässern [da hier die Auflösung immer colirt seyn muss, nimmt man in der Regel bequemer die (schon colirte) officinelle *Mucilago*. — Verhältnisse s. I. S. 358, 359]; überhaupt als Zusatz zu vielen Arzneien, bei denen es darauf ankommt, die Ingredientien unter sich und, um uns mit HILLY dieses Ausdrucks zu bedienen, das Mittel an den Körper besser zu binden und es allmählig einwirkend zu machen.

Gummi Tragacanthae. Tragacantha. Traganth.
[Hauptbestandtheile: Bassorin (in Wasser unlöslich, doch mit demselben einen Schleim gebend), Mimosogummi, etwas Stärkmehl. — 1 Unze $6\frac{1}{3}$, 1 Drachme *subt. pulv.* $1\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave:* s. I. S. 36–37 *sub* 17.

Innerl. zu Scr. 1–2 einigemal tägl.; nicht in Pulver [sehr unangenehm], sondern in Mixturen [als *Mucilago Tragac.* — 1 auf 48 Wasser giebt einen Schleim, dessen Consistenz der der officinellen *Mucil. Gum. Mimos.* entspricht. Wo man es also als Hauptmittel anwendet (freilich selten), würde man der Annehmlichkeit halber 96 od. mehr Theile Wasser nehmen]. Als Trochischen-Constituens ein Traganthschleim, dessen Consistenz u. Quantität dem Apotheker überlassen bleibt. (Nicht passend als Pillenconstituens [I. S. 241] oder als Emulgens.)

Selten äusserl. zu Klystieren [Dr. $\frac{1}{2}$ –Scr. 2, in der Apotheke (weil die Operation für häusliche Bereitung zu schwierig) mit 3–4 Unz. Wasser zum Schleim gemacht, das Glas im Hause des Kranken durch Eintauchen in heisses Wasser erwärmt etc.]. (Zu Augenwässern gar nicht geeignet.)

GUMMIRESINAE. Gummiharze. Schleimharze.
Es gehören hieher [*Opium* und *Lactucarium*, von denen wir besonders handeln wollen, absichtlich ausgeschlossen]: *Ammoniacum*, *Asa foetida*, *Euphorbium*, *Galbanum*, *Gutti*, *Myrrha*, *Olibanum*, *Sagapenum*, *Scammonium*. Diese sind sämmtlich natürliche Gemenge von Harz und ätherischem Öl mit Gummi [in abweichenden Verhältnissen: bei *Ammoniac.*, *Euphorb.*, *Gutti* u. *Scammon.* ist der Gehalt an äther. Öl, bei *Euphorb.* u. *Scammon.* auch der Gehalt an Gummi sehr gering]; ausserdem enthalten einige einen scharfen oder giftigen Stoff [so *Euphorb.*, *Gutti*, *Scammon.*], Salze von Äpfelsäure u. a. Pflanzensäuren mit Kalkerde [so namentlich *Euphorb.*], Extractivstoffe u. s. w.

Sind weder in Wasser noch in Weingeist, Äther, ätherischen Spiritus ganz auflöslich, wohl aber in verdünnten Auflösungen kautistischer Alkalien [nur höchst selten bleiben aus ihnen niedergeschlagene Salzbasen unaufgelöst zurück]. Schwacher Weingeist, Wein, (auch schon starkes Bier), löst sie fast vollkommen auf. Auch Säuren [so Essig.

— Concentrirte Mineralsäuren, ihrer gewöhnlich zersetzenden Wirkung wegen, ausgeschlossen; *Liq. Ammon. acet.* und *Liq. Kali acet.* lösen sie etwas vollkommener auf, als es das Wasser thut, und werden deshalb häufig als Auflösungsmittel angewendet. Öfters bedient man sich namentlich des Essigs, um die Gummiharze, besonders die 4 sogenannten *Gummata ferulacea* (*Ammoniac.*, *Asa foet.*, *Galban.* u. *Sagapen.*) in verschiedene Gestalten zu bringen, indem man sie durch einen grössern oder geringern Zusatz von Essig bald ganz flüssig darstellen, bald nur bis zu einem gewissen Grade erweichen (und so zum Liniment, zum Kataplasma, zur Salbe oder zum Pflaster machen), lässt. (Vgl. namentlich *Ammoniac. depur.*) Die unvollkommenen und deshalb trüben, milchigen, Auflösungen der Gummiharze müssen vor der Anwendung jedesmal umgeschüttelt werden. — Die Gummiharze sind sämmtlich, Myrrhe ausgenommen, schmelzbar, *Oliban.*, *Euphorb.* und *Gutti* jedoch nur unvollkommen. — Man hat im Allgemeinen die Verbindungen mit concentrirten Mineralsäuren [besonders Salpeter-, Schwefel-, Salz-Säure], Salzbildern, kaustischen Alkalien [mit denen ihre harzigen Bestandtheile seifenartige, in Wasser auflösliche Verbindungen eingehe, was oft die Wirkung, wenn auch nicht schwächen, doch verändern dürfte], mehreren Metallsalzen [namentlich salzs. Gold, salpeters. Silber u. Quecksilber, Sublimat, *Cupr. sulphurico-ammoniac.*, essigs. Blei, Chloreisen] zu vermeiden.

Sie werden im Allgemeinen [nicht alle einzelnen] in folgenden Formen angewandt:

1. In Pulver lassen sich die meisten nur schwer verwandeln und das Pulver backt gern, besonders in der Wärme, wieder zusammen [namentlich sind die *Gmm. ferulacea* nur in der Winterkälte spröde genug, um gepulvert werden zu können (welche Operation mit dem vorgeschriebenen Reinigen derselben zusammenfällt), und schon gepulvert backen sie bei der Aufbewahrung allmählig wieder zu Klumpen zusammen, so dass der Apotheker, um sie zu Arzneiformen zu verarbeiten, sie erst noch einmal im Mörser zerreiben muss (wir führen sie deshalb in Pillen- u. andern Formeln gewöhnlich zuerst auf, weil der Apotheker sie zuerst zerreiben muss, ehe er sie mit den andern Ingredientien verbindet)]. Immer ist das Pulver unangenehm einzunehmen. Man wendet deshalb die *Gummata ferulacea* nie, die übrigen nur selten in dieser Form, innerlich oder äusserlich, an, und dann nicht pur [vgl. I. S. 206, d. Tabelle u. sub 3.], lässt auch das Pulver vor Sonnen- u. Ofen-Wärme hüten.

2. In Trochisken (die dann nicht gedörft werden dürfen) nimmt man nur etwa die Myrrhe gern auf, weil die meisten anderen zu schlecht schmecken.

3. Zu Pillen oder Bissen — der beliebtesten Darreichungsform — können die Gummiharze schon mit einer Kleinigkeit Weingeist, Schleim od. dgl. verarbeitet werden [vgl. I. S. 243]; es ist jedoch

meist rathsam [vgl. I. S. 245 sub 5.], noch etwas Seife oder etwas Pulver und Extract zu Hülfe zu nehmen. Wenn man sie mit anderen, an Quantität überwiegenden Mitteln in Pillen aufnimmt, können sie bei der Constitution der Masse meist ausser Rechnung bleiben [I. S. 244 sub 3.].

4. In Latwergen giebt man sie [theils des üblen Geschmacks, theils, namentlich die heftiger wirkenden, der Unbestimmtheit der Dose wegen] nicht gern [die *Gmm. ferulacea* würde man zu dem Ende mit Schleim oder Eigelb subigiren oder wenigstens mit der gleichen Menge Wasser zu einem dünnen Brei verreiben lassen; die übrigen kann man gepulvert zu der Latwerge setzen].

5. In Pflastern. Die *Gummata ferulacea* haben geschmolzen Pflasterconsistenz, die zwar etwas steif ist; man lässt sie jedoch nicht gern, weder für sich, noch mit andern schmelzbaren Stoffen in Verbindung, bloss durch Schmelzen zur Pflastermasse machen, weil sie durch die alsdann nöthige beträchtliche Hitze zu viel von ihrem ätherischen Öl verlieren, und weil sie sich auch auf diese Weise minder gleichförmig vertheilen würden; vielmehr nimmt man immer ein flüssiges Erweichungsmittel, meistens Terpenthin oder Essig, zu Hülfe; auch bringt man sie, falls sie nicht hauptsächlich oder ausschliesslich die Grundlage der zu bildenden Pflastermasse ausmachen, gern erst — etwa mit Terpenthin unter gelinder Erwärmung erweicht — in die bereits halb erkaltete Pflastermasse hinein [vgl. I. S. 263]. — Den spröderen, *Euphorbium* u. *Olibanum*, muss man noch etwas Weiches oder Flüssiges [die passendste Quantität u. I. S. 259] zusetzen, falls man sie zum Pflaster schmelzen will; in der Regel nimmt man sie jedoch nur in untergeordneter Quantität [nicht über das I. S. 260 in der Tabelle angegebene Verhältniss hinaus] in eine Pflastermasse auf, und setzt sie dann am zweckmässigsten gepulvert der bereits halb erkalteten Masse zu. *Myrrha* wird bloss auf die letztere Weise aufgenommen.

6. In Salben, selten; namentlich nicht gern in Einreibesalben [I. S. 277 sub 3.]. Die spröderen Gummiharze verbindet man gepulvert mit wenigstens 2 Theilen einer Salbengrundlage von normaler Consistenz. Den *Gmm. ferulaceis* kann man eine salbenähnliche Consistenz durch Subigiren mit Eigelb, oder durch Mischen mit Essig oder Terpenthin in gelinder Wärme, geben.

7. In Kataplasmen: nur etwa *Ammoniac.* oder *Galban. depur.* [mit Essig in gelinder Wärme erweicht].

8. In flüssiger Form, entweder in einem der oben angegebenen Menstrua aufgelöst oder mit wässrigen Flüssigkeiten emulgirt [nicht ohne Zusatz eines Emulgens (I. S. 177), falls die Emulsion nicht etwa auf Einmal verbraucht werden soll]. Doch wendet man die Gummiharze,

namentlich innerlich, nur selten in flüssiger Form an [theils des üblen Geschmacks, theils der heftigeren Wirkung wegen], eher schon äusserlich zu Klystieren, Injectionen u. dgl. Zu Linimenten sind sie, obwohl man sie durch Erweichen mit Essig leicht dazu machen kann, nicht besonders geeignet [I. S. 372].

9. In Räucherungen [I. S. 386 sub 2.], wozu man sie in Species-Form aus der Apotheke kommen lässt.

Gutti. Gummi Guttae. Gummigutt. [1 Unze 6 $\frac{1}{2}$, gr. pulv. 8 $\frac{1}{2}$ Sgr.; 1 Drachme sub. pulv. 1 $\frac{1}{2}$ Sgr.] Vgl. *Gummiresinae*.

Innerl. (*ad Grana quatuor!*) als Reizmittel zu Gr. $\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{2}$ alle 3–2 St.; als gelindes Purgans Gr. 2–3 einigemal tägl.; als Drasticum (nur noch gegen den Bandwurm oder dann u. wann einmal bei Geisteskranken gebräuchlich) zu Scr. $\frac{1}{2}$ –1 auf Ein Mal oder in einem Paar Portionen rasch hinter einander. — In Pulver [schmeckt sehr widrig, färbt auch das Wasser, womit man es anrührt, gelb], Pillen [R_x 449, 450; 345 (*Extr. Aloës Ac. sulph. corr.*), 904 (*Rad. Scill.*)], Bissen, Latwerge [nicht gern, des üblen Geschmacks, der hier besonders unangenehmen Farbe und der Unbestimmtheit der Dose wegen. — MATTHIEU's Bandwurmcure: s. R_x 990.], Auflösungen u. Emulsionen [man vermeidet auch die flüssige Form des üblen Geschmacks und der Farbe wegen in der Regel; doch hat man es wohl in Essig, Sauerhonig, *Liq. Ammon. acet.*, *Liq. Kali carb.* u. dgl. (unvollkommen) aufgelöst gegeben (auch sonst oft in der flüssigen Form in Verbindung mit *Kali carbon.*); am erträglichsten ist es vielleicht noch in einer Emulsion].

Eine Anzahl älterer, jetzt entbehrlichen Bandwurmcuren, in denen das Gummigutt eine Hauptrolle spielt, — von BECK, HERRENSCHWAND, Madame NUYER, WAGELER u. CLOSSIUS, KORTUM u. A., findet, wer sich dafür interessirt, gesammelt in G. A. RICHTER *Arzneimittell.* Bd. 2. S. 356, 357, Bd. 3. S. 160, 161; oder in BREMSER *üb. lebende Würmer*, S. 172 ff.

449.

R_x *Gutti pulv.*

Rad. Scillae pulv. ana Gr. 12

Sapon. medic. Dr. 1

Spir. Vini rft. q. s.

ut f. *Pilulas* 48. *Consp. Pulv. Cass.*
cinqam. D. S. 4mal tägl. 28 Stück.

450.

Kar gegen den Bandwurm
von Dr. C. A. SCHMIDT in Berlin.
Man lässt von des Morgens an bis Abends
7 Uhr 2 stündl. 2 Essl. (das erstemal
nüchtern) von folgender Mixtur nehmen
(u. schwarzen Kaffees mit vielem Zucker
od. Syrup nachtrinken):

R_x *Rad. Valer. min.* Dr. 6

Fol. Sennae Dr. 2

inf. Aq. comm. ferv. q. s. ad Colat. Unc. 6,
in qua solve

Natri sulphur. dep. cryst. Dr. 3

Elaeos. Tanaceti Dr. 2

et adde

Syr. Marmae Unc. 2.

M. D. —

Zum Mittagbrod eine dünne Mehlsuppe
und einige Stücke Häring mit der Hä-
ringemilch. — Abends um 8 Uhr einen
Häringssalat (ohne Kartoffeln) mit ge-
hacktem rohen Schinken, einer Zwiebel,
recht vielem Oel, und einer Portion Zuk-

ker. — Zum Getränk den Tag über Zuckerwasser.

Am folgenden Tage, von 6 Uhr Morgens an, folgende Pillen:

b.

Ry *Asae foetid. depur.* Gr. 45

Pulv. Gutti

— *Rad. Rhei*

— — *Jalap. ana* Dr. $\frac{1}{2}$

— — *Ipecacuanh.*

— *Hb. Digitalis*

Sulph. sublimat. aurant. ana Gr. $2\frac{1}{2}$

Hydrarg. muriat. mit. Scr. $\frac{1}{2}$

Ol. Tanacetii

— *Anisi ana* Gtt. 4

Extr. Gramin. liq. Gr. 45.

M. f. l. a. Pilulae pond. Gr. 2. [bestens *Extr. Gram. liq. q. s.* und 100 Pillen]. *Consp. Sem. Lycop. D. in vitro.* S. Stündl. 6 Pillen mit 1 Theelöffel gemeinen Syrups. (In der Zwischenzeit schwarzer Kaffee mit vielem Zucker od. Syrup.) Um $6\frac{1}{2}$ Uhr 1 Essl. *Ol. Ricini.*

Gegen Mittag etwas Fleischbrühe.

Bis 2 od. 3 Uhr Nachmittags geht in der Regel der Wurm ab; wo nicht, so giebt man noch einige Dosen Ricinus-Öl, bis er abgegangen ist; mit den Pillen hört man auf.

Abends eine Fleischsuppe oder eine Mehlsuppe mit frischer Butter u. Zucker.

Am folgenden Tage können zur Vorsorge, „damit kein Wurmanest zurückbleibe“, noch einige Pillen genommen werden. — Um etwaige Rückfälle zu verhüten (die besonders entstehen, wenn der Kranke obige Vorschriften nicht streng befolgt oder die Arznei häufig wieder ausbricht), lässt man den Kranken noch öfters Häringssalat und rohen geriebenen Meerrettig mit Essig u. vielem Zucker genießen, auch können noch alle 3 Tage einige Dosen von den Pillen genommen werden. — Zur Nachkur eine stärkende Diät (Bouillon, Eigelb, Wein) und ein bitteres Mittel.

Wo man von der Anwesenheit eines Bandwurms nicht (durch Abgang von Stücken) ganz sicher überzeugt ist, bediene man sich folgender Probe-Vorcur. Nachdem der Kranke den Tag zuvor Mittags nichts als Mehlsuppe, Abends einen Häringssalat von der beschriebenen Art, u. zum Getränk Zuckerwasser genossen, nimmt er des Morgens nüchtern folgendes Pulver (u. trinkt schwarzen Kaffee mit vielem Zucker od. Syrup, oder recht fette Fleischbrühe nach):

c.

Ry *Hydrarg. muriat. mitis.*

Gutti ana Gr. 6

Sem. Cinæ Scr. $\frac{1}{2}$

Rad. Jalap. Gr. 15

Elaeoa. Tanacetii Dr. 1.

M. f. Pulv. D. —

Mittags Mehlsuppe, Abends Häringssalat, zum Getränk Zuckerwasser — wie am vorigen Tage. — Selten geht schon auf die Probepulver der Bandwurm vollständig ab, worauf man dann sogleich die obigen Pillen stündlich mit Syrup nachnehmen lässt, um, falls noch mehr Bandwürmer zugegen seyn sollten, auch diese abzutreiben; meistens gehen nur unter reichlichen Darmausleerungen einzelne Glieder ab, worauf man dann sogleich am folgenden Tage die eigentliche Kur beginnt.

Contraindicirt ist die ganze Kurmethode bei Alterschwäche, Schwangerschaft, kurz vor u. kurz nach der Menstruation, bei Entzündungen, Schwind-suchten u. Abzehrungen aller Art, bei fließenden Hämorrhoiden, Bluthusten. — Bei jugendlichen Individuen verhältnissmässig kleinere Dosen.

(Das Mittel hat sich bei der amtlichen Prüfung im Charité-Krankenhaus zu Berlin, und anderweitig als sicher und gefahrlos vielfältig bewährt, und die Vorschrift ist vom preuss. Staat erkauf worden.)

+ *Helices Pomatiae.* [Unrichtig: *Limaces.*] Weinbergs-

od. Garten-Schnecken. [Hauptbestandtheile: Thierschleim, Osmazom u. Gallerte.] *Cave* Säuren; Salzbilder; Metallsalze; Gerbstoff.

Innerl. [in Substanz zu ekelhaft] hauptsächlich in Abkochung [vgl. I. S. 322 und die Kochbücher. Die PR. HANN. giebt zwar die Vorschrift zu einem *Decoct. Helicum Pomat. compositum* (oder *Lac asinatum artificiale*; — 6 Schnecken, geraspelt, Hirschhorn u. Perlgrauen ana Dr. 3, mit Wasser L. 2 auf L. 1 eingekocht, zur Colat. † *Syr. Capill. Ven. Unc. 1*), welches esslöffelweise, oder auch zu 1 Tasse früh und Abends, mit eben so viel Milch, gebraucht werden soll; doch ist dies ziemlich theuer (12 Unzen 12 Mgr.) und weniger angenehm als ein im Hause bereitetes]. Die PR. SLESV. lässt aus dem Saft der zerschnittenen Schnecken mit *Gm. Mim.* u. Zucker eine *Pasta Helicum (s. Limbicum)* [1 Unze 8 Schl.] bereiten [davon etwa Unc. 1-1½ in Unc. 6 eines aromat. Wassers aufgelöst, stündl. 1 Essl.].

Helminthochortos. *Corallina Corsicana*. Wurmmoos.

Korsikanisches Moos. [Hauptbestandtheile: thierisch-schleimige Substanz, Moosstärke (?), Iodmetalle u. Meersalze. — 1 Unze 1½, *subt. pulv.* 2½ Sgr.]

Cave: man giebt es in der Regel nur mit vegetabil. Substanzen, doch zuweilen mit Eisensalzen, wodurch aber der Auszug dunkelbraun, unter Abscheidung von Flocken, gefärbt wird.

Innerl. zu Scr. 1-Dr. 1, mehrmals tägl.; in Pulver, Latwerge, Aufguss [wässrigem od. weinigem. — Ry 451], Decoct [etwa Unc. 1 mit Unc. 10 auf Unc. 8, 2stündl. 2 Essl. oder ½ Tasse. (Nicht concentrirt, damit es nicht unvollkommen gelatinisire). — Ry 452; 751b.], Gallerte [vgl. I. S. 286. Da jedoch das Wurmmoos der Officinen in seiner Mischung aus verschiedenen Algen und demnach auch in seinem Gallertgehalt merklich variiert, so setzt man wohl, um sicherer eine gute Consistenz zu treffen, einen andern gallertgebenden Stoff, namentlich oft Hausenblase, dazu. — Ry 453, 454; 840 (*Rad. Filic.*)].

Ausserl. zu Klystieren [Dr. 2 mit *Rad. Valer. min.* und *Sem. Cinnae* infundirt; FLEISCH gegen Askariden der Kinder].

451.

Ry *Helminthochorti* Unc. 1

Vini Rhenani Unc. 7.

Digere leni cal. per 8 horas; Colat. refriger. addo

Tinct. Sennae Unc. 1

Syr. Cort. Aurant. Unc. ½.

M. D. S. In einem Tage auf 3mal zu verbrauchen. BALDINGER.

452.

Ry *Helminthochorti* Dr. 1

Aq. comm. bullient. Unc. 4.

Ebulliant per 10 minutos; Colat. re-

friger. addo

Aq. Flor. Aurant. Unc. ½

Syr. Succ. Citri Unc. 1.

M. D. S. Des Morgens nüchtern esslöffelweise (oder auf Ein Mal) zu nehmen. (DE MONTMAHOU.

453.

Ry *Helminthochorti* Unc. 1

Ichthyocollae Dr. ½

coque c. Aq. comm. Unc. 16 ad Colat. Unc. 4, in qua statim coles

Sacch. albiss. Unc. 1.

Reposc in loco frigido, ut in Gelati-

scher Luft gemengt einathmen zu lassen; doch hat die neueste Zeit ihren Gebrauch als zu anstrengend für die Respirationsorgane, daher nicht anhaltend anwendbar, auch durch die oben angegebenen Methoden überflüssig, verworfen.

Ausserdem wendet man die Kohlensäure äusserl. an: 1) In Klystieren [z. B. bei krebigen u. andern geschwägigen Leiden des Mastdarms. — Zu diesem Behuf könnte man wohl am bequemsten das fertige kohlensaure Gas in einer Flasche (oder in mehreren kleinen Flaschen, in jeder nur soviel als man auf Einmal anwenden will) aus der Apotheke kommen lassen, aus der geöffneten Flasche (aus der es bei seiner specifischen Schwere nicht so leicht entweicht) wie Wasser mittelst einer Spritze in kleinen Quantitäten einzeln, und so injiciren]. — 2) Als allgemeines od. örtliches Bad [zu den allgemeinen Bädern benutzt man theils die Ausdünstungen einiger natürlichen Mineralwässer, so z. B. in Meinberg und Eger (Pösterbrunnen), wo jedoch ein wenig Schwefelwasserstoffgas dabei ist, in Cudowa u. s. w.; theils kann man zu dem Ende die Kohlensäure in irgend einem Räucherungskasten aus Kreide und Schwefelsäure entwickeln. Will man nicht bloss ein Bad von kohlensaurem Gas, sondern ein Wasserbad mit Kohlensäure anwenden, so kann man einige Unzen gepulverter Kreide ins Bad thun und dann eben soviel concentr. Schwefelsäure portionenweise, unter Umrühren, zusetzen. DÜBEREINER (*Anleit. z. Darstellg. d. kräft. Bäder*, Jena 1816.) schlägt ein Gährbad aus einem durch Hefen in Gährung gesetzten Malzaufguss vor, dessen sich der Kranke, während die Gährung am stärksten ist, bedienen soll, doch scheint dies umständlich ohne Vortheil. Bei allen allgemeinen Bädern mit Kohlensäure ist es rathsam, den Kopf des Kranken durch passende Vorrichtungen vor der Einwirkung des Gases zu schützen. — Zu örtlichen kohlensauren Bädern finden sich bei manchen Mineralbrunnen eigene Vorrichtungen, so z. B. in Meinberg Vorrichtungen zu Gas-Donchebädern, die auf die Augen, Ohren etc. angewandt werden können. Auch künstlich entwickelte Kohlensäure kann man mittelst eigener Apparate auf die Augen anwenden]. Sonst bedient man sich auch wohl natürlicher kohlensauren Wässer zu Augewaschwässern und Augenbähungen [so z. B. empfiehlt v. GRAVE das Pyramonter Wasser, etwa noch mit der Hälfte Rothwein od. Theeaufguss versetzt, auch wohl noch mit einem kleinen Zusatz von *Eau de Cologne*, als Waschmittel od. Umschlag gegen verschiedene atonische Zustände des Auges; vgl. † *Fol. Theae*]. — Endlich gehören noch hieher die Cataplasmen aus leicht gährenden Dingen [die man auf brandige und krebsartige Geschwüre oder gangränöse Stellen legt, und die ebenfalls wohl nur durch Entwicklung von Kohlensäure wirken; man benutzt dazu geschabte oder auf einem Reibeisen zerriebene Mohrrüben od. Runkelrüben, Sauerteig, Bierhefen, Weintrester, Sauerkohl, Honig, abgekochtes Malz, u. dgl.; etwa mehrere dieser Dinge in Verbindung, vgl. z. B. † *Ferment. Corevis.*, *Malthum Hord.* Zur Bereitung in der Apotheke eignen sich diese Breiumschläge nicht].

† *Gas Acidi muriatici.* Salzsaures Gas. Man erhält es durch Übergiessen von Kochsalz mit einem Gemisch aus gleichen Theilen concentrirter Schwefelsäure und Wasser. Es wird, da es nicht nur die Respirationsorgane sehr stark, sondern auch leblose (anorganische u. organische) Substanzen, angreift, nur noch selten zu Durchräucherungen menschenleerer Räume u. mancher leblosen Sachen angewandt.

Gas Acidi muriatici oxygenati s. oxymuriatici s. Chlorigas. *Chlorum gasiforme.* Oxydirt-salzsäures Gas; Chlorigas. Man entnimmt es nicht leicht fertig aus der Apotheke, sondern lässt es in Krankenzimmern aus den *Fumigationes oxymuriaticae* (vgl. den Artikel) *ex tempore* entwickeln, oder wenn man eine mehr allmähliche, schwächere Entwicklung vorzieht, aus Chlorkalk (vgl. *Chlorum Calcar.*).

+ **Gas Ammonii caustici.** Ammoniumgas. — Man benutzt es nur selten, als höchst eindringliches Riechmittel [doch ist der *Liq. Ammon. caust.*, besonders wenn man ihn noch ein wenig erwärmt, dazu schon stark genug], oder [bei manchen Brustaffectionen, selbst Lungensuchten, besonders da, wo man mehr deprimirend auf die Respirationsorgane wirken will: G. A. RICHTER, *Arzneimittell.* III. S. 338] zum Einathmen [zu diesem Behuf entwickelt man es (vorsichtig, nicht in zu grosser Quantität!) in den Krankenzimmern, indem man Salmiak in kochendem Wasser auflöst, und in die Auflösung ungelöschten Kalk in kleinen Portionen hineinwirft, worauf sich bald das Ammoniumgas im Zimmer verbreitet], oder zu partiellen Dampfbädern [gleiche Theile Salmiak u. Potasche, mit heissem Wasser übergossen, die Dämpfe durch eine Röhre an den kranken Theil geleitet: J. A. SCHMIDT]. (Bei Vergiftung durch Gasarten: s. im Anhang.)

+ **Gas hydrothionicum s. hydrosulphuratum.** *Acidum hydrothionicum.* Aër hepaticus. Schwefelwasserstoffgas; Schwefelleberluft; hepatische Luft. Hydrothionsäure.

Ausser dem natürlichen in den Exhalationen verschiedener Schwefelquellen, z. B. Eilsen's, Nenndorf's oder der Solfatarren Süd-Italiens, Siciliens, benutzt man auch das künstlich bereitete zu allgemeinen od. örtlichen Gasbädern in eignen [gut schliessenden!] Apparaten, auch wohl — sehr vorsichtig — mit atmosphärischer Luft gemischt, zum Einathmen. Man entwickelt es am besten aus Schwefeleisen [als Reagens in allen Apotheken zu finden], oder auch aus Schwefelkalium oder Schwefelcalcium, worauf man verdünnte Schwefelsäure in kleinen Portionen giesst; zum Einathmen am zweckmässigsten in einem offenen Topfe, den man in das Krankenzimmer stellt. (Bei Vergiftung durch Chlorigas: s. im Anhang.)

+ **Gas oxygenium.** *Aër dephlogisticatus s. vitalis.* Sauerstoffgas. Dephlogistisirte od. Lebens-Luft.

Am reinsten entwickelt man es aus (etwas angereichertem) *Kali oxymuriat. depur.*, am wohlfeilsten aus gepulvertem *Mangan. oxydat. nativum*, durch Glühen. Um es einathmen zu lassen, wird es bei der Entwicklung aus diesen Substanzen kunstgemäss in Blasen gefüllt, aus denen man es durch eine mit einem Hahn versehene dünne Röhre langsam und in Absätzen gegen das Gesicht des Kranken

ausströmen lässt; oder noch besser (obwohl etwas kostspielig), man füllt das ganze Zimmer damit an. Bei Asphyzien — hier verdient das aus *Kali oxymuriat. dep.* bereite den Vorzug — wird es wohl entweder ebenfalls aus solchen Blasen oder auch durch eigne künstliche Vorrichtungen (von COLBORNE u. GORCY) in die Lungen gebracht.

****Gelatina Salep.** Salepgallerte. [1 mit 96 auf 56 gekocht etc.] Tägl. einige Unzen. — Vgl. *Rad. Salep.*

Glandes Quercus tostae. Geröstete Eicheln. [Hauptbestandtheile: Gerbstoff und Stärkmehl, durch das Rösten partiell verändert, u. empyreumatisches Öl. — Gröbliches Pulver. — 1 Unze $\frac{2}{3}$ Sgr.] Nur als Eichelkaffee [für ein 8jähriges Kind $\frac{1}{4}$ –1 Essl., Morgens u. Nachmittags, etwa noch mit der Hälfte od. dem Drittheil Kaffee, wie Kaffee abgekocht, mit Milch u. Zucker] oder Eichelschokolade [hie u. da käuflich].

Globuli Tartari ferruginosi s. martiati. Globuli martiales. Eisenweinsteinkugeln; Stahlkugeln. [Werden an der Luft feucht. — 1 Unze $2\frac{3}{4}$, gr. pulv. $3\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave* Adstringentien. — Zu Bädern [Unc. 1–4, mit 1 Quart Wasser gekocht, dann dem (kühlen, später kalten) Bade beigemischt].

***Graphites. Plumbago.** Reissblei (rohes). [Besteht wesentlich nur aus Kohlenstoff, fast immer aber mit etwas Eisen, sehr gewöhnlich auch mit Beimengung anderer metallischen u. erdigen Stoffe. (Aus dem „fast“ geht hervor, dass die Benennung *Ferrum carbonatum* unpassend.) — Dem englischen Graphit giebt man den Vorzug vor andern. — 1 Drachme pulv. $\frac{1}{4}$ Mgr.] Und

***Graphites depuratus.** Gereinigtes Reissblei. [Die Reinigung geschieht durch Auskochen des sehr fein gepulverten rohen Graphits mit Wasser, dann Digeriren mit verdünnter Salpeter-Salz-Säure, Aussüssen mit Wasser und Wieder-trocknen. — 1 Drachme $2\frac{1}{2}$ Sgr. — Man hat zwar bisher meist den rohen Graphit versucht, an dessen Heilkräften vielleicht die Beimengungen Antheil haben mochten, doch scheint die PH. BOR., da sie zuerst eine sorgfältigere Reinigung vorschreibt, zu Versuchen mit dem gereinigten veranlassen zu wollen.]

Innerl. zu Gr. 15–30, 2–3mal tägl., auch wohl kleinere Dosen häufiger; in Pulver [selten. — Gegen *Lichen leproides* 2stündl. 5 Gran gereinigten Graphits mit eben so viel Zucker: v. HILDENBRAND], Pillen od. Bissen [etwa mit *Extr. Dulcam. q. s.*], Latwerge [Unc. 1 mit *Moll. despum. q. s.*, 2–3mal tägl. 1 Theelöffelchen: WEINHOLD gegen Flechten u. andere Hautkrankheiten. Bei sehr complicirten Flechtenkrankheiten (mit Krätze, Gicht, Syphilis) R. 448].

Ausserl. in Salben [1 auf 5–3 Fett, ein Paar Mal tägl. einzureiben: WEINHOLD. Sonst auch, und wohl passender, als Verbandsalbe.], (Pflastern).

448.

Ry *Hydrarg. oxydul. nigri* Scr. 1
Graphitis Anglicani
Sulphur. depurati
Stibii sulphur. nigri laevig. ana
 Unc. $\frac{1}{2}$
Hb. Viol. tricol. pulv.
Extr. Pulsatillae
Extr. Dulcamar. ana Dr. 2
Camphor. trit. (Syrupo Cort. Aur.

subigendae) Dr. 1

Syr. Cort. Aurant. q. s.
 ut f. *Elect. spissius. D. S.* Umgerührt;
 in 8 Tagen zu verzehren. (Dabei etwa
 noch einen Holztrank oder ein anderes
 diaphoretisches Getränk.)

WEINHOLD.

Die Latwerge ist nicht tadelfrei, weil zu
 schwere Pulver und zu differente Dinge
 darin sind.

Gummi Mimosae s. Acaciae. Gummi Arabicum.

Mimosen- od. arabisches Gummi. [1 Unze $2\frac{5}{8}$, gr. pulv. $3\frac{1}{2}$,
 subst. pulv. $3\frac{5}{8}$ Sgr. — Gutes senegalisches Gummi, *Gm. Senegal*, ist
 praktisch nicht verschieden.] *Sol.* etwa 3 [doch lässt es sich auch mit einer
 geringern Menge Wasser (1 und noch weniger) zu einem gleichförmigen Schleim
 mischen; die in der PH. BOR. officinelle *Mucilago* hat das Verhältniss 1 : 3. Die
 Auflösungen des arab. Gummi müssen, wo die höchste Reinheit erfordert wird —
 wie namentlich bei der Application aufs Auge oder auf die Harnröhre mehr noch
 als zum innerlichen Gebrauch —, immer colirt werden, oder man muss *Gm. Mim.*
electum oder die (schon colirte) *Mucilago Gm. Mim.* vorschreiben]. — *Cave:*
 s. I. S. 36 sub 16.

Innerl. zu Dr. $\frac{1}{2}$ –1 mehrmals tägl., [Gegen Wechselfieber (sehr
 unsicher) etwa Unc. 1 tägl.]. Nicht gern in Pulver [Wenigstens nicht gern
 die grösseren Gaben u. nicht gern pur, weil das Pulver beim Anrühren mit Was-
 ser klebrig wird und sich in Klümpchen zusammenballt. — Ry 835 (*Rad. Carya-*
phyllat. — Selten auch in pulveraufnehmenden Formen; in Morsellen höchstens in
 untergeordneter Quantität: Ry 1014 (*Sulph. stib. rub.*)], lieber in Auflö-
 sungen, Mixturen [in der Regel nur 1 auf 8–6 Wasser, weil die Flüss-
 igkeit sonst schon etwas unangenehm zähe wird. — Ry 68 (*Alumen*), 266 (*Con-*
chae ppt.), 356, 357 (*Extr. Chamom. vulg.*), 1018 (*Syr. Amygd.*). — Soll es
 zu flüssigen Auszügen kommen, so thut man in der Regel wohl, es erst nach dem
 Coliren, oder doch gegen das Ende des Kochens, des Digerirens, zuzusetzen, weil
 es sich sonst zuerst auflösen, und das Wasser verhindern würde, die andern Sub-
 stanzen gehörig zu extrahiren. — Selten setzt man es zu Elixiren und nur in gerin-
 ger Menge, weil sie sonst leicht zu dick werden.], auch in Emulsionen
 [Ry 959 (*Sem. Cannab.*), 108 (*Paste zur Mandelemuls.*). — Besonders oft aber
 dient es in dieser Form nur als Emulgens: I. S. 178 ff.]. Auch wohl als Pil-
 lenconstituens [doch selten zweckmässig: I. S. 241, 243 (Tab.), 253
 sub 2)]. — Gummibonbons der Conditoren.

Ausserl. zu Streupulvern [seltnr pur als (zum Blutstillen) mit
 adstringirenden u. a. Mitteln verbunden. — Ry 155 (*Bals. Peruv.*), 327 (*Cupr.*
sulphur.); vgl. auch *Alumen*, *Colophon.*], auch wohl gepulvert zu wässe-
 rigen Salben, um sie consistenter zu machen [z. B. Ry 531; — vgl.
 jedoch I. S. 171.]; aufgelöst zu Mund- u. Gurgelwässern,
 Klystieren [die Consistenz der officinellen *Mucilago* (1 auf 3) wird hier in

der Regel die passendste, und ein geringes Volumen des ganzen Klysters zweckmässig seyn, namentlich, wo man den Mimosenschleim — was freilich selten — als Hauptmittel anwendet; wo er nur Unterstützungsmittel seyn soll, nimmt man freilich oft weniger] u. a. Einspritzungen [vgl. *Extr. Glycyrrh.*], Augenwässern [da hier die Auflösung immer colirt seyn muss, nimmt man in der Regel bequemer die (schon colirte) officinelle *Mucilago*. — Verhältnisse s. I. S. 358, 359]; überhaupt als Zusatz zu vielen Arzneien, bei denen es darauf ankommt, die Ingredientien unter sich und, um uns mit HIMLY dieses Ausdrucks zu bedienen, das Mittel an den Körper besser zu binden und es allmählig einwirkend zu machen.

Gummi Tragacanthae. *Tragacantha*. Traganth.

[Hauptbestandtheile: Bassorin (in Wasser unlöslich, doch mit demselben einen Schleim gebend), Mimosengummi, etwas Stärkmehl. — 1 Unze $6\frac{1}{3}$, 1 Drachme *subt. pulv.* $1\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave*: s. I. S. 36–37 *sub* 17.

Innerl. zu Scr. 1–2 einigemal tägl.; nicht in Pulver [sehr unangenehm], sondern in Mixturen [als *Mucilago Tragac.* — 1 auf 48 Wasser giebt einen Schleim, dessen Consistenz der der officinellen *Mucil. Gum. Mimos.* entspricht. Wo man es also als Hauptmittel anwendet (freilich selten), würde man der Annehmlichkeit halber 96 od. mehr Theile Wasser nehmen]. Als Trochischen-Constituens ein Traganthschleim, dessen Consistenz u. Quantität dem Apotheker überlassen bleibt. (Nicht passend als Pillenconstituens [I. S. 241] oder als Emulgens.)

Selten äusserl. zu Klystieren [Dr. $\frac{1}{2}$ –Scr. 2, in der Apotheke (weil die Operation für häusliche Bereitung zu schwierig) mit 3–4 Unz. Wasser zum Schleim gemacht, das Glas im Hause des Kranken durch Eintauchen in heisses Wasser erwärmt etc.]. (Zu Augenwässern gar nicht geeignet.)

GUMMIRESINAE. Gummiharze. Schleimharze.

Es gehören hierher [*Opium* und *Lactucarium*, von denen wir besonders handeln wollen, absichtlich ausgeschlossen]: *Ammoniacum*, *Asa foetida*, *Euphorbium*, *Galbanum*, *Gutti*, *Myrrha*, *Olibanum*, *Sagapenum*, *Scammonium*. Diese sind sämmtlich natürliche Gemenge von Harz und ätherischem Öl mit Gummi [in abweichenden Verhältnissen: bei *Ammoniac.*, *Euphorb.*, *Gutti* u. *Scammon.* ist der Gehalt an äther. Öl, bei *Euphorb.* u. *Scammon.* auch der Gehalt an Gummi sehr gering]; ausserdem enthalten einige einen scharfen oder giftigen Stoff [so *Euphorb.*, *Gutti*, *Scammon.*], Salze von Äpfelsäure u. a. Pflanzensäuren mit Kalkerde [so namentlich *Euphorb.*], Extractivstoffe u. s. w.

Sind weder in Wasser noch in Weingeist, Äther, ätherischen Spiritus ganz auflöslich, wohl aber in verdünnten Auflösungen kautischer Alkalien [nur höchst selten bleiben aus ihnen niedergeschlagene Salzbasen unaufgelöst zurück]. Schwacher Weingeist, Wein, (auch schon starkes Bier), löst sie fast vollkommen auf. Auch Säuren [so Essig.

— Concentrirte Mineralsäuren, ihrer gewöhnlich zersetzenden Wirkung wegen, ausgeschlossen; *Liq. Ammon. acet.* und *Liq. Kali acet.* lösen sie etwas vollkommener auf, als es das Wasser thut, und werden deshalb häufig als Auflösungsmittel angewendet. Öfters bedient man sich namentlich des Essigs, um die Gummiharze, besonders die 4 sogenannten *Gummata ferulacea* (*Ammoniac.*, *Asa foet.*, *Galban.* u. *Sagapen.*) in verschiedene Gestalten zu bringen, indem man sie durch einen grössern oder geringern Zusatz von Essig bald ganz flüssig darstellen, bald nur bis zu einem gewissen Grade erweichen (und so zum Liniement, zum Kataplasma, zur Salbe oder zum Pflaster machen), lässt. (Vgl. namentlich *Ammoniac. depur.*) Die unvollkommenen und deshalb trüben, milchigen, Auflösungen der Gummiharze müssen vor der Anwendung jedesmal umgeschüttelt werden. — Die Gummiharze sind sämmtlich, Myrrhe ausgenommen, schmelzbar, *Oliban.*, *Euphorb.* und *Gutti* jedoch nur unvollkommen. — Man hat im Allgemeinen die Verbindungen mit concentrirten Mineralsäuren [besonders Salpeter-, Schwefel-, Salz-Säure], Salzbildern, kaustischen Alkalien [mit denen ihre harzigen Bestandtheile seifenartige, in Wasser auflöbliche Verbindungen eingehen, was oft die Wirkung, wenn auch nicht schwächen, doch verändern dürfte], mehreren Metallsalzen [namentlich salzs. Gold, salpeters. Silber u. Quecksilber, Sublimat, *Cupr. sulphurico-ammoniat.*, essigs. Blei, Chloreisen] zu vermeiden.

Sie werden im Allgemeinen [nicht alle einzelnen] in folgenden Formen angewandt:

1. In Pulver lassen sich die meisten nur schwer verwandeln und das Pulver backt gern, besonders in der Wärme, wieder zusammen [namentlich sind die *Gmm. ferulacea* nur in der Winterkälte spröde genug, um gepulvert werden zu können (welche Operation mit dem vorgeschriebenen Reingen derselben zusammenfällt), und schon gepulvert backen sie bei der Aufbewahrung allmählig wieder zu Klumpen zusammen, so dass der Apotheker, um sie zu Arzneiformen zu verarbeiten, sie erst noch einmal im Mörser zerreiben muss (wir führen sie deshalb in Pillen- u. andern Formeln gewöhnlich zuerat auf, weil der Apotheker sie zuerst zerreiben muss, ehe er sie mit den andern Ingredientien verbindet)]. Immer ist das Pulver unangenehm einzunehmen. Man wendet deshalb die *Gummata ferulacea* nie, die übrigen nur selten in dieser Form, innerlich oder äusserlich, an, und dann nicht pur [vgl. I. S. 206, d. Tabelle u. sub 3.], lässt auch das Pulver vor Sonnen- u. Ofen-Wärme hüten.

2. In Trochisken (die dann nicht gedörft werden dürfen) nimmt man nur etwa die Myrrhe gern auf, weil die meisten anderen zu schlecht schmecken.

3. Zu Pillen oder Bissen — der beliebtesten Darreichungsform — können die Gummiharze schon mit einer Kleinigkeit Weingeist, derselben od. dgl. verarbeitet werden [vgl. I. S. 243]; es ist jedoch

meist rathsam [vgl. I. S. 245 sub 5.], noch etwas Seife oder etwas Pulver und Extract zu Hülfe zu nehmen. Wenn man sie mit anderen, an Quantität überwiegenden Mitteln in Pillen aufnimmt, können sie bei der Constitution der Masse meist ausser Rechnung bleiben [I. S. 244 sub 3.].

4. In Latwergen giebt man sie [theils des üblen Geschmacks, theils, namentlich die heftiger wirkenden, der Unbestimmtheit der Dose wegen] nicht gern [die *Gmm. ferulacea* würde man zu dem Ende mit Schleim oder Eigelb subigiren oder wenigstens mit der gleichen Menge Wasser zu einem dünnen Brei verreiben lassen; die übrigen kann man gepulvert zu der Latwerge setzen].

5. In Pflastern. Die *Gummata ferulacea* haben geschmolzen Pflasterconsistenz, die zwar etwas steif ist; man lässt sie jedoch nicht gern, weder für sich, noch mit andern schmelzbaren Stoffen in Verbindung, bloss durch Schmelzen zur Pflastermasse machen, weil sie durch die alsdann nöthige beträchtliche Hitze zu viel von ihrem ätherischen Öl verlieren, und weil sie sich auch auf diese Weise minder gleichförmig vertheilen würden; vielmehr nimmt man immer ein flüssiges Erweichungsmittel, meistens Terpenthin oder Essig, zu Hülfe; auch bringt man sie, falls sie nicht hauptsächlich oder ausschliesslich die Grundlage der zu bildenden Pflastermasse ausmachen, gern erst — etwa mit Terpenthin unter gelinder Erwärmung erweicht — in die bereits halb erkaltete Pflastermasse hinein [vgl. I. S. 263]. — Den spröderen, *Euphorbium* u. *Olibanum*, muss man noch etwas Weiches oder Flüssiges [die passendste Quantität v. I. S. 259] zusetzen, falls man sie zum Pflaster schmelzen will; in der Regel nimmt man sie jedoch nur in untergeordneter Quantität [nicht über das I. S. 260 in der Tabelle angegebene Verhältniss hinaus] in eine Pflastermasse auf, und setzt sie dann am zweckmässigsten gepulvert der bereits halb erkalteten Masse zu. *Myrrha* wird bloss auf die letztere Weise aufgenommen.

6. In Salben, selten; namentlich nicht gern in Einreibesalben [I. S. 277 sub 3.]. Die spröderen Gummiharze verbindet man gepulvert mit wenigstens 2 Theilen einer Salbengrundlage von normaler Consistenz. Den *Gmm. ferulaceis* kann man eine salbenähnliche Consistenz durch Subigiren mit Eigelb, oder durch Mischen mit Essig oder Terpenthin in gelinder Wärme, geben.

7. In Kataplasmen: nur etwa *Ammoniac.* oder *Galban. depur.* [mit Essig in gelinder Wärme erweicht].

8. In flüssiger Form, entweder in einem der oben angegebenen Menstrua aufgelöst oder mit wässerigen Flüssigkeiten emulgirt [nicht ohne Zusatz eines Emulgens (I. S. 177), falls die Emulsion nicht etwa auf Einmal verbraucht werden soll]. Doch wendet man die Gummiharze,

namentlich innerlich, nur selten in flüssiger Form an [theils des üblen Geschmacks, theils der heftigeren Wirkung wegen], eher schon äusserlich zu Klystieren, Injectionen u. dgl. Zu Linimenten sind sie, obwohl man sie durch Erweichen mit Essig leicht dazu machen kann, nicht besonders geeignet [I. S. 372].

9. In Räucherungen [I. S. 386 sub 2.], wozu man sie in Species-Form aus der Apotheke kommen lässt.

Gutti. Gummi Guttae. Gummigutt. [1 Unze 6 $\frac{1}{2}$, gr. pulv. 8 $\frac{1}{2}$ Sgr.; 1 Drachme sub. pulv. 1 $\frac{1}{2}$ Sgr.] Vgl. *Gummiresinae*.

Innerl. (*ad Grana quatuor!*) als Reizmittel zu Gr. $\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{2}$ alle 3–2 St.; als gelindes Purgans Gr. 2–3 einigemal tägl.; als Drasticum (nur noch gegen den Bandwurm oder dann u. wann einmal bei Geisteskranken gebräuchlich) zu Scr. $\frac{1}{4}$ –1 auf Ein Mal oder in einem Paar Portionen rasch hinter einander. — In Pulver [schmeckt sehr widrig, färbt auch das Wasser, womit man es anrührt, gelb], Pillen [R_x 449, 450; 345 (*Extr. Aloës Ac. sulph. corr.*), 904 (*Rad. Scill.*)], Bissen, Latwerge [nicht gern, des üblen Geschmacks, der hier besonders unangenehmen Farbe und der Unbestimmtheit der Dose wegen. — MATTHIEU's Bandwurmcure: s. R_x 990.], Auflösungen u. Emulsionen [man vermeidet auch die flüssige Form des üblen Geschmacks und der Farbe wegen in der Regel; doch hat man es wohl in Essig, Sauerhonig, *Liq. Ammon. acet.*, *Liq. Kali carb.* u. dgl. (unvollkommen) aufgelöst gegeben (auch sonst oft in der flüssigen Form in Verbindung mit *Kali carbon.*); am erträglichsten ist es vielleicht noch in einer Emulsion].

Eine Anzahl älterer, jetzt entbehrlichen Bandwurmcuren, in denen das Gummigutt eine Hauptrolle spielt, — von BECK, HERRENSCHWAND, Madame NUYFEN, WAGELER u. CLOSSIUS, KORTUM u. A., findet, wer sich dafür interessiert, gesammelt in G. A. RICHTER *Arzneimittell.* Bd. 2. S. 356, 357, Bd. 3. S. 160, 161; oder in BREMSER *üb. lebende Würmer*, S. 172 ff.

449.

R_x *Gutti pulv.*

Rad. Scillae pulv. ana Gr. 12

Sapon. medic. Dr. 1

Spir. Vini rfi. q. s.

ut f. *Pilulae* 48. *Consp. Pulv. Cass. cinnam. D. S.* 4mal tägl. 28stück.

450.

Kar gegen den Bandwurm von Dr. C. A. SCHMIDT in Berlin.

Man lässt von des Morgens an bis Abends 7 Uhr 2 stündl. 2 Essl. (das erstemal nüchtern) von folgender Mixtur nehmen (u. schwarzen Kaffee mit vielem Zucker od. Syrup nachtrinken):

a.

R_x *Rad. Valer. min. Dr. 6*

Fol. Sennae Dr. 2

inf. Aq. comm. ferv. q. s. ad Colat. Unc. 6,
in qua solve

Natri sulphur. dep. cryst. Dr. 3

Elaeos. Tanacetii Dr. 2

et adde

Syr. Marmae Unc. 2.

M. D. —

Zum Mittagbrod eine dünne Mehlsuppe und einige Stücke Häring mit der Häringssmilch. — Abends um 8 Uhr einen Häringssalat (ohne Kartoffeln) mit gebacktem rohen Schinken, einer Zwiebel, recht vielem Oel, und einer Portion Zuk-

ker. — Zum Getränk den Tag über Zuckerwasser.

Am folgenden Tage, von 6 Uhr Morgens an, folgende Pillen:

b.

Ry *Asae foetid. depur.* Gr. 45

Polv. Gutti

— *Rad. Rhei*

— — *Jalap. ana* Dr. $\frac{1}{2}$

— — *Ipecacuanh.*

— *Hb. Digitalis*

Sulph. stibiat. aurant. ana Gr. 2 $\frac{1}{2}$

Hydrarg. muriat. mit. Scr. $\frac{1}{2}$

Ol. Tanacet.

— *Anisi ana* Gtt. 4

Extr. Gramin. liq. Gr. 45.

M. f. l. a. Pilulae pond. Gr. 2. [bes-
per: *Extr. Gram. liq. q. s.* und 100
Pillen]. *Consp. Sem. Lycop. D. in vitro.*
S. Stündl. 6 Pillen mit 1 Theelöffel ge-
meinen Syrups. (In der Zwischenzeit
schwarzer Kaffee mit vielem Zucker od.
Syrup.) Um 6 $\frac{1}{2}$ Uhr 1 Essl. *Ol. Ricini.*

Gegen Mittag etwas Fleischbrühe.

Bis 2 od. 3 Uhr Nachmittags geht
in der Regel der Wurm ab; wo nicht, so
gibt man noch einige Dosen Ricinus-Öl,
bis er abgegangen ist; mit den Pillen hört
man auf.

Abends eine Fleischsuppe oder eine
Mehlsuppe mit frischer Butter u. Zucker.

Am folgenden Tage können zur Vor-
sorge, „damit kein Wurmeest zurück-
bleibe“, noch einige Pillen genommen
werden. — Um etwaige Rückfälle zu
verhüten (die besonders entstehen, wenn
der Kranke obige Vorschriften nicht
streng befolgt oder die Arznei häufig
wieder ausbricht), lässt man den Kran-
ken noch öfters Häringssalat und rohen
geriebenen Meerrettig mit Essig u. vie-
lem Zucker genießen, auch können noch
alle 3 Tage einige Dosen von den Pillen
genommen werden. — Zur Nachkur ei-
ne stärkende Diät (Bouillon, Eigelb,
Wein) und ein bitteres Mittel.

Wo man von der Anwesenheit eines
Bandwurms nicht (durch Abgang von
Stücken) ganz sicher überzeugt ist, be-
diene man sich folgender Probe-Vorcur.
Nachdem der Kranke den Tag zuvor
Mittags nichts als Mehlsuppe, Abends
einen Häringssalat von der beschriebe-
nen Art, u. zum Getränk Zuckerwasser
genossen, nimmt er des Morgens nüchtern
folgendes Pulver (u. trinkt schwarzen
Kaffee mit vielem Zucker od. Syrup, oder
recht fette Fleischbrühe nach):

c.

Ry *Hydrarg. muriat. mitis.*

Gutti ana Gr. 6

Sem. Cinnae Scr. $\frac{1}{2}$

Rad. Jalap. Gr. 15

Elaeos. Tanacet. Dr. 1.

M. f. Pulv. D. —

Mittags Mehlsuppe, Abends Häringssa-
lat, zum Getränk Zuckerwasser — wie
am vorigen Tage. — Selten geht schon
auf dies Probepulver der Bandwurm
vollständig ab, worauf man dann so-
gleich die obigen Pillen stündlich mit
Syrup nachnehmen lässt, um, falls noch
mehr Bandwürmer zugegen seyn sollten;
auch diese abzutreiben; meistens gehen
nur unter reichlichen Darmausleerungen
einzelne Glieder ab, worauf man dann
sogleich am folgenden Tage die eigent-
liche Kur beginnt.

Contraindicirt ist die ganze Kur-
methode bei Alterschwäche, Schwan-
gerschaft, kurz vor u. kurz nach der Men-
struation, bei Entzündungen, Schwind-
suchten u. Abzehrungen aller Art, bei
fließenden Hämorrhoiden, Bluthusten. —
Bei jugendlichen Individuen verhältniss-
mässig kleinere Dosen.

(Das Mittel hat sich bei der amtlichen
Prüfung im Charité-Krankenhaus zu
Berlin, und anderweitig als sicher und
gefahrlos vielfältig bewährt, und die
Vorschrift ist vom preuss. Staat erkauf-
t worden.)

+ *Helices Pomatiae.* [Unrichtig: *Limaces.*] Weinbergs-

od. Garten-Schnecken. [Hauptbestandtheile: Thierschleim, Osmaxom u. Gallerte.] *Cave* Säuren; Salzbilder; Metallsalze; Gerbstoff.

Innerl. [in Substanz zu ekelhaft] hauptsächlich in Abkochung [vgl. l. 8. 322 und die Kochbücher. Die PH. HANN. giebt zwar die Vorschrift zu einem *Decoct. Helicum Pomat. compositum* (oder *Lac asinum & artificale*; — 6 Schnecken, geraspelt, Hirschhorn u. Perigranpen ana Dr. 3, mit Wasser L. 2 auf L. 1 eingekocht, zur Colat. † *Syr. Capill. Ven. Unc. 1*), welches eßlöffelweise, oder auch zu 1 Tasse früh und Abends, mit eben so viel Milch, gebraucht werden soll; doch ist dies ziemlich theuer (12 Unzen 12 Mgr.) und weniger angenehm als ein im Hause bereitetes]. Die PH. SLESV. läßt aus dem Saft der zerschnittenen Schnecken mit *Gm. Mim.* u. Zucker eine *Pasta Helicum* (s. *Limacum*) [1 Unze 8 Schl.] bereiten [davon etwa Unc. 1-1½ in Unc. 6 eines aromat. Wassers aufgelöst, stündl. 1 Essl.].

Helminthochortos. *Corallina Corsicana*. Wurmmoos.

Korsikanisches Moos. [Hauptbestandtheile: thierisch-schleimige Substanz, Moosstärke (?), Iodmetalle u. Meersalze. — 1 Unze 1½, *subt. pulv.* 2½ Sgr.]

Cave: man giebt es in der Regel nur mit vegetabil. Substanzen, doch zuweilen mit Eisensalzen, wodurch aber der Auszug dunkelbraun, unter Abscheidung von Flocken, gefärbt wird.

Innerl. zu Scr. 1-Dr. 1, mehrmals tägl.; in Pulver, Latwerge, Aufguss [wässrigem od. weinigem. — Ry 451], Decoct [etwa Unc. 1 mit Unc. 10 auf Unc. 8, 2stündl. 2 Essl. oder ½ Tasse. (Nicht concentrirt, damit es nicht unvollkommen gelatinisire.) — Ry 452; 751 b.], Gallerte [vgl. l. 8. 286. Da jedoch das Wurmmoos der Officinen in seiner Mischung aus verschiedenen Algen und demnach auch in seinem Gallertgehalt merklich variiert, so setzt man wohl, um sicherer eine gute Consistenz zu treffen, einen andern gallertgebenden Stoff, namentlich oft Hausenblase, dazu. — Ry 453, 454; 840 (*Rad. Filic.*)].

Ausserl. zu Klystieren [Dr. 2 mit *Rad. Valer. min.* und *Sem. Cinac* infundirt; FLEISCH gegen Askariden der Kinder].

451.

Ry *Helminthochorti* Unc. 1

Vini Rhenani Unc. 7.

Digere leni cal. per 8 horas; Colat.

refriger. adde

Tinct. Sennae Unc. 1

Syr. Cort. Aurant. Unc. ½.

M. D. S. In einem Tage auf 3mal zu verbrauchen. BALDINGER.

452.

Ry *Helminthochorti* Dr. 1

Aq. comm. bullient. Unc. 4.

Ebulliant per 10 minutos; Colat. re-

friger. adde

Aq. Flor. Aurant. Unc. ½

Syr. Succ. Citri Unc. 1.

M. D. S. Des Morgens nüchtern eßlöffelweise (oder auf Ein Mal) zu nehmen. (DE MONTMAHOU.

453.

Ry *Helminthochorti* Unc. 1

Ichthyocollae Dr. ½

coque c. Aq. comm. Unc. 10 *ad Colat.* Unc. 4, *in qua statim coles*

Sacch. albiss. Unc. 1.

Repone in loco frigido, ut in Gelati-

nam abeat. D. S. Theelöffelweise. (Für Kinder.)

BUNDELIN.

Unc. 3; hanc evapora ad reman. Unc. 2; tunc statim admisce

Elaeosacch. Amygdal. amar. (Gtt. 2) Unc. 1

454.

Ry *Helminthochorti* Unc. 1

Ichthyocolae Dr. $\frac{1}{2}$

coque c. Aq; comm. Unc. 9 ad Colat.

Fini Gallici albi Unc. 2.

Repone etc. D. in pyxide alba. S. 4mal
tägl. 1 Essl.

HERBAE. Kräuter. — Hier nur einige abgerissene Bemerkungen über die (hauptsächlich durch äther. Öl wirkenden) aromatischen Kräuter, vorzugsweise für die aus der natürlichen Pflanzenfamilie der Labiaten [*Hb. Basil., Heder. terr., Hyssop., Majoran., Mari veri, Marrub., Meliss., Ment. crisp. u. pip., Origani cret. u. vulg., Puleg., Rorismar., Salviae, Saturej., Scordii, Serpylli, Thymi*; — nebst *Flor. Lavandul.*], zum Theil jedoch auch für *Flor. Chamom. vulg. u. Roman., Sambuci, Tillae* (hauptsächlich nur frisch), u. a. geltend.

Man giebt [von der diätetischen Benutzung einiger derselben abgesehen] diese Mittel selten in Pulverform, namentlich fast nie so in acuten Krankheiten, weil ihre flüchtige Wirkung auf diese Weise weniger hervortritt; meistens vielmehr im warmen wässerigen Aufguss oder auch wohl in einem weinigen, oder — namentlich für die äussere Anwendung — einem geistigen. Kleinere und concentrirtere Aufgüsse derselben benutzt man innerlich meistens nur als adjuvirende Vehikel andrer Arzneien: Unc. $\frac{1}{2}$ - 1 auf Unc. 6 - 8, esslöffelweise. Will man dagegen die Wirkung dieser Mittel allein haben, so verordnet man sie am häufigsten als Theeaufguss: ein Paar Drachmen auf ein Paar Tassen. — Abkochen wäre bei diesen Kräutern unpassend, würde das äther. Öl vertreiben; wo es [wie z. B. öfters bei *Hb. Marrub., Heder. terrestr.*] darauf ankommt, neben dem äther. Öl auch ihre extractiven Stoffe in reichlicherem Maasse auszuziehen, wähle man den Digestionsaufguss.

Über die Auswahl unter ihnen für die äusserliche Anwendung von trockener aromatischer Wärme (Kräuterkissen p. p.) s. I. S. 199. Für die Anwendung von feuchter arom. Wärme mag man ähnlich wählen. — Zu Cataplasmen passen nur selten aromatische Ingredientien oder Zusätze, und es ersetzen dann wohl die Kamillenblumen alle andern Mittel der Art vollkommen. — Zu einem aromatischen Bade nimmt man in der Regel L. 2-3 (u. mehr) von diesen Kräutern (von Kamillenblumen des widerlichen Geruchs wegen meist weniger). Bei den jetzigen wohlfeilen Preisen vieler äther. Öle wird man jedoch in der Regel wohl thun, statt der aromatischen Kräuter lieber geistige Auflösungen jener Öle, als Badespiri-

tus, anzuwenden, ansgenommen bei Leuten, welche sich [s. unten] die Kräuter selbst einsammeln können. — Zu aromatischen Dampfbädern, allgemeinen od. örtlichen, machen Flieder- und Kamillen-Blumen meist alle andern entbehrlich. —

Arme können sich, namentlich wenn sie den Gebrauch aromatischer Bäder eine Zeit lang fortsetzen sollen, im Sommer *Hb. Serpylli*, *Scordii*, *Orig. vulg.*, die einheimischen *Mentha*-Arten [bei denen eine Verwechslung der Arten hier nicht schaden kann], so wie auch die oft gleichzeitig und zu gleichem Zweck verordneten Wurzeln von *Calamus* u. *Angelica*, selbst einsammeln, wenn der Arzt Botaniker genug ist, ihnen dazu die nöthige Anweisung zu geben; oder können *Hb. Thymi*, *Majoran.*, *Rorismar.*, † *Saturej.*, *Basil.*, *Meliss.*, *Hys-sopi*, *Salv.*, *Flor. Lavand.*, vom Gärtner entnehmen.

**Herba Abrotani.* Eberraute. Stabwurz; Citronenkraut; Citronelle; Gürtelkraut. [Hauptbestandtheile: äther. Öl, Bitterstoff u. Gerbstoff. — 1 Unze conc. $1\frac{1}{3}$, sub. pulv. $2\frac{1}{4}$ Sgr.] *Cave* besonders Metallsalze.

Innerl. zu Scr. 1–2, mehrmals tägl., in Pulver u. pulveraufnehmenden Formen; in Aufguss [tägl. Unc. $\frac{1}{2}$ –1 auf Unc. 6–8; auch in wenigem Aufguss].

Äusserl. [sehr entbehrlich] zu Klystieren [wie *Sem. Cinnae*], zu trocknen oder [mit Wasser, Wein, Weingeist infundirt] feuchten Umschlägen etc.

Herba Absinthii. Wermuth. Wurmtod. [Hauptbestandtheile: äther. Öl, bitterer Extractivstoff, wenig Gerbstoff, auch Kali- und Natron-Salze. — 1 Unze conc. $\frac{5}{8}$, gr. pulv. 1, sub. pulv. $1\frac{1}{8}$ Sgr.] *Cave* besonders Salzbilder, Metallsalze [zuweilen verbindet man wohl Eisensalze damit, doch nicht gern in flüssiger Form, welcher sie eine grünbraune Farbe unter Abscheidung von Flocken geben].

Innerl. zu Scr. 1–2 mehrmals tägl. in Pulver [selten, ausser etwa bei Wechselstiebern, wo auch wohl noch stärkere Gaben]; meist in Aufguss [tägl. Unc. $\frac{1}{2}$ –1 auf Unc. 6–8; auch wohl mit Wein infundirt oder — etwa in Verbindung mit *Bacc. Junip.*, bei Wassersucht — mit Bier. Der Digestionsaufguss extrahirt am vollständigsten alle Hauptbestandtheile. — *Infus. Absinth.* PH. MIL.: Unc. 1 mit 11 Unz. 1 St. digerirt, Colat. von 8 Unzen.], doch auch in Abkochung [wenn man mehr die Bitterkeit als das äther. Öl haben will; aber nur gelinde gekocht, etwa Unc. 1 mit Unc. 12 auf Unc. 8, 2stündl. 1–2 Essl.].

Äusserl. in Substanz zu Kräuterkissen, Kräuterbetten u. dgl. [wo man nur einer gelinderen aromatischen Wärme bedarf]; im Aufguss zu anthelminthischen Klystieren [wie *Sem. Cinnae*. —

Ry 404 (*Fel Tauri insp.*), zu Fomentationen, Verbandwässern [concentrirter als zum innerlichen Gebrauch; mit Wasser, Wein, Weingeist].

Herba Aconiti. Eisenhütlein. Sturmhutkraut.

[Hauptbestandtheile: ein scharfes flüchtiges Princip, ein Alkaloid (Aconitin) und etwas Gerbstoff. — 1 Unze conc. $1\frac{1}{2}$, sublt. pulv. $2\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave* [mit sanctionirten Ausnahmen, namentlich bei den Aconit-Extracten] Salzbilder; Metallsalze [besonders salzsaur. Gold, salpeters. Silber u. Quecksilber, Sublimat, Eisensalze]; Gerbstoff.

Innerl. zu Gr. 1-3 (u. allmählig mehr, bis zur Wirkung oder zu Erscheinungen von Narkose) einigemal tägl.; in Pulver [Ry 182 (*Calcar. sulphurata*)], Pillen [vgl. *Extr. Acon.*]. (Häufiger die Extracte u. Tincturen.)

Herba Althaeae s. Bismalvae. Eibischkraut; Altheenkraut; weisse Pappel, etc. [Hauptbestandtheil Schleim. — 1 Unze conc. $\frac{1}{4}$ Sgr.] In Aufguss od. Abkochung; seltener innerlich [Das Kraut ist weit weniger schleimig als die Wurzel; man kann die Auszüge doppelt, ja fast 3mal so concentrirt machen als bei dieser] als äusserl. [zu ähnlichen Zwecken, wie die Abkochungen der Wurzel, nur ebenfalls concentrirt].

Herba Arnicae. Wohlverleihkraut; Fallkraut. [Hauptbestandtheile (und *Cave*) wie bei *Flor. Arn.* — 1 Unze conc. 1 Sgr., sublt. pulv. $1\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. u. äusserl. wie *Flores Arnicae*, doch in etwas grösseren Gaben.

+ **Herba Asari cum Radice.** Haselwurzkraut mit Wurzel. Nur etwa zu Niesepulvern [*q. v.*].

***Herba Basilici.** Basilienkraut. [Hauptbestandtheile: Ether. Öl u. Gerbstoff. — 1 Unze conc. $2\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. [selten] in Pulver, zu Scr. 1-Dr. $\frac{1}{2}$ mehrmals tägl.; in Aufguss [wässrigem oder weinigem; Unc. $\frac{1}{2}$ -1 auf Unc. 6, eسلöffelweise; als Thee Dr. 2-4 auf 2 Tassen]. — Äusserl. zu Bädern [vgl. *Herbas*].

Herba Belladonnae. Tollkirschenblätter; Toll- od. Tollbeeren-Kraut; Wolfskirsche; Waldnachtschatten. [Hauptbestandtheil: Atropin (Alkaloid). — 1 Unze conc. $1\frac{1}{2}$, gr. pulv. $1\frac{1}{2}$, sublt. pulv. $1\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave* [mit sanction. Ausnahmen] Iod; Alkalien, besonders kaustische fixe; salzsaur. Gold, salpeters. Silber und Quecksilber, Sublimat, essigs. Blei; Gerbstoff; Thierkohle; Kochhitze.

Innerl. (*Pulvis ad Grana quatuor!*) zu Gr. 1-3 und allmählig mehr; 1-2mal tägl. [kleinere Gaben öfter zu reichen, ist in der Regel weniger zweckmässig, ausser etwa bei Kindern u. in manchen besonderen Fällen]. In Pulver [z. B. 4stündl. Gr. $\frac{1}{2}$ mit *Cort. Chip. reg.* Scr. 1: OSIANDER gegen hartnäckige Wechselieber; — einen Abend um den andern Gr. 5 mit *Rad. Rhei* Gr. 3: G. C. SIEBOLD gegen Gesichtsschmerz], Pillen, Aufguss [wässrigem oder wenigem; Scr. 1-2 auf Unc. 3, ein Paar Mal tägl. 1 Essl.; Kindern, für welche diese mildere Form oft die passendste, verhältnissmässig schwächer. — Ry 455].

Ausserl. als Rauchmittel [gegen *Asthma spasmodicum*; selten; etwa wie *Hb. Stramonii*], als Strenpulver [selten], auch endermatisch; zu Cataplasmen [selten; etwa wie *Hb. Conii macul.*, doch nicht pur, sondern nur als Zusatz]; infundirt oder [nur ganz kurz] ebullirt zu Klystieren [Gr. 15-20. — Klystiere von Dr. 1-2, wie sie z. B. FISCHER bei Ischurie, selbst von verhärteter Prostata, rühmt, scheinen doch sehr gewagt] u. a. Einspritzungen [z. B. für die Vagina (die indess auch, z. B. bei krampfhafter Rigidität des Mutterhalses, welche die Geburt erschwert, viel gesüßigere Einspritzungen erträgt) Ry 456], Augewässern [Zur Erweiterung der Pupille Behufe der Untersuchung des Auges oder (2 St. vorher lauwarm einzutropfen) der Staroperation Gr. 5-20 zur Colatur von Unc. $\frac{1}{2}$ infundirt. — Zu Augenbähungen Dr. $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$ auf Unc. 4; z. B. Dr. 1 auf Unc. 3 $\frac{1}{2}$, lauwarm überzuschlagen: v. GRÄVE bei heftigen u. schmerzhaften Blennorrhöen], Fomentationen [Scr. 1-Dr. 1 auf die Unze]. (Die frischen Blätter wohl zerquetscht als Umschlag.)

455.

Ry *Hb. Belladonn.* Gr. 24

Aq. comm. ferv. q. s.

Digere per $\frac{1}{2}$ hor.; liquorem adhuc calidum cola; Colat. refrigerat. Unc. 2 adde

Vini stibiat. Dr. 1

Syr. Senegae Dr. 6.

M. D. S. 3-4 mal tägl. $\frac{1}{2}$ Essl. (Bei Keuchhusten eines 10 jährigen Kindes.)

VOGT.

456.

Ry *Hb. Belladonn.* Dr. 1.

Ebulliat semel c. Aq. comm. q. s. ad Colat. L. 2, cui refriger. adde

Aq. Laurocer. Dr. 3.

M. D. S. 4mal tägl. einspritzen (in die Vagina als *Injectio contrastimulans* bei langsamer Entzündung des Uterus mit anfängender schleichenden Scirrhotät).

BRENA.

+ *Herba Borraginis.* Borretsch- od. Borasch-

Kraut. [Hauptbestandtheile: Schleim und salpetersaure u. a. Salze. — 1 Unze 2 Shl.] Innerl. in Aufguss oder leichter Abkochung [*ad lib.* — Ry 895 (*Rad. Sarsapar.*)], im Presssaft. Diätetisch als Salat.

**Herba Calendulae.* Ringelblumen- od. Todtenblumen-Kraut. [Das Kraut mit den noch unentwickelten Blumen. —

Hauptbestandtheile und *Cave* wie bei \dagger *Flores Calend.* — 1 Unze conc. $1\frac{1}{4}$, subtl. pulv. $1\frac{3}{4}$ Sgr.]

Innerl. zu Scr. 1-2 einigemal tägl.; in Pulver, Pillen [Ry 405 (*Ferr. oxydat. fusc.*)], Abkochung [STEIN (in Weinheim) verordnet es bei Hautkrebs (?) frisch, z. B. einem 2jährigen Kinde tägl. Unc. $\frac{1}{2}$ (allmählig bis Unc. $1\frac{1}{2}$), mit L. 1 Wasser oder Milch auf Unc. 8 gekocht (oder auch statt dessen eine aus dem frischen Saft bereitete Mellago, in einem aromat. Wasser gelöst, etc.); dabei eine aus dem frischen Saft mit Butter bereitete Salbe 1-2 mal tägl. mit Charpie auf das zuvor mit dem Decoct abgespülte Geschwür zu legen (bei zu heftigem Schmerz mehr Butter)].

Ausserl. in concentrirtem Aufguss oder Absud zu Umschlägen, Injectionen, u. s. w.

\dagger *Herba Capilli (Capillorum) Veneris.* Frauenhaar. [Hauptbestandtheile: Gerbstoff u. Bitterstoff. — 1 Unze conc. 2 Mgr.] Innerl. selten im Aufguss [*ad libit.*], meist nur der \dagger *Syrup. C. V.*

Herba Cardui benedicti. Cardobenediktenkraut. [Hauptbestandtheile: bitterer Extractivstoff, Kali- u. Kalk-Salze. — 1 Unze conc. 1 Sgr., subtl. pulv. $1\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave* Salzbilder; Alaun, salpetersaur. Silber u. Quecksilber, Sublimat, salzs. Gold, essigs. Blei, besonders Blausäure; in flüssiger Form auch Eisenoxydsalze.

Innerl. [wo jedoch häufiger das Extract] zu Scr. 1-2 mehrmals tägl., in Pulver u. pulveraufnehmenden Formen, in Aufguss u. Abkochung [die jedoch, namentlich die Abkochung, höchst widerlich schmecken, oft dadurch Brechen erregen; weshalb man sie in der Regel nur, wo man diese Eigenschaft benutzen will, also namentlich zur Unterstützung von Brechmitteln, anwendet, etwa Unc. $\frac{1}{2}$ mit 2-3 Tassen Wasser infundirt od. leicht abgekocht; vgl. *Rad. Ipecacuanh.*].

Ausserl. zu Visceralklystieren [etwa Unc. $\frac{1}{2}$ -1, infundirt od. leicht abgekocht. — Ry 935 (*Rad. Valer. min.*)].

Herba Centaurii minoris. Tausendgüldenkraut. Erdgalle. [Hauptbestandtheile: bitterer Extractivstoff und Salze. — 1 Unze conc. $1\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave* wie bei *Hb. Card. bened.*

Innerl. zu Scr. 1-2 einigemal tägl.; in Pulver [selten], Aufguss [Unc. $\frac{1}{2}$ -1, zur Geschmacksverbesserung etwa noch mit *Cardamom. min.* Scr. 1 (oder mit Wein oder Bier infundirt), auf Unc. 8, 2-4 mal tägl. $\frac{1}{2}$ Weinglas. — Ry 275 (*Cort. Cascar.*), 491 (*Hb. Trifol. fibr.*)] oder leichter Abkochung [in ähnlichem Verhältniss]. Im Frühsommer [Juni, Juli] den Presssaft [zu Unc. $\frac{1}{2}$ -2 tägl.].

Ausserl. nur noch zu Visceralklystieren [vgl. *Rad. Valer. min.* Ry 457].

457.

Ry *Hb. Centaurii minoris*
Rad. Graminis
 — *Saponariae*

Rad. Taraxaci ana Unc. 2.
Conc. M. f. Species. D. S. Den 8ten
 Theil mit 1 Pf. Wasser auf $\frac{1}{2}$ Pf. gekocht
 zum Klystier. KÄMPF.

**Herba Chaerophylli sylvestris.* Kälberkraut. Wilder Körbel. [1 Unze conc. $1\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. zu Gr. 5-15 u. mehr, einigemal tägl., in Pulver, Bissen, Aufguss.

Herba Chelidonii majoris. Schöllkraut. Schwalben-Kraut od. - Wurzel. Goldwurzel. [Hauptbestandtheile: ein scharfer flüchtiger Stoff (Chelidonin), scharfes Harz, bitterer Extractivstoff und Gerbstoff. — 1 Unze conc. $1\frac{1}{2}$ Sgr.]

Man benutzt in der Regel nur den Presssaft [vom April bis Juni; Dr. $\frac{1}{2}$ - 1 (u. allmählig mehr), 2mal tägl.; gewöhnlich mit andern Kräutersäften, oder auch mit Milch, Molken — Ry 978 (*Ser. Lact. dulce*) —, Schleim, mit Honig u. Wasser, oder (L. W. SACHS) mit süßem Wein verdünnt. — Ry 458. — Man benutzt ihn auch äusserl. bei asthenischen Augenkrankheiten stark verdünnt als Eintröpfung; zur Vertreibung von Warzen, Feigwarzen u. dgl. unverdünnt, u. s. w.].

458.

Ry *Succi rec. expr. Hb. Chelidon.* Dr. 1-2
 — — — — *Fumariae*
 — — — — *Taraxaci* ana
 Dr. 6 - Unc. 1.

Succos colatos et decantatos misce; addo
Aether. acet. Gtt. 10.
D. S. In einem Tage (umgeschüttelt)
 zu verbrauchen.

Herba Chenopodii ambrosiaci s. Botryos Mexicanae. Mexicanisches Traubenkraut; mexic. Gänsefuss; mexic. Thee. [Hauptbestandtheil: äther. Öl und (?) Salpeter; — 1 Unze conc. 2 Sgr.] Innerl. zu Scr. 1 - Dr. 1, 2-3mal tägl.; in Pulver; Latwerge [z. B. mit 4 Syr. *Flor. Aurant.*; zu 1-2 Theelöffeln. — Ry 231 (*Castor.*)], Aufguss [tägl. Unc. $\frac{1}{2}$ - 1 auf Unc. 6. Meist jedoch nur als Thee, Dr. 2-3 auf eben so viel Tassen]. — Selten äusserl. [I. 8. 199].

**Herba Clematidis erectae s. Flammulae Jovis.* Brennkraut. [Hauptbestandtheile: ein flüchtiger scharfer Stoff und Gerbstoff. — Frisch am kräftigsten. — 1 Unze conc. $1\frac{1}{2}$, sub. pulv. $1\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave* Metallsalze; Gerbstoff. — Innerl. im Aufguss [Dr. 1- $1\frac{1}{2}$ auf Unc. 6, 2stündl. 1-2 Essl.]. — Äusserl. als Streupulver oder im Aufguss. Das frische Kraut als blasenziehendes Mittel.

† *Herba Cichorei (agrestis s. sylvestris).* Wegwart-

kraut (wildes). [Hauptbestandtheil: bitterer Extractivstoff.] Selten im Prefsaft.

Herba Cochleariae. Löffelkraut. Löffelkresse. Scharbockskraut. [Hauptbestandtheil: ein scharfes äther. Öl. — 1 Unze conc. 28gr. — Nur frisch, im Frühjahr anzuwenden. Will ein Arzt es sich länger brauchbar erhalten, so kann er vom Apotheker eine Conserve mit 3 Theilen Zucker (wie sie in der PH. SLESV. — 1 Unze 4 Shl. — und AUSTR. officinell) anfertigen, diese aufbewahren lassen, und zu Unc. 4-8 tägl. verordnen (freilich theuer).]

Innerl. diätetisch auf Butterbrod oder als Salat; arzneilich infundirt [ein Paar Unzen auf den Tag; mit Wasser, Wein, Molken; warm oder kalt. — Ry 459, 460; 827 (Rad. Armorae.)], oder der Prefsaft [zu 1-3 Unzen tägl., entweder bloss mit Zucker versüßt, oder mit Wein, Molken, mit andern Prefsäften (z. B. von Brunnenkresse, Sauerampfer, Bachbungen, Meerrettig, bittern Kräutern), auch wohl mit Citronen- od. Pomeranzen-Saft (doch diesen nicht mit dem Prefsaft vermischt, sondern gesondert hinterdrein), p.p. — Ry 461].

Ausserl. bisweilen der Prefsaft [zum Befeuchten scorbutischer Geschwüre].

459.

Ry Hb. Cochlear. rec. conc. Unc. 2.

Sem. Sinapis cont. Unc. $\frac{1}{2}$

Fini Gallici albi L. 2.

Macera per biduum. Colat. addo

Spirit. muriat. aether. Dr. 2.

M. D. S. 3mal tägl. $\frac{1}{2}$ Weinglas. (Gegen Scorbut.) (SUNDELIN.)

460.

Ry Hb. rec. Cochlear.

† — — Nasturt. aquat.

— — Tarax. ana Unc. $\frac{1}{2}$

Seri Lactis dulcis bullient. L. 3.

Digere per horas 12. In Colat. solve

Sacch. albis. Unc. 2.

M. D. S. Den Tag über zu verbrauchen.
SCHUBARTH.

461.

Ry Succj rec. expr. Hb. Cochlear.

† — — — Nasturtii a-

quat.

† — — — Beccabung.

— — — Trijol. fibr.

ana Dr. 6.

Succos colatos et decantatos misce. D.

S. In einem Tage zu verbrauchen (mit etwas Rheinwein; als Unterstützungsmittel bei Scorbut).

Herba Conii maculati s. Cicutae (terrestris s. vulgaris). Erdschierlingskraut; gefleckter Schierling oder Schierling schlechtweg. [Hauptbestandtheile: Coniin (st-ähnliches Alkaloid), Extractivstoff, auch Kali-, Kalk- und Magnesia-Salze. — 1 Unze conc. 1 $\frac{1}{2}$, gr. pulv. 1 $\frac{1}{2}$, subf. pulv. 1 $\frac{3}{4}$ 8gr.] Cave [mit sanction. Ausnahmen] concentr. Mineralsäuren; Salzbilder; Alkalien; salzsaur. Gold, Sublimat, salpeters. Quecksilber und Silber, Bleisalze, Vitriole; Gerbstoff.

Innerl. zu Gr. 3-5, 2-3mal tägl., allmählig steigend, selbst

wohl bis zu Dr. $\frac{1}{2}$ auf die einzelne Gabe. In Pulver [Ry 559 (*Hydr. stibiato-sulph.*), 718 (*Natr. carbon. dep. sicc.*)], Pillen [vgl. *Exfr. Conii macul.*], Bissen [Ry 538 (*Hydrarg. muriat. mite*)], (nicht gern in Latwerge, der Unbestimmtheit der Dose wegen), Aufguss [selten, etwa Dr. 1-1 $\frac{1}{2}$ (später allmählig mehr) auf Unc. 3, 3mal tägl. 1 Essl.]. — Selten den Presssaft [im Frühjahr, zu 4-8 Tropfen (u. allmählig mehr) ein Paar Mal tägl., etwa mit andern Kräutersäften].

Ausserl. zu Räucherungen [i. §. 98.], Cataplasmen [man lasse diese in der Regel im Hause des Kranken — nicht durch Kochen, sondern nur durch Anrühren mit kochendem Wasser bereiten, oder falls man andere Dinge, z. B. Semmel, Mehl, kochen lässt, das Conium erst gegen Ende des Kochens, hinzufügen. — Ry 462, 463; 422, 423 (*Fol. Hyosc.*)], Salben [entbehrlich]; infundirt (oder allenfalls leicht abgekocht) zu Mund- u. Gurgelwässern [Ry 464; 504 (+ *Hydrarg. hydrocyan.*)], Klystieren [selten; etwa Scr. 1] u. a. Injektionen [z. B. für die Vagina Unc. $\frac{1}{2}$ -1 auf L. 1], Waschungen u. Bähungen [Ry 465], Bädern [selten; etwa Unc. 3-6].

462.

Ry *Fol. Malv. gross. pulv.* Unc. 2
coque c.

Lactis vaccini q. s.
sub finem coct. addendo

Hb. Conii macul. gross. pulv. Unc. $\frac{1}{2}$

+ *Butyri recentis* Unc. 1 $\frac{1}{2}$.

F. Cataplasma molle. D. S. Lauwarm
auf den Kopf zu legen. (Gegen Erb-
grind.) P. FRANK.

463.

Ry *Succi Dauci insp. crudi* L. $\frac{1}{2}$
Pulv. Hb. Conii macul. Unc. 1
Tinct. Opii croc. Dr. 1 $\frac{1}{2}$.

M. f. Cataplasma. D. —
Cataplasma ad Cancrum apertum
DISP. FULD.

464.

Ry *Sem. Hyoseyami* Dr. $\frac{1}{2}$

— *Papaveris* Dr. 1

Hb. Conii macul. Dr. 2.

C. C. M. D. — Mit einem Paar Tas-
sen Milch leicht abzukochen; von der
warmen Abkochung öfters etwas in den
Mund zu nehmen und wieder auszuspei-
en. (Bei rheumatischem Zahnschmerz.)

FISCHER.

465.

Ry *Fol. Nicotian.* Dr. 1

coque c. *Aq. comm. q. s. per* $\frac{1}{4}$ hor.,
sub fin. coct. addendo

Hb. Conii macul. Dr. 2,
ad Colat. Unc. 8. *D. S.* Zum Waschen.
(Bei Erbgrind eines Kindes.)

WENZEL.

Herba Digitalis (purpureae). Purpurfingerhuts-
kraut; rother Fingerhut. [Hauptbestandtheile: Digitalin (Alka-
loïd, leicht löslich in Säuren, aber durch Wasser daraus niedergeschlagen; des-
halb sind Essig-Auszüge der Digitalis beachtungswerth, aber ein Zusatz von Säure
zu einem wässerigen Digitalis-Auszug verwerflich. Durch Kochen leidet das
Alkaloïd.), bitterer Extractivstoff, Gallussäure. — 1 Unze conc. 1 $\frac{1}{8}$, gr. pulv.
1 $\frac{1}{3}$, sub. pulv. 1 $\frac{1}{2}$ Sgr.] **Cave** Salzbilder; empfindliche Metallsalze;
Gerbstoff [mit häufigen Ausnahmen, doch dann in flüssiger Form umzuschüt-
teln].

Innerl. (*Pulvis ad Grana quinque!*) zu Gr. $\frac{1}{2}$ - 2 und allmählig mehr [bei Geisteskrankheiten selbst wohl bis zu Scr. 1, einmal tägl.], 2 - 4 mal tägl. In Pulver [In dieser Form und in den sie aufnehmenden — Pillen, Bissen — namentlich bei Wassersuchten (z. B. bei hitziger Gehirnhöhlenwassersucht der Kinder 2stündl. $\frac{1}{8}$ Gran mit $\frac{1}{2}$ Gran Calomel: GÖLLIS) und bei Drüsenkrankheiten, Scrofeln, Kropf u. dgl. Da die Digitalis in dieser Form am leichtesten nachtheilig auf den Magen wirkt, so setzt man wohl, wo es erlaubt ist, etwas Aromatisches zu, bisweilen ein wenig Opium. — R_y 224 (*Carbo Spong.*), 379 (*Extr. Lactuc. vir.*), 533 (*Hydrarg. muriat. mite*), 567 (*Iodum*), 899, 901 (*Rad. Scill.*)], Pillen u. Bissen [R_y 466; 378 (*Extr. Hyosc.*), 450b. (*Gutti*), 691 (*Morphium acet.*), 860 (*Rad. Ipecac.*), 903, 904, 906 (*Rad. Scill.*)], Aufguss [vorzüglich bei organischen Herzkrankheiten und bei Lungenschwindsucht. — Scr. 1 - Dr. 1 auf Unc. 6, alle 2 St. 1 Essl. — CLARUS gegen Blutspen: *Extr. Ratanh.* Dr. $\frac{1}{2}$ - 1 in *Inf. Hb. Digit.* (Dr. $\frac{1}{2}$) Unc. 6, alle 3 St., umgeschüttelt, 1 Essl. — NEUMANN giebt bei Lungenschwindsucht in einem von inflammatorischen Erscheinungen, verdorbenem Magen, Durchfall u. s. w. freien Zeitraum von einem Aufguss von Dr. $\frac{1}{2}$ auf 6 Unzen stündl. 1 Essl., bis leichter Ekel, Druck im Halse, Flimmern vor den Augen entsteht, der Puls auffallend langsamer wird; dann eine Pause von 7 - 8 Tagen, u. darauf nach Umständen von Neuem. Vgl. HUFELAND *Journ.* Bd. 55. S. 58. — CLESS rühmt gegen *Delirium tremens* als sehr sicher einen Aufguss von Dr. $\frac{1}{2}$ (bei sehr stürmisch auftretender Krankheit Dr. 1) auf 6 Unzen mit 1 Unze Syrup, 2stündl. 2 Essl. — R_y 467 - 472; 211 (*Canthar.*), 613 (*Kali sulphuric. dep.*)], Abkochung [selten und nur, wenn man mehr die scharfe als die narkotische Wirkung wünscht; etwa Dr. $\frac{1}{2}$ - 2 mit Unc. 9 auf Unc. 6, esslöffelweise].

Ausserl. gepulvert zu iatraliptischen Einreibungen [Scr. 1, allmählig Dr. $\frac{1}{2}$, 12 St. lang in Speichel eingeweicht, und dies tägl., in 2 Portionen, in Unterleib und Schenkel eingerieben: CHRESTIEN bei Wassersucht], zweckmässiger wohl endermatisch [Gr. 2 u. mehr, vorsichtig steigend bis zu Scr. $\frac{1}{2}$ oder Scr. 1]; infundirt (nicht zweckmässig abgekocht) zu Bähungen [auf den Unterleib, als kräftiges Diureticum: TROUSSEAU], Waschungen [gegen chronische Hautkrankheiten]; infundirt oder (mit Fett oder anderen Flüssigkeiten) abgekocht, oder (das frische Kraut) ausgepresst, seltener bloss gepulvert, zu Linimenten u. Salben [Die PH. HASS. lässt Dr. 1 $\frac{1}{2}$ mit Fett Unc. 1 und Wasser q. s. (zweckmässiger wäre es, die Quantität zu bestimmen, vgl. I. S. 279) oder auch statt dessen Dr. 4 $\frac{1}{2}$ des frischen Krauts mit eben so viel Fett, aber ohne Wasser, — bis zur Verdampfung des Wassers kochen, dann coliren. — *Ungt. Digital.* PH. P. (1 Unze 2 $\frac{1}{2}$ Sgr.) besteht aus dem ausgepressten Saft des frischen Krauts mit Fett q. s. (d. h. etwa 4 Theilen). — R_y 473; 178 (*Calcar. muriat.*), 498 (*Hydr. ammon. mur.*), 777 (*Ol. Tereb.*)]. — Das frische Kraut zerquetscht als Breiumschlag bei Drüsenaffectionen; der ausgepresste Saft desselben zu Einreibungen oder [CLOQUET] zum Verband von Krebsgeschwüren.

466.

R_z Hb. Digital. pulv. Gr. 12
Ol. Junip. Baccar. Gr. 12
Extr. Levistici Dr. 1
Baccar. Junip. pulv. q. s.
ut f. Pilulas 60. Consp. Pulv. Cass.
cinnam. D. in vitro. S. 3mal tägl. 5.

467.

R_z Hb. Digital. Dr. 1
Aq. comm. ferv. q. s.
reponere ad refrigerat.; Colat. Unc. 6 adde
Tinct. aromat. Dr. 1.
M. D. S. 2stündl., umgeschüttelt, 1 Essl.
(Dabei 3 mal tägl. Rad. Scill. pulv.
Gr. 1. — Bei Wassersucht.)

HORN.

468.

R_z Hb. Digital. Gr. 16
Aq. comm. ferv. q. s.
reponere ad refrigerat.; Colat. Unc. 6 adde
Liq. Kali acet.
Syr. Alth. ana Unc. 1.
M. D. S. 2stündl. 1 Essl.

SUNDELIN.

469.

R_z Hb. Digital. Dr. $\frac{1}{2}$ - 1
Sem. Phellandr. Unc. $\frac{1}{2}$
Aq. comm. ferv. q. s.
reponere ad refrigerat.; Colat. Unc. 4 adde
Spir. nitrico-aeth. Dr. 1
Syr. Alth. Unc. $\frac{1}{2}$.
M. D. S. 2stündl. 1 Essl. (Bei pituitö-
ser Lungensucht.)

JAHN.

470.

R_z Infus. Hb. Digital. (Scr. 1) Unc. 5
fiat cum
Ammoniaci depur. Dr. 1
Gm. Mimos. pulv. Dr. 2

1. a. Emulsio, cui adde

Syr. Bals. Peruv. Unc. 1.

M. D. S. Umgeschüttelt 2stündl. 1 Essl.
LOCKSTAEDT.

471.

R_z Lichen. Island. ab amaritie libe-
rati Unc. 1 $\frac{1}{2}$
coque c. Aq. comm. Unc. 9 ad Colat.
Unc. 4, in qua statim solve
Sacchari albi pulv. Unc. 1.
Evapora leni cal., sub contin. agit.,
ad remanent. Unc. 4; statim admisce
Infus. Hb. Digital. (Scr. 1) Unc. 1.
Repone in loco frigido, ut in Gelati-
nam abeat. D. S. 2stündl. 2 Theelöff-
fel (u. mehr). LOCKSTAEDT.

472.

R_z Hb. Digital. Unc. $\frac{1}{2}$
Aceti Unc. 4.
Digere leni calore per nycthemerum.
In Colat. solve
Sacch. albiss. Unc. 5.
D. S. Zu 1 Theelöffel u. mehr auf die
Gabe.
(Oxysaccharum liquidum Hb. Digita-
lis von) MARTIUS.

473.

R_z Hb. Digital. Dr. 2
Aceti Unc. 1.
Coque sub contin. agit., ad consum-
tionem tertiae partis. Colaturam eva-
pora leni igne ad Extracti consisten-
tiam; adde
Hydrarg. muriat. mitis Scr. $\frac{1}{2}$
Ungt. Elemi Scr. 8.
M. f. Ungt. D. S. Auf Leinwand dick
aufgestrichen 2 mal tägl. überzulegen.
(Gegen chronische Drüsengeschwülste.)
SUNDELIN.

Herba Fumariae. Erdrauchkraut. Taubenkropf.

Wilde Raute. [Hauptbestandtheile: bitterer Extractivstoff, fumarsaurer Kalk und salzsaur. Kali. — 1 Unze conc. 1 Sgr.] Cave Salzbilder; salzs. Gold, Sublimat, salpeters. Quecksilber u. Silber, Bleisalze, schwefelsaure Salze; Gerbstoff. Auch nicht gern mit Säuren [namentlich

Schwefel- u. Weinstein-Säure], Alkalien.

Innerl. in Abkochung [Unc. $\frac{1}{2}$ - 1, $\frac{1}{4}$ St. lang gekocht, die Colatur von 8 Unzen 2stündl. zu 1 - 2 Essl. — Ry 474]; lieber noch den Presssaft [im Mai u. Juni, zu 2 - 4 Unzen tägl., mit andern Kräutersäften oder mit Molken u. a. w. — Ry 458 (Hb. *Chelidon. maj.*), 482 (Hb. *Millefol.*)].

Ausserl. zu Visceralklystieren [die Abkochung von Unc. 1 od. mehr; vgl. *Rad. Valer. min.*].

474.

Ry Hb. *Fumariae*
— c. *Florib. Millefolii*
Rad. Taraxaci
— *Saponariae*

Rad. Graminis ana Unc. 2.
Conc. M. f. Species. D. S. Zur Abkochung auf 10 Tage. (Ähnlich den *Spec. resolventes* PH. P., die aber ausserdem noch eben so viel *Rad. Rubiae* enthalten; — 1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr.)

† *Herba Galeopsidis grandiflorae cum Floribus s. Galeops. ochroleucae.* Gelber od. grossblüthiger Hohlzahn. Liebersche Brust- od. Auszehrungs-Kräuter. Blankenheimer Thee. [Hauptbestandtheile: ein reizendes bitterliches Harz, bitterer Extractivstoff, Gerbstoff; auch Kali- u. Kalk-Salze. — 1 Unze 2 Shl.] Innerl. in Aufguss oder leichter Abkochung, zu Unc. $\frac{1}{2}$ - 1 auf den Tag [bisweilen mit Zusatz von etwas Milch. — Mit *Rad. Alth.* ana Dr. 2, *Rad. Glycyrrh. glabr.* Dr. $\frac{1}{2}$, mit L. $1\frac{1}{2}$ Wasser leicht abgekocht, tägl. zu verbrauchen: RADIUS gegen chronische Brustkatarrhe, dieselbst schon an Schleim-schwindsucht grenzen, Riterauswurf von Erweichung einzelner Lungenknoten].

† *Herba Genistae. Cacumina Spartii.* Pfriemenkraut. Besenginster. [Von *Spartium scoparium* L., nicht mit den von MAROCHETTI bei Hundebiss empfohlenen *Summitates Genistae tinctoriae* zu verwechseln. — 1 Unze 2 Shl.] Innerl. in Abkochung. [Oder auch nach älteren Ärzten die Asche des Krauts zu Scr. 1, steigend bis zu Scr. 4, 3mal tägl. Oder L. 1 der Asche und Dr. $\frac{1}{2}$ der Blätter mit L. 2 Rheinwein übergossen, davon 3mal tägl. 4 Unzen: SYDENHAM.] (Obsolet.)

Herba Gratiolae. Gottesgnaden-, Gnaden- od. Purgir-Kraut. Wilder Aurin. Wildaurin. [Hauptbestandtheil: ein scharfes, bitteres Weichharz, Kali-, Kalk- u. Natron-Salze. — 1 Unze *conc.* $1\frac{1}{2}$, *subt. pulv.* $1\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave* Gerbstoff.

Innerl. zu Gr. 2 - 4 u. steigend mehr, einigemal tägl., bis vermehrte Darmausleerungen eintreten; als Purgans ist wenigstens Scr. $\frac{1}{2}$ - 1 erforderlich, bei Geisteskranken reicht bisweilen Dr. $\frac{1}{2}$ - 1 kaum hin. [Überhaupt ist die Dose unsicher, vgl. I. S. 82.] — In Pulver [so namentlich zur Erzeugung der stärkern drastischen Wirkung], Pillen [vgl. *Extr. Gratiol.*], Abkochung [Dr. 1 - 4 mit Unc. 12 auf Unc. 8, 2stündl. 1 Essl., gern mit etwas Aromatischem, etwas *Spir. sulph. aeth.*, oder noch mit ei-

nem Zusats von Salz u. s. w.] oder wenigem Aufguss [z. B. Dr. 1–4 mit L. 1 Rheinwein 24 St. digerirt, 2stündl. 2 Essl.].

Äusserl. abgekocht als Umschlag [gegen chronische Geschwüre, Hautausschläge], als Klystier [Dr. $\frac{1}{2}$ –1 (für einen Geisteskranken noch mehr) mit Unc. 12 auf Unc. 8 gekocht; wenn es anthelminthisch wirken soll, etwa noch mit einem Paar Drachmen *Fel Tauri inspiss.*].

Herba Hederæ terrestris. Gundermannkraut. Gundelrüben. Gundelrebe. [Hauptbestandtheile: bitterer Extractivstoff, Gerbstoff, Arom. — 1 Unze conc. $1\frac{1}{8}$ Sgr.]

Innerl. zu Dr. $\frac{1}{2}$ einigemal tägl. In Pulver [selten], 'Aufguss' [Unc. $\frac{1}{2}$ –1 auf Unc. 6, esslöffelweise]. Conserve [PH. AUSTR.: 1 auf 3 Zucker; zu mehreren Unzen tägl.]. Im Frühling u. Frühsommer der Presssaft des frischen Krauts [unzenweise, mit andern Kräutersäften],

Äusserl. der Presssaft, oder auch die ganze (frische) Pflanze zerstoßen, zu Umschlägen auf den Kopf [nach englischen Ärzten bei Wahninn].

* ***Herba Hyperici.*** Johanniskraut [mit welchem Namen aber auch hier u. da *Aspidium Filix mas*, die Mutterpflanze der officinellen *Rad. Filicis*, belegt wird]. Nur noch das *Oleum coctum* gebräuchlich.

* ***Herba Hyssopi.*** Ysopkraut. [Hauptbestandtheile: äther. Öl und Gerbstoff. — 1 Unze conc. $1\frac{1}{8}$ Sgr.] Innerl. als Thee [Dr. 2–3 auf 2 Tassen]. — Äusserl. mit Wasser od. Wein infundirt zu Umschlägen u. s. w.

Herba Lactucæ virosæ. Giftlattigkraut. [Hauptbestandtheile: Lactacarium (s. den Art.), lactucasaure Salze und (?) Gallussäure.] **Cave:** salzs. Gold, Sublimat, salpeters. Quecksilber u. Silber, Eisen-, Blei- u. Kupfer-Salze; Gerbstoff. — Bis jetzt ist in der Regel bloss das Extract gebraucht worden.

Herba Ledi palustris s. Rosmarini sylvestris. Wilder Rosmarin. Porsch; Porst; Sumpfporst. [Hauptbestandtheile: äther. Öl und Gerbstoff. — 1 Unze conc. $1\frac{1}{8}$ Sgr.] Innerl. in Aufguss [Dr. 1–3 auf den Tag. — R_x 475, 476]. — Äusserl. ebenfalls in Aufguss, zu Bähungen, Waschungen, Gurgelwässern, Bädern.

475.

R_x Hb. Ledi pal. Dr. 2— Trifol. fibr. Unc. $\frac{1}{8}$

inf. Aq. comm. ferv. q. s. ad Colat. Unc. 6,

cui adde

Extr. Gramin. liq. Unc. 2.

M. D. S. 3 stündl. 1 Essl.

BUNDELIN.

476.

R₂ Rad. Ipecac. Gr. 4

Fol. Sennae Dr. 1

Hb. Ledi pal. Unc. 1

Aq. comm. ferv. q. s.

Digere per horam. In Colat. Unc. 4

solve

Sacch. albi Unc. 1

et post refrigerat. addo

Liq. Ammon. anis. Dr. 1.

M. D. S. Umgeschüttelt 2stündl. $\frac{1}{2}$ Recl.

(Gegen Keuchhusten.) BÜTTNER.

Herba Majoranae. Majoran. Mairan. [Hauptbestandtheile: äther. Öl und Gerbstoff. — 1 Unze conc. $1\frac{1}{2}$, gr. pulv. $1\frac{2}{3}$, sub. pulv. $1\frac{5}{8}$ Sgr.] Innerl. [ausser der diätetischen Anwendung] als Thee [Dr. 2-3 auf 2 Tassen]. — Äusserl. zu Niesepulvern [so zum officinellen Pulv. sternutator.], Kräutersäckchen [R₂ 227 (Caryophylli)]; infundirt [mit Wasser, Wein, Weingeist] zu Mund- u. Gurgelwässern, Klystieren [selten. — R₂ 479 (Hb. Menth. crisp.)], Umschlägen, Bädern [L. 2-3].

* **Herba Mari veri.** Amberkraut. Katzenkraut. [Hauptbestandtheile: äther. Öl, bitterer Extractivstoff, Gerbstoff. — 1 Unze conc. $3\frac{1}{2}$, sub. pulv. 4 Sgr.] Innerl. selten in Pulver od. pulveraufnehmenden Formen [Latwerge: R₂ 231 (Castor.)], meist im Aufguss [Unc. $\frac{1}{2}$ -1 auf Unc. 8, esslöffelweise; meist jedoch nur als Thee, Dr. 2 auf 2 Tassen. — R₂ 477]. — Äusserl. zu Niesepulvern [etwa das officinelle Pulv. sternutator. — Gegen Nasenpolypen pur, 3-5mal tägl. eine Prise: MAYER; doch sey man damit bei Neigung zu Congestionen nach dem Kopfe vorsichtig].

477.

R₂ Hb. Mari veri

— Marrubii

Hb. Melissa

— Menth. crisp. ana Unc. 1.

Conc. M. f. Species. D. S. Morgens u. Abends 1 Recl. zum Aufguss.

Herba Marrubii (albi). Weisses Andorn. [Hauptbestandtheile: Bitterstoff, äther. Öl, etwas Harz. Der wässrige Auszug wird durch Eisenoxydsalze ins Olivengrüne verdunkelt. — 1 Unze conc. 1 Sgr.] Innerl. im Aufguss [Unc. $\frac{1}{2}$ -1 auf Unc. 6, esslöffelweise; häufiger als Thee, Dr. 2-3 auf 2 Tassen. — R₂ 477 (Hb. Mari veri)]. Im Frühsommer [Juni bis August] der Presssaft des frischen Krauts [Unc. 1-2 tägl. mit Honig od. mit andern Kräutersäften]. — Äusserl. zu Visceralklystieren [Unc. $\frac{1}{2}$ -1; vgl. Rad. Valer. min.].

* **Herba Matricariae.** Mutterkraut. [Hauptbestandtheile: äther. Öl, bitterer Extractivstoff und (?) Gerbstoff. — 1 Unze conc. $1\frac{5}{8}$ Sgr.] Innerl. etwa wie Flor. Chamom. vulg.

Herba Meliloti citrinae cum Floribus. Meliloten-, Steinklee- od. Honigklee-Kraut. [Hauptbestand-

theile: äther. Öl, bitterer Extractivstoff, Benzoesäure. — 1 Unze conc. 1 Sgr.] Bisweilen noch infundirt oder (unpassend) abgekocht zu Bähungen, Cataplasmen, weniger passend zu trocknen Umschlägen. Meist nur als Zusatz zu anderen Mitteln.

Herba Melissae (citratæ). Melisse. Citronenmelisse. [Hauptbestandtheile: äther. Öl, Gerbestoff, Bitterstoff. — 1 Unze conc. 2½ Sgr.] Innerl. im Aufguss [Unc. ½ - 1 auf Unc. 6; häufiger als Thee, Dr. 2-4 auf 2 Tassen. — R_z 478; 421 (Fol. Aurant.), 477 (Hb. Mari veri)]. — Äusserl. wohl, infundirt, zu Umschlägen [offic. Spec. resolventes].

478.

R_z Hb. Melissae Unc. 2
Sem. Foeniculi Dr. 6
Rad. Glycyrrhizae Unc. ½.

C. C. M. f. Species. D. S. Zum Theeaufguss (als Vehikel für andere Arzneien).
Spec. pro Thea PH. P. (1 Unze 3½ Sgr.)

Herba Menthae crispæ. Krauseminze. [Hauptbestandtheile: äther. Öl und Gerbestoff. — 1 Unze conc. 1½, gr. pulv. 1½, sublt. pulv. 2 Sgr.] Innerl. in Pulver od. Latwerge [selten. Scr. 1-2 einigemal tägl.], als Thee [Dr. 2-4 auf 2 Tassen. — R_z 477 (Hb. Mari veri)]. — Äusserl. zu Kräuterkisschen; infundirt zu Klystieren [Unc. ½. — R_z 479. Vgl. Rad. Valer. min. und R_z 934], Umschlägen, Bädern [L. 2-3].

479.

R_z Hb. Menth. crisp.
— Majoran. ana Dr. 2
Sapon. domestici Dr. 1.

Conc. M. f. Species. Disp. tal. dos. nr. 4. D. S. 2mal tägl. eine Portion mit 2 Tassen Wasser angebrüht zum Klystier. (Bei Colica flatulenta.)

Herba Menthae piperitæ. Pfefferminze. [Hauptbestandtheile: äther. Öl u. Gerbestoff. — 1 Unze conc. 1½, gr. pulv. 1½, sublt. pulv. 2 Sgr.]

Innerl. zu Scr. 1-Dr. ½ einigemal tägl., in Pulver [selten. — 4mal tägl. Dr. ½ mit eben so viel Elaeos. Menth. pip.: WENDT bei Nervenlebern], Latwerge [R_z 228 (Cass. cinnam.)], Aufguss [Unc. ½ - 1 auf Unc. 6, esslöffelweise (Unc. ½ auf Unc. 8: Infus. Menth. pip. PH. MIL.); als Thee Dr. 2-3 auf 2 Tassen. — R_z 491 (Spec. amaræ PH. P.). Vgl. Rad. Valer. min.].

Äusserl. wie die vorige. [R_z 480.] — Den Presssaft, mit Honig vermischt, in die Nase einzubringen [bei üblem Geruch aus derselben: CLOQUET].

480.

R_z Sem. Amomi Unc. ½
Rad. Calami
Hb. Rorismarini ana Unc. 3

Hb. Menthae piperit. L. ½.
C. C. M. f. Species. Disp. tal. dos. nr. 3. D. — Zu 3 Bädern.

LOCKSTAEDT.

bei der vorigen.)) Wie die vorige [und ihr vielleicht, namentlich bei Lungen-
sucht, vorzuziehen, weil sie weniger bitter, vermuthlich aber mehr expectorirend
ist; auch sind wohl, ohne dass die Ärzte es glaubten, durch Arten-Verwechslung,
mehr Resultate von der *Polyg. vulgar.* als von der *amara* erhalten worden].

† *Herba Pulegii.* Poley; Poleyminze; Floh-
kraut. [1 Unze 1 Sgr.] Innerl. und äusserl. wie *Hb. Menth.*
pip. [Hauptbestandtheile dieselben]; auch wohl innerl. der Presssaft
[im Frühsommer; eßlöffelweise gegen Keuchhusten]. In die Betten gelegt ge-
gen Fäulnis.

* *Herba Pulsatillae (nigricantis s. minoris).* Schwar-
ze od. Wiesen-Küchenschelle. [Hauptbestandtheile: Pulsatillen-
saurem (brennend scharf) und Gerbstoff. — Nur frisch eingesammelt, im Früh-
jahr, wirksam; doch wendet man überhaupt lieber das in seiner Wirkung mehr
gleichbleibende Extract, das freilich an Schärfe weit ärmer ist als das frische
Kraut, an. — 1 Unze conc. 1 $\frac{1}{8}$, sublt. pulv. 1 $\frac{3}{4}$ Sgr.] Cave Salzbilder; emp-
findliche Metallsalze; Gerbstoff.

Innerl. zu Gr. 5–10 u. mehr, einigemal tägl. In Pulver,
Pillen, Aufguss [wässrigem od. weinigem. R_x 483].

Äusserl. [selten] im Aufguss zu Augewässern [etwa
Dr. $\frac{1}{2}$ –1 auf die Unze].

483.

R_x *Hb. Pulsatill.* Dr. 1–3*Vini Gallici albi q. s.**Digere per hor. Colat. Unc. 8 refriger.*
*adde**Syr. Cinnam. Unc. 1**Aether. acet. Scr. 1.**M. D.* — Eßlöffelweise in steigender
Menge. (Gegen Amaurose u. Cataract.)
v. GRAEFE.

Herba Rosmarini s. Rosmarini s. Anthos. Rosma-
rinkraut. [Hauptbestandtheil: äther. Öl. — 1 Unze conc. 1 Sgr.] Innerl.
[selten] als Theeaufguss [Dr. 1–2 auf 2 Tassen]. — Äusserl. zu
Kräutersäckchen [R_x 227 (*Caryophylli*). — *Offic. Spec. aromat.*]; in
[wässrigem od. geistigem] Aufguss zu Augewässern [R_x 430
(*Fol. Nicot.*); vgl. auch *Flor. Arnic.*], Bähungen, Waschungen
[R_x 1055 (*Tinct. Canthar.*)], Bädern [R_x 480 (*Hb. Menth. pip.*)], u. s. w.

Herba Rutae. Raute; Gartenraute; Weinraute.
[Hauptbestandtheile: äther. Öl und bitterer Extractivstoff. — 1 Unze conc. 1 $\frac{1}{2}$,
sublt. pulv. 2 $\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerl. zu Scr. $\frac{1}{2}$ –1 mehrmals tägl.; in Pulver u. pulver-
aufnehmenden Formen, häufiger in Aufguss [wässrigem od. weini-
gem, od. halbweinigem; Dr. 2–4 auf Unc. 6, eßlöffelweise], weniger zweck-
mässig in Abkochung. — Indess das trockene, länger aufbewahrte
Kraut ist überhaupt unkraftig; man wendet deshalb lieber den (falls

ihn der Apotheker vorrätig hält) aus dem frischen Kraut bereiteten Essig (S. 16), oder im Mai u. Juni den Presssaft [zu Dr. 2–Unc. 1 tägl.], oder, diätetisch, das frische Kraut selbst auf Butterbrod an.

Aüsserl. das frische Kraut zerstoßen als Riechmittel; das getrocknete im Auszug, und zwar in der Regel am besten in geistigem oder halbgeistigem, wenigem Aufguss (od. den Rautenessig), nicht in Abkochung, — zu Mund- u. Gurgelwässern [besonders hier ist *Acetum Rut.* wohl oft am passendsten], Klystieren u. a. Einspritzungen, Bähungen [auch z. B. Augenbähungen. Man hat auch den Dampf eines Rautendecocts an geschwächte Augen zu leiten empfohlen], Bädern, Verbandwässern u. s. w.

Herba (Fronde) Sabinae. *Fronde s. Turion Sabinae.* Sadebaum-, Sevenbaum- od. Säbenbaum-Kraut; stinkender Wachholder. [Hauptbestandtheile: äther. Öl und Gerbestoff. — 1 Unze conc. 1 Sgr., *subt. pulv.* 1½ Sgr.]

Innerl. [häufiger jedoch das Öl, weil dies in seiner Wirkung sich mehr gleich bleibt] zu Gr. 5–10, allmählig bis zu Gr. 20, 2–3mal tägl. In Pulver und pulveraufnehmenden Formen [z. B. Pillen: Ry 484; 832 (*Rad. Bellad.*). Doch nicht oft in dieser Art, denn das trockne, länger aufbewahrte Kraut ist nicht so wirksam als das (seines Wassergehalts wegen zwar in etwas grösseren Dosen zu gebende) frische. Man lässt deshalb wohl aus dem letzteren (im Frühjahr) eine (freilich schlecht schmeckende) *Conserva* bereiten und aufbewahren, so z. B. nach der PH. HANN. 1 auf 3 Zucker — 1 Unze 3 Mgr., 6 Unz. 15 Mgr. — theelöffelweise mehrmals tägl.]; in Aufguss [tägl. Dr. 1–4 auf Unc. 3–4. — Ry 485–487. — Unc. ½ mit Zimmt Dr. 2 zu 6 Unz. Colatur, stündl. 1 Essl. : KOPF gegen Blutfluss und Ausdehnung des Uterus. — Auch wohl, besonders kräftig, mit Mallagawein infundirt.], Decocto-Ebullition [L. S. 162 *sub b*], minder zweckmässig in Abkochung.

Aüsserl. als Streupulver [Ry 556 (*Hydrarg. oxydat. rubr. ppt.*)], in Salben [z. B. das Pulver mit Schweineschmalz *q. s.* gegen Condylome: HORN u. A. — Auch wohl, doch zu anderm Behuf (zum Offenhalten künstlicher Geschwüre, statt der Cantharidensalbe), mit Fett gekocht als Salbe; so z. B. das *Ungt. Sab.* PH. SLESV. (1 Unze 3 Shl.), ganz ähnlich bereitet wie die I. S. 278 angeführte Sabinasalbe der PH. BAV.]; infundirt [mit Wasser od. Weingeist; minder zweckmässig wohl abgekocht, wenigstens nicht stark] zu Gurgelwässern [z. B. *Hydrarg. muriat. corros.* Gr. 1 in *Inf. Hb. Sabin.* (Dr. 6–8) Unc. 6, gegen chronische Anginen: KOPF], Einspritzungen [für die Vagina etwa Unc. ½ auf Unc. 8; für Fisteln, cariose Geschwüre weit stärker], Bädern [unzen- u. halbpfundweise], Umschlägen, Verbandwässern.

484.

Ry Hb. Sabinae pulv.

Croc. pulv. ana Dr. 1

Ol. Sabinae Gtt. 3–6

Extr. Chamomill, q. s.
ut f. Pilulae 120. Consp. Pulv. Cass.
cinnam. D. in vitro. S. 3mal tägl. 10.
 LOCKSTAEDT.

485.

Ry Hb. Sabinæ Dr. 2
Aq. comm. fervid. Unc. 5
digere per ¼ hor. Colat. refrigerata
stat c.

Camphoræ trit. Gr. 2-6
Gm. Mimos. pulv. Dr. 1½
Syr. Glycyrrhiz. Unc. ½
I. a. Emulsio. D. S. Umgeschüttelt
stündl. 1 Essl. (Gegen Blasenlähmung
nach schwerer Niederkunft.) (HORN.

486.

Ry Hb. Sabinæ

Rad. Calami ana Dr. 6

Aq. comm. ferv. q. s.

digere per horam. Colat. refriger. L. 2
adde

Acid. phosphor. depur. Dr. 1-2

Syr. Cort. Aurant. Unc. 2.

M. D. S. 2stündl., umgeschüttelt, 2 Essl.
(Bei Caries.) ONTID.

487.

Ry Boracis Dr. 1

Sacch. albiss. Dr. 6

solue in

Infuso Hb. Sabin. (Dr. 6) Unc. 6.
D. S. 3mal tägl., zur Zeit der Menstrua-
tion aber 2stündl. 1 Essl. (Gegen Dys-
menorrhoe aus Atonie und Torpor der
Gebärmutter.) KOPF.

† *Herba Salicariæ s. Lysimachiae purpureas.* Wei-
 derich (brauner). [Hauptbestandtheile: Gerbestoff und Schleim.] Innerl.
 etwa zu Dr. 1, einigemal tägl.; in Pulver, leichter Abkochung.

Herba Salviae. Salbeikraut. [Hauptbestandtheile: Äther.
 Öl, bitterer Extractivstoff, Gerbestoff. — 1 Unze conc. 1½, sub. pulv. 2 Sgr.]

Innerl. im Aufguss [wässrigem od. weinigem; etwa Unc. ½ auf
 den Tag; z. B. Ry 488. — *Infus. Salv. PH. MIL.:* Unc. ½ auf Unc. 8. — Am öf-
 tersten als kalter Salbeithée (gegen profuse nächtliche Schweisse): 1 Essl.
 des zerschnittenen Krauts mit 2-3 Tassen heissen Wassers angebrüht, die Colatur
 kalt vor Schlafengehn getrunken, etwa noch mit einer Dose *Mixt. sulph. acidæ*].

Ausserl. zu Zahnpulvern, Zahnfleischlatwergen,
 Streupulvern; infundirt, weniger passend abgekocht, zu Mund-
 u. Gurgelwässern [Ry 489; 22 (*Acid. muriat.*), 119 (*Aq. oxymur.*),
 325 (*Cupr. sulphur.*), 876 (*Rad. Pimpin.*), 879 (*Rad. Ratanh.*)], Pinsel-
 säften [Ry 490], Injectionen [Ry 34 (*Acid. phosphor.*)], Augen-
 wässern [zu Augen-Waschungen u. Bähungen etwa Unc. ½ auf Unc. 4; bis-
 weilen mit Zusatz von etwas Weingeist p. p. — Ry 430 (*Fol. Nicot.*)], Um-
 schlägen, Bädern u. s. w. — Mit den frischen Blättern reibt man
 wohl scorbutisches Zahnfleisch.

488.

Ry Hb. Salviae Unc. 1

Aq. comm. ferv. L. 1.

Digere per ¼ horam. Colat. refriger.

adde

Vini Gallici rubri L. ½.

M. D. S. 2stündl. ½ Tasse. (Gegen
Nachtschweisse.) NIEMANN.

489.

Ry. Extr. Ratanh. venal. Dr. $\frac{1}{2}$
selve in

Infuso Hb. Salviae (Unc. 1) Unc. 8
adde

Tinct. Pimpinell. Unc. $\frac{1}{2}$

Syr. Moror. Unc. 1.

M. D. S. Gurgelwasser, umgeschüttelt.

490.

Ry Infus. Hb. Salviae (Dr. 2) Unc. 2
Syr. communis Unc. 1.

M. D. — Zum Pinseln, auch wohl zum
Umschlagen mit Leinwandläppchen.
(Gegen Aphthen; auch gegen wunde
Brustwarzen.) KLUGER.

+ *Herba Saponariae*. Seifenkraut. Waschkraut.
Wie *Radix Sapon*.

+ *Herba Saturejae* (*sativae s. hortensis*). Saturey;
Pfeffer- od. Wurst-Kraut. [Hauptbestandtheile: äther. Öl u. Gerb-
stoff.] Innerl. u. äusserl. wie *Hb. Serpylli*.

+ *Herba (recens) Scandicis odoratae s. Cerefolii
Hispanici*. Spanischer Körbel. [Hauptbestandtheil: äther. Öl —
1 Unze 2 Shl.] Selten innerl. oder äusserl. der Presssaft (meist
nur das destill. Wasser, s. S. 50).

Herba Scordii. Lachenknoblauchkraut. Was-
serlauch. [Hauptbestandtheile: äther. Öl, Bitterstoff und Gerbstoff. — 1 Unze
conc. $1\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. [selten] im Aufguss [z. B. Unc. $\frac{1}{2}$ auf Unc. 8,
mit *Aeth. sulphur.* Dr. $\frac{1}{2}$, esslöffelweise: BRERA als Anthelminticum. — Oder
als Thee, Dr. 2-3 auf 2 Tassen]. — Äusserl. als Streupulver [sel-
ten]; infundirt [mit Wasser, Wein od. Essig] zu Mund- u. Gurgel-
wässern [Ry 22 (*Acid. muriat.*)], Einspritzungen, Umschlägen,
Verbandwässern.

+ *Herba Sedi acris s. minoris s. Sempervivi minoris*.
Mauerpfeffer. Katzenkräutlein. Kleiner Hauslauch.
Kleine Hauswurz. [Hauptbestandtheile: äpfelsaurer Kalk und ein ei-
gentümlicher scharfer Stoff. — 1 Unze rec. 1 Shl., pulv. 4 Shl.] Innerl.
zu Gr. 10-20 (-60), 2-4mal tägl. In Pulver [etwa mit *Pulv. gum-
mos.* zu gleichen Theilen], Aufguss od. leichter Abkochung [etwa
mit Bier], Presssaft. — Äusserl. der Presssaft [als Umschlag
auf Geschwüre. — Mit wenig Arrak vermischt gegen rothe Hautflecke.], oder
das frische Kraut zu Brei gequetscht [auf oberflächliche Krebsgeschwüre].

Herba Serpylli. Quendel. Kuttel- od. Feldküm-
mel-Kraut. Feldpolei. Wilder Thymian. [Hauptbestand-
theile: äther. Öl, Gerbstoff, Bitterstoff. — 1 Unze conc. $\frac{2}{3}$ Sgr. — Empfiehlt
sich vor vielen andern aromatischen Kräutern und Blumen durch starken u. dauer-

haften Geruch und durch grosse Wohlfeilheit. Arme können es sich sogar den ganzen Sommer hindurch selbst einsammeln.]

Innerl. als Thee [Dr. 2-3 auf 2 Tassen].

Äusserl. zu Kräutersäckchen; infundirt [mit Wasser, Weingeist, Wein] zu Mund- u. Gurgel-Wässern, Umschlägen, Bädern [L. 2-3]. (Kommt zu den officinellen *Spec. aromat.*, *Spec. ad Foment.*)

Herba Stramonii. Stechapfelkraut. [Hauptbestandtheil Daturin (Alkaloid). — 1 Unze conc. $1\frac{1}{2}$, gr. pulv. $1\frac{3}{4}$, subf. pulv. $1\frac{1}{8}$ Sgr.] **Cave** Salzbilder; empfindliche Metallsalze; Gerbstoff.

Innerl. (*Pulvis ad Grana quatuor*!) zu Gr. $\frac{1}{2}$ - 2 u. vorsichtig steigend mehr (besonders bei Geisteszerrüttungen wohl bis zu Scr. 1 u. mehr), einigemal tägl.; in Pulver, Pillen, Aufguss [wässrigem oder weinigem; Scr. 1-2 auf Unc. 5; alle 4-2 St. 1 Theelöffel, u. allmählig gestiegen bis zu 1 Eol. u. mehr].

Äusserl. als Rauchmittel [aus Tabackspfeifen geraucht, gegen Asthma; vorsichtig! Die Dose lässt sich nicht wohl im Voraus bestimmen: an Taback gewöhnte Männer vertragen wohl gleich anfangs ein Paar Pfeifen des Tags u. allmählig mehr — in Absätzen geraucht, mit Unterbrechungen, sobald sich Eingenommenheit des Kopfes, Schwindel, Uebelkeit einstellen; Frauen weit weniger. Für an Taback Gewöhnte kann man das Kraut etwa mit 2 oder 1 Theil Taback gemengt anwenden]; zu Räucherungen [Dr. $\frac{1}{2}$ auf glühende Kohlen gestreut: gegen die Dyspnoe bei Cholera (Rigaer Ärzte)]; in Salben [etwa 1 mit 4 Schweineschmalz, gegen chronische Rheumatismen, neben innerlichem Gebrauch des Mittels]; endermatisch [zu Gr. 1-3].

* ***Herba Tanacetii.*** Rainfarnkraut. [1 Unze conc. 1, gr. pulv. $1\frac{1}{8}$ Sgr.] Wie *Flores Tanacetii*.

Herba Taraxaci. Löwenzahnkraut. Butterblume. Pfaffenröhrlein. [Hauptbestandtheile: eigenthümlicher Bitterstoff, Schleimzucker, Inulin (Alantstärkmehl) und Salze. — 1 Unze conc. 1 Sgr.] **Cave** Salzbilder; Metallsalze.

Innerl. in Abkochung [Unc. 4- $1\frac{1}{2}$ tägl., mit L. 2-3 auf L. $1\frac{1}{2}$ - 2 gekocht, tassenweise]; selten im Aufguss [By 460 (*Hb. Cochlear.*)]. — Der Presssaft [in der Regel aus Kraut und Wurzel zugleich, „e *Taraxaco toto*“; zu 2-3 Unzen des Morgens; am kräftigsten im beginnenden Frühjahr, doch sind auch noch den Sommer hindurch junge, dazu passende Pflanzen zu finden. — By 458 (*Hb. Chelidon. maj.*), 482 (*Hb. Millefol.*)].

Äusserl. zu Visceralklystieren [wie *Rad. Tarax.* — By 923 (*Rad. Tarax.*), 935 (*Rad. Valer. min.*)].

Herba Thymi. Thymiankraut. Gemeiner od.

Gartenthymian. Römischer Quendel. [Hauptbestandtheil: äther. Öl und (?) Gerbstoff. — Der Auszug wird durch Eisenoxydsalze grünlichbraun. — 1 Unze conc. $1\frac{1}{2}$, gr. pulv. $1\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. u. äusserl. wie *Hb. Serpylli*.

Herba Trifolii fibrini s. aquatici. Fiebertklee-od. Bitterklee-Kraut. [Hauptbestandtheil: bitterer Extractivstoff. Der Auszug wird durch Eisenoxydsalze grünlichbraun. — 1 Unze conc. $\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerl. zu Scr. 1–2 einigemal tägl., in (Pulver, Latwerge,) Aufguss [wässrigem oder kaltem weinigen, etwa Unc. 1 auf Unc. 6, esslöffelweise. — Ry 491; 438 (Fol. Senn.), 475 (Hb. Ledi pal.). — Infus. Trifol. PH. MIL.: Unc. 1 mit 11 Unz. 1 St. digerirt, Colatur von 8 Unzen.], Abkochung [nicht zu lange gekocht, sonst schmeckt es sehr widerlich. Etwa Unc. 1 mit Unc. 9 auf Unc. 6, esslöffelweise]. Im Frühjahr [namentlich im Mai u. Juni; im April, vor dem Blühen, ist das junge Kraut noch weniger bitter.] der Presssaft [Unc. 1–3 tägl., mit andern Kräutersäften oder mit Molken, Fleischbrühe, u. s. w. — Ry 461 (Hb. Cochlear.)].

Äusserl. abgekocht zu Visceralklystieren [wie *Hb. Centaur. min.*], als Waschwasser [bei chronischen Hautausschlägen, bei nach dem Scorbüt zurückbleibenden Flecken —, wo indess der Presssaft noch wirksamer; diesen oder die frischen Blätter benutzt man auch bisweilen zum Auflegen auf scorbutische Geschwüre].

491.

Ry Flor. et Hb. Millefolii
Hb. Trifolii fibrini
— *Centauri minoris*
— *Menthae piperitae*

Sem. Foeniculi ana Unc. 1,
C. C. M. f. Spec. D. — Etwa tägl.
den 8ten Theil mit $\frac{1}{4}$ Tassen köchenden
Wassers angebrüht, tassenweise.
Species amarae PH. P. [1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr.]

+ **Herba Urticae (majoris) recens.** (Grosse) Nessel; (grosse) Brenn-Nessel. [Hauptbestandtheile: flüchtiger scharfer Stoff, Extractivstoff und (?) Gerbstoff.] Von der PH. AUSTR. um des Presssafts willen [einige Unzen täglich] noch aufgenommen, obwohl dieser ziemlich obsolet. Wichtiger ist der Gebrauch dieses Krauts und mehr noch der kleinen Brenn-Nessel, *Urtica urens* LINN., pharmac. *Hb. Urticae minoris*, zur Urtication.

Herba Verbasci. Wollkraut; Himmelbrand; Königskerze. [Hauptbestandtheile: Schleim, etwas Schleimzucker. — 1 Unze conc. $\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. infundirt od. leicht abgekocht als (schleimiger) Thee ad libitum. — Äusserl. [selten] das frische Kraut, zerquetscht, zum Auflegen auf Geschwüre.

Herba Veronicae. Ehrenpreis-Kraut. [Hauptbestandtheile: Bitterstoff und (?) Gerbstoff. — 1 Unze conc. $1\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. [zieml.

oboles] drachmenweise im Aufguss; im Frühjahr der Presssaft [unzenweise, mit andern Kräutersäften].

Herba Violae tricoloris s. Jaceae. Freisamkraut. Stiefmütterchenkraut. Dreifaltigkeitsblume. [Hauptbestandtheile: Violin (sehr wenig) und Schleim. — 1 Unze conc. 1, subsp. 1½ Sgr.]

Innerl. zu Dr. 1½-3 auf den Tag (Kindern von ½-1 Jahr zu Ser. 1-2 tägl., auf 2 Portionen, Morgens u. Abends, vertheilt); in Pulver [das man den Kindern, wenn es ihnen nicht anders beizubringen, wohl unter einen Brei mischt. — Ry 492, 493], Latwerge [Ry 448 (Graphit.)]; Abkochung [von grüner Farbe. — Unc. ½ mit L. 2 auf L. 1, 2stündl. ½ Tasse (gleichzeitig auch das Decoct als Gurgelwasser): SCHLEGEL bei Syphilis. — Bei Crusta lactea für ein Kind von ½-1 Jahr tägl. Dr. 1-2 mit Unc. 2-3 Wasser od. Milch auf Unc. 1½ gekocht, davon Morgens u. Abends die Hälfte oder auch wohl 2stündl. ¼ Essl.], seltner im Aufguss [der weniger gut auszieht, wozu man also etwas mehr von der Substanz nehmen kann. — Ry 494]; auch wohl den Presssaft [im Frühjahr u. Sommer; für ein Kind von ½-1 Jahr Dr. 1-2 tägl., mit Wasser verdünnt].

Ausserl. abgekocht, seltner infundirt, zu Augewässern [Ry 495], zu Waschwässern od. Umschlägen [z. B. bei Milchborke Unc. ½ mit Unc. 9 auf Unc. 6 gekocht u. dies anzuwenden, nachdem man die Borken durch fettige Mittel erweicht und vorsichtig gelöst hat; bei mehr feuchter Borke kann man noch etwas Kalkwasser dazu setzen], Bädern [selten; für Kinder L. ½-1]; gepulvert zu Salben.

492.

Ry Hb. Viol. tricol. Dr. 3
Sem. Foenic. Dr. 1
Sacch. Lactis Dr. 2.
M. f. Pulv. D. S. 3mal tägl. eine Messerspitze. (Bei Crusta lactea.)

HAASE.

493.

Ry Sulph. praecipit.
Magn. carbon. ana Scr. 2
Hb. Viol. tricol.
Sacch. Lact. ana Dr. 3.
M. f. Pulv. D. S. 4mal tägl. eine Messerspitze. (Bei Crusta lactea.)

HAASE.

494.

Ry Hb. Viol. tricol. Dr. 2
Aq. comm. ferv. q. s.
reponere ad refriger.; Colat. Unc. 2 adde
Vini stibiaci Scr. 1
Syr. Althaeae Unc. ½.
M. D. S. 2stündl. ¼ Essl. (Gegen Milchborke, Gripd.)

JAHN.

495.

Ry Hb. Viol. tricol. Unc. ½
Aq. comm. ferv. Unc. 6
reponere ad refrigerat.; Colat. adde
Tinct. Opii simpl. Dr. ½.
M. D. S. Umgeschüttelt zum Auswaschen der Augen. (Gegen die Ophthalmia e Crusta lactea.)

BENEDICT.

Hirudines. Blutegel. — Der Preis wechselt in den meisten Staaten alle 1-2 Monate. Im Preussischen pßegt das Stück im Sommer ungefähr

1 Sgr., im Winter 2½ Sgr. zu kosten. Der Theure wegen läßt man sich wohl in der Armenpraxis bis weilen von anderen Leuten, welche sie etwas wohlfeiler als der Apotheker verkaufen, entnehmen; sonst aber ist dies nicht bloss unbillig gegen den letzteren (dem gerade die Aufbewahrung der Egel besonders viel zu schaffen macht), sondern auch insofern unzweckmässig, als man vor nachtheiliger Verwechslung mit Arten, deren Biss entweder unkünftig ist oder entgegengesetzt heftige Entzündung der Stelle veranlasst, nicht sicher ist, bisweilen auch Egel erhält, die erst vor kurzem gezogen haben und deshalb nicht anbeissen. — Wo man glaubt, dass die Application der Egel binnen einigen Tagen zu wiederholen seyn dürfte, bringe man sie, sogleich nachdem sie gezogen, 5 Minuten lang in eine Mischung aus gleichen Theilen Moselweins und frischen Flusswassers oder (wohlfeiler) eine Mischung von rectif. Weingeist 3, Weissessig 4, Wasser 12; sie geben darin das Blut wieder von sich, werden zwar betäubt, erholen sich aber, wenn man sie hinterher mit Wasser (nicht ganz kaltem, etwa von + 15° R.) abspült und in frischem Flusswasser aufbewahrt, bald wieder, und können gewöhnlich nach einigen Tagen schon wieder zum Sagen benutzt werden (KLUGE).

Man setzt die Egel gewöhnlich dem kranken Theil möglichst nahe, doch empfindlichere Theile, grössere Gefässzweige und, so viel als möglich, verschiebbare, mit lockerem Zellgewebe angeheftete Hautstellen (wo leicht Blutunterlaufung entsteht) vermeidend. Die Stelle muss von Schweiß, Schmutz, Salbe p. p. gereinigt, wenn sie behaart ist, rasirt seyn. Zur Beförderung des Anbeissens bestreicht man sie gewöhnlich mit lauer Milch, Zuckerwasser, etwas Blut (von einem Egel, der schon angebissen hat, oder sonst frischem Menschen- oder Thier-Blut, z. B. dem blutigen Ende einer frisch ausgerissenen Schwanz- oder Flügel-Feder einer Taube) oder frischem Schweineschmalz; bisweilen thut ein Tropfen frischen Wassers, mit einem Hölzchen aufgetupft, die besten Dienste. Will man nur Einen Egel ansetzen, so fasse man ihn mit einem reinen Tuche (weniger gut mit der blossen Hand) sanft an, oder applicire ihn auch (so namentlich im Munde, wo es auch noch nöthig ist, dem Egel einen Faden durch das Schwanzende zu ziehen) mittelst eines zusammengerollten Kartenblatts oder einer kleinen, an beiden Enden offenen Glasröhre (damit man beim Wegziehen dieses Cylinders, wenn der Egel angebissen hat, diesen nicht wieder abreisse, schiebe man ihn mit einem Federkiel od. dgl. hindurch). Wenn man viele Egel auf einen flachen Theil zu setzen hat, thue man sie in ein Glas und kehre dies auf dem Theil um (oft, um Erkältung zu verhüten, unter der Bettdecke; Kindern, die sich vor den Thieren scheuen, kann man dabei vorreden, es werde ein Pflaster aufgelegt). Man hat auch ein eignes Instrument, „*Poss-Sanguis*“, dazu: ein Netz aus Silberdrath, welches auf einer ovalen, mit einem Handgriff versehenen Scheibe sitzt. Um mehrere Egel auf genau bestimmte Stellen anbeissen zu lassen, schneidet man in ein Stück grobes graues Löschpapier (wie es zum Filtriren des Kaffees gebraucht wird) mit der Scheere an den entsprechenden Stellen Löcher, so gross dass ein Egel Kopf und Schwanz zugleich hindurchbringen kann, legt das Papier befeuchtet auf den Theil, setzt die Egel frei darauf, und verhütet, dass sie sich nicht vom Löschpapier entfernen; sie kriechen dann auf der ihnen unangenehm-rauen Fläche so lange umher, bis sie die Löcher finden, wo sie alsbald anbeissen; sobald dies geschehen, zerreisst man unter ihnen das durch die Anfeuchtung mürbe Papier, und entfernt es. — Für den Muttermund hat DIEFFENBACH ein zweckmässiges, doch nöthigenfalls entbehrliches Instrument zum Ansetzen der Egel angegeben (in Berlin bei Kuppeke, s. I. S. 333, für 1 Thlr. zu haben).

Wenn die Egel abgefallen sind, ist es in der Regel rathsam, die Stelle noch

1 (bis 2) St. warm zu bähen, um die Blutung zu unterhalten; am bequemsten mit einem Badeschwamm, den man in heisses Wasser taucht, ausdrückt, und, so oft er mit Blut gefüllt ist, in ein anderes Gefäss entleert. Saugen von mehreren zugleich angesetzten Egelu einzelue na lange und hindern dadurch das Fomentiren auf den Stellen, wo die übrigen bereits abgefallen sind, so darf man ihnen nur einige Kürner Salz auf den Rücken streuen. — Selten setzt man, zu besonders starker Blutentziehung, Schröpfköpfe auf die Egelstücke. — Will man der Blutung ein Ende machen, falls dies nicht schon von selbst zur rechten Zeit eintritt, so lege man eine Comprime mit kaltem Wasser oder Essig auf, oder drücke, wo die Kälte nachtheilig werden könnte, ein Stückchen Feuerschwamm oder Zunder auf jedes Loch, und befestige dies nöthigenfalls durch Heftpflasterstreifen. Reichen diese Hausmittel nicht hin, so muss man zu styptischen Pulvern, zum Auflegen einer heissgemachten und in Leinwand gewickelten Münze, oder — noch sicherer — zur Compression seine Zuflucht nehmen. Diese letztere geschieht nöthigenfalls mit den Fingern, am zweckmässigsten aber durch Einklemmen einer kleinen Hautfalte in eine Schieberpincette od. dgl. Man hat eigene Blutegelklemmen von Metall (kleine Schieberpincetten mit breiten Spitzen), kann sich aber auch, wenn man damit nicht oder nicht in genügender Zahl versehen ist, leicht und schnell kleine pincettenartige Klemmen aus 2 länglichen, platten Stückchen Holz, deren untere Enden man mit etwas Leinwand umwickelt und deren obere Enden man, wenn die Hautfalte gefasst ist, mit Zwirn oder dünnem Bindfaden fest zusammenbindet, machen. Selten, nur etwa bei sehr unruhigen Kranken, wird man genöthigt seyn, zum Cauterisiren (mit einer glühenden Stricknadel, mit Hüllenstein od. dgl.) oder zu dem, ebenfalls schmerzhaften, aber freilich sichersten Mittel, dass man eine Nadel durch die Hautfalte sticht und um diese eine Fadenumschlingung in Achter-Touren macht, seine Zuflucht zu nehmen.

Besondere Vorsicht, dass die Nachblutung nicht erschöpfend werde, ist bei ganz kleinen Kindern nöthig, die sich schon an Einem Egel verbluten können. Bei solchen, überhaupt bei allen unbehülflichen oder besinnungslosen Kranken muss man, namentlich in der Nacht, öfters nachsehen, ob keine Nachblutung eintritt. Auch muss man verhüten, dass Egel in Mund, Nase oder After hineinschlüpfen; sollte es doch geschehen seyn, so tödte man die Egel im Körper durch Salzwasser, welches man verschlucken lässt oder einspritzt.

Hydrargyrum. Mercurius. Argentum vivum.

Quecksilber. — Wir wollen hier nur als zu allen Quecksilberpräparaten gehörig bemerken, dass man zweckmässig bei der Darreichung dieser Präparate, wenn es darauf ankommt, den Eintritt der Salivation möglichst hinauszuschieben, nach dem Einnehmen jedesmal, etwa mit einem *Infus. Hb. Salviae*, den Mund ausspülen lässt.

* *Hydrargyrum aceticum. Mercurius acetatus. Terra foliata mercurialis. Acetas hydrargyrosus.* Essigsaures Quecksilberoxydul. [1 Scrup. 2½ Sgr.] Sol. 333. — *Cave* Säuren; Salzbilder; Alkalien; viele Salze [besonders phosphorsäure, borsäure, kohlens., kless., bernsteins., salzs., hydriods., hydrobroms., hydrothions. Alkalien, blausaure Eisenoxydulalkalien]; Seifen; *Aq. comm.*; Gerbstoff; (Schleime).

Innerl. (*ad Granum unum!*) zu Gr. $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{4}$, steigend bis zu Gr. 2-3, 2mal tägl., in Pillen.

Ausserl. in Salben [Scr. $\frac{1}{2}$ - Dr. $\frac{1}{2}$ auf $\frac{1}{2}$ Unze Fett], Auflösungen [selten, der Schwerauflöslichkeit wegen].

Hydrargyrum ammoniato-muriaticum. *Mercurius praecipitatus albus s. cosmeticus. Lac mercuriale. Hydrochloras ammonicus cum Oxydo hydrargyrico.* Weisser Präcipitat. Basisch-salzsäures Quecksilberoxyd-Ammonium. [Pulver. — 1 Drachme 28gr.], *Cave* kaust. Alkalien; Gerbstoff; Hitze.

Gegenwärtig nur noch äusserl. (\neq) in Salben [officinell: *Ungt. Hydrarg. album*, 1 auf 9 Fett. — *Ungt. mercuriale album* PH. F.: 1 auf 8. — 1 auf 8 ist auch das Verhältniss von WERLHOF's u. ZELLER's Krätzsalbe: einer Bohne bis einer Haselnuss gross Morgens u. Abends einzureiben. — R_x 496-498], namentlich Augensalben [Um das Pulver recht gleichmässig zu vertheilen, lässt man es wohl, namentlich wenn man nur eine kleinere Quantität aufnimmt, mit etwas destill. Wasser zu einem Brei anreiben. — In sehr verschiedener Stärke, Gr. 2-24, in der Regel Gr. 5-15, auf Dr. 2. (Manche Augenärzte halten den weissen Präcipitat für stärker als den rothen, HIMLY, RUST u. A. dagegen für schwächer.) Z. B. Gr. 1-2 auf Dr. 1, nur Einmal tägl. in geringer Quantität anzuwenden: KNESCHKE bei Hornhauttrübungen; eben so, noch mit Zinkblumen Gr. 4-6: Derselbe bei Hornhautgeschwüren. — Gr. $7\frac{1}{2}$ auf Dr. 1: BÜTTNER's Salbe gegen contagiöse Augenentzündung, die aber auch bei scrofulösen Augenentzündungen, überhaupt in allen Augenkrankheiten, wo eine vermehrte Schleim- od. Eiter-Absonderung stattfindet, gute Dienste leistet; man soll davon tägl. (wenn es zu stark reizt, nur einen Tag um den andern) Vormittags etwa Gr. 1-2 auf die ganze innere Fläche des untern Augenlides einpinseln, worauf der Kranke das Auge sanft schliesst u. so lange auf dem Rücken liegen bleibt, als der von der Salbe erregte Schmerz dauert. Bei grosser Empfindlichkeit des Auges soll man nur, eine etwas grössere Quantität, auf die äussere Haut der Augenlider einreiben. — R_x 499-502]; selten in Augenpulvern [wie *Hydr. oxyd. rubr. ppt.*], Streupulvern [mit Stärkmehl, gegen Kopfungesiefer — vorsichtig!].

496.

R_x *Hydrarg. ammoniato-muriat.* Scr. 1
Camphuras trit. Gr. 5
Adipis suilli Unc. $\frac{1}{4}$.

M. f. *Ungt. D.* (Gegen *Herpes pustulosus*, nachdem die eitrigen Symptome durch erweichende Mittel beseitigt.) (BIETT.

497.

R_x *Hydrarg. ammoniato-muriat.* Dr. 1
Ungt. rosati Unc. 1.
M. f. *Ungt. D.* — (Gegen hartnäckige,

tiefe, habituelle, sehr ausgebreitete Flechten. — Nach einem oder einigen reinigenden Bädern wird tägl. Einmal, am besten vor Schlafengehen, der ganze Körper $\frac{1}{4}$ St. lang mit der Salbe so eingerieben, dass die Haut nur glänzt, ohne dass die Salbe in Klumpen zurückbleibt. Dabei tägl. eine Tisane aus *Stip. Dulcam.* u. *Hb. Violae tricol.* ana Dr. 4-6; bei Mangel an Stuhlgang noch *Fol. Senn.* Dr. 1 dazu. Zimmertemperatur nicht unter + 15-16° R. Diät mager u. einfach (nur Kalb- oder Hühner-Fleisch,

feine Glütze, Graupen, Weissbrod p. p.). Wöchentlich ein laues Seifenbad (Reinigung mit weichem Schwamm). Die Leibwäsche in den ersten Wochen nicht gewechselt. Werden einzelne Stellen schmerzhaft, spannend, so übergeht man sie, so lange dies dauert, beim Einreiben. Wo in seltenen Fällen eine zu heftige Wirkung des Quecksilbers, namentlich Salivation, sich zeigt, Aussetzen der Einreibungen, Wäsche wechseln, Seifenbäder; nach Beseitigung das Heilverfahren erneuern. — So 4-8 Wochen, bis die Haut überall ihre normale Farbe u. Glätte zeigt. Dann China, Malzbäder, nahrhafte Kost, frische Luft.) v. GRAEFE.

498.

R_x *Hydrarg. ammon. muriat.* Scr. 3-4
† *Ungt. Digital. PH. HASS.* (s. S. 234)
(oder *Adip. suilli*) Unc. 1.

M. D. — 3-4mal tägl. 1 Theelöffelvoll einzureiben und die Stelle mit Wachstaffent (allenfalls auch Wachspapier) zu bedecken. (KOPF empfiehlt statt der Brechweinsteinsalbe diese, ebenfalls Pusteln erzeugende Salbe. Sie schmerze weniger, mache keine bösartigen, brandigen Geschwüre, hinterlasse kaum Narben, und wirke schneller, doch auch vielleicht etwas weniger eingreifend.)

Andere Ärzte nehmen zur Erzeugung von Pusteln mehr weissen Präcipit., z. B. BAREZ, selbst bei Kindern, Dr. 2 auf Unc. 1.

499.

R_x *Hydrarg. ammoniato-muriat.* Scr. $\frac{1}{2}$
† *Tutiae ppt.* Gr. 5*)
Adipis suilli Dr. 2.

M. exactiss. D. in olla alba. S. Augensalbe. (Gegen chronische Entzündung der Augenlieder u. Meibomschen Drüsen.)

RUST.

*) Vgl. *Zinc. oxydat.*

500.

R_x *Hydrarg. ammoniato-muriat.* Scr. $\frac{1}{2}$
† *Butyri recent. insulsi* Dr. 2
Tinct. Opü crocat.

Aceti plumbici ana Scr. $\frac{1}{2}$.

M. etc. — (Ganz wie R_x 553 (*Hydr. oxyd. rubr. ppt.*) zu gebrauchen. Auch wohl, statt des weissen Präcipitats allein, weisser und rother, ana 4 Gran.)

(RUST.)

501.

R_x *Hydrarg. ammoniato-muriat.* Gr. 15
† *Tutiae ppt.*

Boli Armenae ppt. ana Dr. $\frac{1}{2}$

Adip. suilli Dr. 1.

M. exactiss. f. Ungt. ophthalm. D. in olla alba. (*Balsamum ophthalmicum* JANINI; sehr stark!)

502.

R_x *Hydrarg. ammoniato-muriat.* Gr. 2
Zinci oxydati Gr. 6

Extr. Ratanh. exot. subt. pulv. Scr. $\frac{1}{2}$

Adipis suilli Dr. 1.

M. etc. Augensalbe (bei *Ophthalmoblenorrhoea neonatorum*). RITTERICH.

Hydrargyrum depuratum. Mercurius vivus (s. purus s. regulinus) depuratus. Gereinigtes, regulinisches od. laufendes od. lebendiges, Quecksilber. [1Unze $7\frac{1}{2}$ Sgr.]

Die früher ziemlich häufige innerliche Anwendung [pur oder abgekocht, oder mit Zucker, Magnesia, Schwefel, Schleim, Honig, Terpenthin u. dgl. m. abgerieben, in Pulver, Pillen, Bissen oder einer Art von Emulsion — gegen Volvulus, Würmer, Syphilis u. s. w.] ist gegenwärtig in Deutschland ziemlich obsolet [nur EBERS hat es vor einiger Zeit wieder gegen *Ileus* empfohlen, pur, zu L. $\frac{1}{2}$ auf einmal oder, namentlich bei reizbaren, zarten Personen und bei schwankender Diagnose, in Dosen von Unc. 2-4 in kurzen Intervallen bis

zum Aufhören der Convulsionen gegeben] man wendet es nur noch äusserlich an, zu Pflastern [selten magistral; officinell: *Empl. Hydr.*] u. Salben [vgl. *Ungt. Hydrarg. ciner.*, † *Ungt. pedicular.*].

+ *Hydrargyrum hydrocyanicum s. Borussicum s. xooticum s. xootinicum s. cyanatum* [unrichtig *Hydr. cyanicum*]. *Prussias Hydrargyri. Cyanuretum Mercurii. Cyanidum Hydrargyri.* Blausaures Quecksilber. Quecksilber-Cyanid. [1 Drachme 8 Sht.] *Sol.* 8; in Weingeist fast unauflöslich. — *Cave* [es wird durch keine Sauerstoffsäure oder Sauerstoffbase zersetzt] besonders Salzbilder; Wasserstoffsäuren; mehrere Salze, [namentlich Salmiak, salpeters. Silber, essigs. Blei]; Schwefellebern; Gerbstoff; *Aq. comm.*; Hitze.

Innerl. zu Gr. $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ (u. mehr), $\frac{1}{2}$ - 3mal tägl.; wenn es Erbrechen macht, mit etwas Opium. In Pulver [z. B. 2mal tägl. Gr. $\frac{1}{4}$ mit 10 - 15 Gr. Kalmus: HORN], Pillen [zuvor aufgelöst], Auflösung [z. B. Gr. 1 - 2 in *Aq. Laurocer.* Scr. 1, zu 6 Tropfen p. dosi, mit Schleim. — R₂ 503].

Äusserl. zu Mund- u. Gurgel-Wässern [etwa Gr. 2 - 8 auf Unc. 4 einer (mit *Aq. destill.* bereiteten) schleimigen Flüssigkeit. R₂ 504. — Pinselsäfte (etwa Gr. 3 - 12 auf 1 Unze Honig od. dgl.) dürften doch wohl empfehlenswerther seyn.], Injectionen [R₂ 505], Verbandwässern [z. B. Gr. 2 - 3 auf *Aq. destill.* Unc. 3: HORN gegen Schanker], Salben [R₂ 506].

503.

R₂ † *Hydrargyri hydrocyanici* Gr. 2
solve in

Aq. destill. Unc. 3

adde

Tinct. Opii croc. Gtt. 18.

M. D. S. Morgens (3 St. nach dem Frühstück) u. Abends 1 Rsl. in einer Sarsaparill-, Scorzoner- oder Geizen- Abkochung. MENDAGA.

504.

R₂ *Rad. Sarsaparill.* Unc. $\frac{1}{4}$
coque c. *Aq. destill.* Unc. 16, sub fin.
coct. addendo

Hb. Conii mac. Dr. 2,

ad Colat. Unc. 8, in qua solve

† *Hydrarg. hydrocyanici* Gr. 2.

D. S. Gurgelwasser, umgeschüttelt. (Gegen Mund- u. Rachen-Geschwüre.)

MÜLLER.

505.

R₂ † *Hydrarg. hydrocyanici* Gr. 2
solve in

Aq. destill. Dr. 14

— *Laurocer.* Dr. 2.

D. — (Zum Einspritzen, bei Gonorrhoea secundar., besonders mit erhöhter Empfindlichkeit.) HORN.

506.

R₂ † *Hydrarg. hydrocyanici* Gr. 6 - 7
Adipis suilli Unc. $\frac{1}{3}$

Ol. Citri Cort. Gtt. 7 - 8.

M. f. *Ungt. D.* — Gegen entzündete syphilit. Hautleiden, entzündete schuppige, feuchte Flechten. BIETT.

PARENT wendet eine ähnliche Salbe ohne Citronenöl zum Verbinden von Schankern an.

Hydrargyrum muriaticum corrosivum. Mer-

curius sublimatus corrosivus. Bichloretum (s. Perchloridum) Hydrargyri. Sublimat. Ätzendes salzsaures Quecksilberoxyd. Chlorquecksilber im Maximum des Chlors; Quecksilberchlorid. [1 Drachme $1\frac{1}{2}$ Sgr. — In Mitteln, welche auf die Haut od. a. weniger edle Theile angewandt werden, darf man das *H. m. c. veniale* (1 Unze $4\frac{1}{8}$ Sgr.) substituiren.] *Sol.* 18, siedend Wasser 2; Alkohol 2; Schwefeläther 3. — *Cave:* Der Sublimat geht mit einigen Stoffen [mehrere Chlormetalle (z. B. Salmiak *), Eiweiss u. s. w.] eigenthümliche Verbindungen ein. Er wird durch keine Sauerstoffsäure zersetzt, wohl aber, wie es scheint, durch die meisten übrigen [auch organischen] Stoffe, mit denen ihn die Praktiker zu verbinden pflegen, entweder in Quecksilberoxyd [so durch fixe Alkalien, Bittererde, Kalkerde] oder [am häufigsten] in Calomel umgewandelt [bald mehr, bald weniger rasch und vollständig]; zuweilen geht ein unzersetzter Theil des Sublimats mit Bestandtheilen organischer Substanzen neuer, mitunter kräftig wirkende, Verbindungen ein [so mit den Bestandtheilen des Opium]. Folgende Stoffe zersetzen den Sublimat theils nur langsam, theils nur unvollkommen: Thonerde, Stärkmehl, *Rad. Althaeae*, Gummi, *Rad. Irid. Flor.*, *Rad. Glycyrrhiz.*, *Succus Glycyrrh.*, thierische Fette. Für den äusserlichen Gebrauch sind zahlreiche Verbindungen mit anderen Stoffen als den genannten durch Erfahrung sanctionirt [so auch mehrere der von uns aufgeführten]; für den innerlichen wird man wohl thun, andere Verbindungen zu vermeiden und sich namentlich bei der Auswahl von Pillenconstituentien an die genannten Stoffe zu halten. [Man vermeide selbst als Vehikel beim Einnehmen: Hafer- u. Gersten-Schleim, auch andere Pflanzen-Auszüge, Mandelmilch, Zuckerwasser, Fleischbrühe, Oblate (bei Pillen); zum Verschlucken der Pillen ist destillirtes (oder doch wenigstens statt dessen gekochtes und erkaltetes) Wasser oder ein (am besten mit *Aq. destill.* bereiteter) Althäenschleim anzuwenden.] Immer verordne man nur auf kurze Zeit. Die wässerigen Auflösungen sind vor dem Licht zu schützen [die alkoholischen und ätherischen werden nur bei Gegenwart von Wasser durch Licht zersetzt. — Wir lassen unten bei mehreren äusserlichen Formeln das *D. in vitro charta nigra obl.* weg, weil die Compositionen selbst schon so zersetzend sind, dass das Licht nicht mehr zu fürchten ist].

*) Man empfiehlt wohl, um die wässrige Auflösung des Sublimats vor rascher Zersetzung zu schützen, einen Zusatz von etwas Salmiak, und es ist nicht zu leugnen, dass sich in einer solchen Auflösung nicht so früh ein Niederschlag bildet; es dürfte sich aber dabei durch Bildung eines Doppelsalzes — Ammonium-Quecksilberchlorid, Nembrothsalz — die Wirkung des Sublimats wesentlich ändern. Man sollte deshalb die auf diese Weise bereitete officinelle Auflösung, *Liq. Hydrarg. muriat. corros.*, nie als dem Sublimat äquivalent betrachten und überhaupt nicht innerlich anwenden.

Innerl. (*ad Granum dimidium!* — *Non solutum* \pm) zu Gr. $\frac{1}{16}$ – $\frac{1}{4}$, vorsichtig steigend bis zu Gr. $\frac{1}{2}$ –1; 1–2mal tägl. Selten kleinere Gaben häufiger. (Nicht gern bei ganz nüchternem Magen [vgl. jedoch I. 8. 83]; gern mit etwas Opium.) [Es lässt sich nicht recht bestimmt angeben, wie hoch man wohl ohne Schaden steigen dürfe, weil es darüber an Erfahrungen fehlt, denn die meisten Formeln, in denen man bisher den Sublimat zu reichen pflegte, waren chemisch fehlerhaft componirt, so dass man nur im Anfang kleine Gaben Sublimat, später aber grössere Gaben Calomel od. dgl. reichte. Will man sich für die Folge zweckmässigerer Formeln bedienen, so betrachte man darin den Sublimat als ein noch wenig geprüftes Mittel, fange mit den kleinsten Dosen an, und steige sehr vorsichtig. — Vgl. I. §. 18. sub c.)] In Auflösungen [entweder in wässerigen (Althäendecoct oder einfachem destill. Wasser, wo man dann Althäendecoct nachtrinken lässt) oder (der Zersetzung etwas weniger unterworfen) in geistig-wässerigen (z. B. Gr. $\frac{1}{4}$ –1, und vorsichtig steigend mehr, in *Spir. V. rftiss.* Dr. 1, Wasser Dr. 3, theelöffelweise und Althäendecoct nachzutrinken). Ätherische Auflösungen sind milder zweckmässig, weil man bei ihnen die Einzelgabe nach Tropfen bestimmen muss, was noch weniger Genauigkeit zulässt als die Bestimmung nach Löffeln. — VAN SWIETEN's Darreichungsart — in (Fuselöl enthaltendem!) *Spir. Frumenti*, esslöffelweise — werden deutsche Ärzte nicht mehr nachahmenswerth finden. — Gr. 1 in *Aq. destill.* Dr. 6 mit \dagger *Vin. Colchici e Semine* Dr. 2; 2stündl. (umgeschüttelt, der Zersetzung wegen) 30–40 Tropfen: LENTIN, BURDACH (in Triebel) u. HACKER bei acuter Gicht. (Zweckmässiger wohl das \dagger *Vin. Colch. e Semine* und die Sublimatauflösung jedes für sich, und die letztere seltener.], besser aber in Pillen [auch in diesen immer aufgelöst (I. §. 150). Wir theilen unten, ihrer Berühmtheit wegen, die chemisch nicht tadelfreien (Kleber u. Zucker enthaltenden) Formeln von HUGELAND u. DZONDI mit, Ry 507 u. 508. Zweckmässiger sind die Formeln Ry 509 u. 510, aber auch diese verordne man nur auf so kurze Zeit, als wir es unten gethan haben. — Wenn man den Sublimat in kaltem Wasser auflösen lässt, so muss man, da er 18 Theile Wasser erfordert, einen starken Zusatz von fester Masse machen, also den Sublimat auf eine grössere Zahl von Pillen (wie dies z. B. HUGELAND in Ry 507 gethan hat) vertheilen oder die einzelnen Pillen etwas gross werden lassen; — beides würde zwar nicht schaden; will man es indess doch vermeiden, so lasse man den Sublimat, wie in Ry 510, in heissem Wasser auflösen].

Ausserl. [man vergesse nicht, dass, namentlich bei wunder Haut oder auf Schleimbäuten, auch die äusserliche Anwendung des Sublimats nicht gefahrlos ist] zu Mund- u. Gurgelwässern [bei diesen ist grosse Vorsicht wegen des Verschluckens nöthig, doch werden auch gewöhnlich zersetzende Compositionen (wie Ry 511), mit Honig od. dgl., gewählt, welche den Sublimat mehr od. weniger rasch und vollständig in Calomel od. dgl. verwandeln. Will man die Zersetzung möglichst verhüten u. doch etwas Einhüllendes haben, so passen die S. 253 angegebenen Stoffe. — Gr. $\frac{1}{2}$ –2 (u. mehr) auf Unc. 6. — Ry 511. — Vgl. *Hb. Sabin.*], Pinselflüssigkeiten [bei diesen ist die gleiche Vorsicht nöthig, doch werden auch hier gewöhnlich zersetzende Compositionen gewählt; so Ry 512], Klystieren [Ry 513, 514] u. a. Injectionen [z. B. für die Harnröhre Gr. $\frac{1}{4}$ –1 auf Unc. 1, für die Vagina verhältnissmässig

stärker. — Gr. 1 auf Unc. 2-3: RAUCH bei Flechten im Gehörgang. — ℞ 515-519], Augenwässern [Zu Waschungen u. Bähungen Gr. $\frac{1}{2}$ -1 auf Unc. 4. Zu Tropfwässern Gr. $\frac{1}{12}$ - $\frac{1}{4}$ auf Unc. $\frac{1}{2}$. Zu Pinselwässern (selten) Gr. 1 u. mehr auf Dr. 1. — Es ist nicht zu billigen, dass viele Augenärzte, weil sie sich scheuen, einen Bruch von einem Gran zu verschreiben, immer einen ganzen Gran ansetzen, dazu nun eine Anzahl Unzen Wasser und etwa noch theure Zusätze, z. B. Opiumtinctur in grosser Quantität; der Kranke bekommt auf diese Weise oft ein unnütz voluminöses und theures Augenwasser, das schon verdorben ist, wenn er vielleicht erst den 8ten Theil davon verbraucht hat. Man schreibe vielmehr unbedenklich einen Bruch auf. — Will man einen Schleim zu den Augenwässern, so wähle man *Mucil. Gm. Mimos.* oder eine (mit *Aq. destill.* bereite) Althäenabkochung; unschicklich aber ist der Quittenschleim und deshalb z. B. die *Aq. ophthalm. mercurialis* PH. P. (Gr. $\frac{1}{2}$ in *Aq. Rosar.* Unc. 3, mit Quittenschleim Dr. 1, *Aq. Laurocer.* 30 Tropf.) nicht zu loben. — Statt des beliebten Rosenwassers oder andrer riechenden Wässer nehme man lieber einfaches destillirtes Wasser. — ℞ 520-523]; zu Umschlägen, Waschungen u. Einreibungen [gewöhnlich etwa Gr. 1-2 auf Unc. 1, doch auch weniger oder mehr. — Gegen *Prurigo pudendi muliebris* lässt WENDT mit Gr. 1 auf *Aq. destill.* Unc. 3, BATEMAN mit Gr. 2 od. etwas mehr auf *Aq. Calcar.* Unc. 1 (über die hierbei erfolgende Zersetzung vgl. den Art. *Aq. phagedün.*), waschen (sind aber Risse, Excoriationen dabei, dann zuvor gegen diese Palliativmittel). — Gr. 1 (bisweilen mit eben so viel Grünspan) auf *Aq. destill.* Unc. 1-2: BENEDICT zum Umschlagen bei beginnendem *Herpes exedens nasi*, umgeschüttelt. — Gr. $2\frac{1}{2}$ - $7\frac{1}{2}$ auf L. $\frac{1}{2}$ einer saturirten Abkochung von *Rad. Helen.* od. *Hb. Clematid. erect.*, damit bei chronischen Hautausschlägen mittelst eines Schwämmchens die mit Pusteln u. Rändern besetzten Hautstellen, auch die daraus entstandenen Geschwüre, öfters tägl. zu befeuchten (gewöhnlich gleichzeitig innerlich *Hydrarg. sulphurat. nigr.* od. *Hydr. stibiato-sulph.*); RUST. — Dr. $\frac{1}{2}$ auf L. 1: WEIKARD's Waschwasser gegen Krätze. — ℞ 524, 525. — Weit stärkere Auflösungen wendet man an, wo man ätzend wirken will; z. B. Gr. 15-20 auf Unc. 1, mehrmals tägl. mit Compressen überzuschlagen (bis die Stelle wund wird): RIGORD u. A. bei verhärteten Babonen; — Scr. 1-Dr. $\frac{1}{2}$ auf *Spir. F. rft.* Unc. 1, damit Aftergewächse 1-2mal tägl. zu bestreichen: v. WALTHER. Vgl. ℞ 526, 527]; zu Bädern [vgl. I. S. 363. — Dr. 1-Unc. 1 zu jedem Bade (am besten aus Regenwasser, s. I. S. 362). — Z. B. bei hartnäckiger Gicht Bäder mit Dr. 1-2 Subl. (anfangs 20, dann 30 Minuten; der Kranke tauche sich bis über die Brust ins Wasser. Gewöhnlich sind 3-5 Bäder hinreichend, dann andere Mittel): KÖPP. — Dr. 1-2, allmählig bis Unc. $\frac{1}{2}$, zu jedem Bade (von 22-28° R.; $\frac{1}{4}$ -1 St.; nach dem Bade liege der Kranke eine Weile im Bett): BONNARDEL bei chronischen Gelenkschwellungen aus verschiedenen Ursachen. — Bei Syphilis, fieberloser Gicht, chronischen Rheumatismen, weisser Kniegeschwulst, Scrofeln, Rhachitis u. s. w., laue Bäder ($\frac{1}{4}$ -1 St.; der Kranke reibe im Bade den leidenden Theil gelind mit der Hand), zu jedem Dr. 2-Unc. 1 Sublimat (der Kranke bleibe darauf 1 St. im Bett; am besten nimmt er das Bad am Morgen oder, besonders im Winter, am Abend; wenn bleibendes starkes Jucken, starke Hautröthung, ein frieselartiger Ausschlag od. dgl. entsteht, einige Tage aussetzen): v. WEDEKIND (der Autor lässt bei Wohlhabenden bisweilen noch etwas *Spir. Lavandul.* zum Bade setzen, was aber, wegen Zersetzung wegen, nicht rathsam). — Unc. $\frac{1}{2}$ auf jedes Bad: FRICKE bei syphilitischen Ausschlägen. — Auch örtliche Bäder; z. B. ℞ 528, 529.],

Verband wässern [selten; etwa Gr. $\frac{1}{2}$ - 2 auf Unc. 1: nur, wo man fürmlich ätzend einwirken will, mehr, vgl. z. B. *Empl. Canth. ordin.* (RENAUD)], Salben [z. B. Scr. 1 auf Unc. 1 Fett: FISCHER gegen Kopfgrind, doch nur immer stellenweise anzuwenden, um zu rasche Unterdrückung zu verhüten. — CIRILLO's antisypilit. Heilmethode, von HUFELAND abgeändert: Von einer Salbe aus Sublimat u. Salmiak ana Dr. 1 (CIRILLO hat den Zusatz von Salmiak nicht) auf Unc. 1 Fett (*Ungt. mercuriale corros.* PH. P.; 1 Unze 6 Sgr. — Die Salbe muss sehr fein zerrieben seyn, darf sich zwischen den Fingern nicht sandig anfühlen.) wird jeden Abend Dr. 1 (nach CIRILLO anfangs Dr. $\frac{1}{2}$ u. allmählig mehr, bis zu Dr. 2) in eine Fuss-Sohle eingerieben, am besten durch den Kranken selbst; dieser behält des Nachts wollene Socken an. Dabei einen Tag um den andern ein laues Bad, tägl. eine Tisane aus *Rad. Sarsaparill.* Unc. 1, bei Knochenkrankheiten, besonders Knochenschmerzen, noch mit *Cort. Mezer.* Dr. $\frac{1}{4}$ - 1; mässige, mehr vegetabilische Diät, nichts Erhitzendes. Nach Beseitigung der Symptome setzt man die Cur noch einmal so lange fort, als sie bis dahin gedauert hat. Es habe diese Methode vor andern den Vorzug, dass sie auch bei alten od. geschwächten Individuen, bei Neigung zu Bluthusten, zu Lungensucht, bei grosser Abmagerung, Neigung zur Hektik, erlaubt sey. — ROMBERG lässt bei hydropischen Affectionen der Brusthöhle von einer Salbe aus Sublim. Dr. 1 und *Ungt. rosat.* Unc. 1 Erwachsenen stündl., Kindern 2stündl., 1 Theelöffel voll in der Herzgrube oder auf dem Brustbein einreiben, bis Blasen entstehen (diese werden nicht geöffnet; ist dies zufällig geschehen, so legt man Bleisalbe auf). — Noch stärkerer Sublimatsalben bedient man sich, um zu ätzen; z. B. R_x 530, 531; 661 (*Liq. Stib. mur.*).]; als Streupulver [heftig ätzend; bei fauligen und krebsartigen Geschwüren, doch selten]. — Man bedient sich auch wohl einer, mehr oder weniger gesättigten, Auflösung des Sublimats in starkem Branntwein, um Leichen oder Theile derselben, die man damit getränkt hat, für eine spätere Untersuchung, gegen die Verwesung geschützt, trocken aufbewahren zu können; doch macht der Sublimat die meisten Theile, namentlich die Muskeln, grau.

507.

R_x Hydrarg. muriatici corrosivi Gr. 6
solve in

Aq. destill. q. s.

adde

Micas Panis albi pulv.

Sacch. albi pulv. ana q. s.

ut f. Pilulas 180. — HUFELAND. Vgl. das S. 254 Bemerkte. — Ähnlich componirt, aber noch mit unpassendem Quantitätsverhältniss der Constituentien, sind die *Pilulas Hydr. mur. corros. s. Pil. majores Hoffmanni* der PH. SLESV. Die *Massa Pilul. majorum Hoffmanni* der PH. HANN. enthält keinen Zucker.

508.

DZONDI's antisypilit. Methode.

R_x Hydrarg. muriat. corros. Gr. 12

solve in

Aq. destill. q. s.

adde

Micas Panis albi pulv.

Sacch. albi pulv. ana q. s.

ut f. Pilulas 240. *Consp. Pulv. Cass. cinnam. aut Sem. Lycop. D.* — Einen Tag um den andern, unmittelbar nach dem Mittagessen, das erste Mal 4 Pillen ($\frac{1}{3}$ Gran), dann jedesmal 2 ($\frac{1}{6}$ Gran) mehr, zu nehmen (u. etwa Wasser od. Bier nachzutrinken), bis man (am 27ten Tage) auf 30 ($1\frac{1}{2}$ Gran) gekommen ist. (Sehr selten ist es nöthig, noch, in derselben Weise fortfahrend, höher, bis auf 40 od. mehr Pillen, zu steigen.) — Oft (bei Reizbarkeit der Verdauungswerkzeuge, der Lungen, bei Schmerzen, Neigung zu Diarrhöe, Erbrechen u. dgl.) setzt DZONDI der Pillenformel noch

Opium (Gr. 2-4) zu. Sollten die Pillen weggebrochen werden, dann eine andere, gleich grosse Portion derselben sogleich oder kurz nachher mit 2-4 Tropfen Opiumtinctur. Wenn einige Stunden nach dem Einnehmen Leibes Schmerzen entstehen, gebe man (wenn nicht schon der Genuss einer leichten Speise, z. B. eines Zwiebacks, hilft) entweder sogleich, oder in der Folge mit dem Pillen zugleich, 2-6 Tropfen Opiumtinct. Zu den grössern Gaben der Pillen lässt DZONDI überhaupt gern einige Tropfen Opiumtinct. nehmen. — Dabei sehr schmale Diät [nur halb satt essen; Schweine-, Gänse-, Enten-, Wildfleisch, alter Käse und Saurer, an den Arzneitagen auch Milchspeisen, zu meiden; Spirituosa höchstens mässig]; fortwährende Unterhaltung einer gelinden Hautausdünstung [noch 8-14 Tage nach der Cur]; tägl., oder auch nur an den Arzneitagen, eine Sarsaparill-Tisane [1 gehäufte Esel. (etwa Dr. 3) zerschnittener Sarsap. mit 5-6 Tassen Wasser $\frac{1}{2}$ St. eingekocht, dann noch 1 St. heiss digerirt], die hauptsächlich am Vormittag zu trinken, warm oder kalt [statt der Sarsap. bei Armen *Lign. Sassafr. u. Guaj. ana*]; und eine möglichst indifferente örtliche Behandlung. — Bei üblen Zuträufen von Erhaltung, bei Speichelfluss u. s. w. nöthigenfalls Aussetzen der Cur; nach Beseitigung [durch Diaphoresis, Bäder, Schwefel, Opium, Camph. p.p.] da fortfahren, wo man stehen geblieben. Kündigt sich der Speichelfluss erst kurz vor der höchsten Gabe (von 30 Pillen) an, so darf man diese noch geben (mit Opiumtinct., neben passender örtlicher Behandlung des Zahnfleisches). — Wer schon kurz vor der Cur viel Quecksilber genommen und sich dabei nicht gehörig gehalten hat, soll ein Paar Wochen lang durch Schwefelmitel [etwa *Sulph. dep. oder pulv. Dr. 2* mit 4 Unz. Wasser u. 20 Tropfen *Tinct. Op. simpl.*, davon 3mal tägl., umgeschüttelt, 1 Esel., — oder *Kali sulphurat. Scr. 1* in *Aq. dest. Unc. 1* mit *Syr. Cinnam. Dr. 2*, dies tägl. in 3 Portio-

nen, — daneben Schwefelleberbäder, diaphoret. Verhältn.] vorbereitet werden. Auch scorbut. Disposition ist vorher möglichst zu tilgen [u. nöthigenfalls während der Cur durch gleichzeitigen Gebrauch von Chins od. a. Mitteln (nur nicht Säuren) zu berücksichtigen], chronische Diarrhöe vorher zu heben. Die Menstruation nöthigt nur bisweilen zum Aussetzen. Schwangerschaft contraindicirt die Methode nicht. — Die Cur muss, wenn man der gründlichen Heilung gewiss seyn will, unter allen Umständen ganz durchgemacht werden, selbst wenn schon früher alle Krankheiterscheinungen verschwanden. (Ein Mehreres s. in DZONDI's *neue zuverlässige (?) Heilart der Lustseuche*. 2te Aufl. Halle 1832. und bei KLUGE in *RUST's Magazin*. Bd. 26. S. 17 ff.)

509.

Rx *Hydrarg. muriat. corros. Gr. 1*
solve in

Aq. destill. Scr. 1

adde

Succi Glycyrrh. dep. Dr. $\frac{1}{2}$

Rad. Glycyrrhiz. pulv. q. s.

ut f. *Pilulae 32. Cons. Pulv. Rad. Alth. D. —*

510.

Rx *Hydrarg. muriat. corros. Gr. 1.*
solve in

Aq. destill. fervid. Scr. $\frac{1}{2}$

adde

Opti pulv. Gr. 1

Rad. Glycyrrhiz. pulv. Scr. $\frac{1}{2}$

Succi Glycyrrh. dep. q. s.

ut f. *Pilulae 10. Cons. Pulv. Rad. Glycyrrh. D. —*

Ähnlich die *Pilul. ex Hydr. mur. corr. PH. MIL.*, die aber nur halb so viel Opium enthalten.

511.

Rx *Hydrarg. muriat. corros. Gr. 3*
Ammon. muriat. dep. Scr. 1

solve in

Aq. destill. Unc. 5

adde

*Tinct. Opü croc. Dr. 1**Mucil. Gm. Mimos.**Mell. despum. ana Unc. ½.*

M. D. — Umgeschüttelt als Mund- u. Gurgelwasser. (Gegen syphilit. Mund- u. Rachen-Geschwüre.) BIETT.
Vgl. S. 253 (Note) u. S. 254.

512.

Ry *Hydrarg. muriat. corros. Gr. 3-6*
solve in

Aq. destill. q. s.

adde

*Extr. Conii macul.**Extr. Chamomill. vulg. ana Dr. 1**Tinct. Opü simpl. Scr. 2**Mell. rosati Unc. ½.*

M. D. S. Pinselsaft, 2-3mal tägl., umgerührt, anzuwenden (auf Rachen- u. Nasen-Schanker, auch wohl auf Schanker an den weiblichen Genitalien. Bei sehr hartnäckigen statt der Opiumtinctur Scr. 1 reines Opium). RUST.
Vgl. S. 254.

513.

Ry *Hydrarg. muriat. corros. Gr. ¼ - ½*
solve in

Aq. destill. Unc. 1

adde terendo

*Opü pulver. Gr. 1**Mucil. Gm. Mim. Unc. 1½.*

M. D. S. Erwärmt u. umgeschüttelt zum Klystier. (Bei heftigen Dysenterien, hartnäckigen Diarrhöen, wo Opiumklystiere allein nicht ausreichen.) KOPP.

514.

Ry *Hydrarg. muriat. corros. Gr. ⅓ - ½*
solve in Colat. refriger.

Infusi Sem. Cinæ (Dr. 2) Unc. 1½

adde

Mucil. Gm. Mimos. Dr. 2.

M. D. S. Erwärmt und umgeschüttelt als Klystier. (Gegen Askariden, bei Kindern von 6-8 Jahren.) KOPP.

515.

Ry *Hydrarg. muriat. corros. Gr. 1*
solve in

Aq. destill. Unc. 4

adde

Tinct. Opü simpl. Gtt. 24.

M. D. in vitro charta nigra obd. S. Mehrmals tägl., umgeschüttelt, einzuspritzen. (Bei ödematöser und wenig empfindlicher Phimose.) WENDT.
Stärker ist Ry 516.

516.

Ry *Hydrarg. muriat. corros. Gr. 1½*
solve in

Aq. destill. Unc. 3

adde

Tinct. Opü simpl. Dr. 2.

M. D. in vitro charta nigra obd. S. Umgeschüttelt einzuspritzen (zwischen Eichel und Vorhaut, bei syphilitischer Phimose). RUST.

517.

Ry *Hydrarg. muriat. corros. Gr. 2*
solve in

Aq. destill. Unc. 2

adde

Tinct. Opü croc. Scr. 1.

M. D. in vitro charta nigra obd. S. Umgeschüttelt zum Einspritzen u. Waschen. (Bei Eicheltripper.) WENDT.

518.

Ry *Hydrarg. muriat. corros. Gr. 6*
solve in

Aq. destill. Unc. 16

adde

Tinct. Opü croc. Unc. ½.

M. D. in vitro charta nigra obd. S. Umgeschüttelt einzuspritzen. (Bei syphilit. Geschwüren der weiblichen Genitalien.)

Formel des Hôpît. des Vénériens.

519.

Ry *Hydrarg. muriat. corros. Gr. ¼*
solve in

Aq. destill. Dr. 2

adde

Tinct. Galbani Dr. $\frac{1}{4}$.

M. D. in vitro charta nigra obd. — Umgeschüttelt, in den vorher durch eine milde Einspritzung gereinigten Gehörgang einige Tropfen zu giessen u. ihn dann mit Baumwolle zu verstopfen. (Bei specifischer Otorrhöe.) VOGT.

520.

Ry *Hydrarg. muriat. corros.* Gr. $\frac{1}{4}$

solve in

Aq. Rosar. (besser *Aq. destill.*) Unc. 3

adde

Tinct. Opii croc. Scr. 1.*M. D. in vitro charta nigra obd.* —

Aq. ophthalm. CONRADII nach Angabe der PH. HANN. (1 Unze $1\frac{1}{2}$ Mgr.) Es wird theils zu Augen-Waschungen u. -Bähungen, theils (doch dann meist mit viel stärkerem Zusatz von Opiumtinct.) zum Eintröpfeln gebraucht.

521.

Ry *Hydrarg. muriat. corros.* Gr. 1

solve in

Aq. destill. Unc. 4

adde

Tinct. Opii crocat. Scr. 1.

M. D. in vitro charta nigra obd. S. Zu Augenbähungen, umgeschüttelt. (Bei anfangender Cataract u. Ausschwitzungen der Iris.) (ANDREAE.

522.

Ry *Hydrarg. muriat. corros.* Gr. 1

solve in

Aq. destill. Unc. 6

adde

Tinct. Opii croc. Scr. $\frac{1}{4}$.

M. D. in vitro charta nigra obd. S. Augewasser, umgeschüttelt (für das 2te Stadium der Augenentzündung bei Neugeborenen — wo der Autor auch verdünnte *Tinct. Op. croc.* allein anwendet). SCHÖN.

523.

Ry *Rad. Althaeae* Scr. 2coque c. *Aq. destill.* q. s. per $\frac{1}{4}$ hor.

ad Colat. Unc. 4, cui refrigerat. adde

Hydrarg. muriat. corros. Gr. $\frac{1}{3}$ — 1 antea in

Aq. Laurocer. Dr. 2solutum. *M. D. S.* Zu Augenbähungen.

Es bildet sich, der guten Wirkung unbeschadet, Cyanquecksilber.

524.

Ry *Stipit. Dulcam.* Unc. 1ebulliant c. *Aq. destill.* q. s. ad Co-

lat. Unc. 6, in qua solve

Hydrarg. muriat. corros. Gr. 4.

D. in vitro charta nigra obd. — Umgeschüttelt, Abends vor Schlafengehn das Gesicht damit zu waschen. (Gegen *Porrigio larvata* u. a. Gesichtsausschläge.)

ASCHERSON.

525.

Ry *Hydrarg. muriat. corros.* Scr. $\frac{1}{4}$ *Ammonii muriat. depur.* Dr. 2

solve in

Aq. destill. Unc. 6.

D. S. Zum Einreiben (auf die Brust, bei im normalen Verlauf durch äussere Ursachen gestörtem, namentlich bei durch Erkältung zurückgetretenem Friesel nicht allzu erschöpfter Individuen). HENSER.

526.

Ry *Hydrarg. muriat. corros.* Scr. 1*Ferri sulphur. cryst.* Scr. 2

tere cum

Spir. Vini rft. Unc. 3.

M. D. S. Umgeschüttelt mittelst Charpie anzuwenden. (Wenn syphilit. Condylome der allgemeinen Behandlung nicht weichen.) KLUGE.

527.

Ry *Hydrarg. muriat. corros.* Dr. 1*Camphorae* Dr. $\frac{1}{4}$

solve in

Spir. Vini rftiss. Unc. 1.

D. in vitro charta nigra obd. — Umgeschüttelt, täglich 2mal die Excreascenten damit zu betupfen. (Hat sich im Charité-Krankenhaus zu Berlin sehr wirksam gegen *Condylomata lata*, nicht aber gegen die *acuminata*, gezeigt.)

FREYBERG.

528.

Rx *Hydrarg. muriat. corros.* Scr. 1 — Dr. $\frac{1}{2}$

Ammon. muriat. dep. Unc. $1\frac{1}{2}$ — 2
solve in

Aq. destill. Unc. 12-18
addo

Ol. Sabinas Gtt. 12-18
antea in

Spir. V. rft. Unc. 4-6
solutas. M. Disp. tal. dos. nr. — . *D.* — 2-3 mal tägl. eine solche Portion zum Hand- oder Fuss-Bade. (Bei örtlicher Gicht.) (KOPF.)

Der Autor wählt \dagger *Aq. Sabin.* u. \dagger *Spir. Sabin.*, die in den neueren Pharmacopöen nicht mehr officinell sind. Um das Mittel wohlfeiler zu machen, könnte man die Quantität des zur Auflösung der Salze verwendeten Wassers verringern (Unc. 7-8); noch mehr würde erspart, und zugleich die Zersetzung mehr hinausgeschoben, wenn man mehrere Dosen der Salze-Auflösung in einer Flasche, der Ölauflösung in einer andern verabreicht und die Eintheilung beider im Hause vornehmen liesse.

529.

Rx *Hydrarg. muriat. correa.* Gr. 48
solve in

Spir. Vini rftas. Unc. 1

Aq. destill. L. 1.

D. in vitro charta nigra obd. — Auf 6 oder 5 Fussbäder (in einem bis unter die Knöchel mit heissem Wasser gefüllten Gefässe, durch Zugiessen von heissem Wasser immer auf 36° R. zu erhalten, $\frac{1}{2}$ St. lang) zu vertheilen. (Als Antisymphiliticum.) VERDUCCI.

530.

Rx *Hydrarg. muriat. corros. pulv.*

Liq. Stibii muriat. ana Dr. 1

Ungt. Cantharid. Unc. $\frac{1}{2}$.

M. D. — (Besonders zur Bildung von Fontanellen.)

Unguentum acre PH. HASS.

531.

Rx *Hydrarg. muriat. corros. pulv.* Dr. 2
Gm. Mimos. pulv.

Aq. destill. ana Scr. 1.

M. f. Ungt. spissum. D. — (Besonders zur Heilung von callösen Fistelgeschwüren; aber auch zum Wegätzen von Schwammgewächsen, schwammigem Fleisch in Geschwüren u. s. w.)

Ungt. corrosivum s. escharoticum.
v. GRÄFE.

Hydrargyrum muriaticum mite. Mercurius dulcis. Calomelas. Panacea mercurialis. Chloretum (s. Protochloridum) Hydrargyri. Versüßtes Quecksilber; Calomel; mildes salzsaures Quecksilberoxydul. Chlorquecksilber im Minimo des Chlors. Quecksilberchlorür. [Sehr feines Pulver. — 1 Drachme $1\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave* [mit häufigen sanction, Ausnahmen] Salpetersäure; Blausäure; Salzbilder; reine u. kohlensaure Alkalien u. alkal. Erden [die unchemischen Verbindungen mit *Magnesia carbonica* od. *Conchas ppt.*, *Lap. Cancr.* zum innerlichen, mit Kalkwasser zum äusserlichen Gebrauch hat jedoch die Erfahrung sanctionirt]; Schwefelmetalle [Mineralkermes und Goldschwefel zersetzen sich mit dem Calomel gegenseitig — wenn sie, wie gewöhnlich, luftfeucht sind, sogar zum Theil

schon während des Zusammenreibens — zu Chlorstibium und Schwefelquecksilber; man beobachtet jedoch davon (bei der alltäglichen Darreichung des Plummer'schen Pulvers z. B.) keine Noetheile; wollte man es aus Vorsicht vermeiden, müsste man sie und das Calomel eigens gut auszutrocknen vorschreiben]; Seifen; — (Schwefelsäure, Salzsäure, salzsaure Salze, Schwefel u. Phosphor nur unter Hitze).

Innerl. in chronischen Krankheiten [namentlich auch in der Syphilis — bei Wassersuchten aber meist in höheren Gaben] zu Gr. $\frac{1}{4}$ – $1\frac{1}{2}$, 2–3mal tägl. [nach PHILIP zu $\frac{1}{30}$ – $\frac{1}{20}$ Gran 3–4mal tägl.]; in acuten Krankheiten meistens zu Gr. 1–3 alle 3–4 St. [gern so, dass tägl. einige breiige, grüne Stühle — aber keine wässerigen Durchfälle — erfolgen. — Einiger Ärzte ungewöhnlich grosse Gaben s. unt. Pulver. — Beim Tetanus nach einigen nordamerikanischen Ärzten zu 1 Drachme p. dosi (!), in kurzen Intervallen zu wiederholen]; als Laxans Gr. 2–6 alle 3–2 St., 2–3mal hinter einander [doch hier selten pur, sondern meist mit *Rad. Jalap.* od. dgl.]. [Kinder vertragen verhältnissmässig sehr grosse Gaben.] — In Pulver [meistens nicht gern (I. B. 210 sub b.); und wenn man diese Form wählen muss, weniger zweckmässig mit Zucker od. a. leicht auflöselichen Dingen, als mit unaflöselichen oder doch schwer od. nur unvollständig auflöselichen Constituentien (I. §. 112. sub 1)). — Ry 532–535; 450.e. (Gutti), 567 (Iodum), 852 (*Rad. Jalap.*). — OTTO gegen rheumat. Fieber u. hitzigen Rheumatismus: Abends beim Schlafengehn 10 Gran mit 2 Gran (!) Opium; am folgenden Morgen *Inf. Sennae comp.* — LESSER und WOLFF bei Gastroenteritis zu Ende des 1ten und im 2ten Stadium: des Morgens zwischen 9 und 11 Uhr, 2mal binnen $\frac{1}{2}$ St., jedesmal 10 Gran; in schweren Fällen auch noch Abends 10 Gran; wenn die Kräfte sehr sinken, mit Campher (Gr. 1–3 zu jeder Gabe oder auch eine Campheremulsion in der Zwischenzeit); wenn das Mittel Erbrechen erregt, mit *Elaeosacch. Menth.* (oder dies kurz nachher); dabei das gewöhnliche Mercurialregim (warmes Zimmer, warmes Getränk, Säuer, wiederholte Reinigung des Mundes). So 5–7 (–10) Tage; bei Besserung oder bei zu grossem Verfall der Kräfte das Calomel nur 2 od. 1mal tägl. oder ganz ausgesetzt. In der (meist schweren, langwierigen!) Reconvalescenz Campher, *Serpentar.*, dann Roborantien, und sehr vorsichtige Verbesserung der Diät. — WEINHOLD's Methode bei eingewurzelten Dyscrasien, syphilitischer, rheumatischer, arthritischer, scrofulöser: Abends kurz vor Schlafengehn bei leerem Magen Gr. 10–15 Calom., u. ein Paar Tassen warme Fleischbrühe nachgetrunken; nach $\frac{1}{2}$ St. Wiederholung dieser Gabe, u. bei starken Subjecten nach einer 2ten halben Stunde noch die Hälfte einer solchen Gabe; Morgens darauf ein Paar Tassen mässig starken Kaffees, worauf gewöhnlich 3–4 flüssige Stuhlgänge erfolgen; wo nicht, ein Pulver aus *Jalape* u. *Kali tartar.*, von jedem Gr. 15–20. Diese sämtlichen Mittel jeden 4ten Tag (Quartantypus, also am 4ten, 7ten, 10ten, 13ten Tage, u. s. w.) wiederholt, 7–8mal (also bis zum 19ten od. 22sten Tage). Etwa von der Mitte der Kur an in der Zwischenzeit eine leichte China-Abkochung und kräftige (Fleisch, Wein), doch nur sehr sparsame Diät; bei nicht ganz üblem Wetter darf der Kranke ausgehn. Eine vehemente Methode!], Trochisken [die nur unvollständig zu zerkauen, rasch zu verschlucken sind, um das Verweilen des Calomels im Munde nicht zu befördern; Kinder werden es meist von selbst so machen. — Ry 536], Pillen u. Bissen [Ry 537, 538; 852 (*Extr. Calend.*), 367 (*Extr. Conil mae.*)],

450. b. (Gutti), 853 (Rad. Jalap.), 940 (Res. Guaj. nat.), 975 (Sem. Stramon.); s. auch *Sapo jalapin.*]

Ausserl. zu Schnupfpulvern [Scr. $\frac{1}{2}$ auf Dr. 2 Zucker, mehrmals tägl. eine Prise: SCHMUCKER bei Augenkrankheiten, namentlich Amaurose. — Gr. 24 mit Gr. 12 rothen Präcipitats u. $\frac{1}{2}$ Unze Candiszucker (*D. in vitro*); 5-6mal tägl. eine Prise: TROUSSEAU gegen Ozaena und chronischen Schnupfen], Klystieren [R₅ 539], Augenpulvern [nicht unvermischt. — R₅ 540. — Auch wohl für die Umgegend des Auges mit Speichel *ex tempore* zu einer Art Liniment gemacht; z. B. mit *Extr. Opii ana* Gr. 3-4 (RUST), oder 8 Gran mit 4 Gran Opium (BEER), gepulvert ums Auge einzureiben, bei chronischen, zu Exsudation u. organischen Metamorphosen neigenden oder sehr schmerzhaften Ophthalmien, bei scrofulöser Photophobie u. s. w.; — bei chronischer Wassersucht der Augenlider von scrofulöser Ursache nach v. AMMON mit Zucker, sehr oft des Tags, aber jedesmal nur wenig, in die Augenlider einzureiben.], Augewässern [R₅ 541], Streupulvern [selten: R₅ 127 (*Arsen. alb.*)], Salben [Dr. $\frac{1}{2}$ -2 auf Unc. 1. — R₅ 542-547; 473 (*Hb. Digital.*), 569 (*Iodum*). — Scr. $\frac{1}{2}$ auf Dr. 2 Rosensalbe: WENDT gegen Excoriationen der Schaamtheile beim Weibertripper. — Augensalbe: R₅ 1106 (*Zinc. oxyd.*)], Verbandwässern [R₅ 548]; endermatisch [als Purgans zu Gr. 3-4 u. mehr, gegen Syphilis zu Gr. $\frac{1}{16}$ -2 angewandt; — nach A. L. RICHTER sehr anzuverlässig]; in Frankreich auch zu Räucherungen [etwa wie *Cinnabaris*].

532.

R₅ *Hydrarg. muriat. mitis*

Sulph. stibiati aurant. ana Gr. 1

Sacch. albi (besser *Pulv. gummosi*) Scr. $\frac{1}{2}$.

M. f. Pulv. Disp. tales nr. — *D. S.* Morgens u. Abends, oder auch 3-4ständl., 1 Pulver.

Pulvis alterans PLUMMERI s. Edinburgensis.

Mit 18 Gran Zucker: *Pulv. ex Hydr. mur. miti et Sulph. stib. aur.* PH. MIL.

— Oft werden aus Calomel und Goldschwefel *ana* Pillen gemacht (etwa mit *Extr. Graminis*) und diese wohl *Pilulae alterantes PLUMMERI* genannt. Man verbindet auch wohl noch *Extr. Conii macul. od. dgl.* damit, vgl. z. B. R₅ 538.

533.

R₅ *Hydrarg. muriat. mitis* Gr. 3

Opii puri Gr. $\frac{1}{4}$

Hb. Digitalis Gr. 1

Elaeos. Foenic. Scr. $\frac{1}{2}$.

M. f. Pulv. Disp. tales nr. 12. D. in

charta cer. S. Tägl. 1-2 Pulver. (Bei Hydrophthalmus.) RUST.

534.

R₅ *Hydrarg. muriat. mitis* Gr. $\frac{1}{2}$

Sulph. stibiati aurant.

Extr. Hyocyami ana Gr. $\frac{1}{4}$

Rad. Glycyrrh. glabr. Scr. $\frac{1}{2}$.

M. f. Pulv. Disp. tales nr. 8. D. in charta cer. S. 4mal tägl. 1 Pulver. (Bei Brustentzündung eines 2jährigen Kindes zur Beförderung der Krise.)

535.

R₅ *Hydrarg. muriat. mitis* Gr. 3

Amyli Dr. $\frac{1}{2}$

Sacch. albi Dr. 1 $\frac{1}{2}$.

M. f. Pulv. Div. in 12 part. aeq. D. S. 3mal tägl. 1 Pulver. (Für syphilitische Säuglinge; das Amylum soll die abführende Wirkung beschränken.)

WENDT.

536.

R₅ *Hydrarg. muriat. mitis* Scr. 2

Rad. Jalap. pulv. Dr. 2
Cass. cinnam. pulv. Dr. ½
Sacch. albi pulv. Unc. 1½
Extr. Filicis äther. Scr. 1
Mucil. Gm. Tragac. q. s.
 et f. Trochisci nr. 160, Pulv. *Rad. Glycyrrh. glabr. conspergendi, leni calore torrendi. D. S. Morgens und Abends 5-8 Stück.* (Gegen den Bandwurm, bei zarten u. verwöhnten Kindern.)

(LANGE.

Dazu wird folgendes Pflaster, auf Leder gestrichen, über den Unterleib gelegt:

Ry *Cerae flavae Dr. 3.*

Leni cal. liquesfact. admisce

Empl. foetid. Unc. ½

et sub finem

Camphorae Dr. ½-1, ts

Ol. Absinth. äther.

Petrolei ana Dr. ½

antea solutam. F. l. a. Empl. D.

(Meistens wird wohl die Hälfte dieser Quantität zu einmaliger Application ausreichen.)

537.

Ry *Hydrarg. muriat. mitis Gr. 5*

Rad. Glycyrrhiz. pulv. Gr. 15

Succi Glycyrrh. dep. Scr. 1

Aq. comm. q. s.

ut f. Pilulae 20. Consp. Sem. *Lycop. D.* —

Pilulae ex Hydr. mur. miti PH.

MIL.

Statt des *Succ. Glycyrrh.* mit Wasser würde man einfacher *Extr. Glycyrrh.* anwenden.

538.

Ry *Hydrarg. muriat. mitis*

Sulph. stibiati aurant. ana Gr. 3

Hb. Conii macul. Gr. 12

Extr. Absinth. q. s.

ut f. Boli nr. 6. Consp. Pulv. *Cass. cinnamom. D. S. 2-3mal tägl. 1 Stück.* (Für ein 10 jähriges scrofulöses Kind.)

539.

Ry *Hydrarg. muriat. mitis Gr. 1-2-6*

Gm. Mimos. pulv. Unc. ½

terendo sensim misce c.

† *Aq. Valerian. Unc. 1½.*

D. S. Zum Klystier. — Das Glas wird in warmes Wasser gesetzt, u. wenn sein Inhalt lauwarm geworden ist, derselbe gut umgeschüttelt in die Spritze gegossen. (Bei krampf- u. schmerzhaften Hämorrhoidalbeschwerden im Mastdarm, bei Verdickung desselben und gegen Ascariden.) KOPF.

540.

Ry *Hydrarg. muriat. mitis*

Sacch. albi ana Dr. ½

Opü Scr. ½.

M. f. Pulv. alcohol. D. S. 2mal tägl. mit einem trockenen Pinsel aufzutupfen. (Bei adynamischen Hornantrübungen.)

JÜNGKEN.

541.

Ry *Extr. Hyoscyami Gr. 15*

solve in

Aq. Rosar. Unc. ½.

adde

Aq. Calcar. Unc. 3

Hydrarg. muriat. mitis Scr. ½.

M. D. S. Schwarzes Augenwasser. (Umgeschüttelt als Umschlag nach heftigen Blennorrhöen des Auges, wenn der Schmerz nachgelassen hat, der Ausfluss noch fortdauert, u. der Zustand noch zu frisch ist, als dass andere Mittel vertragen würden.) v. GRÄFE. Die schwarze Farbe rührt hier von derselben Zersetzung wie in Ry 548 her.

542.

Ry *Hydrarg. muriat. mitis Scr. 1*

Ol. Succini rft.

— *Galban. ana Scr. ½*

Adip. suill. Unc. ½.

M. f. Ungt. D. S. Zum Einreiben auf der schmerzenden Stelle u. auf dem Processus mastoideus. (Bei Prosopalgie.)

STARK.

543.

Ry *Hydrarg. muriat. mitis Dr. ½*

Opii pulv., c. pauc. Aq. in pulvem redacti, Scr. ½

Adip. suilli Unc. ½.

M. f. Ungt. D. S. Alle 2-4 St. hievon in die vordere Halsfläche sanft einzureiben. (Bei Croup.)

KRÜGER-HANSEN.

544.

R_y Hydrarg. muriat. mitis Dr. ½

Sulphuris depur. Dr. 1

Adip. suilli Unc. ½.

M. D. — (Pomatum antiherpeticum der Charité zu Paris.)

545.

R_y Hydrarg. muriat. mitis Dr. 2

Opii pulv., c. pauc. Aq. in pulvem triti Dr. 1

Adip. suilli Unc. 1.

M. D. S. Verbandsalbe. (Bei secundären syphilit. Hautgeschwüren.)

RUST.

546.

R_y Hydrarg. muriat. mitis

Rad. Scill. pulv. ana Dr. 2

Adip. suilli Unc. 1

Ol. Rosar. Scr. ½.

M. D. S. 2mal tägl. (zu Dr. 1-2) einzureiben. (Bei chronischen Gelenkschwellen.)

DUPUYTREN.

Für eine Einreibsalbe etwas zu steif;

man nehme, namentlich im Winter, lieber etwas mehr Fett oder weniger Pulver. — Ohne Rosenöl: *Graisse résolutive* des *Hôtel-Dieu* zu Paris.

547.

R_y Hydrarg. muriat. mitis Dr. 3½

Carbonis ppt. Dr. ½

Adipis suilli Dr. 5.

M. f. Ungt. Dr. — (Bei Hiefsgriech der kranken Stellen, zuvor mit einem warmen weinigen China-Aufguss gewaschen, Morgens u. Abends damit zu bestreichen. Daneben passende innerliche Behandlung.)

BIERT.

Auch diese Salbe ist zu steif (vgl. R_y 546).

548.

R_y Hydrarg. muriat. mitis Dr. ½

Opii pulv. Scr. 2

tere cum

Aq. Calcar. Unc. 3-4.

M. D. — Umgeschüttelt bei syphilitischer Phimose zwischen Eichel und Vorhaut einzuspritzen, oder — stärker, mit nur 2 Unzen *Aq. Calcar.*, 2-3mal tägl. auf primäre Schanker aufzulegen.

Aqua phagedonica nigra (auch wohl schlechtweg *Aqua nigra*), modificirt von

RUST.

Es bildet sich salzsaurer Kalk, und *Hydrarg. oxydulat. nigr.*, neben etwas unzersetztem Calomel.

Hydrargyrum oxydatum rubrum praeparatum s. laevigatum. *Mercurius praecipitatus ruber praeparatus. Oxydum hydrargyricum ppt.* Präparirter rother Präcipitat, Quecksilberoxyd. [Sehr feines Pulver. — 1 Drachme 1½ Sgr. Äusserl. darf man, doch nicht zu Augenmitteln, das *H. o. r. venale* (1 Unze 5 Sgr.) substituiren.] **Cave:** Man vermeide, mit einigen durch Erfahrung sanctionirten Ausnahmen, alle Verbindungen mit mineralischen Mitteln, äusserlich auch, besonders auf längere Zeit, die Verbindung mit Salben, welche Harz, Balsam, äther. Öl od. Honig enthalten [wodurch, besonders unter Einfluss des Lichts, das Oxyd zu Oxydul reducirt wird, u. die Salbe sich allmählig dunkel färbt].

Innerl. (*ad Granum dimidium!*) zu Gr. ¼ - ½, allmählig bis

1 (u. mehr), 1-2mal tägl.; in Pulver [gewöhnlich nach der Vorschrift von BERG, R₅ 549] od. Pillen [R₅ 550].

Ausserl. zu Schnupfpulvern [selten. Vgl. *Hydr. mur. mite*], Augenpulvern [selten; Gr. 5-15 auf Dr. 2], Augen- u. anderen Salben [Offic. *Ungt. Hydrarg. rubr.*, Scr. $\frac{1}{2}$ auf *Ungt. simpl.* Unc. 1. Diese Salbe ist indess für die meisten Fälle zu schwach, selbst zu Augensalben; zu diesen letzteren, zu denen man überdies die Salbe gern frisch anfertigen und den Präcipitat mit etwas Wasser zum Brei reiben lässt, nimmt man gewöhnlich Gr. 2-12 auf Dr. 2 Fett — z. B. Gr. 4 auf Dr. 2 frischer ungesalzener Butter: *Ungt. ophthalmicum* PH. R. (1 Unze $3\frac{1}{2}$ Sgr.); Gr. 1 auf Dr. 1 Butter, längere Zeit 1mal tägl. voras Einschlafen anzuwenden; FISCHER gegen nach scrofulöser Augenliederdrüsen-Entzündung zurückbleibende Verknötung od. Verhärtung des Liedrandes; — R₅ 551-555. — Zu andern Salben, je nachdem man mehr od. weniger reizend einwirken will, 1 auf 16-2 Fett, — z. B. Dr. $\frac{1}{2}$ - 1 auf *Ungt. plumbic.* Unc. 1: RUST zum Verbinden secundärer syphilitischen Hautgeschwüre; oder doppelt so stark: Derselbe zum Verbinden scrofulöser Geschwüre., Streupulvern [pur od. in Verbindungen. R₅ 556; vgl. *Cantharid.*].

549.

R₅ *Hydrarg. oxyd. rubri ppt.* Gr. 2
Stibii sulphurati nigri laevig. Scr. 8
Sacch. albi Scr. 2.

M. exacte, f. Pulv. Div. in 16 part. aeq. D. S. Morgens u. Abends ein Pulver. — Bei der Reiteration der Formel wird die Menge des rothen Präcipitats jedesmal um Gr. 2 vermehrt, bis man auf Gr. 10 (also Gr. $\frac{5}{8}$ p. dost) gekommen ist; dann fällt man mit der Dose wieder in derselben Art wie man gestiegen ist. Das *Stibium* bleibt dabei immer in derselben Quantität, doch darf man auch, wenn man bis zu 6 Gr. Präcipitat gestiegen ist, die Quantität bis zur Hälfte verringern. — Dabei eine Tisane aus *Cort. Mez.*, *Rad. Caric. aren.* u. *Stip. Daleam.* Katateht Diarrhöe, etwas Opium zu den Pulvern. (Bei inveterirter Syphilis mit Scrofelsucht complicirt, wo Mercurialien allein ohne Erfolg angewandt worden, u. keine besonders urgirenden Symptome vorhanden sind.) BERG.

550.

R₅ *Hydrarg. oxyd. rubri ppt.* Scr. 1
Extr. Glycyrrhiz. Dr. 2
Pulv. Rad. Glycyrrh. q. s.
ut f. *Pilulas* 160. *Consop.* D. S. Drei Tage lang, jedesmal $\frac{1}{2}$ St. nach dem Mit-

tagessen, 1 Pille ($\frac{1}{8}$ Gran Präcipitat), dann 3 Tage lang jedesmal 2, u. s. w., bis $1\frac{1}{2}$, höchstens 2 Gran Präcipitat pro dosi genommen werden. Mit diesen Gaben wird so lange fortgefahren, bis Magen- oder Mund-Beschwerden das Aussetzen der Pillen gebieten, oder die Krankheits Symptome verschwinden; im ersteren Fall giebt man nach Beseitigung jener Beschwerden das Mittel, zuerst wieder in geringeren Dosen, von neuem; im letzteren fällt man mit der Menge der Pillen in derselben Art, wie man gestiegen ist. (Bei hartnäckiger Syphilis, wo eine schwache Brust die Anwendung des Sublimats verbot, im Charité-Krankenhaus zu Berlin öfters mit Nutzen angewandt.)

551.

R₅ *Ol. Cacao*
Adip. suilli ana Dr. 1.
Lent igne liqyatis et refrigeratis adm.
Hydrarg. oxyd. rubri ppt. Scr. 1.
D. in olla alba. — Um die Orbita herum einzureiben. (Bei chronischen Ophthalmien.)

Ungt. ophthalm. RICHTERi nach der PH. HANN. (1 Drachme $2\frac{1}{2}$ Mgr.) Die Anwendung an einer weniger edlen Stelle rechtfertigt die etwas starke Dose.

552.

R_x *Hydrarg. oxyd. rubri ppt.* Gr. 6-8
Opⁱ pulv. Gr. 4-6
tere c. Aq. dest. pau-xillo in pulvem, adde
Ungt. rosati Dr. 2.

M. exactiss. D. in olla alba. S. 1-2 mal
 tägl., Abends u. Nachmittags vorm Schla-
 fengehn, einer kleinen Erbsen gross auf
 die Liedränder einzureiben (bei scrofa-
 löser Augenliederdrüsen-Entzündung)
 oder einer Erbsen gross mit einem Pinsel
 auf das umgekehrte Augenlid an die
 metamorphosirte Stelle zu bringen (bei
 schon etwas weiter vorgeschrittener ka-
 tarthal. Augenblennorrhöe).

(JÜNGKEN.

FISCHER bedient sich bei scroful. Augen-
 liederdrüsen-Entzündung einer un-
 gefähr halb so starken Salbe.

553.

R_x *Hydrarg. oxyd. rubri ppt.* Gr. 6
 † *Butyri recentis insulsi* Dr. 2
Tinct. Opⁱ crocatae
Aceti plumbici ana Scr. ½.

M. exactiss., donec omnis humiditas
 disparuerit. D. in olla alba. S. 1-2 mal
 tägl. vorm Schlafengehn einer Linse
 gross ins Auge zu bringen, oder auch
 nur auf die geschlossene Liedspalte ge-
 lind einzureiben. — Brennt die Salbe zu
 sehr, sieht das Auge den andern Tag roth
 aus, so setze man einen Tag aus. (Bei
Leppitudo, Psorophthalmie, *Ophthalmia*
angularis, Augenentzündung der Alten,
 und im 2ten Stadium fast aller Ophthal-
 mien, besonders katarrhalischer u. scro-

fulöser; desgleichen nach Ophthalmio- u.
 Blepharophthalamio-Blennorrhöen, bei
 Geschwüren der Augenlider, der Con-
 junctiva und Hornhaut.) (RUST.)

554.

R_x *Cerae albae* Dr. ¼
leni cal. liquefactae admisce
Adip. suilli Dr. 1½
et tandem

Hydrarg. oxyd. rubri ppt.
Plumbi acet. depur. pulv. ana Gr. 8
Extr. Opⁱ pulv. Gr. 4
antea c. pau-x. Aq. dest. in pulvem trita.
M. exactiss. D. in olla alba. S. Augen-
 salbe. (In scrofulösen Augenentzündun-
 gen, bei Trübung der Hornhaut.)

ANDREAE.

555.

R_x *Cerae albae* Gr. 15
Adip. suilli Dr. 1½.
Liquefactis et refrigeratis adde
Hydrarg. oxyd. rubri ppt. Gr. 7½
Zinci oxydati Gr. 4
Camphorae pulv. Gr. 3
Ol. Olorum Gtt. 2.

M. exactiss. D. in olla alba. S. Augen-
 salbe. (Bei Psorophthalmie.)
Ungt. (Bals.) ophthalm. ST. YVES
 nach der PH. HANN. (1 Drachme
 1 Mgr.)

556.

R_x *Hydrarg. oxyd. rubri ppt.*
Aluminis usti ana Dr. ¼
Hb. Sahinae Dr. 2.
M. f. Pulv. D. S. Aufzustreuen. (Ge-
 gen Condylome.) SCHUBARTH.

Hydrargyrum oxydulatum nigrum. Mercurius
solubilis Hahnemanni. Mercurius praecipitatus niger. Tur-
pethum nigrum. Nidras ammonicus immixto Oxydo hy-
drargyrico. Schwarzes Quecksilberoxydul (mitsalpe-
 tersaurem Ammonium). HAHNEMANN's auflösliches Queck-
 silber. [Die letztere unpassend gewählte Benennung bezieht sich auf die Auf-
 löslichkeit in concentrirter Essigsäure. — 1 Drachme 7½ Sgr.] Und

* *Hydrargyrum oxydulatum nigrum purum.*
Mercurius cinereus Moscati. Reines Quecksilber-Oxydul.
 [1 Drachme 6½ Sgr.]

[Beides Pulver, in Wasser u. Weingeist unauflöslich.] *Cave* Säuren, saure Salze; Salzbilder; fixe Alkalien; Schwefellebern; [doch giebt man überhaupt beide Präparate gern pur, nur mit organischen Zusätzen]; Wärme; Sonnenlicht.

Innerl. zu Gr. $\frac{1}{4}$ -1; zu grösserer Wirkung Gr. 1-3 u. mehr; 2-4mal tägl.; wo man schnell einwirken will, Gr. 1-3 alle 2 St. In Pulver [z. B. Gr. $\frac{1}{4}$ mit etwas *Magnes. carb.* und Zucker, 3mal tägl.: WANDT bei Syphilis Neugeborner], Pillen; selten u. der Unbestimmtheit der Dose wegen nicht zweckmässig in Latwerge [Ry 448 (*Graphit.*)].

Ausserl. nur noch zu Augensalben [z. B. Gr. 10 auf Dr. 1 Fett: BLASIVS gegen Augenblennorrhöen bei noch nicht ganz reizlosem Zustande, wo andere Quecksilber-Präparate noch nicht vertragen werden. Ry 557. — Auch wohl in Augenlinimenten; z. B. Gr. 1 auf *Ol. Nuc. Jugland.* Dr. 1, umgeschüttelt 2-3mal tägl. aufzupinseln, gegen Verdunkelungen der Hornhaut: HYFELAND; ANDREAE.] u. a. Salben [z. B. wohl mit 6-3 Theilen Fett statt des *Ungt. Hydr. ciner.* — HIMLY nimmt nur Scr. 1 - Dr. $\frac{1}{2}$ auf Unc. 1 Fett, wenn er zu Einreibungen in der Umgegend des Auges das *Ungt. Hydr. ciner.* ersetzen will].

557.

Ry *Hydrarg. oxydul. nigri* Scr. 2
† *Butyri recent. insulsi* Dr. 2
Camphorae q. *Ol. Amygd. paux.*
trit. Gr. 4-6.

M. exactiss. D. in olla alba. S. Augensalbe. (Bei *Ophthalmia gonorrhoeica* — nach vorausgeschickter Blutentziehung.)

BELL.

Hydrargyrum stibiato-sulphuratum. Aethiops antimonialis. Schwefelspiessglanzquecksilber. Spiessglanzmohr. [Pulver. — 1 Drachme 1 Sgr.] *Cave* Salzbilder. (Auch nicht gern mit Säuren, sauren Salzen.)

Innerl. zu Gr. 5-12, 2-3mal tägl., (gern mit Absorbentien); in Pulver [Ry 558, 559; 718 (*Natr. carbon. depur. sicc.*), 937 (*Res. Guaj. nat.*)], Trochisken [nicht zu dörren], Pillen [Ry 560], Bissen; nicht recht passend in Latwergen [der Schwere u. der unbestimmten Dose wegen].

558.

Ry *Hydrarg. stibiato-sulph.* Gr. 4-6
Resin. Guaj. nativ.
Sacch. albi ana Gr. 12.

M. f. Pulv. Disp. tales nr. 12. D. S.
2-3mal tägl. 1 Pulver. (Gegen Lippitudo.)

RUST.

559.

Ry *Hydrarg. stibiato-sulph.* Gr. 6
Hb. Conii macul. Gr. 2

Magnes. carbon. Gr. 8.

M. f. Pulv. Disp. tales nr. 10. D. S.
3mal tägl. 1 Pulver. SCHUBARTH.

560.

Ry *Hydrarg. stibiato-sulph.*
Resin. Guaj. nativ. pulv. ana Dr. 1
Extr. Dulcamar. Dr. 2
Pulv. Hb. Viol. tricol. q. s.
ut f. Pilulae 120. *Consp. Pulv. Rad. Glycyrrh.* D. S. 2mal tägl. 8. (Gegen

gichtische Kachexie und chronische Hautausschläge.) (P. FRANK.

RUST nimmt zu seinen antarthrit. Pillen nur halb so viel Extr. Dulcam., also

mit den beiden Hauptmitteln an, wo es dann oft keines pulverigen Zusatzes mehr bedarf und man „l. a.“ 90 Pillen machen lassen kann; davon 3mal tägl. 5-8.

Hydrargyrum sulphuratum nigrum. Aethiops mineralis s. mercurialis. Schwarzes Schwefelquecksilber. Mineralischer od. Quecksilber-Möhr. [Pulver. — 1 Drachme 1 Sgr.] *Cave* und Gebrauch wie beim vorigen.

561.

R. *Hydrargyri sulphurati nigri*
Conchar. ppt. ana Dr. 1

Flaved. Cort. Aurant. Dr. ½.

M. f. Pulv. Div. in 10 part. aq. D. S.
tägl. 3 Pulver. SCHUBARTH.

Ichthyocolla. Colla Piscium. Hausenblase. Fischleim. [Besteht fast ganz aus thierischem Leim; ist in kochendem Wasser bis auf einen geringen Rückstand auflöslich. — 1 Drachme conc. 2½ Sgr.] *Cave: s. l. B. 35 sub 12.*

Innerl. abgekocht als Getränk [Dr. 1 mit Unc. 16-18 auf Unc. 12. — R. 562. — Zu eigentlichen Kraftbrühen auch wohl noch einmal so concentrirt, mit etwas Zucker u. Zimmt. Man lässt aber diese Abkochungen, besonders die concentrirteren, am zweckmässigsten im Hause des Kranken, jedesmal kurz vor dem Gebrauch frisch, bereiten, weil sie erkaltend bald etwas zäh und unangenehm werden (unvollkommen gelatinisiren). — *Decoctum FELSII:* R. 892], in Galerte [Quantitätsverhältnisse s. l. B. 286. Als Corrigenzien Zucker, Citronen-Ölsäcker, Wein, ein säuerlicher Syrup, oder Citronensaft (auf eine Tagesportion ein Paar Drachmen). R. 563; 453, 454 (*Helminthochort.*), 840 (*Rad. Filic.*)].

Ausserl. abgekocht zu Klystieren [etwa Dr. 1 auf Unc. 4; am besten im Hause des Kranken, unmittelbar vor der Application, zu bereiten und, sobald es lauwarm geworden, anzuwenden] u. a. Einspritzungen [in der Regel, weil das Gelatinisiren nicht erwünscht wäre, weniger concentrirt als zu Klystieren; etwa Dr. ½ auf Unc. 5-6. (Dazu noch *Liq. Myrrh.* Dr. 1; LENTIN bei Harnblasenvereiterung.)]. Zu Bädern die wohlfeileste *+ Colla animal.* — Englisch Pflaster S. 154.

562.

R. *Ichthyocollae* Dr. 1.
coq. c. Aq. comm. Unc. 16 ad Colat.
Unc. 12, in qua solve
Sacch. alhiss. Unc. ½
et adde
Vini Rhenani Unc. 1.
M. D. S. Tassenweise.

563.

R. *Ichthyocollae* Dr. 3
coq. c. Aq. comm. Unc. 9 ad Colat. Unc. 3,
cui statim admisce
Succi Citri rec. expr. et colati Dr. 2
Elaeosacch. Citri Unc. 1.
Repos. in loco frigido, ut in Gelatinam
abeant. D. in pyxide alba. S. 2stündl.
2 Theelöffel.

+ Indicum. Pigmentum Indicum. Indigo. Indig. [Hauptbestandtheil: ein eigenthümliches, stickstoffhaltiges Princip (Indighlau, Indigotin). — 1 Unze sub. pulv. 12½ Sgr.] *Cave* Brom, Chlor; chlorichtsaurer Salze.

Innerl. zu Gr. 5-10, 6-8mal tägl., oder (energischer) zu Gr. 15-Dr. 1 (u. mehr), 2-4mal tägl. [so dass im Anfang etwa Dr. $\frac{1}{2}$ -2, zuletzt Unc. $\frac{1}{2}$ -1 tägl., zur (monatelangen) Nachcur nach der Beseitigung einer Epilepsie wieder etwas weniger, verbraucht wird]. Gern, um Erbrechen u. Durchfall zu verhüten oder zu beschränken, mit *Pulv. aromat.*, auch wohl kleinen Dosen Opium. In Pulver [unangenehm], Latwerge [R₅ 564]. — Bisweilen zum Conspargiren [I. S. 186].

564.

R₅ † *Indici pulv.* Dr. 2-4-Unc. 1.
Pulv. aromat. Gr. 15-30-Dr. 1

Syr. simpl. q. s.
 ut f. *Electuar.* D. S. Den Tag über in
 4-6 Gaben zu verbrauchen; umge-
 rührt. ROTH (nach IDELER).

**** Infusum Sennae compositum. Loco Aquae laxativas (Infusi laxativi) Viennensis s. Mannagettke.**
 Wiener Tränkchen. [Fol. Senn. 4 mit 32 siedenden Wassers $\frac{1}{2}$ St. macerirt, zur Colatur Tart. natronat. 4, Manna 6, Elaeos. Citri 1. — 1 Unze $2\frac{1}{2}$ Sgr.] Als eigentliches Abführmittel 2-3 Unzen auf einmal od. in einem Paar Portionen rasch hinter einander; als gelind eröffnendes Mittel esslöffelweise.

Ähnlich, doch etwas schwächer, sind R₅ 565, 566. In beiden ist aber das Glaubersalz ungefähr eben so wichtig als die Senna. Beide eignen sich für die Hospitalpraxis; in der Privatpraxis dagegen würden sie für Wohlhabende nicht angenehm genug, für Arme noch zu theuer und durch häusliche Bereitung zu ersetzen seyn.

565.

R₅ Fol. Sennae Dr. 2
 Aq. comm. fervid. Unc. 4
 digerere per $\frac{1}{4}$ hor. In Colat. solve
 Natri sulphur. dep. crist.
 Mannae ana Unc. $\frac{1}{2}$.

Cola. D. —

Infusum laxativum PH. P.
 Über das Digeriren der Senna vgl.
 S. 207 Z. 6 u. R₅ 437.

566.

R₅ Fol. Sennae Dr. 2
 Aq. comm. fervid. Unc. 4
 macerare per $\frac{1}{4}$ hor. In Colat. solve
 Natri sulphur. dep. crist. Dr. 6
 et adde

Syrupi communis Unc. $\frac{1}{2}$.

D. (pro dosi). —

Infus. Senn. comp. PH. MIL.

Iodum. Iodina. Iod od. Iodine. [Von scharfem Geschmack und chlorähnlichem, doch schwächerem Geruch. In Wasser fast unauflöslich (Sol. 7000); leicht auflöslich jedoch in einer wässerigen Auflösung gewisser Salze, vorzüglich der Iodmetalle, z. B. des *Kali hydroiod.*, so dass man es bequem mit diesem Salze in Verbindung in Wasser auflösen kann; es bildet sich hierbei, der Wirkung unbeschadet, hydriodigsaures Kali. Leicht auflöslich in Alcohol und Äther (unter der Benennung *Aether iodatus* wird häufig eine Auflösung in 10 Theilen verstanden). — 1 Scrup. $1\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave* [mit sanctionirten Ausnahmen]: starke, auch organische, Basen [besonders Ammonium]; kohlen saure Alkalien, Alkaloidsalze, neutrale Ammoniumsalze, mehrere Metallsalze [salpetersaures Silber; Quecksilbersalze; Blei-, Kupfer- und Spiesglanz-Oxyd-

salze]; organische Substanzen [namentlich in länger aufzubewahrenden Arzneien], besonders amyllumhaltige Flüssigkeiten als Vehikel beim Einnehmen [z. B. Gersten-, Hafer-, Althäen-Schleim, Sarsaparill-Tisane; diese nehmen mit Iod eine violette oder blaue Farbe an, welche dem Kranken die Arznei verdächtig machen kann; man wähle also dazu lieber Zuckerwasser oder dünnen Gummischleim oder eine Abkochung (etwa 1 auf 24-16) von *Sem. Linf.*]; Licht [wenn man es allein aufgelöst giebt, nicht aber, wenn mit *Kali hydroiod.* in Verbindung]; Metallgefäße [namentlich Spritzen u. Badewannen; mit einem silbernen Löffel muss wenigstens rasch eingenommen werden].

Innerl. (\neq) zu Gr. ($\frac{1}{2}$ -) $\frac{1}{4}$ -1, 2-3mal tägl. Jede Einzelgabe in einhüllendem Vehikel. Selten in Pulver [wohl nicht zu empfehlen. — R. 567], Pillen [noch weniger zu empfehlen]; meistens aufgelöst, bisweilen in Äther [z. B. Gr. 3 in *Aeth. sulph.* Dr. $\frac{1}{2}$, zu 10 Tropfen ($\frac{3}{10}$ Gran) *p. dosi*: RICHARD], gewöhnlicher in Weingeist [vgl. *Tinct. Iodi*] oder mit *Kali hydroiod.* in Wasser [z. B. nach LUGOL u. A. mit 2 Theilen *Kali hydroiod.* in vielem Wasser (so R. 568). Das Wesentliche mehrerer von LUGOL (gegen Scrofeln) aufgestellten, ohne Vorzug unhequamen, Normen besteht darin, dass kleine Dosen — z. B. Gr. $\frac{1}{4}$, allmählig bis Gr. $\frac{1}{2}$, selten $\frac{3}{4}$, 2mal tägl. bisweilen (in einer Formel, welche LUGOL, weil sie eine sehr verdünnte Auflösung ist, Iodmineralwasser nennt) anfangs nur Gr. $\frac{1}{32}$, allmählig mehr, 2mal tägl. — sehr lange (bis zu $\frac{1}{2}$ Jahr u. darüber) fortgebraucht werden].

Äusserl. in Salben [Gr. 8-15 (und mehr — wenn es ertragen wird) auf Unc. $\frac{1}{2}$ Fett. JAHN's Salbe zum Einreiben bei Eierstockwassersucht, Gr. 45 auf *Ungt. Hydrarg. ciner.* Unc. $\frac{1}{2}$, möchte wohl oft nicht vertragen werden. — R. 569. — Vgl. *Kali hydroiod.*], Pflastern, auch endermatisch [noch wenig versucht. Etwa nach COSTER Application einer Salbe aus 2 Gran mit 4 Gran *Kali hydroiod.* und 1 Dr. Fett]; aufgelöst [in sehr verschiedener Stärke, z. B. R. 570-572, zwischen welchen natürlich Mittelstufen gebildet werden können] zu Waschungen [R. 573], Bähungen, Kataplasmen [LUGOL lässt in eiden Brei von Leinsamenmehl unmittelbar vor der Application eine beliebige Quantität seiner rothmachenden Iodsolution (R. 571) mittelst eines hölzernen Löffels einmischen, u. bedient sich dieser Kataplasmen bei sehr harten tuberculösen Geschwülsten (Iodsalbe eingerichen, bei gleichzeitigen Geschwüren mit Iodsolution verbunden, dann Katapl. aufgelegt), kalten Abscessen (Anfüllen mit der gewöhnlichen Iodsolution, Einreiben der Hautwandungen mit Iodsalbe und Auflegen des Katapl. so warm als möglich), Gelenkgeschwülsten (ebenfalls Salbe und Kataplasma) u. s. w.], Einreibungen, Injectionen [R. 574; vgl. R. 570], Augengewässern [vgl. R. 570, 571, 590], Bädern [LUGOL nimmt zu allgemeinen Bädern (2-3mal wöchentlich, zu 28-30° R.) auf jedes Quart des Badewassers (etwas misslich zu bestimmen) Iod Gr. 1 und *Kali hydroiod.* Gr. 2, vorher in etwas *Aq. destill.* aufgelöst, — für Erwachsene und für Kinder, für welche letzteren er nur die Wanne und somit die Quantität des Badewassers kleiner bestimmt. Passender wohl: für Erwachsene auf ein Bad von etwa 20 Eimern Dr. 3-4 Iod mit doppelt so viel *Kali hydroiod.* (freilich theuer!), für Kinder die Flüssigkeit verhältnissmässig schwächer. Nach dem Bade lüfte man bald das Gemach, falls der Kranke in demselben bleibt, weil sich Iod-

dämpfe in der Luft verbreiten. — Bei localen Bädern lässt LUGOL zu der nöthigen Menge warmen Wassers so viel von seiner rothmachenden Iodsolution (R_z 571) setzen, bis die Flüssigkeit eine ziemlich gesättigte gelbe Farbe annimmt].

567.

R_z Iodⁱ Gr. $\frac{1}{16}$

Hydrarg. muriat. mitis

Hb. Digital. ana Gr. $\frac{1}{2}$ - 2

Pulo. gummosi Scr. 1.

M. f. Pulo. Disp. tales nr. 16. D. in charta cerata. S. Stündl. 1 Pulv., mit Leinsamenschleim (oder Syr. simpl.). (Bei, chronischer und acuter, Gehirnwassersucht der Kinder. — Dabei Einreibungen einer Iodsalbe.) (JAHN. Iod bildet mit dem Calomel Sublimat und (Einfach- und Doppelt-) Iodquecksilber; sollte deshalb die Formel nicht bisweilen unerwünscht heftig wirken?)

568.

R_z Iodⁱ Gr. $1\frac{1}{2}$

Kali hydroiodici Gr. 3

solve in

Aq. Menth. pip. Unc. 4.

D. S. 2-3mal tägl. 1 Essl., Kindern 1 Theelöffel. (Gegen Mundfäule; bisweilen auch gegen Leukorrhöe, Gonorrhöa secundaria. — Bei Wiederholung der Verordnung jedesmal um $\frac{1}{2}$ Gran Iod u. 1 Gran Kali hydroiod. zu steigen.)

RIEDRICH.

569.

R_z Iodⁱ pulv. Gr. 4-5

Hydrarg. muriat. mitis Gr. 6-7 $\frac{1}{2}$

Adipis suilli Unc. $\frac{1}{2}$.

M. f. Ungt. D. —

PLANCHE. KURZ.

Es erfolgt hier, der guten Wirkung unbeschadet oder sie wohl hauptsächlich bedingend, dieselbe Zersetzung wie in R_z 567.

570.

R_z Iodⁱ Gr. 1-2

Kali hydroiodici Gr. 2-4

solve in

Aq. destill. Unc. 8.

D. — LUGOL's gewöhnliche Iodsolu-

tion zum äusserlichen Gebrauch, z. B. zum Einspritzen unter die Augenlider bei serofulösen Ophthalmien, in Fisteln, geöffnete Cysten, zum Einspritzen [den Strahl nicht zu sehr gegen die Rachenhöhle gerichtet] oder Aufschnupfen bei seroful. Schnupfen, u. s. w.

571:

R_z Iodⁱ Unc. $\frac{1}{2}$

Kali hydroiod. Unc. 1

solve in

Aq. destill. Unc. 6.

D. sub sigillo. — LUGOL's rothmachende Iodsolution, deren er sich, wöchentlich 2-3mal, bedient, wenn die vorige (R_z 570) durch Gewöhnung ihre Wirksamkeit verloren hat, oder wo immer ein träger örtlicher Process zu beschleunigen ist: so bei Ophthalmien, wo er die Augenwinkel oder Liederänder damit betupft oder damit getränkte feine Charpiebäuschchen auf diese Theile legt, — bei Coryza, wo er sie mittelst eines Charpiepinsels applicirt, — bei Geschwüren, — zum Betupfen der äusseren Mündungen von Fisteln und der Narben geheilter Geschwüre, um sie nach und nach mit der Haut gleicher und glatter zu machen. Bei fressenden serofulösen Flechten verstärkt er diese Iodsolution wohl noch (und entfernt, wo es nöthig, Crusten mittelst eines Spatels oder durch jeweiliges Auflegen eines Iod-Kataplasma, s. oben).

572.

R_z Iodⁱ Unc. 1

Kali hydroiod. Unc. 2

solve in

Aq. destill. Unc. 2.

D. sub sigillo. — LUGOL's kaustische Iodsolution, da anzuwenden, wo die vorige (R_z 571) ihre Wirkung versagt. Sie erzeugt Schorfe auf den Theilen. Besonders gebraucht sie LU-

geel, wo die Haut an den Rändern der Geschwüre sehr hypertrophisch, roth, schwammig, von Eiter durchdrungen ist, — dann bei der fressenden Flechte, wo er sie sehr bald an die Stelle der vorigen treten lässt, um die einzelnen Pusteln zu betupfen, 2-3mal wöchentlich, oder bei grosser Ausdehnung auch täglich, so dass die Stellen immer gewechselt werden.

573.

DAUVERAGNE's Iodschwefelwaschungen gegen *Herpes crustosus flavescens*:

a.

Ry Iodi Dr. 3
Kali hydroiodici Dr. 6
solve in
Aq. destill. Unc. 3.

D. S. Iodlösung.

b.

Ry Kali sulphurati Unc. 4
solve in

Aq. destill. Unc. 8.

D. S. Schwefellösung.

Man mischt 1 Dr. (1 Theelöffel) Iodlösung mit $\frac{1}{2}$ Unze (1 Essl.) Schwefellösung, und schüttet dies in ein Waschbecken voll lauen oder kalten Wassers.

574.

Ry Iodi Gr. 5
Kali hydroiod. Gr. 15

solve in

Aq. destill. Unc. 2.

D. — 1 Theil hiervon mit 8 Theilen eines lauwarmen Einsamen-Decocts in die Vagina einzuspritzen. SANDRAS.

Kali aceticum. Terra foliata Tartari. Arcanum Tartari. Oxytartarus. Tartarus regeneratus. Sal diureticum s. essentielle Vini. Acetas kalicus. Essigsäures Kali; geblätterttes Weinstein Salz; (Weinstein-) Blättererde. [Zerfließt an der Luft. — 1 Drachme $1\frac{1}{2}$ Sgr.] Sol. $\frac{1}{2}$. — Cave [ausgenommen in Blechpulvern, wo man die Essigsäure entbinden will] starke Mineralsäuren, Weinsteinsäure und diejenigen Salze dieser Säuren, die eine schwächere Base als Kali enthalten.

Innerl. zu Scr. $\frac{1}{2}$ - Dr. $\frac{1}{2}$, um auflösend, diuretisch —, zu Dr. $\frac{1}{2}$ - 1, um mehr auf den Darmcanal zu wirken; mehrmals tägl. Des Zerfließens wegen nur in Auflösungen [Ry 575; 265 (Cinchon. sulphur.). Auch wohl in geistiger Auflösung, z. B. 1 auf Spir. F. rft. 3, zu 30-50 Tropfen. Vgl. Spir. Junip. und Tinct. Pimpin.], höchstens noch in Latwergen. — Häufig giebt man es *ex tempore* bereitet, indem man *Kali carbon.* mit Essig sättigen lässt [vgl. Acetum u. Ry 584, 585. (Liq. Kali acet. s. Saturatio Salis Tartari PH. MIL. u. Kali carb. mit Acet. gesättigt; 1 Unze $\frac{2}{3}$ Sgr. — Eben so Potio RIVERII der PH. HANN. u. 1 Unze $\frac{1}{2}$ Mgr.) So soll es nach der Angabe vieler Praktiker weniger eindringend wirken, aber auch von Empfindlichen besser vertragen werden; man darf jedoch hierbei nicht übersehen, dass die Saturationen, wie sie gewöhnlich verordnet werden, nur verhältnissmässig geringe Quantitäten essigs. Kalis enthalten; wesentliche Unterschiede liegen wohl darin, dass die Saturationen noch Kohlensäure enthalten (I. S. 136) und etwas wohlfeiler kommen. Wenn aber die PH. HANN., SLESV. u. a. einen „Liquor Kali acet. niger (Liq. digestivus BOERHAAVII)“ durch Abdampfen einer 17 Gewichtstheile betragenden Saturation auf 3 Gewichtstheile darstellen

lassen, so geht die Kohlensäure auch verloren und es bleibt nur die Wohlfeilheit (1 Unze 4 Skl.)].

Äusserl. zu Riechpulvern [R₅ 576].

575.

R₅ *Extr. Cardui bened.* Dr. 2
Kali acetici Dr. 3
 solve in
Aq. Menthae piperit. Unc. 5
 addo
Tinct. Cort. Aurant. Dr. 1.
M. D. S. 2stündl., umgeschüttelt, 1 Essl.

576.

R₅ *Kali acetici* Dr. 1
 — *sulphurici acid*i Dr. 1½
 (*Ol. Caryophyllor.* Gtt. 5).
M. f. Pulv. D. in vitro bene clauso.
S. Riechpulver, mit etwas Essig zu befeuchten.

Kali carbonicum acidulum s. neutrale s. perfecte saturatum s. crystallisatum. Sal Tartari crystallisatum. Bicarbonas kalicus cum Aqua. Saures kohlen-saures Kali. [Nur die Zahl (2) der Atome der Kohlensäure kann die Benennung „acidulum“ rechtfertigen, denn es reagirt noch immer schwach alkalisch. — 1 Drachme 2½ Skl.] *Sol.* 4. — *Cave* wie bei *Kali carbon. e Tart.*; ausserdem Hitze.

Innerl. zu Scr. ½-1, mehrmals tägl. In Pulvern [R₅ 577], namentlich Brausepulvern [vgl. I. S. 138. — R₅ 578], Pillen [R₅ 601 (*Kali sulphurat.*)], Auflösungen [namentlich auch Brausemischungen, wie R₅ 579. — Zu Saturationen aber ökonomischer *Kali carb. e Tart.* — R₅ 603 (*Kali sulphurat.*)].

Äusserl. [selten] zu Waschungen [vgl. *Kali sulphurat.*], (Bädern) [zu theuer und leicht durch *Kali carbon. crud.* und (aus Kreide und Schwefelsäure entwickelte) Kohlensäure (vgl. S. 216) zu ersetzen].

577.

R₅ *Kali carbon. aciduli* Gr. 15
Flaved. Cort. Aurant. Gr. 5.
M. f. Pulv. Disp. tales nr. 6. D. S.
 3mal tägl. 1 Pulver in Zuckerwasser.
 G. A. RICHTER.

578.

R₅ *Acidi tartarici* Gr. 7
Kali carbon. aciduli
Sacch. albi (od. *Elaeos. Citri*) ana
 Scr. ½.
M. f. Pulv. Disp. tales nr. — . D. S.
 Brausepulver.

579.

R₅ *Kali carbon. aciduli*
Elaeos. Citri ana Dr. 1
 solve in
Aq. destill. Unc. 2.
D. S. Von Zeit zu Zeit 1 Essl. zu nehmen, nachdem unmittelbar zuvor 3-4 Theelöffel Citronensaft (mit Zucker und Wasser zu einer concentrirten Limonade gemacht oder auch — wo zu viel Flüssigkeit zum Brechen reizen könnte — bloss versüsst) genommen.

Kali carbonicum crudum. Carbonus kalicus crudus. Cineres clavellati. Potassa cruda. Rohe Potasche; unreines kohlen-saures Kali. [1 Unze ½ Skl.] Nur

zu Bädern [diese heissen vorzugsweise Laugenbäder, doch nennt man auch wohl die Bäder von kautstischem Kali so. Zu allgemeinen Bädern Unc. 3-6 (u. mehr); zu Fussbädern Unc. 1-2 (ganz Arme können statt dessen einige Hände voll büchene od. eichene Heerdasche in einen Beutel binden, mit Wasser auskochen, und die so erhaltene Lauge ins Fussbad thun); zu andern localen Bädern Dr. $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ auf 1 Quart. Die Leute können sich das unreine Präparat selbst genügend reinigen, indem sie die Auflösung desselben coliren. Sämmtliche Bäder instituiert man meist lauwarm, nur etwa $\frac{1}{4}$ St. lang, einmal tägl.].

Kali carbonicum e Cineribus clavellatis. *Carbonas kalicus e Cin. clav. Potassa depurata.* Kohlensaures Kali aus Potasche bereitet. Gereinigte Potasche. (Einige Synonyme des folgenden gehören auch hieher.) [Weniger rein als das folgende, doch zur Bereitung verschiedener Präparate — z. B. der *Tinct. Rhei aquosa*, des *Syr. Rhei*, zur Entbitterung des *Lichen Island.*, etc. — und zum äusserlichen Gebrauch (ausgenommen zu Augenwässern) rein genug; bei Armen kann man zum äusserlichen Gebrauch oft sogar das vorige substituiren. — Zerfliesst an der Luft. — 1 Unze 2 Sgr.] *Sol.* 1. — *Cave* Säuren; Kalkpräparate; die meisten Salze, namentlich alle Metallsalze; alkaloidische Vegetabilien.

Äusserl. (≠) zu Klystieren [selten; vorsichtig! Vgl. R_x 582] u. a. Injectionen [meist lauwarm; etwa Dr. $\frac{1}{2}$ - 2 auf Unc. 6. — TROUSSEAU gegen Jucken u. Fressen der Vagina: Dr. 3 auf Unc. 4; von dieser Auflösung anfangs 1 Essl. auf 32 Unz. warmen Wassers, u. die Quantität des Salzes allmählig vermehrt, bis die Einspritzungen, welche tägl. 4mal, jedesmal 4-5 Minuten lang, zu machen, ein gelindes Brennen verursachen.], Umschlägen u. Waschungen [etwa Dr. 2 - Unc. 1 auf L. 1; meist warm. Vgl. I. S. 226 sub 1). — R_x 580; 776 (*Ol. Tereb.*)], Linimenten [z. B. 1 in 2 Wasser aufgelöst, mit *Ol. Amygdal.* 3 (umzuschütteln): CONRADI gegen mancherlei Hautleiden], Salben [selten; etwa Dr. 1 auf Unc. 1. — R_x 1085 (*Sulph. dep.*)]; auch wohl zum Aufstreuen [z. B. auf Kopfgrind, bei nicht zu langen Haaren: ALIBERT].

580.

R_x *Kali carbon. e Cin. clav.* Dr. 3
Natri muriatici Dr. 2
Aq. Rosarum Unc. 8

Aq. Flor. Aurantii Unc. 2.
Solve. D. S. Waschwasser. (Gegen Sommerflecken, *Aspredines.*)

SUNDELIN.

Kali carbonicum e Tartaro. *Kali subcarbonicum. Kali purum mite. Alkali vegetabile aëratum. Sal Tartari. Carbonas kalicus e Tartaro.* Kohlensaures Kali aus Weinstein bereitet (das reinste); mildes Kali; Gewächsalkali; Weinsteinsalz. [Gröbliches Pulver; zerfliesst an der Luft. — 1 Drachme $1\frac{1}{8}$ Sgr.] *Sol.* 1. — *Cave* Säuren [ausgenommen in Saturationen], saure Säfte u. Salze; Kalkpräparate; die meisten

Salze, namentlich alle Metallsalze; alkaloidische Vegetabilien; (*Aq. comm.*).

Innerl. zu Gr. 2-10, 2-4mal tägl.; bei Convulsionen zu Gr. 5-15 alle $1\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ St.; bei Vergiftungen [wo jedoch Seife oder *Magn. carb.* in den meisten Fällen den Vorzug verdienen] zu Scr. 1-Dr. $\frac{1}{2}$ in kurzen Zwischenräumen; bei Steinbeschwerden wenigstens Dr. 1 tägl., in L. 1 Wasser aufgelöst, doch auch steigend bis zu Dr. 2 u. 3. [In chronischen Krankheiten gern mit bittern od. aromatischen Mitteln. Das beste Vehikel, um den üblen Geschmack zu mildern, also auch zum Nachtrinken besonders passend, ist Bier.] In Auflösungen [mit vielem Menstruum, auch wohl in Emulsionen, schleimigen Abkochungen, Bier; gegen Nieren- u. Blasensteine etwa in $\frac{1}{2}$ Selterser od. einem andern natürlichen Mineralwasser, z. B. Dr. 1-2 in L. $1\frac{1}{2}$ oder 2 $\frac{1}{2}$ Selterser Wasser, hiervon Morgens u. Abends die Hälfte: *Aq. mephitica alcalina* (dieselbe Benennung kommt unter *Natr. carb. acidul.* vor). — Ry 581, 582; 417 (*Mixt. anthect.* GRIFFITH.), 441 (*Fol. Uv. Urst.*), 604 (*Kali sulphurat.*)], namentlich auch Brausemischungen [Ry 583. Häufiger jedoch zu diesem Zweck das *Kali carb. acidul.*] und Sätturationen [vgl. I. S. 138. — Ry 584, 585; 1 (*Acet. aromat.*), 14 (*Acet. scillit.*)].

Ausserl. zu Augengewässern [zu Waschwässern u. Bähungen Scr. $\frac{1}{2}$ -1 auf Unc. 4; zu Tropfwässern Gr. 1-5 auf Unc. $\frac{1}{2}$. — Z. B. Gr. 1-3 auf Unc. $\frac{1}{2}$, alle 4, später alle 2 St. einzutropfen: HIMLY gegen Hornhautverdunkelungen, nur nicht bei noch vorhandener Entzündung, oder wo die Verdunkelung mit Auflockerung der Substanz verbunden]. Sonst für die äusserliche Anwendung die beiden vorigen Präparate.

581.

Ry *Kali carbon. e Tart.* Dr. 1-1 $\frac{1}{2}$
solve in

Aq. Menth. crisp. Unc. 5
addo

Syr. Cort. Aurant. Unc. 1 $\frac{1}{2}$.
M. D. S. Alle 3-2 St. 1 Essl. (Säure-
tilgend, auflösend, krampfstillend.)

SUNDELIN.

582.

STÜTZ'S Methode gegen
Starrkrampf.

a.

Ry *Kali carb. e Tart.* Dr. 3
solve in

Aq. Chamomillae
— *Cinnam. simpl.* ana Unc. 3
addo

Syr. Capit. Papay. Unc. 1.
M. D. S. Alle 1- $\frac{1}{2}$ St. abwechselnd
mit dem Folgenden 1 Essl.

b.

Ry *Tinct. Opii simpl.* Dr. 2.

D. S. Alle 1- $\frac{1}{2}$ St. abwechselnd mit
dem Vorigen 5-15 Tropfen.

Dabei eröffnende Seifenklystiere, allen-
falls mit Zusatz von Dr. 1-2 *Kali carb.*
e *Cin. clav.*; 1-2 mal tägl. ein war-
mes Bad (von einigen Minuten) mit eini-
gen Unz. *Kali carb. crud.* oder Unc. 1-1 $\frac{1}{2}$
Kali caust. sicc., oder statt dessen eine
Auflösung von *Kali caust. sicc.* in Sei-
fenwasser — etwa Dr. $\frac{1}{2}$ auf 1 Quart —
mit Flanell über den Unterleib geschla-
gen, und den Körper damit öfters gewa-
schen u. abgerieben.

583.

Ry *Kali carb. e Tart.* Scr. 2
Sacch. albiss. Dr. 2

solve in

Aq. destill. Unc. 4
— *Cinnam. simpl.* Unc. 2.

D. S. Alle $\frac{1}{2}$ St. 3 Essl. mit 1 Essl. Ci-
tronensaft während des Aufbrauens zu
nehmen. (Besonders zur Stillung von
Erbrechen.) *Potio RIVERÆ,*

wiesie gewöhnlich angegeben wird. — Die *Potio Riverii* der PH. SLESV. (1 Unze $2\frac{1}{2}$ Shtl.) ist eine Saturation von *Kali carb.* 1 mit Citronensaft *q. s.* und *Aq. destill.* 12; die der PH. HANN. s. S. 272.

584.

Ry. *Kali carbonici & Tartaro* Dr. 2
satura
Aceti *q. s.*
adde

Aq. Chamomill. Unc. 2-3.
M. D. S. 2stündl. 1 Essl.

SUNDELIN.

585.

Ry *Kali carb. & Tart.* Dr. $1\frac{1}{2}$
satura
Aceti *q. s.*
adde
Aq. Cerasor. Unc. 3
Syr. Rhoeados Unc. 1.
M. D. S. 2stündl. 1 Essl.

Kali causticum fusum. Hydras kalicus fusus.
Lapis causticus chirurgorum. Causticum alcalinum.
Geschmolzenes Ätzkali; Ätzstein. [Zerfließt an der Luft, zieht dabei Kohlensäure an. — 1 Drachme $1\frac{3}{4}$ Sgr.] Nur als Ätzmittel [Wir dürfen in dieser Hinsicht auf G. A. RICHTER's *Arzneimittell.* III. S. 505 ff. u. Suppl. Bd. S. 474 ff. verweisen, wenn wir uns auch, nach vielfältiger Erfahrung, nicht zu der Meinung des Vf. bekennen, dass es schlechte Eiterung, langsame Abstossung des Schorfs u. s. w. zur Folge zu haben pflege; es verdiente gewiss viel häufiger angewandt zu werden als es geschieht, namentlich (da es verhältnissmässig wenig Schmerz macht) bei empfindlichen Personen. — Es wird zu dem Ende in einem verschlossenen Gläschen dispensirt. Wenn es zerflossen ist (wodurch es sehr geschwächt wird), applicirt man es mittelst eines Pinsels (am besten von Asbest)].

Kali causticum siccum. Alkali causticum s. vegetabile purum. Hydras kalicus. Ätzkali; ätzendes vegetabilisches Laugensalz. Kaliumoxydhydrat. [Zerfließt wie das vorige. — 1 Drachme 1 Sgr.] *Sol.* $\frac{1}{2}$. [Auch leicht auflöslich in Weingeist.] — *Cave:* s. I. S. 32 sub 3.; auch alkaloïdische Vegetabilien, *Aq. comm.*; während des innerlichen Gebrauchs auch, wenigstens kurz vor u. nach dem Einnehmen, saure, salzige u. a. zersetzende Nahrungsmittel.

Innerl. (≠) zu Gr. $\frac{1}{2}$ - 2 (u. mehr), 2-3mal tägl., aufgelöst, in reichlichem u. einhüllendem Vehikel. [Also z. B. Gr. 12 in *Aq. destill.* Unc. 3; 2-3mal tägl. 1 Theelöffel bis 1 Essl. in einer Tasse Gerstenschleim, Fleischbrühe (ohne Salz) od. dgl. — Scr. $\frac{1}{2}$ in $\frac{1}{2}$ *Aq. Cort. Aurant.* Unc. 1; 4mal tägl. 12-20 Tropfen in Fleischbrühe: WENDT u. CERUTTI gegen Scrofeln. — DZONDI gab bei Scrofeln das Mittel in weit größern Gaben, angeblich ohne Nachtheil. Von einer Auflösung nämlich von Dr. 1 in Unc. 1 gab er Morgens nach dem Frühstück u. Abends vor Schlafengehn Erwachsenen (von 15 Jahren an) anfangs Dr. 1 *p. dosi*, dann alle 3-4 Tage Dr. 1 mehr, bis zu Unc. $\frac{1}{2}$, ja wohl sogar Unc. 1 *pro dosi*; 8-15jährigen anfangs Dr. $\frac{1}{2}$, dann alle 3-4 Tage Dr. $\frac{1}{2}$ mehr, bis zu Dr. 3, ja selbst Dr. 6; 4-8jährigen anfangs Scr. 1, dann alle 3-4 Tage Scr. 1 mehr, bis zu Dr. 2 u. selbst Unc. $\frac{1}{2}$; zarteren Kindern tropfenweise; alle diese Gaben vor dem Einnehmen immer so verdünnt, dass sie durchaus keine brennende

Empfindung auf der Zunge erregen. Oft reichten 1–2, oft erst 4–6 Wochen zur Vollendung der Cur hin.]

Ausserl. ebenfalls aufgelöst zu Injectionen [etwa Gr. $\frac{1}{2}$ –2 auf Unc. 1; doch auch wohl stärker. HANDSCHUCH bei Hodenverhärtung nach unterdrücktem Tripper: Gr. 2–3 auf Unc. 1 (und verstärkt, bis Brennen erfolgt) in die Harnröhre zu injiciren (sobald der Ausfluss wiederhergestellt, Breiumschläge ums Scrotum). — Ry 586, 587], Augentropfwässern [Gr. $\frac{1}{2}$ –2 auf Unc. $\frac{1}{2}$. — Gr. 1 auf Unc. $\frac{1}{2}$: GIMBERNAT gegen Hornhautflecke; nach der Application das Auge mit einer schleimigen Flüssigkeit auszuwaschen.], Waschungen [Im Eruptionsstadium der *Miliaria rheumatica s. pulmonalis*, namentlich bei starkem Schweiss, instituiert. SCHÖNLEIN mit dem günstigsten Erfolg laue Kaliwaschungen: anfangs Dr. 1–1 $\frac{1}{2}$, dann allmählig bis zu Unc. $\frac{1}{2}$, auf L. 1 Wasser; damit wird (mehr od. weniger häufig, je nachdem es die Symptome erfordern, anfangs vielleicht alle St., später alle 3–4 St.) der ganze Körper gewaschen, nachdem man vorher den Schweiss abgetrocknet. Unangenehme Folgen, die SCHÖNLEIN nach diesen Waschungen gesehen hat, sind nicht wichtig genug, um deshalb diese bis jetzt beste Methode bei einer so gefährlichen Krankheit aufzugeben; denn sie bestanden immer bloss in nicht eben bedeutenden rheumatischen nervösen Affectionen des Herzens (lange zurückbleibende Reizbarkeit desselben, leicht Herzklopfen u. s. w. — dagegen Aq. Laurocer. u. wiederholte Hautreize) oder, seltener, des Magens (reissende Schmerzen, nach Genuss Erbrechen u. s. w. — dagegen Dowersches Pulver, Autenriethsche Pockensalbe, reizlose Diät). —

RUST's Verfahren beim Hundebiss s. im Anhang: Vergiftungen], Bädern [zu einem allgemeinen Unc. 1–2 (u. mehr); zu örtlichen Dr. $\frac{1}{2}$ –1 auf 1 Quart. (Wo destillirtes Wasser zu theuer, verfahre man, wie L. 8. 362 Z. 12 v. u. angegeben.) Wohlfeiler würde die Seifensiederlauge (eine Ätzkaliauflösung) seyn, nur ist ihre Stärke nicht bloss bei den verschiedenen Seifensiedern, sondern auch bei einem und demselben in verschiedenen Perioden der Arbeit, sehr verschieden; man kann nur im Allgemeinen angeben, dass ihr Gehalt an Ätzkali zwischen 5 u. 15 Procent schwankt; obenein ist bei den empirisch arbeitenden Seifensiedern oft noch ein mehr od. weniger grosser Theil des in der Lösung enthaltenen Kali kohlensäuer. Dieser Unbestimmtheit halber wird man sich der Seifensiederlauge nur etwa zu Fussbädern bedienen (dem Kranken angehend, dass er so viel ins Fussbad schütte, bis er ein gelindes Jucken od. Brennen empfindet), falls man nicht von einem gebildeteren Seifensieder eine genau nach dem Alcalimeter bestimmte Lauge erhalten kann. Man muss übrigens dem Seifensieder sagen lassen, dass man „frische Lauge vom Äscher, ohne Zusatz von Unterlauge“ haben wolle. (Die sogenannte Unterlauge nämlich, Residuum von der Bereitung der harten Seifen, enthält salzsaurer Kali.) — Gewöhnliche Heerdaschenlauge, von Büchen- od. Eichen-Holz, durch ungelöschten Kalk *ex tempore* geschärft (kaustisch gemacht) ist noch unsicherer als Seifensiederlauge], Verband wässern [Gr. 1–6 auf Unc. 1; z. B. zum Umschlag auf primäre Schanker, um sie — in den ersten Tagen, wo sie noch als rein örtliches Uebel angesehen werden dürfen — zu zerstören, Gr. 1–2 auf Unc. 1: RUST; — Dr. $\frac{1}{2}$ auf Unc. 6: CERUTTI auf scrofulöse Geschwüre].

586.

Ry *Kali caustici sicci* Gr. $\frac{1}{2}$
 solve in
 Aq. Chamomill. Unc. 1 $\frac{1}{2}$

addo

Tinct. Opii simpl. Gtt. 5.
 M. D. S. Zu den Einspritzungen ins
 Ohr. (Bei jauchiger Ohr-Eiterung.)
 RUST.

587.

Ry *Kali caust. sicci* Gr. $\frac{1}{2}$
 solve in

Aq. Calcar. Dr. 3

adde

Tinct. Opii simpl. Gut. 20.

M. D. S. Einige Tropfen in den zuvor durch eine Kienstritzung gereinigten Gehörgang zu giessen, dann denselben mit Baumwolle zu verstopfen. (Bei Otorrhöa catarrhalis pituitosa im Uebergang zur atonischen Otorrhöe.) VOGT.

+ *Kali hydrobromicum. Hydrobromas Potassae. Brometum Kalii cum Aqua.* Bromwasserstoffsäures Kali. Bromkalium. — Leicht auflöslich in Wasser. — *Cave:* s. I. S. 34; auch Chlorverbindungen; doch wird man es vorläufig nur nach mitgetheilten Vorschriften prüfen.

Innerl. zu Gr. $\frac{1}{2}$ - 2, einigemal tägl. [Gr. 4 - 8 - 12 auf den Tag], in Auflösungen [z. B. Gr. 12 in 3 Unzen destill. Wassers mit *Syr. Altk.* Ums. 1, eestöffelweise in 24 St. zu verbrauchen: MAGENDIE].

Ausserl. zu Salben [z. B. Dr. $\frac{1}{4}$ (bisweilen noch mit 3 - 6 Tropfen Brom) auf $\frac{1}{2}$ Unze Fett, davon, zu Dr. $\frac{1}{2}$ - 1 jedesmal, auf Scrofelgeschwülste einzureiben: MAGENDIE. — Dr. 1 auf $\frac{1}{2}$ Unze Fett; damit 2mal tägl. eine Stelle bis zur Grösse eines Thalers einzureiben; ist diese geheilt, eine andere: PRIEGER bei bösartigem Kopfgrind, nässenden bösartigen Flechten. — Vgl. *Bromum.*], Umschlägen [aufgelöst].

- *Kali hydroiodicum. Kalium iodatum. Hydroiodas kalicus. Iodetum Kalii.* Iodwasserstoffsäures Kali. Iodkalium. [Zieht an der Luft mit der Zeit Feuchtigkeit an. — 1 Drachme $4\frac{1}{2}$ Sgr.] *Sol.* $\frac{3}{4}$; *Spir. V. rftiss.* $5\frac{1}{2}$. — *Cave* [mit sanctionirten Ausnahmen] Säuren [namentlich auch ranzige Säure; es darf deshalb das Iodkalium nicht auf längere Zeit mit Balsamen, äther. Ölen, Fetten oder harzigen Salben verbunden werden. Ein Zusatz von *Magnesia carb.* oder *Kali carb.* zu diesen Stoffen vermag einer Zersetzung des Iodkaliums nicht ganz zu begegnen. Man giebt es deshalb in der Salbenform oft am passendsten mit *Ungt. ceruum*, wodurch die Zersetzung weiter hinausgeschoben wird]; Chlor, Brom; mehrere Metallsalze [salpetersaures Silber; Quecksilbersalze; Blei-, Kupfer- und Spiesglanz-Oxydsalze; einige Chlormetalle, z. B. Chlorgold; — falls man nicht, wie in einigen unten anzuführenden Verordnungen, Iodquecksilber oder Iodblei bilden will]; Metallgefässe [wie *Iodum*].

Innerl. (≠) zu Gr. $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ und mehr, 2-3mal tägl. [Englische u. a. Ärzte geben es in weit grösseren Dosen, z. B. Ry 588; WILLIAMS zu Gr. 8, 3mal tägl., bei syphilitischen Knochenkrankheiten (zur Unterstützung Sarsaparille); MAGENDIE gegen Epilepsie 3mal tägl. 1 Scr. *Kali hydr.* mit $\frac{1}{2}$ Gr. Iod in einem Eestöffel Mins- u. Orangenblüth-Wasser, so wie gegen chronische Rheumatismen u. alte syphilit. Übel Dr. $\frac{1}{2}$ - 1 auf den Tag, mit oder ohne 1-2 Graa Iod, in einer Tisane aufgelöst; ELLIOTSON bei Anschwellung der Leber u. Milz gar Dr. 1 - 2 auf den Tag]; in (Pillen oder) Auflösung, geistiger oder wässriger, am besten in der Regel [die sehr beliebte Verbindung mit Iod ausgenom-

men] pur [z. B. Gr. 12 in *Spir. F. rftiss.* Dr. 2 aufgelöst, davon 2-3mal tägl. 8-24 Tropfen, oder in demselben Verhältniss in *Aq. destill.* aufgelöst, eben so oft 5-15 Tropfen]. Oft rathsam jede Einzelgabe in einhüllendem Vehikel.

Ausserl. in Salben [Gr. 10-30 (und mehr — wenn es ertragen wird) auf $\frac{1}{2}$ Unze Salbengrundlage, am besten gewöhnlich (s. oben unter *Cave*) *Ungt. ceruum.* — Officinell *Ungt. K. h.* — Gr. 10 auf Unc. $\frac{1}{2}$, davon 2mal tägl. auf den Penis einzureiben u. diesen mit Flanell unwickelt zu halten: BENABEN bei Harnröhrenstricturen (wenn Pusteln ausbrechen, mache man die Salbe schwächer; bei etwaniger Strangurie setze man aus und applicire Egel). — Gr. 12-15 auf *Ungt. Hydr. cin.* Unc. $\frac{1}{2}$: BLASIUS zum Auflegen bei ulcerirtem, zum Einreiben bei nicht ulcerirtem Lupus (bei diesem Übel scheint doch Vorsicht mit so eindringlichen Mitteln nöthig). — Scr. 1-2 mit Iod Gr. $2\frac{1}{2}$ - 5 auf Unc. $\frac{1}{2}$ Fett: LUGOL gegen scroful. Geschwülste, Geschwüre p. p. — Gr. 30-45 auf Unc. $\frac{1}{4}$: RADIUS gegen Drüsengeschwülste, Sackwassersucht, Kopfwassersucht, Ausschwitzungen zwischen den Hirnhäuten, selbst gegen Balggeschwülste bisweilen nützlich. — Gr. 2 auf Dr. 1: FISCHER zum Einreiben (1mal tägl.) in Hagelkörner. — R₅ 589], Pflastern [z. B. Gr. 3-5 auf *Empl. Rharg. simpl.* oder *Hydrarg.* Dr. 1 (die Verbindung mit Quecksilber in Pflastern der Salbe greife leicht die Haut an, sey aber auch um so wirksamer): ASCHERSON gegen Überbeine], Kerzen [z. B. 1 Scr. mit eben so viel *Extr. Bellad.* auf 4 Unz. gelbes Wachs: MAGENDIE bei Harnröhrenstricturen], auch endermatisch [vgl. *Iodum*]; in Auflösungen [die den Vortheil haben, dass sich das Salz darin nicht so leicht zersetzt wie in Verbindung mit Fett], so zu Einreibungen [z. B. Dr. $\frac{1}{2}$ - 1 in *Spir. Lavand.* oder *Rorismar.* Unc. 1, 3mal tägl. auf verhärtete Drüsen, den Kropf od. dgl. einzureiben], Augengewässern [R₅ 590; vgl. R₅ 570, 571 (*Iod.*)], Bädern [vgl. *Iodum*], Dämpfen [z. B. 4-5mal tägl. in einem Glase die Auflösung von $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ Gran mit etwas Schwefelsäure zu verbinden und die Dämpfe 1-2 Minuten einzuathmen: BERTON bei Phthisis, Hämoptysis], u. s. w.

588.

R₅ Iodi Gr. $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ *Kali hydroiodici* Gr. 15-30
solve in*Aq. destill.* Unc. 4
adde*Syr. Caput. Papas.* Dr. 2.

M. D. S. 3 mal tägl. 1 Essl., und die Gaben nach Befinden zu vergrössern. (Gegen veraltete Geschwüre und Knochenaufreibungen scrofulöser, arthritischer, syphilitischer oder syphilitisch-mercurieller Natur etc., besonders wo Quecksilber nicht vertragen wird.)

DEWEES.

589.

R₅ *Kali hydroiod. pulv.**Natri carbon. dep. sicci ana* Dr. $\frac{1}{2}$ *Ungt. rosati* Dr. 6-4.

M. D. S. Früh u. Abends einer kleinen Bohne gross einzureiben. (Gegen chronische Hodengeschwulst.)

V. WALTHER.

590.

R₅ Iodi Gr. $\frac{1}{4}$ - 1*Kali hydroiod.* Scr. $\frac{1}{2}$

solve in

Aq. Rosar. Unc. 3.

D. S. Augengewasser, 4 mal tägl. zu appliciren. (Bei scroful. Augenentzündung, selbst mit Schwärung der Conjunctiva u. Cornea.)

MAGENDIE.

Kali nitricum depuratum. Nitrum depuratum

*s. prismaticum. Alkali vegetabile nitratum. Sal Petrae. Sal Nitrum. Nitrus kalicus s. Potassae depuratus. Gereinigter Salpeter. Salniter; Felsensalz etc. Salpetersaures Kali. [1 Unze $2\frac{1}{2}$, sub. pulv. $2\frac{1}{2}$ Sgr.] Sol. 4-5. — Cave s. I. S. 33 [unt. „Salpeters. Salze“]; ausserdem: Weinstein säure; schwefelsaure Metallsalze; *Baryta muriat.**

Innerl. zu Gr. 5-20, alle 2-1 St. (Dr. 1-2-3 tägl.). Zweckmässig in der Regel mit Schleim [indem man den Pulvern *Gm. Mimosq.* zusetzt, für flüssige Formen ihn in *Decoct. Alth.* oder *Gramin.* oder in Emulsionen, bei häuslicher Bereitung in versüßtem Haferschleim, od. dgl. auflöst, oder doch die Einzeldosen in schleimigem Vehikel nehmen lässt]. In Pulver [Ry 591, 592; 183 (*Camph.*), 223 (*Carbo Spong.*), 229 (*Castor.*), 784 (*Opium.*)]. — Tägl. 1-2 mal Scr. 1 mit *Sulph. stib. aur.* Gr. 1: BURCHARD gegen chronische Heiserkeit. („Etwa in versüßtem Haferschleim.“) Sonst lässt man wohl bei Anginen Salpeter (bisweilen mit einem kleinen Zusatze von Campher) gepulvert messerspitzenweise auf der Zungenwurzel fließen (mit Honig ana: VOIGTEL bei entzündlicher Angina.)] od. Auflösungen [als Geschmacks correction: schleimige od. säuerliche Syrupe, *Pasta gummosa* (2 auf 1 Salpeter), *Oxymel simpl.*, *Sacch. Lact.* — Ry 593-597; 922 (*Rad. Tarax.*), 1034 (*Tart. stib.*)], Emulsionen [besonders bei schwachem Magen und bei entzündlichem Tripper. — Ry 598; 189 (*Camph.*), 745 (*Ol. camphorat.*)]; zum Getränk [etwa Dr. 1 mit *Tartar. depur.* oder *Acid. tartar. ana* und *Syr. Rubi Id.* Unc. 2 auf 1 Quart Wasser].

Ausserl. in Mund- u. Gurgelwässern [Dr. $\frac{1}{2}$ -2 auf Unc. 6. — Z. B. Dr. 1 auf 8 Unz. Gerstenabsud, 1 Unze Maulbeersyrup: WENDT zum Einspritzen gegen *Angina scarlatinosa* mit tiefer Röthe (ohne Geschwürs).], Klystieren [Dr. 1-2. — Ry 599, 600. — Dr. 1 mit *Ser. Lact. tamarind.* Unc. 8 (umzuschütteln, weil sich etwas Weinstein bildet): WENZEL zu 2 Klystieren für ein grösseres Kind], Fomentationen [hier namentlich für Arme durch den rohen Salpeter, *Kali nitr. crudum*, *Nitrum crudum*, den sie vom Specereihändler wohlfeiler als vom Apotheker entnehmen, zu ersetzen. Die beliebtesten sind die kältemachenden SCHMUCKERschen Fomentationen: man legt eine Portion einer Mischung aus 1 Theil rohen Salmiaks u. 3 Theilen Salpeter gröblich gepulvert in einer zusammengelegten Serviette od. dgl. auf den kranken Theil, u. befeuchtet dies mit einer Mischung aus Essig 6 u. Wasser 12-24; so oft die Salze aufgelöst sind, wird der Umschlag erneuert. — Unpassend ist es, wenn die PH. HANN. eine ähnliche Composition, *Fomentatio frigida*, in der Apotheke bereiten lässt; vgl. I. S. 369], Waschungen [Ry 11 (*Acet. plumb.*)], Salben [selten. Ry 1090 (*Sulph. dep.*)], Streupulvern [Ry 308 (*Cort. Salic.*)].

591.

Ry *Kali nitrici depur.*
Tartari depur.

Sacch. albi ana Scr. $\frac{1}{2}$.

M. f. Pulv. Disp. tales nr. 12. D.S. Ry *Kali nitrici depur.*

Alle 2-1 St. 1 Pulver mit Haferschleim.
Ruhr.

592.

Kali sulphurici depur. ana Dr. 2
Tartari depur. Unc. 1.
M. f. Pulv. D. S. Alle 3-2 St. 1 Theelöffel.

Pulo. antiphlogisticus PH. P.
 (1 Unze 3 Sgr.)

593.

R_y *Kali nitrici depur.* Dr. 2
 solve in

Aq. commun. Unc. 8
 adde

Syrupi communis Unc. $\frac{1}{2}$.
M. D. S. Stündl. 1 Essl.

Mixt. e Kali nitr. (*Mixt. nitrosa*) PH. MIL.

Eine in der Hospitalpraxis brauchbare Vorschrift, aber für die Privatpraxis nicht zu empfehlen, denn bei Wohlhabenden würde man ein anderes Corrigens, bei Armen die häusliche Bereitung vorziehen.

594.

R_y *Kali nitr. depur.*
Gm. Mimosae electi ana Dr. 3
Sacch. Lactis Unc. $\frac{1}{2}$

solve in
Aq. comm. Unc. 6.
D. S. Alle 2 St. 1 Essl.

595.

R_y *Kali nitrici depur.* Dr. 2
 solve in
Decocti Rad. Gramin. (Unc. $\frac{1}{2}$) Unc. 6
 adde

Oxymell. simpl. Unc. 1.
M. D. S. Stündl. 1 Essl. (Häufig bei Erysipelaceen u. s. w.) SCHÖNLEIN.

596.

R_y *Kali nitrici depur.* Dr. 2

Natri sulph. depur. cryst. Unc. $\frac{1}{2}$
 solve in
Aq. Cerasor. Unc. 5
 adde

Syr. Rubi Id. Unc. $1\frac{1}{2}$.
M. D. S. Alle 2-1 St. 1 Essl.

597.

R_y *Extr. Hyoscyami* Gr. 3
Kali nitrici depur. Scr. 2
 solve in

Aq. Foenic. Unc. $1\frac{1}{2}$
 adde

Syr. Alth. Unc. 1.
M. D. S. Alle $1\frac{1}{2}$ St. 1 Theelöffel. (Bei Brustentzündung eines 1jährigen Kindes.)

598.

R_y *Extr. Hyoscyami* Scr. $\frac{1}{2}$
Kali nitrici dep. Dr. 2
Sacch. Lactis Unc. 1

solve in
Emulsion. amygdalinae L. 1.
D. S. Stündl., umgeschüttelt, 1 Essl.
 (Bei entzündlichem Tripper.)

599.

R_y *Kali nitrici depur.* Dr. 1-3
 solve in
Decocti Sem. Aven. excoct. Unc. 7
 adde
Oxymell. simpl. Unc. 2.
M. D. S. Zu 2 Klystieren, etwas erwärmt. (BERENDS.)

600.

R_y *Kali nitrici depur.* Dr. 1
 solve in
Seri Lactis acid. Unc. 4
 adde
Oxymell. simpl. Unc. $\frac{1}{2}$.
M. D. S. Zum Klystier. REIL.

Kali oxymuriaticum s. muriaticum oxygenatum (hyperoxygenatum) s. chloricum depuratum. Chloras kalicus depuratus. Chlorsaures, oxydirt-salzsaures od. hyperoxygennirt-salzsaures Kali. [1 Drachme

1½ Sgr.] *Sol.* 16-17. — *Cave* stärkere Säuren; saure schwefelsaure Salze; Hitze.

Innerl. zu Gr. 3-10, 2-4mal tägl.; in Pulver oder (am besten) Auflösung [z. B. Gr. 25 auf *Aq. dest.* Unc. 4; 3mal tägl. 1 Essl.: KYR gegen Mundgeschwüre nach starker Salivation; — Dr. 1½ auf *Aq. destill.* Unc. 4, 2stündl. 1 Essl.: KNOD v. HELMENSTREITT gegen hartnäckige Rheumatismen nervöser Art, Kreuzschmerzen, Cotdunnisches Hüftweh, Fothergill'schen Gesichtsschmerz].

Zu Moxen [Baumwolle in eine concentr. Auflösung des Salzes getaucht und in die Gestalt kleiner, mehr od. weniger compacter Kegel gebracht: FERRARI].

Kali sulphuratum. *Hepar Sulphuris salinum s. alcalinum s. vulgare. Sulphuretum Kalii cum Sulphate kalico. Sapo Sulphuris.* Schwefelkalium; Schwefelleber, alkalische etc.; Schwefelseife. [Grübliches Pulver; zerfließt an der Luft, u. riecht dabei, indem es durch die Kohlensäure der Luft zersetzt wird, so wie auch sonst beim Zutritt von Säuren, nach Schwefelwasserstoffgas. — 1 Drachme 1½ Sgr. Für Arme kann man bei der Anwendung auf die Haut das wohlfeilere *Kali sulphurat. pro Baln.*, s. den Art., substituiren.] *Sol.* 2. — *Cave* Säuren [falls man nicht die Entwicklung von Schwefelwasserstoffgas beabsichtigt], saure Salze u. Säfte; Metalle [vgl. *Kali sulphurat. pro Baln.*] u. Metallpräparate; *Aq. comm.* Man verordne es, namentlich zum innerlichen Gebrauch, tägl. frisch. [Metall-Löffel nach dem Einnehmen sogleich in Wasser zu stecken: I. S. 394 sub 8].

Innerl. zu Gr. 5-10, 3-4mal tägl. in chronischen, — etwas kleinere Gaben alle 3-2 St. in acuten Krankheiten [man regulirt die Gabe am besten so, dass tägl. einige breiige Stühle erfolgen]; bei Neigung zur Säure mit einem absorbirenden, sonst auch, namentlich bei chronischen Krankheiten, gern mit einem aromatischen Zusatz. [Beste Geschmackscorrigentien: *Glycyrrhiza, Elaeosacch. Menth. pip., Syr. Croci.*] — In (Pulvern) [unzweckmässig], Pillen od. Bissen [auch hier sey man des Zerfließens wegen vorsichtig, mache etwa einen Feuchtigkeits anziehenden Zusatz, z. B. von *Pulv. Rad. Ath., Carbo ppt.* (oder einer andern Kohle — die Kohle beugt zugleich einem zu raschen Freiwerden des Schwefelwasserstoffgases im Magen einigermaßen vor), vermeide die Extracte, die viel salinische Bestandtheile enthalten (s. S. 160), wähle lieber *Extr. Dulcam., Calami* oder *Glycyrrhiz.*, und lasse *in vitro bene clauso* verabreichen. — Ry 601, 602]; am besten jedoch in Auflösung [mit Arom u. Zucker. — Ry 603-605; 1015 (*Sulph. stib. rub.*)]. Ein latwergengählicher Linctus: Ry 606.

Ausserl. zu Collutorien [selten (schmeckt abscheulich); etwa Dr. 1 auf Unc. 6], Injectionen [selten. — Gr. 15 auf Unc. 3-2; v. WEDEKIND gegen Nachtripper], Augewässern [selten. — Scr. 2 mit *Extr. Hyosc.* Scr. 1 auf Rosenwasser Unc. 4: CHELIUS zu lauen Bähungen bei Augenniederkrebs], Waachungen [Dr. 1 - Unc. 1 auf Unc. 8; um unterdrückte

chronische Exantheme wieder hervorzurufen, heiss (VOGT). — Bei *Crusta lactea* nach HAASE Dr. $\frac{1}{2}$ auf L. 1, einigemal tägl. anzuwenden. — Dr. 2 mit *Kali carb. acidul.* Dr. 1 auf L. 1: BLASIUS gegen *Prurigo*. — Bei Krätze nach AUTENRIETH folgendermassen: Zuerst werden, damit etwa noch verborgene Krätzpusteln schneller herauskommen, einige Tage lang, etwa alle 4 St. 1mal, alle krätzigen Theile schnell mit einem in sehr heisses Wasser getauchten Schwamm überfahren. Dann wird ein Waschwasser aus 1 *Kali sulphurat.* auf 20-3 Wasser (nach Verschiedenheit des Alters) so angewandt, dass tägl. mehreremal damit nur Ein Theil überstrichen und erst nach einigen Tagen, wenn der erste geheilt ist, ein zweiter eben so behandelt wird; also z. B. zuerst der rechte Arm u. die Hand, dann der linke Arm, hierauf die eine u. dann die andre untere Extremität, u. erst zuletzt die Brust und der übrige Rumpf. Das Waschwasser erregt nur ein leichtes Beissen; die Krätzpusteln werden dabei schwärzlich, trocknen aus u. sehen wie mit einem Causticum betupft aus. Der unangenehme Geruch lässt sich vom Körper leicht abwaschen, was jedoch jedesmal erst einige Minuten nach dem Bestreichen geschehen darf. In 15-18 Tagen werde auf diese Art gefahrlos die verbreitetste Krätze gehoben. Am Ende der Kur müssen aber die Kleidungsstücke des Kranken mit siedendem Wasser abgebrüht, und das Bettzeug gewechselt werden, damit nicht dadurch neue Ansteckung erfolge. — Ry 607, 608; 573 (*Iodum*), Linimenten [Ry 609].

601.

Ry *Kali sulphurati*
Besin. Guajaci nat. pulv. ana Scr. 1
Kali carbon. aciduli Gr. 5
Carbon. ppt. Scr. $\frac{1}{2}$
Extr. Dulcam. q. s.
 ut f. *Pilulae* 30. *Consp. Pulv. Rad. Irid. Flor. D. in vitro bene clauso. S.*
 3mal des Tags 10.

602.

Ry *Ferri pulv.* Gr. 3
Kali sulphurati Gr. 6
Extr. Quass. Ligni Gr. 10
Carbon. Spong. q. s.
 ut f. *Bolus. Cons. Pulv. Rad. Irid. Flor. Disp. tales nr. 4. D. in vitro bene clauso. S.* Früh u. Abends 1 Stück. (Bei Drüsenverhärtungen. — Als Ersatz einer Formel von KORTUM u. JAHN.)

603.

Ry *Kali sulphurati* Dr. $\frac{1}{2}$
 — *carbon. aciduli* Scr. $\frac{1}{2}$
Ol. Menth. pip. Gut. 1-2
 solve in
Syr. Cort. Aurant. Unc. 2-4
Mucil. Gm. Mimos. Unc. 1.

M. D. S. 2stündl. 1 Theelöffel.

LOCKSTAEDT.

604.

Ry *Kali sulphurati* Scr. 1
 — *carb. e Tart.* Scr. $\frac{1}{2}$
 solve in
Aq. Menth. pip. Unc. 2
 adde
Syr. Croci Unc. 1.
 M. D. S. Alle 2 St. 1 Essl.

605.

Ry *Sacch. albi pulv.* Unc. $1\frac{1}{2}$
 solve leni calore in
Aq. destill. Dr. 6
 adde
Kali sulphurati Scr. $\frac{1}{2}$ -1.
 Solve. D. S. Schwefellebersyrup,
 alle 2 St. 1 Theelöffel. (Für Kinder von
 1-4 Jahren bei Croup.) (CHAUSSIER.)

606.

Ry *Ol. Cacao* Dr. 2
 solve leni calore in
Ol. Amygdal. Unc. $\frac{1}{2}$
 adde torendo
Kali sulphurati Gr. (10-) 18

Sacch. albi pulv. Dr. 3.
M. D. S. Umgerührt theelöffelweise.
 (Besonders für Kinder.) CHAUSSIER.

607.

Ry *Kali sulphurati* Unc. 1

solvo in

Aq. destill. Unc. 4½

addo

Acidi sulph. diluti Dr. 1.

M. D. S. Morgens u. Abends etwas davon in die Hohlhand gegossen; damit die Ausschlagstellen zu waschen und zu reiben. (Bei Krätze.) DUPUYTREN.
 Zweckmäßiger wäre es, die Schwefelleberlösung für sich bereiten und ihr jedesmal unmittelbar vor dem Gebrauch verdünnte Schwefelsäure (auf die Unze etwa 12 Tropfen) zusetzen zu lassen.

608.

Ry *Kali sulphurati* Dr. 1½

Sapon. Hispan. albi Dr. ½

Kali sulphuratum pro Balneo. [Weniger rein als das

vorige Präparat, doch für die Haut rein genug. — 1 Unze 1½ Sgr.] *Cave* Metallgefäße, auch das Mitbringen von Metallgeräthschaften [Geschmeiden p.p.] ins Badezimmer.

Ausserl. zu Waschungen u. Linimenten [für Arme — vgl. *Kali sulphurat.*], zu Bädern [Diese nennt man gewöhnlich vorzugsweise Schwefelbäder (bisweilen versteht man unter dieser Benennung aber auch die aus *Calcar. sulphurata*). — Zu Einem Bade Unc. 2-4; oder Unc. 1-2 im Bade aufgelöst, u. dann noch halb so viel *Acid. sulphur. dilut.* hineingeschüttet; zu diesen letzteren Bädern kann man auch noch etwas Kreide, etwa *ana* mit dem *Kali sulphurat.*, nehmen, wo dann die Schwefelsäure ausser dem Schwefelwasserstoffgas auch kohlensaures Gas entbindet. — Unc. 4 mit 2 Pf. („sehr viel!“) Thierleim (vgl. † *Colla animal.*) zu Einem Bade: im *Hôtel-Dieu* zu Paris gegen Hautkrankheiten, besonders Krätze, manche Nervenkrankheiten u. s. w.], auch wohl zu Dampfbädern [entweder indem man heissen Wasserdampf durch ein mit der Schwefelleber gefülltes Gefäß u. dann in einen Räncherungsapparat leitet; oder, intensiver, auf die unter † *Gas hydrothion.* angegebene Weise].

***Kali sulphuricum acidum.** *Bisulphas kali-oss.* Saures schwefelsaures Kali. [1 Unze 2½ Sgr.] *Sol.* 2. — *Cave* Weinsteinsäure; Kalkwasser; Kalk-, Baryt-, Quecksilber-, Silber- und Blei-Salze; Schwefellebern; Gerbstoff. — In-

solvo in

Aq. Calcar. Unc. 4

addo

Spir. Vin. rft. Dr. 1.

M. D. S. 2mal tägl. die kranke Stelle damit zu waschen. (Bei Grind.)

BARLOW.

Eine sehr ähnliche Formel lobt BIRT.

609.

Ry *Kali sulphurati* Unc. ½

tere cum

Aq. destill. calidae Scr. 4

addo

Sapon. Hispan. (od. domest.) albi
 Unc. 2

Ol. Papav. Unc. 4

antea liquefacta et mixta. Massae ad refrigerat. usque agitatae addo

Ol. Lavandul. Gtt. 10.

M. f. Linim. D. S. Zu 1-2 Loth 1-2mal tägl. einzureiben. (Gegen Krätze u. a. chronische Hautkrankheiten.)

JADELOT.

nerl. (selten) zu Scr. 1-Dr. 1, 3-4mal tägl.; in Pulvern, Auflösungen. — Äusserl. zu Riech- u. Räucher-Pulvern [in denen man seinen Überschuss von Schwefelsäure zur Entwicklung flüchtiger Stoffe benutzt. Ry 576 (*Kali acet.*). Vgl. auch *Chlorum Calcar.*].

Kali sulphuricum depuratum. Arcanum duplicatum dep. Tartarus vitriolatus dep. Sal de duobus. Sal polychrestum Glaseri. Nitrum vitriolatum Schröderi. Panacea duplicata s. Holsatica. Sulphas kalicus depuratus. Schwefelsaures Kali. Doppelsalz. Vitriolisirter Weinstein. [1 Unze 1 Sgr., *subt. pulv.* 1 $\frac{3}{4}$ Sgr.] Sol. 10. — Cave Weinsteinsäure; Kalkwasser; Kalk-, Baryt-, Quecksilber-, Silber- u. Blei-Salze; Gerbstoff.

Innerl. zu Scr. $\frac{1}{2}$ -Dr. $\frac{1}{2}$, 3stündl.; um abzuführen, Unc. $\frac{1}{2}$ -1, auf einige Portionen vertheilt. In Pulvern [mit *Magnes. carb.*, Fenchel, Pomeranzenschalen u. dgl. — Ry 610; 592 (*Kali nitr. dep.*), 962 (*Sem. Cinae*). — 1 mit Salpeter u. *Stib. oxyd. alb.* ana $\frac{1}{2}$; *Pulv. resolvens* der PH. SLESV. (1 Drachme 1 Shl.)], Bissen od. Pillen [mit *Rheum, Jalapa* u. dgl. — Ry 611], Latwerge [Ry 965 (*Sem. Cinae*)], Auflösungen [besonders die grösseren Gaben in flüssiger Form. — Ry 612, 613].

610.

Ry *Kali sulphurici dep.*
Tart. depur. ana Dr. 2
Magnes. carbon. Dr. 1
Elaeos. Foenic. Dr. 3.
M. f. Pulv. D. in vitro. S. 3stündl.
 1 Theelöffel. G. A. RICHTER.
 Braust schwach auf.

611.

Ry *Kali sulphurici dep.* Dr. 2
Pulv. Rad. Rhei Scr. 2
Ol. Foenic. Gtt. 6
Extr. Card. bened. q. s.
ut f. Pilulae 60. *Consp. Pulv. Sem.*
Foenic. D. S. 4mal tägl. 5-6.

612.

Ry *Kali sulphurici dep.* Unc. $\frac{1}{2}$
 solve in
Aq. comm. Unc. 8
 adde
Extr. Tarax. liq. Unc. 1.
M. D. S. 2stündl. 1 $\frac{1}{2}$ Essl.

613.

Ry *Kali sulphurici dep.* Dr. 6
 solve in
Infusi Hb. Digital. (Dr. $\frac{1}{2}$) Unc. 6
 adde
Mellis despum. Dr. 6.
M. D. S. 2stündl. 1 Essl. (Bei *Phlegmasia alba dolens.*) (MARTIN.)

Kali tartaricum. Tartarus tartarisatus. Tartarus solubilis [nicht mit *Cremor Tartari solubilis* od. *Tartarus solubilis ammoniacalis* zu verwechseln]. *Sal vegetabilis. Tartras kalicus.* Neutrales weinsteinsaures Kali; tartarisirter oder auflöslicher Weinstein. [Pulver; Feuchtigkeit anziehend. — 1 Unze 5 Sgr. — Es schmeckt sehr unangenehm; man verschone den Kranken damit, wo, wie so oft in Pulvern für Hämorrhoiden u. dgl., der ärztliche Zweck es er-

laugt, ihm den *Tart. depur.* oder *natronat.* (welche beide auch wohlfeiler sind) zu substituiren. — Am erträglichsten corrigirt noch *Glycyrrhiza* den Geschmack.]

Sol. 1. — *Cave* Säuren; säuerliche Früchte u. Säfte; schwefelsaure, phosphorsaure, salpetersaure und salzsaure Salze; Metallsalze; Kalkwasser. In Auflösungen erleidet es mit der Zeit eine Zersetzung.

Innerl. zu Scr. $\frac{1}{2}$ — Dr. $\frac{1}{2}$ alle 3-2 St.; um abzuführen, Unc. $\frac{1}{2}$ — 1 $\frac{1}{2}$, auf mehrere Portionen vertheilt. In Pulvern [des Feuchtigkeits-Anziehens wegen mit den nützigen Cautelen (I. §. 108 sub 1.). — Ry 614; 911 (*Rad. Seneg.*)], Pillen oder besser Bissen [ebenfalls mit Cautelen wegen des Feuchtigkeits-Anziehens. — Ry 615; 912 (*Rad. Seneg.*)], Auflösungen [Ry 616-620; 370 (*Extr. Dulcam.*), 251 (*Rad. Helleb. nigri*), 921, 922 (*Rad. Tarax.*)].

Ausserl. bisweilen in Klystieren [vgl. *Rad. Valer. min.*].

614.

Ry *Sulphur. praecip. Scr. 2*

Rad. Rhei Dr. 1

Flaved. Cort. Aurant.

Magnes. carbon. ana Dr. 1 $\frac{1}{2}$

Kali tartarici

Klaeos. Foenic. ana Dr. 3.

M. f. Pulv. D. in vitro. S. 3 mal tägl.

1 Theelöffel.

Solamen hypochondriacorum.

KLEIN.

Schmeckt sehr schlecht; bei Wohlhabenden deshalb lieber die folgenden Bissen.

615.

Ry *Sulphur. praecip. Gr. 2*

Rad. Rhei pulv. Gr. 3

Magnes. carbon. Gr. 5

Kali tartarici Scr. $\frac{1}{2}$

Ol. Aurant. Cort. Gtt. $\frac{1}{2}$

Extr. Taraxaci liq. q. s.

ut f. Bolus. Congp. Pulv. Rad. Irid.

Flor. Disp. tales nr. 12. D. in vitro

bene clauso. S. 3mal tägl. 1 Stück.

616.

Ry *Kali tartarici Unc. $\frac{1}{2}$*

solve in

Aq. comm. Unc. 6

adde

Syr. communis Dr. 2.

M. D. S. Alle 3-2 St. 1-2 Essl.

Mixt. o Kali tartar. PH. MIL.

Für die Hospitalpraxis brauchbar [wenn

nach auch durch die Säure des *Syr. communis* (vgl. den Art.) ein wenig *Tart. depur.* bildet]; in der Privatpraxis für Wohlhabende nicht angenehm genug, für Arme durch weniger Menstruum und Zusetzen von Syrup im Hause wohlfeiler zu stellen.

617.

Ry *Kali tartarici*

Succi Glycyrrh. dep. ana Unc. $\frac{1}{2}$

solve in

Aq. Menth. crisp. Unc. 5

adde

Extr. Tarax. liq.

— *Gramin.* — ana Unc. $\frac{1}{2}$.

M. D. S. Alle 2 St., umgeschüttelt, 1 Essl.

618.

Ry *Kali tartarici Scr. $\frac{1}{2}$*

solve in

Aq. Foenic. Unc. 1

adde

Syr. Rhei Unc. $\frac{1}{2}$.

M. D. S. Theelöffelweise. (Purganz für Neugeborene.) VOGT.

619.

Ry *Kali tartarici Dr. 1 $\frac{1}{2}$*

solve in

Aq. Foenic. Unc. 2

adde

Vini stibiat Dr. 1

Syr. Mannas Unc. $\frac{1}{2}$.
M. D. S. 2stündl. 1 Theelöffel. (Als
 gelind eröffnendes Mittel — z. B. bei
 Keuchhusten p.p. — für Kinder von
 1-2 Jahren; auch wohl als eigentlich
 abführendes für jüngere.) *OSANN.*

620.

Ry *Kali tartarici* Unc. $\frac{1}{2}$

+ *Kalium. Potassium.* Kalimetall. Nur als Ätzmittel
 [s. G. A. RICHTER *Arzneimittell. Suppl. Bd. 8. 473*].

Kino. Gummi Gambiense. Kinogummi. [In Wasser u.
 Weingeist fast vollkommen, doch nicht leicht auflöslich. Hauptbestandtheile: Gerb-
 stoff (eisengrünend) und Extractivstoff. — 1 Unze 5, *subt. pulv.* 6 $\frac{3}{4}$ Sgr. Surro-
 gate für Arme: Catechu, Alaun p.p.]

Innerl. zu Scr. $\frac{1}{2}$ -1 mehrmals tägl. in Pulver [Ry 621; 68
 (*Alum.*), 835 (*Rad. Caryophyllat.*)], Pillen od. Bissen [vgl. 1. 8. 243. —
 z. B. Dr. 2 mit *Extr. Salic. q. s.* zu 120 Pillen, 4mal tägl. 10. — Ry 415 (*Ferr.*
sulph. cryst.)], Latwege, Auflösungen [geistigen, wässerigen od.
 geistig-wässerigen (Wein), zu denen man es indess Vorsichts halber gepulvert setzt
 und sie umgeschüttelt anwenden lässt. Man lässt es auch wohl mit heissem Was-
 ser, worin es sich weit leichter auflöst, infundiren (oder leicht abkochen), noch heisse
 coliren, u. dann umgeschüttelt gebrauchen, oder es auch wohl mittelst Schleim gleich-
 sam zur Emulsion machen; etwa Dr. 2 auf Unc. 6; alle 3-4 St. 1-2 Eael. — Ry 622].

Äusserl. wie *Catechu* [z. B. eine Zinkfalschlattwege: Ry 236];
 auch zu Salben [selten], Streupulvern [mit andern styptischen
 Pulvern bei Blutungen. Ry 327 (*Capr. sulphur.*)], u. s. w.

621.

Ry *Opü* Gr. $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ *Kino* Gr. 8-12*Cass. ednam.* Gr. 2-3.

M. f. Pulv. Disp. tales nr. 4. D. in
charta cerata. S. Stündl. 1 Pulv. (Bei
 innerlichen Blutungen. — Nach einer
 englischen Ophthalformel.)

622.

Ry *Kino pulv.* Dr. $\frac{1}{4}$ *tera cum**Syr. simpl.* Unc. $\frac{1}{2}$ *Aq. comm.* Unc. 3 $\frac{1}{2}$

adde

Spir. sulphurico-äther. Dr. $\frac{1}{2}$ *Tinct. Cinnamomi* Dr. 1.

M. D. S. Umgeschüttelt stündl. 1 Eael.
 (Bei Blutflüssen.)

* *Lac vaccinum.* Kuhmilch. [Hauptbestandtheile: Butter,
 Käse, Milchsäure, Milchzucker und Salze, mit vielem Wasser. — 1 Unze $\frac{1}{8}$ Sgr.]
Cave: die Milch gerinnt durch die meisten Säuren, Alaun, Me-
 tallsalze, Gerbstoff, Weingeist, grosse Quantitäten neutraler Alkali-
 salze; auch spontan [durch Bildung von Kohlensäure, Milchsäure u. wenig
 Essigsäure].

Innerl. und äusserl. in verschiedenen Formen; pur [in-

nerl. bisweilen mit einigen Tropfen *Liq. Kali carb.* zu jedem Glase, um der Magensäure zu begegnen] oder häufiger als Menstruum od. Vehikel anderer Mittel. [10 Gran Manna in 4 Unz. warmer Milch aufgelöst, davon öfters lau in die Nase aufzuschnupfen: ROSAS zur Wiederherstellung unterdrückten Schnupfens, z. B. bei Amaurose.] Besonders wichtig aber sind uns hier die eigentlichen Milhcuren [Zweckmässig nur bei guten Verdauungsorganen (schon nicht gern bei Neigung zu Säure, Flatulenz, Schleimanhäufung), im Frühjahr u. Sommer, bei heftiger Bewegung im Freien (am besten auf Gebirgen), heiterer Gemüthsstimmung, passender Diät („*Diæta alba; diæta blanche*“: nichts Saures, also auch kein Obst, keine spirituellen, bisweilen selbst keine warmen Getränke, keine schweren Fleischspeisen u. s. w.; hauptsächlich nur Weissbrod, leichte Gemüse, Hühner- oder Kalb-Fleisch u. dgl.). Anfangs nur Morgens nüchtern, später, wenn es vertragen wird, auch mehrmals tägl. (ja man macht wohl die Milch zur Hauptnahrung) $\frac{1}{2}$ – $\frac{1}{4}$ Quart, am besten frisch gemolken (wenn dies jedoch nicht vertragen wird, abgekocht) oder doch in einem Gefäss mit warmem Wasser etwas erwärmt; bisweilen mit Kalkwasser (das zugleich als *Antacidum* dient) oder Selterser Wasser. Das Thier muss zweckmässig ausgesucht seyn und gut ernährt und gehalten werden: beachtungswerth ist der Gebrauch, es mit Kräutern, die in der vorhandenen Krankheit heilsam seyn können, zu füttern. — Entsteht Säure, Flatulenz, Verstopfung od. Durchfall, — leichte Palliative dagegen. — Dauer solcher Curen 1 od. mehrere Monate. Man breche nicht plötzlich ab. — Auf ähnliche Weise wendet man auch bisweilen die Ziegenmilch (bei der man sich nur zu hüten hat, dass sie nicht durch giftige, der Ziege selbst nicht schadende, Futterkräuter vergiftet werde), seltner (wenn man mehr nähren will) die fettere, schwerverdauliche Schaafmilch an.] und die Anwendung zur künstlichen Ernährung in den ersten Lebensmonaten [Man giebt hier die Kuhmilch am besten frisch gemolken (nur wenn dies nicht vertragen wird, abgekocht u. abgerahmt), anfangs mit gleichen Theilen abgekochten Wassers (unter Umständen auch eines schwachen Fenchel- od. Kamillen-Thees) verdünnt, mit etwas Zucker; nach einigen Wochen fängt man an, sie allmählig weniger zu verdünnen, und endlich giebt man sie unverdünnt. Die genannten Zusätze macht man immer erst unmittelbar vor der Darreichung. Man lässt die Milch entweder ein, oder reicht sie (wohl zweckmässiger, weil der Reiz des Saugens vortheilhaft auf die Thätigkeit der Speicheldrüsen wirkt) mittelst eines Saugglases (vgl. hierüber etwa JÖRG *Kinderkrankh.* Lpz. 1826. §. 236.). Bei Magensäure ein Zusatz von leichter Fleischbrühe; gelinde Absorbentien. Am besten nimmt man die Milch von einer gesunden Kuh, die das 2te oder 3te Kalb etwa 14 Tage vor der Geburt des Kindes geworfen hat; wo möglich immer von derselben (wenigstens doch von keiner andern Thierart). Das Thier darf sein eignes Junge nicht säugen, und muss in jeder Hinsicht gut, namentlich auch an den Eutern rein, gehalten werden. — Auf ähnliche Weise wendet man auch wohl Ziegenmilch (vgl. oben) und Eselinnenmilch, die letztere jedoch weniger verdünnt und nicht versüsst, an].

† *Lactucarium*. Lattig-Opium. [Die PH. AUSTR. allein hat es aufgenommen. So wie sie es bereiten lässt (durch Austrocknen an der Luft des aus Einschnitten in den blühenden Stengel des Garten-Lattigs, *Garten-Salats*, *Lactuca sativa* L., gesammelten Safts), verdient es die Benennung *Lactucar. optimum s. genuinum s. Anglicum*, und ver-

hält sich wie ein Gummiharz. — 1 Scr. $4\frac{1}{2}$ Sgr. — Weit schwächer ist das *Lactucar. Gallicum s. Parisiense*, so wie das, auch oft *Lactucar.* genannte Präparat, welches ROTHAMEL *Extract. Lactucac sativ.* nennt. Es dürfen mithin viele gedruckte Formeln, welche sich auf eines der beiden letzteren Präparate beziehen, nicht auf das *Lactucar. Anglicum*, von welchem wir hier allein handeln, übertragen werden. Die Benennung *Thridacium*, franz. *Thridace*, wird häufiger für eines oder das andere der beiden letzteren Präparate, namentlich für das *L. Gallicum*, gebraucht als für das *L. Anglicum*.]

Innerl. zu Gr. $\frac{1}{2}$ -2 (-3), einigemal tägl.; in Pulver [z. B. alle 4-3 St. Gr. 1-2 mit *Rad. Glycyrrh.*: SACHSE bei Tripper-Erectionen, Chorda] oder pulveraufnehmenden Formen, namentlich Emulsion [etwa bloss mit einem Syrup].

Ausserl. nur etwa in Pflastern [wohl sehr entbehrlich].

Lapides (Oculi) Cancrī s. Cancrorum. Krebssteine; Krebsaugen. [Hauptbestandtheile und *Cave* wie bei *Conchas ppt.* (die als wohlfeiler meist den Vorzug verdienen). Man schreibt sie „*praeparati*“ vor. — 1 Unze ppt. $4\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerl. zu Scr. $\frac{1}{2}$ -1, mehrmals tägl. In Pulver [z. B. mit *C. C. ras.* („sollte nicht *Cornu Cervi ustum album* gemeint seyn?“), *Rad. Valer. min.*, *Viscum alb.* ans: *Pulv. antispasmodicus infantum* PH. P. (1 Unze 3 Sgr.), bei Säure, Durchfällen, Erbrechen, Nervenreizungen, Zahnkrämpfen empfohlen, etwa zu Scr. $\frac{1}{2}$ (einer kleinen Messerspitze) p. dosi für ein einjähriges Kind. — Ry 623, 624. — Bisweilen als Pulver-Constituens: I. §. 112. sub 1)], namentlich auch wohl Brausepulvern [z. B. Scr. $\frac{1}{2}$ mit eben so viel *Elaeosacch. Citri* und Gr. 15 *Tart. depur.* Doch dürften zu diesem Behuf, wie zu Saturationen, die Krebssteine weniger passend seyn als kohlensaures Natrium, Kali oder Magnesia, weil der citronensaure und der weinstein-saure Kalk sehr schwerauflöslich sind.], Trochisken [Ry 625], Pillen u. Bissen, Saturationen [vgl. das oben Gesagte], Schüttelmixturen. — Als Conspergens: I. §. 90.

Ausserl. als Zahnpulver, Streupulver, Augenpulver [q. v.].

623.

Ry *Lapid. Cancr. ppt.* Dr. 3*Macidis* Scr. 1*Sacch. albi* Scr. 2.

M. f. *Pulv. D. S.* Einigemal tägl. eine Messerspitze voll. SCHUBARTH.

624.

Ry *Moschi* Gr. $\frac{1}{2}$ *Croci* Gr. 1*Lapid. Cancr. ppt.* Gr. 3.

M. f. *Pulv. Disp. tales* nr. 6. D. in

charta dentata. S. Stündl. 1 Pulver, mit sehr wenig Wasser angeführt. (Für ein halb- od. einjähriges Kind.)

625.

Ry *Lapid. Cancr. ppt.* Dr. 6*Cinnamomi acuti* Dr. 1*Sacch. albi* Unc. 2*Mucil. Gm. Tragac. q. s.*

ut f. *Trochisci* nr. 90, *Pulv. Cinnam. acuti conspergendi, leniter torrendi. D.* S. Alle 2 Stunden 3-4 Stück.

* **Lapis calaminaris.** *Calamina. Galmei.* [Unreines koh-

lenqures (bisweilen kiesel-saures) Zinkoxyd. — 1 Unze ppt. $1\frac{1}{2}$ Sgr.] Nur äusserl., fein gepulvert, „präparirt“, zu Pflastern [so zum officinellen *Empl. consolidans*. — Mit *Empl. Litharg. simpl.* ana 12; Wachs 4, Hammeltalg u. Terpentin ana 1: *Empl. griseum* (s. de *Lap. calam.*) PH. SLESV. (1 Unze 3 Shl.)], Salben [Ry 626. — Selten zu Augensalben; z. B. 1 auf 2 Fett: RICHTER bei chronischen schwärenden Augenentzündungen.], Streupulvern [z. B. mit Stärkmehl ana: gegen *Pruritus vulvae*. — Par auf dem Bersten nahe Pockenpusteln dick aufzustreuen, um die Bildung dicker Schorfe u. hässlicher Narben zu verhüten: GEORGE. — Vgl. I. S. 223 sub a)].

626.

Ry *Ceras flavas* Dr. $1\frac{1}{2}$
 † *Ol. Raparum* Dr. $2\frac{1}{2}$.
Liquatis et ab igne remotis adm.
Lap. calaminar. ppt. Dr. 1.

D. —

Ungt. de Lap. calam. PH. SLESV.
 (1 Unze 3 Shl.)

Ähnlich *Cerat. Calaminae* PH. HANN.
 (1 Unze 3 Mgr., 6 Unz. 14 Mgr.)

† *Lapis Pumicis*. Bimsstein. [1 Unze *praep.* $1\frac{1}{2}$ Sgr.]

Bisweilen zu Zahn-Pulvern u. - Latwergen [vorsichtig, vgl. I. S. 217. — Die PH. SLESV. und HANN. haben ein *Electuar. dentifricium* (mit der nicht passenden synonymen Benennung *Elect. gingivale*) aus Bimsstein, *Tart. dep.*, *Lap. Cancr.*, Myrrhe, *Rad. Irid. Flor.*, Cochenille, Nelkenöl u. Rosenhonig. (1-Unze resp. 6 Shl. u. 4 Mgr.) Da aber die beiden ersten Ingredientien (vgl. für *Tart. dep.* I. S. 218) nur ausnahmsweise passend sind, so wird diese Latwerge nur selten und auf kurze Zeit anzuwenden seyn].

† *Lichen Carrageen. Carragaheen. Carragean. Korrigeen. Fucus Irlandicus s. crispus*. Irländisches Moos. Irländisches Perl- od. See-Moos. Geperltes Seemoos. Carrageen. [Botan. *Sphaerococcus crispus* AGARDH. — Hauptbestandtheile: Bessorin und Moosstärke. — 1 Unze conc. 2 Mgr.]

Innerl. in Abkochung, zu Dr. $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ auf den Tag. [Maceriren mit kaltem Wasser, nur einige Minuten lang, benimmt ihm schon den multrigen Geschmack. Ausserdem als Geschmacks- und Verdaulichkeits-Corrigentien: Zucker (2- oder mehrmal so viel als Substanz), Milchezucker, Citronenölzucker; *Syr. Cinnamon.*, *Flor. Aurant.*, *Amygdal.*, *Rubi Id.*; Honig; kleine Quantitäten blausäurehaltiger Mittel (z. B. *Aq. Laurocer.*); auch wohl etwas Wein.] Entweder in minder concentrirter Abkochung als Schleim [z. B. Dr. $\frac{1}{2}$ - 1, mit Unc. 9-18 auf Unc. 6-12 gekocht, dazu etwa *Syr. Rubi Id.* Dr. 3-4; zu halben Tassen in Einem Tage zu verbrauchen] oder [häufiger und angenehmer] in concentrirter Abkochung als Gallerte [Dr. $1-1\frac{1}{2}$ mit Unc. $3\frac{1}{2}$ - 5 auf Unc. 2-3 gekocht, dazu Corrigentien; theelöffel- oder esslöffelweise in Einem Tage zu verbrauchen. Kocht man mit Milch, so erhält man schon mit eiger merklich geringeren Menge Moos eine eben so concentrirte Gallerte. — Man kann namentlich die mit Wasser bereiteten Gallerten etwa noch durch *Syr. Cerasor.* oder *Rhosad.* schön roth färben. — Ry 627, 628]. In Berlin, bei *Misthe* u. bei *Pollack*, ist eine Carrageen-Schokolade käuflich.

627.

Ry *Lichenis Carrageen* Dr. 1½
macera per 5 minutos in Aq. comm.
q. s.; Aquam ut inutilem abjice; tunc co-
que c. Aq. comm. Unc. 5 ad Colat. Unc. 3,
cui adde

Syr. *Cerasor.* Dr. 6

Aq. *Laurocer.* Scr. 1.

Reposne in loco frigido, ut in Gelatinam

abeat. D. in vitro albo. S. In einem Ta-
 ge zu verbräuen.

628.

Ry *Lichenis Carrageen* Dr. 1
macera etc. (wie in Ry 627); tunc co-
que c. Lactis vaccini Unc. 6 ad Colat.
Unc. 4, cui adde

Syr. *Cinnam.* Dr. 6.

Reposne etc. (wie in Ry 627).

Lichen Islandicus. Isländisches Moos (Flechte).

Blutlungenmoos. [Hauptbestandtheile: Moosstärke, eigenthümlicher Bitterstoff und Flechtensäure. — Wo man den Bitterstoff aus therapeutischen Gründen entbehren möchte, kann man sich seiner entledigen: entweder 1) indem man ihn durch anhaltendes Kochen verändert; oder 2) noch besser, indem man ihn gradezu durch Auflösen oder auf andere Weise aus der Substanz entfernt; dies kann man wieder erreichen, indem man den *Lichen* zerschnitten mit kaltem oder heissem Wasser macerirt oder digerirt und dies Wasser dann abgiesst; oder noch vollständiger (weil sich der Bitterstoff in blossem Wasser nur schwer, leicht aber in kalischem auflöst) durch Digeriren mit *Kali carbon. e Cin. clav.* (auf jede Unze *Lichen* etwa Dr. ½) in heissem Wasser ein Paar St. lang; oder (vielleicht besonders zweckmässig, doch noch nicht gebräuchlich) durch Digeriren mit Thierkohle. (Beispiele von den verschiedenen Methoden, die zuletzt erwähnte ausgenommen, in den unten angehängten Formeln.) Bisweilen überlässt man die Wahl zwischen diesen Verfahrensweisen dem Apotheker, und schreibt: Ry *Lich. Isld. ab amaritie liberati* u. s. w. — Den so entbitterten *Lichen* kann man nun zu allen gewöhnlichen Arzneiformen verarbeiten lassen, zu Abkochungen, Gallerten, oder indem man ihn trocknen und pulvern lässt, zu Pulvern, Schokolade u. s. w. — Bei der Bereitung der Gallerte tritt zwar schon durch das anhaltende Kochen die oben angegebene Veränderung des Bitterstoffs ein; um indess die Gallerte noch angenehmer zu machen, lässt man gewöhnlich — was indess, wo man sie etwas bitterer haben will, keineswegs nothwendig ist — den *Lichen* noch auf die 2te oben angegebene Weise, durch ein kurzes Digeriren mit heissem Wasser, entbittern. — 1 Unze conc. ¾, sub. pulv. 1½ Sgr.] *Cave* mineralische Mittel.

Innerl. zu Unc. ½–1, auf den Tag; in (Pulver oder Trochischen) [ohne weitere Vorbereitung gepulvert, ist er schwerverdaulich; die vorgeschlagenen Zubereitungen sind umständlich, ohne Vorzüge vor der Gallertform zu gewähren, und deshalb nicht beliebt], Paste [meist nur als Moos-Schokolade, *Pasta Cacao e Lich. Isld.* — vgl. den Artikel], Abkochungen [längeres Kochen — z. B. Unc. 1 mit Unc. 24 auf Unc. 12 oder mit Unc. 16 auf Unc. 8 — giebt ein mehr schleimiges, kürzeres Kochen — z. B. Unc. 1 mit Unc. 16 auf Unc. 12 oder mit Unc. 11–12 auf Unc. 8 — giebt ein mehr bitteres Decoct; man mache, namentlich im ersteren Falle, die Abkochung nicht concentrirter als wir die Verhältnisse angegeben haben, weil sie sonst beim Erkalten dick, halb gallertartig, unangenehm zu nehmen wird. — Ry 629 (mehr bitter), 630 u. 631 (mehr schleimig, besonders die letztere Formel). Ry 309 (*Cort. Simarub.*). — *Mucil. Lich. Isld.* Ph. MIL.: 1 mit 18 auf 8.], auch wohl in Decoct-

species [z. B. *Unc.* $\frac{1}{2}$ - 1 mit eben so viel *Hb. Polygal. amer.*, mit $\frac{3}{4}$ Quart Wasser auf $\frac{1}{2}$ Quart gekocht, tägl. zu verbrauchen]; in Gallerte [s. I. 8. 286 ff. — Man hat diese Gallerte bisweilen (etwa mit Zusatz von Zucker) bis zur Trockne abdampfen und pulvern lassen (so z. B. das Brustpulver von TROSS); dergl. mag mitunter im Kriege, wenn es an Apotheken und Wärtern fehlt, nützlich werden; sonst aber gewährt es keinen Vortheil. — Ry 632-635; 471 (*Hb. Digital.*); Verb. m. China s. I. 8. 288]. Viele andere neuester Zeit, namentlich aus Frankreich, empfohlene Darreichungsarten sind theils nicht empfehlenswerth, theils doch nur zu Officialformeln geeignet.

629.

Ry *Lichen. Isld.* Dr. 6 - *Unc.* 1

Rad. Colombo Dr. 2

coq. c. Aq. comm. *Unc.* 16 *ad Colat.*

Unc. 12, *cui refrigerat. addo*

Spir. sulphurico-aeth. Dr. 1

Syr. Cinnam. *Unc.* 1.

M. D. S. 2stündl. 2 Essl.

630.

Ry *Lichen. Isld.* *Unc.* 1

coq. c. Aq. comm. L. 2 *ad Colat.* L. 1, *cui addo*

Syr. Glycyrrhiz. *Unc.* 1.

M. D. S. Alle 2-1 St. 1-2 Essl.

631.

Ry *Lichen. Isld.* *Unc.* $\frac{1}{2}$

Aq. comm. fervid. L. $\frac{1}{2}$

repono ad refrigerat., tum aquam ut inutilem abjice, et cum Aq. comm.

Unc. 16 *coque, sub fin. coct. addendo*

Sem. Phellandr. cont. *Unc.* $\frac{1}{2}$

ad Colat. *Unc.* 8, *in qua solve*

Extr. Glycyrrhiz. Dr. 2.

D. S. Umgeschüttelt 2stündl. 1 Essl.

632.

Ry *Lichen. Isld.* *Unc.* 1 - $1\frac{1}{2}$

coque cum Aq. comm. *Unc.* 9 *ad Colat.* *Unc.* 3-4, *in qua statim solve*

Sacch. albiss. pulv. *Unc.* 1 - $1\frac{1}{2}$.

Repono in loco frigido, ut in Gelatinam abeat. *D. S.* In einem Tage zu verbrauchen.

Gelat. Lich. Isld. PH. HANN. (1 Unze $2\frac{1}{4}$, 6 Unz. 10 Mgr.) ist weniger concentrirt und stärker versüßt.

633.

Ry *Lichen. Isld.* *Unc.* 1 - $1\frac{1}{2}$

Kali carbon. e Cin. clav. Scr. 2 - Dr. 1

Aq. comm. fervid. *Unc.* 9

masera per nycthemeron; tum liquorem decanta et Lichenem residuum probe ablutum coque c. Aq. comm. *Unc.* 12 *ad Colat.* *Unc.* 6, *in qua ebulliendo solve*

Sacch. albi *Unc.* 1 - $1\frac{1}{2}$.

Elliqua Album. Ovi q. s.; denuo cola; evapora ad roman. *Unc.* 4-5; *repono etc.* (wie in Ry 632).

Gelat. Lich. Isld. edulcorata PH. BLESV. ist weniger concentrirt und stärker versüßt, *Gelat. Lich. Isld. amara* PH. BLESV. ohne Infusion mit *Kali carb.* bereitet und nicht versüßt.

634.

Ry *Lichen. Isld.* *Unc.* 1

coq. c. Aq. comm. *Unc.* 16 *ad Colat.* *Unc.* 5, *cui statim addo*

Rad. Salep pulv. Dr. $\frac{1}{2}$

antea cum

Aq. comm. frigid. *Unc.* 1

triturando mixtam. Miscella sub contin. agit. paulisper ebulliat, tum admisce statim

Rhacosacch. Aurant. Cortic. (Gtt. 3) *Unc.* $1\frac{1}{2}$.

Repono etc. (wie in Ry 632).

635.

Ry *Lichen. Isld.* *Unc.* 1

digere per $\frac{1}{2}$ hor. c. Aq. comm. fervid. *Unc.* 6, *tum aquam ut inutilem abjice. Licheni residuo addo*

Cornu Cervi raspati et abluti *Unc.* $\frac{1}{2}$

coq. c. Aq. comm. *Unc.* 14 *ad Colat.* *Unc.* 6; *elliqua Album. Ovi q. s.; denuo cola;*

evapora ad reman. Unc. 4; *tandem solve*

Elaeosacch. Cinnam. (Gtt. 3) Unc. 1.
Repone etc. (wie in Ry 632).

Lignum Campechianum. Campeche-, Blau- od. Blut-Holz. [Hauptbestandtheil: ein rother Extractivstoff (Hämatoxilin, Hämatin od. Blauholzroth). Die Farbe des Auszugs wird durch mancherlei Beimischungen verändert. — 1 Unze *rasp.* $\frac{2}{3}$ Sgr.] Innerl. in Abkochung [Dr. 6 mit Unc. 9-12 auf Unc. 6, alle 2-1 St. 1 Essl. — Unc. 1 mit L. 1 auf Unc. 8, damit Scr. 1 Campher durch Gummi emulgirt, 2stündl. 2 Essl.: HAA5E gegen faulige Ruhr, Diarrhöe ohne Leischneiden nach Typhus, Faulfieber etc. (Man würde als Geschmackscorrigens passend etwa *Syr. Cinnam.* Unc. 1-1 $\frac{1}{2}$ dazu setzen u. dafür die Colatur etwas compendiöser machen.)], besser wohl noch in geistig-wässrigem Digestionsaufguss.

Lignum Guajaci s. sanctum. Guajak-, Franzosen- od. Pocken-Holz. [Hauptbestandtheile: Harz und ein eigenthümlicher, kratzender Extractivstoff. — 1 Unze *rasp.* $\frac{2}{3}$, *subt. pulv.* 1 $\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerl. zu Unc. $\frac{1}{2}$ -2 tägl., in Abkochung [Es muss sehr stark kochen; mit 2 Theilen Wasser auf 1 Theil ist fast schon zu wenig, besser mit 3, ja 4 auf 1; also etwa Unc. 1-2 mit L. 3 auf L. 1, zu halben oder ganzen Tassen. Man bereitet es auch wohl durch vorheriges Digeriren mit heissem Wasser auf das Kochen vor — Digestionsdecoct —, damit es sich dann durchs Kochen leichter aussiehen lasse und kein so starkes Einkochen nöthig sey; dies thut man namentlich dann gern, wenn man es mit andern Mitteln verbindet, die man nicht so stark kochen lassen will. (Ein Beispiel I, S. 164; auch bei den *Spec. ad Decoct. Lignor.* ist aus diesem Grunde ein Digestionsdecoct wohl die zweckmässigste Form.) Gern setzt man *Rad. Gramin.*, *Alth.* od. *Glycyrrh.* — die beiden letzteren jedoch erst *sub finem coctionis*, oder wenn die Abkochung im Hause des Kranken gemacht wird, lieber dafür etwas *Succ. Glycyrrh. dep.* zur Colatur — zu, um die Schärfe des Mittels einzuhüllen; bisweilen auch etwas Gewürzhaftes od. dgl., damit die Verdauung nicht leide, z. B. ein wenig *Tinct. aromat.* od. *Spir. nitr. aeth.* zur erkalteten Colatur, wodurch zugleich der Geschmack corrigirt wird. — Ry 636, 637; 893-896 (*Rad. Sarsap.*); vgl. auch † *Fin. Colch. e Sem.*], weniger gern [der Schwerverdaulichkeit wegen] und in verhältnissmässig geringeren Gaben gepulvert in Latwerge [Ry 434 (*Fol. Senn.*)].

636.

Ry *Ligni Guajaci* Unc. 2
coq. c. Aq. comm. L. 4 $\frac{1}{2}$ ad *Colat.* L. 1 $\frac{1}{2}$,
sub. finem coct. addendo

Sem. Foeniculi

Rad. Glycyrrh. ana Unc. $\frac{1}{2}$.

D. S. In 2 Tagen zu verbrauchen; umgeschüttelt.

637.

Ry *Ligni Guajaci*

Rad. Bardan. ana Unc. 3

— *Lapathi acuti*

— *Gramin.* ana Unc. 2.

Conc. M. f. Spec. D. S. Den 5ten Theil mit 1 Quart heissen Wassers zu übergiessen, einige Stunden an einem warmen Orte unter öfterm Umschütteln stehen zu lassen, dann auf die Hälfte einzukochen, u. in einem Tage zu verbrauchen.

Lignum Juniperi. Wachholderholz. [Hauptbestandtheile: äther. Öl und Harz. — 1 Unze conc. $\frac{2}{3}$ Sgr.] Innerl. in Tisanenform, seltner im Aufguss als [weil es in der Regel besonders um das Harz zu thun ist] in Abkochung [Unc. 1-2 mit L. 2-3 eine halbe St. gekocht, sub finem coct. wohl 1-2 Drachmen Rad. Glycyrrh. zugesetzt, tägl. zu verbrauchen]. — Äusserl. zu Räucherspecies [es riecht auf Kohlen gestreut angenehmer (schwächer) als die Beeren].

Lignum Quassiae. Quassiaholz. Bitterholz. [Hauptbestandtheile: s. Cortex Quass. — 1 Unze rasp. $1\frac{1}{2}$, sub. pulv. $2\frac{1}{2}$ Sgr.] Cave wie bei Cortex Quass.

Innerl. zu Scr. $\frac{1}{4}$ - Dr. $\frac{1}{4}$ einigemal tägl. [Geschmackscorrigentien; Cassia cinnam., Zimmtwasser, Äther oder ätherische Spiritus, Flavedo od. Tinct. Cort. Aurant.] In Pulver [ungern; eher schon in pulveraufnehmenden Formen; doch zieht man in der Regel die leichter verdaulichen flüssigen Auszüge vor. — Ry 217 (Carbo ppt.); vgl. auch Magnes. carbon.]; in Aufguss [Sowohl in warmem wässerigen Aufguss (Dr. 3-4 auf Unc. 6, 2 stündl. 1-2 Essl. — Ry 638; 302 (Cort. Pom. Aurant.), 883 (Rad. Rhei) —), als in kaltem wässerigen oder weinigen (Dr. 3-4 auf Unc. 12, 4 mal tägl. $\frac{1}{2}$ - 1 Weinglas. — Ry 639; 280 (Cort. Chin. fusc.) —). Bei Neigung zu Säure lässt man den kalten Aufguss auch wohl mit Kalkwasser bereiten. Der Bitterstoff der Quassia ist so leicht auszuziehen, dass es nicht nöthig ist, zum kalten Aufguss — wie bei andern holzigen Vegetabilien — das gäsbliche Pulver anzuwenden.]; Abkochung [Dr. 3-4 mit L. 1 - $1\frac{1}{2}$ auf $\frac{2}{3}$, höchstens bis auf die Hälfte eingekocht, in 2-1 Tage zu verbrauchen. Die Abkochung scheint keine Vorzüge vor dem Aufguss zu besitzen und nicht empfehlenswerth zu seyn]. Als ein Hausmittel werden Becher aus Quassiaholz angewandt, die man mit Wein oder Wasser füllt; sobald die Flüssigkeit hinlänglich bitter geworden, trinkt man sie; ein solcher Becher bleibt ziemlich lange brauchbar.]

Äusserl. der Aufguss als Umschlag, um das Eierlegen der Fliegen auf kranken Oberflächen, Verbandstücken p. p. zu verhüten.

638.

Ry Lign. Quass. rasp. Unc. $\frac{1}{2}$
 Kali carbon. s. Cin. clav. Dr. $\frac{1}{2}$
 Aq. comm. ferv. Unc. 8
 repons ad refrigerat.; Colat. adde
 Tinct. Cort. Aurant. Dr. 3.
 M. D. S. 2 stündl. 1 Essl. (Bei Magenschwäche mit Säure; auch wohl als
 Burrogat geistiger Getränke, um Säu-

fer allmählig davon zu entwöhnen.)

639.

Ry Lign. Quass. rasp. Dr. 3-4
 Aq. comm. q. s.
 macera, saep. agit., per nychthemeron. Colat. L. 1 adde
 Aether. acetici Dr. $\frac{1}{2}$.
 M. D. S. 4 mal tägl. $\frac{1}{2}$ - 1 Weinglas.

+ **Lignum Santali rubri s. sandalinum rubrum.** Rothes Sandelholz. [Hauptbestandtheil: ein rothes Harz (Sandel od. Santalin). — 1 Unze conc. $\frac{5}{8}$, pulv. $1\frac{1}{2}$ Sgr.] Nur noch etwa zu Zahnpulvern [s. I. 8. 220. — Ry 286 (Cort. Chin. fusc.)], Salben [selten. Ry 1048 (Terebinth.)].

Lignum Sassafras. Sassafras- od. Fenchel-Holz.

[Hauptbestandtheile: äther. Öl, nächst dem Harz, Gerbstoff. — 1 Unze conc. 1 Sgr. — Die Rinde gilt für kräftiger; man verordnet sie deshalb oft allein. 1 Unze conc. 2½, sub^t. pulv. 3 Sgr.] Innerl. zu Scr. 1–2 einigemal tägl.; in Pulver, Latwerge [R_x 434 (Fol. Senn.)]; häufiger in Tisanenform (Unc. ½–1 auf den Tag), und zwar in der Regel in Aufguss [besonders passend Digestionsaufguss. — R_x 1077 (Turion. Pin)], selten in Abkochung [nur etwa wenn man mehr den harzigen Bestandtheil haben oder es mit andern holzigen Mitteln verbinden will (so in den Spec. ad Decoct. Lignor., im Roob de LAFFECTEUR); doch ist es in der Regel zweckmässiger, es erst sub finem coct. zuzusetzen. R_x 640; 891, 894, 896 (Rad. Sarsap.)].

640.

R_x Rad. Bardanas Unc. 2

coq. c. Aq. comm. L. 5 ad Colat. L. 3,

sub finem coct. addendo

(Cort.) Ligni Sassafr. Unc. 2

Rad. Glycyrrhiz. gtabr. Unc. ½.

D. S. 2stündl. 1 Weinglas.

LINIMENTA. Linimente; Schmiersalben. — Die der Ph. Bor., überhaupt fast alle officinellen, entmischen sich, wenn sie nicht vorzüglich sorgfältig vor Luft und Wärme bewahrt werden, rasch; es ist deshalb rathsam, immer nur geringe Totalquantitäten zu verordnen und die sorgfältige Bewahrung besonders einzuschärfen.

Linimentum Aeruginis. Oxymel Aeruginis.

Oxymel Aegyptiacum. Unguentum basilicum viride. (Auch wohl *Unguent. Aeruginis* od. *Aegyptiacum*, welche Benennungen jedoch jetzt in der Ph. Bor. einem andern Präparat angehören.) Grünspanliniment. Grünspanauehönig. [Grünspan 3 mit Essig 24 gekocht, bis etwa 8 Essig übrig ist; filtrirt, 24 Mel despum. zugesetzt, u. die Mischung auf 24 eingedampft. — Syrupconsistenz. Stets umzurühren (weil der Honig das neutrale essigsaure Kupferoxyd zersetzt, das Oxyd partiell reducirt u. s. w.), mit einem Holzstäbchen. — 1 Unze 2½ Sgr.] Zu Gurgelwässern [etwa Dr. 1–3 auf Aq. destill. Unc. 5 mit Mel rosat. Unc. 1; der Kranke hätte sich, etwas zu verschlucken, u. spüle jedesmal nach der Application den Mund aus], Pinselsäften [Dr. 1–2 auf 1 Unze Saft]; auch wohl pur als Verbandsalbe, u. s. w.

★★ *Linimentum ammoniato-camphoratum s. volatile camphoratum.* Campherhaltiges flüchtiges Liniment. [Provencer oder Mohn-Öl 2, Ol. camphorat. u. Liq. Ammon. caust. ana 1. — 1 Unze 2½ Sgr. — Das gleichnamige Präparat der Ph. Mil. nicht erheblich verschieden.] Wie das folgende.

★★ *Linimentum ammoniatum s. volatile. Sapo Ammoniae. Oleum ammoniatum.* Ammoniumliniment;

flüchtiges Liniment; flüchtige Salbe. [Provencer oder Mohn-Öl 3; *Liq. Ammon. caust.* 1. — 1 Unze $2\frac{1}{2}$ Sgr. Bei Armen kann man es sehr leicht im Hause, etwa mit Rüböl, bereiten lassen.] Man kann, wenn man es magistral verschreibt, mit den Verhältnissen variiren [Beispiel: Ry 652], kann es auch in jedem Verhältniss mit officinellen Salben [z. B. *Ungt. Hydrarg. cin.* — Setzt man mehr als 1 Theil Salbe zu 3 Theilen des Liniments, so würde die Mischung zu dick werden, um sie in einem gewöhnlichen Glase verabreichen zu können; man wählt also dann ein Töpfchen (mit einem Korkstöpsel) oder ein Glas mit weiter Mündung (Opodeldoc-Glas)] und mit den verschiedenartigen Ölen [z. B. *Ol. Hyosc. coct.* (Ry 641), *Ol. Terob. rft.*] verbinden. Setzt man Tincturen zu [z. B. *Tinct. Camthar.*, *Euphorb.*, *Opü.*, *Iodi*, — in der Regel Dr. $\frac{1}{2}$ –1 auf die Unze Liniment], so lasse man vor dem Gebrauch jedesmal umschütteln.

641.

- Ry *Liq. Ammonii caustici* Dr. 2
Ol. Hyoscyami cocti Dr. 6

Tinct. Opü croc. Dr. $\frac{1}{2}$.

M. D. S. Umgeschüttelt einzureiben.
 RICHTER.

★★ *Linimentum saponato-ammoniatum.* [Hausseife

Gr. 15, Wasser Dr. 6, Kornbranntwein Unc. $\frac{1}{2}$, *Liq. Ammon. caust.* Scr. $10\frac{1}{4}$. — 1 Unze $\frac{5}{8}$ Sgr.] Hat vor dem vorigen, ausser der Wohlfeilheit, die Vorzüge, dass es die Haut nicht fettig macht und deshalb oft besser vertragen wird, und dass es die Wäsche nicht so beschmutzt. Es kann ebenfalls leicht im Hause bereitet werden. Man kann es noch durch Terpenthinöl oder Campher (Dr. 1–2 auf die angegebene Quantität) verstärken.

Linimentum saponato-cumphoratum. *Balsa-*

um Opodeldoc. Campher-Seifen-Liniment. Opodeldoc. [Weisse Hausseife u. spanische Seife ana $4\frac{1}{2}$, Campher $1\frac{1}{2}$, in *Spir. V. rftiss.* 60 aufgelöst, filtrirt; dazu *Ol. Thymi* $\frac{3}{8}$, *Ol. Rorismar.* $\frac{3}{8}$, *Liq. Ammon. caust.* $1\frac{1}{2}$. — Gallertartige Consistenz. Frisch gelb, durchscheinend, opalisirend; später weisslich, undurchsichtig. — 1 Unze $2\frac{3}{4}$ Sgr.] Meistens pur, um die Consistenz nicht zu ändern; so lange einzureiben, bis der Theil wieder trocken wird. Doch auch wohl mit Zusätzen [z. B. Unc. 1 mit *Tinct. Opü croc.* Dr. 1, einer Haselnuss gross 4mal tägl. in die Herzgrube einzureiben: v. HILDENBRAND gegen Gastrodynie. — Oder, zum Abreiben des Körpers im Bade (Badespiritus), in 2 Theilen *Spir. V. rftiss.* (oder *Spir. Lavand.*, *Serpyllä*, *Rorismar.*) aufgelöst].

Liquor Ammonii acetici. *Liq. Acetatis ammoniaci.* Flüssiges essigsames Ammonium; Essigsalmiak. [Spec. Gewicht = 1,030–1,040. — 1 Unze 5 Sgr. — *Liq. Amm. ac.* (*Spir. Mindereri*) PH. MIL. ist eine Saturation von *Ammon. carbon.* mit Essig, enthält mithin (falls nicht der Apotheker bei der Bereitung Hitze angewandt hat, und dies ist nicht vorgeschrieben) auch etwas Kohlensäure, und ist viel schwächer als das Präparat der PH. BOR.; (1 Unze $\frac{5}{8}$ Sgr.). Sonst ist auch der Salmiak ein Sur-

rogat des *Liq. Ammon. acet.* für die Arzneipraxis.] *Cave* stärkere Säuren; reine u. kohlen-säure fixe Alkalien, Kalkwasser; viele Mittelsalze stärkerer Säuren, namentlich schwefelsäure, salpetersäure u. salzsaure Erd- u. Metall-Salze.

Innerl. zu Dr. 1-4 mehrmals tägl. (oder Dr. 6-Unc. 1 bloß vor Schlafengehn); pur [etwa in Flieder- od. Melissen-Thee zu nehmen; z.B. vor Schlafengehn Dr. 6-Unc. 1 auf 3 Tassen Fliederthee vertheilt] oder in Mixturen [z.B. mit *Syr. Succ. Citri ana*, oder auch 2 Theilen Syrup. — Ry 642, 643; 135 (*Asa foet. dep.*), 340 (*Extr. Acon.*), 927 (*Rad. Valer. min.*)].

Ausserl. zu Gurgelwässern [Mit Rosenhonig ana Unc. 1, *Inf. Fl. Samb.* Unc. 8: WENDT bei geschwüriger Halsentzündung im Scharlach], Einreibungen [vgl. *Extr. Bellad.*], Waschungen, Umschlägen etc. [theuer!].

642.

Ry *Aether. acetici* Scr. 1
Liq. Ammon. acet. Unc. 1
Aq. Meliss. Unc. 2
Syr. Flor. Aurant. Unc. $\frac{1}{2}$.
M. D. S. Stündl. 1 Essl.

643.

Ry *Vini stibiat.* Dr. 2
Liq. Ammon. acet. Unc. 1
Succi Samb. insp. dep. Unc. $\frac{1}{2}$
Aq. Sambuci Unc. $1\frac{1}{2}$.
M. D. S. 2stündl. 1 Essl.

Liquor Ammonii anisatus. Spiritus Salis Ammoniaci anisatus. Anisölhaltiger Salmiakgeist. [*Liq. Ammon. caust.* 1, *Ol. Anisi* $\frac{1}{2}$, *Spir. Vini rftiss.* 4. — Macht in Wasser getrüpfelt dasselbe durch das sich dann ausscheidende äther. Ölmilchig; deshalb umzuschütteln. — 1 Unze 2 $\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave* wie bei *Liq. Ammon. caust.*

Innerl. zu 10-30 Tropfen öfters tägl.; etwa mit einem schleimigen Syrup [z.B. Dr. 2 auf Unc. 1 *Syr. Alth.* od. *Amygdal.*, umgeschüttelt theelöffelweise] oder in andern Mixturen [etwa Dr. 2-4 auf Unc. 6, esslöffelweise; man berechnet die Drachme nämlich zu 70-80 Tropfen. — Ry 373 (*Extr. Helen.*), 447 (*Galban. depur.*), 476 (*Hb. Led. pal.*), 676 (*Manna*), 928 (*Rad. Valer. min.*), 1015 (*Sulph. stib. rub.*)].

Ausserl. zu Injectionen [Ry 196 (*Camph.*)], Einreibungen [Dr. 1 mit *Spir. Lavand.* Unc. 2: v. SIEHOLD gegen abhaltendes Schluchzen der Kinder], Salben [Dr. 1 mit *Ungt. Rorism. comp.* Unc. $\frac{1}{2}$, früh u. Abends einer Haselauss gross in Brust oder Unterleib einzureiben; TOURNAL als krampftötlend, beruhigend, carminativ in nicht fieberhaften Zuständen der Kinder].

Liquor Ammonii carbonici. Spiritus Salis Ammoniaci aquosus. Liquor Carbonatis ammoniaci. Wässeriger Salmiakgeist. [*Ammon. carbon. depur.* 1, *Aq. destill.* 5. — 1 Unze 1 Sgr.] *Cave* wie bei *Ammon. carbon. dep.* —

Innerl. zu 20-50 Tropfen [Gr. 24-Dr. 1] mehrmals tägl., in Mixturen [etwa in einem *Inf. Rad. Valer.* od. dgl. — R_y 644], auch wohl zu Brausemischungen [z. B. 30 Tropfen mit $\frac{1}{2}$ Essl. Citronensaft während des Aufbrausens zu nehmen. Vgl. I. S. 138]. — Äusserl. lieber das wohlfeilere *Ammon. carbon. crudum*.

644.

R_y *Liq. Ammonii carbon.*
Syr. Chamomill. ana Dr. 6

Aq. Chamomill. Unc. 3.

M. D. S. Halbstündl. 1 Essl. (Gegen Cardialgie von Erkältung.) RICHTER.

Liquor Ammonii carbonici pyro-oleosi. Spiritus Cornu Cervi rectificatus. Liquor Carbonatis ammonici cum Oleo empyreumatico. Brenzlig-ölige kohlenaure Ammoniumflüssigkeit. Rectificirter Hirschhornggeist. [Spec. Gewicht = 1,050-1,060. — 1 Unze 2 Sgr.] *Cave* wie bei *Ammon. carbon. depur.*

Innerl. zu 20-40 Tropfen mehrmals tägl. [die Drachme berechnet man zu 70-80 Tropfen]. Pur [etwa in Thee zu nehmen] oder in Mixturen [R_y 645, 646; 699 (*Mosch.*), 1057 (*Tinct. Castor.*)]; auch wohl zu Saturationen [vgl. I. S. 138. — R_y 14 (*Acet. scill.*)].

Äusserl. zu Augentropfwässern [mit *Aq. Rosar.* verdünnt oder selbst pur; gegen Hornhautflecke: GUERIN], Einreibungen [pur; auch wohl mit Baumöl, doch ist dieser Verbindung das *Liniment. ammoniac.* mit einem kleinen Zusatz von *Ol. anim. foet.* vorzuziehen], u. s. W.

645.

R_y *Moschi* Scr. $\frac{1}{2}$
terre cum
Syr. Bals. Peruv. Unc. 1
sensim addendo
Aq. Mellis. Unc. 2
Liq. Ammon. carb. pyro-ol. Dr. 3.
M. D. S. Umgeschüttelt stündl. $\frac{1}{2}$ Essl.
 — Vgl. R_y 699.

646.

R_y *Camphorae trit.* Gr. 12
Gm. Mimos. pulv. Dr. 2
terendo sensim misce c.
Syr. Menth. Unc. 1
Aq. Menth. pip. Unc. 5
ut f. Emuls., cui adde
Liq. Ammon. carb. pyro-ol. Dr. 2-4.
M. D. S. Umgeschüttelt 2stündl. 1 Essl.

Liquor Ammonii caustici. Spiritus Salis Ammoniaci cum Calce viva paratus s. causticus. Sal Alkali Fluor. Ammonia pura liquida. Liquor Ammonii. Ätzammonium-Flüssigkeit. Salmiakgeist, (ätzender). [Spec. Gewicht = 0,965-0,975; Gehalt an wasserfreiem Ammonium folglich (nach H. DAVY) ungefähr 7-9 $\frac{1}{2}$ Procent. — Vermischt sich in allen Verhältnissen mit Wasser und Weingeist. — Eine Temperatur von 44° R. treibt alles Ammoniumgas aus. — 1 Unze 2 Sgr.] *Cave* Säuren; Salzbilder; saure Salze, erdige u. metallische Salze; alkaloidische Vegetabilien, namentlich Opium- u. narkotische Tincturen überhaupt; (*Aq. comm.*).

Innerl. zu 5-10 Tropfen (bei Vergiftungen, heftigen Krämpfen, nervösem Schlagfluss, Scheintod, auch noch mehr) öfters tägl., stark verdünnt und gern auch noch eingehüllt; entweder pur [dann die Einzelgabe etwa in schleimigem Vehikel] oder in Mixturen [in denen man die Drachme zu 80 Tropfen berechnet; also etwa Scr. 2-4 auf Unc. 6, eßlöffelweise. — R_x 647-649].

Äusserl. als Riechmittel [sehr kräftig, aber widrig, erstickend; daher nur für dringendere Fälle: starke Ohnmachten, Scheintod u. dgl.; sonst sind *Acet. concentrat.*, *Acid. acetic.*, *Acid. acet. aromat. od. aromatico-camph.*, *Aeth. acet. u. a.* vorzuziehen], zu Klystieren [10-20 Tropfen mit Hafer Schleim od. dgl., aber der warmen Flüssigkeit erst unmittelbar vor der Application zugesetzt] u. a. Injectionen [z. B. 4mal tägl. 10 Tropfen mit 2 Unzen Gerstenschleim in die Vagina einzuspritzen: BRERA bei Amenorrhöe, der nicht Blutmangel, sondern nur fehlerhafte Richtung des Bluttriebes zum Grunde liegt (man sey jedoch damit, besonders bei jungen Mädchen, sehr vorsichtig); stärker noch nach LAVAGNA: mehrmals tägl. 12-15 Tropfen mit 2 Rast. lauer Milch verdünnt einzuspritzen. Oder in Verbindung mit *Decoct. Cort. Mezerei*: SCHÖNLEIN, um unterdrückten Tripper oder weissen Fluss wieder hervorzurufen. — R_x 650], Augensäubern [bei reizbaren Augen sehr vorsichtig! — 5-15 Tropfen auf Unc. $\frac{1}{2}$ Wasser, 1-2mal tägl. einen Tropfen ins Auge fallen zu lassen: BRACH im spätern Zeitraum der contagiösen Augenentzündung. — Zu Augenpinselwässern 5-10 Tropfen auf Dr. 2. Bisweilen mit fettem Öl („Augenliniment“); z. B. 5 (und wenn das Auge reizloser wird, mehr) Tropfen auf 2 Dr. Nussöl, einigemal tägl. aufzupinseln: v. GRÄFE bei Hornhautflecken. — Auch als Augendampfmittel und zum Einreiben ums Auge. R_x 651; vgl. auch *Tinct. Castor.*]; als Exutorium [in der Regel ist zu diesem Behuf das Präparat der PH. GALL. angewandt worden, welches fast $2\frac{1}{2}$ mal (so wie das Präparat der PH. AUSTR. etwa 3mal) so stark ist als das der PH. BOR.; dies letztere ist (wie auch die Präparate der PH. HANN. u. SLESV.) zu schwach und deshalb, ausser etwa bei sehr zarter Haut, höchst unzuverlässig. Die Anwendung geschieht entweder, indem man es wiederholt auf dieselbe Stelle stark einreibt, bis Rötung der Haut, eine Blase oder Aufätzung erfolgt; oder, wohl zweckmässiger, indem man in ein auf beiden Seiten mit einer gut klebenden Pflastermasse bestrichenes Stück Leinwand ein rundes Loch, etwa 2 Zoll im Durchmesser oder wie gross man sonst will, schneidet, dies auf den leidenden Theil legt, auf die unbedeckte Stelle eine mehrfach zusammengelegte, mit *Liq. Ammon. caust.* getränkte, Compresse bringt, u. über das Ganze ein 2tes mit Pflastermasse bestrichenes Stück Leinwand legt; nach 1-2 Stunden kann die gehörige Wirkung erfolgt seyn. — Auch mehrere von französ. Ärzten, namentlich zur Ausübung der endermatischen Methode, empfohlenen ätzenden Ammoniaksalben (z. B. die von GONDRET aus Salmiakgeist 2, Baumöl und Hammeltalg ana 1) lassen sich deshalb bei uns nicht nachahmen. Doch ist der Salmiakgeist in dieser Beziehung auch entbehrlich.]; zu Waschungen u. Einreibungen [meist verdünnt; namentlich als Zusatz zu aromatischen, spirituösen u. a. Mitteln, etwa Dr. $\frac{1}{2}$ -2, doch auch mehr, auf Unc. 1; oder in Verbindung (Seife) mit fettem Öl (vgl. *Linim. ammoniat.*). — R_x 652, 653; 778, 779 (*Ol. Tereb.*), 805 (*Phosph.*); vgl. auch *Ol. Hyosc. coct.*, *Petrol.* — Mit *Tinct. Castor. äther. ana* in das obere Augenlid und die Augenbrauengegend einzureiben: RICHTER bei torpider Amaurose.], Salben

[Ry 654, 655. — Mit Schweinefett ana: *Ungt. irritans* (s. *ammoniatum*) PH. SLESV., 1 Unze 4 Sbl.]; bisweilen zu Sinapismen [Ry 974].
(Vgl. *Gas Ammon. caustici*.)

647.

Ry *Liq. Ammon. caust.* Dr. $\frac{1}{2}$ - 1
Aq. Menth. piper. Unc. 4
Syr. Alth. Unc. 1.
M. D. S. Stündl. 1 Essl.

648.

Ry *Liq. Ammon. caust.* Gtt. 3
Aq. Menth. crisp. Unc. $\frac{1}{4}$
— *destill.* Unc. 5.
M. D. S. Auf 2- od. 1mal zu nehmen.
(Gegen saures Aufstossen während der Verdauung.) CHEVALLIER.

649.

Ry *Sapon. Hispan. albi* Gr. $1\frac{1}{2}$
solve in
Spir. Vini alcohol. Unc. $\frac{1}{4}$
filtra, adde
Ol. Succini rft. Dr. $\frac{1}{4}$
Liq. Ammon. caust. Unc. 2.
Perpetua agitationis misce, usque dum colorem lacteum acquisiverint. D. S. Eau de Luce, (Aqua Luciae. —
Bei Schlangengbiss, hysterischen Krämpfen u. s. w., zu 5-20 Tropfen in Wasser od. Thee; auch äusserlich, als Riechmittel oder, noch mit Weingeist verdünnt, gegen Sommerprossen, Mitesser u. dgl.)

650.

Ry *Ol. Amygdal. (od. Lini)* Unc. 1
Liq. Ammon. caust. Gtt. 6
Tinct. Opii simpl. Gtt. 10.
M. D. — Umgeschüttelt, einen Theelöffel voll in das zuvor durch Injection von Seifenwasser gereinigte Ohr zu giessen. (Bei Otorrhöe, deren Ursache unbekannt, als empirisches Mittel.)
RUST.

651.

Ry *Ol. Menth. pip.* Scr. 1
Aether. sulphur. Scr. $\frac{1}{2}$

Liq. Ammon. caust. Dr. 1.

M. D. S. Anfangs als Augendampfmittel (ein Paar Tropfen in der Hand gegen das Auge gehalten); später in der Umgegend des Auges tropfenweise einzureihen, (Bei asthen. Amblyopie u. Amaurose, auch Augenliderlähmung.)

Y. GRAEFE.

652.

Ry *Camphorae* Dr. $\frac{1}{2}$ - 1
solve in
Ol. Amygdal. Unc. $\frac{1}{2}$
adde

Liq. Ammon. aqust. Dr. 2
Tinct. Opii simpl. Dr. 1.

M. D. S. Zertheilendes Liniment.

RUST.

653.

Ry *Ol. Rorismar.* Unc. 1
Tinct. Canthar. Unc. 2
Spir. camphorati Unc. 3
Liq. Ammon. caust. Unc. 4.
M. D. S. Zum Einreiben (über einen grossen Theil des Körpers; bei Cholera), umgeschüttelt. LEVISEUR.

654.

Ry *Ungt. Resin. Pini Burg.* Unc. 1
Camphor. trit.
Petrolei
Ol. Terebinth. ana Dr. 1
— *Rorismar.* Dr. $\frac{3}{4}$
— *Bergamott.* Dr. $\frac{1}{4}$
Liq. Ammon. caust. Dr. 2.
M. D. — Ungt. nervin. PH. P. [1 Unze 3 Sgr.]
Das *Ol. Bergamott.* ist für Arme neben weit kräftigeren Mitteln wohl antheuerlich.

655.

Ry *Liq. Ammon. caust.*
Ol. anim. foet. ana Dr. $\frac{1}{2}$

Ungt. Hydrag. min. Dr. 2.
M. D. S. Zum Einreiben (längs dem Samenstrang oder auf dem Testikel selbst, bei chronisch verhärtetem Testi-

kel),
G. A. RICHTER.
Empfiehl sich freilich schlecht durch seinen Geruch, der hier leicht die Krankheit verräth.

† *Liquor Ammonii hydrothionici s. hydrosulphurati* der PH. SLESV. *Hydrosulphuretum Ammonii liquidum. Liquor Ammonii sulphurati* der PH. BOR. [die es zwar nur als Reagens anführt]. Flüssiges hydrothionsaures Ammoniak. Schwefelwasserstoffsäure Ammoniumflüssigkeit. Einfach Schwefelammonium nach BERZELIUS. [Einige andere Synonyme: *Ammonium sulphuratum, Spirit. Salis Ammoniaci sulphuratus, Sulphuretum Ammonii, Schwefelwasserstoff-Ammoniak, geschwefelte Ammoniumflüssigkeit, flüssiges Schwefelammonium, gewasserstofftes Schwefelammonium, Hydrothion-Schwefelammoniak, u. s. w.* sind eben so oft für das folgende als für dieses (von ROLLO bei Harnruhr als Arzneimittel eingeführte) Präparat gebraucht worden.] [Farblöse oder schwach gelbliche, durchdringend nach Hydrothionsäure und Ammoniak riechende und schmeckende, an der Luft rauchende und sich schnell gelb färbende Flüssigkeit. — 1 Drachme 3 Shl.] *Cave* wie beim folgenden.

Innerl. u. äusserl. in gleichen oder etwas grösseren Gaben und denselben Formen wie das folgende.

† *Liquor Ammonii hydrothionosi. Spiritus (Balsamum) Sulphuris (s. sulphuratus s. Sulphuris volatilis) Beguini. Liquor fumans Boylei. Hepar Sulphuris volatile. Liquor Ammonii sulphurati* der PH. HANN. und PH. P. *Spiritus Beguini (Sulfuretum hydrogenatum Ammoniae; Ammonium sulfuratum hydrogenatum; Hydrosulfuretum ammonicum)* der PH. AUSTR. Flüssiges hydrothionichtsäures Ammoniak. Flüchtige Schwefelleber. Schwefelammonium im Maximo (des Schwefels) nach BERZELIUS. [Dunkel-orangefarbne Flüssigkeit von öli-ger Consistenz, nach Hydrothionsäure, aber nicht so durchdringend wie die vorige, riechend, an der Luft gewöhnlich weisse, erstickende Dämpfe ausstossend. — 1 Drachme 3 Mgr.] *Cave* Säuren; Salzbilder; Basen; Salze; Luft; Wärme.

Innerl. anfangs zu 1–3 Tropfen, 2–4mal tägl., und vorsicht-ig mehr, bis etwa 20 oder 24 Tropfen tägl. verbraucht werden [oder bis sich Übelkeiten und Schwindel einstellen], gut verdünnt [etwa in einer mässigen Menge eines aromat. Wassers, so dass ein Theelöffel oder Essl. auf die Einzelgabe kommt, der dann noch mit Schleim genommen wird].

Äusserl., verdünnt und selbst pur, zu Einreibungen [z. B. mit 4 Theilen Mohnöl gegen *Pruritus vulvae*], Salben [Ry 949 († *Res. Pini empyr. liq.*)], Umschlägen.

Liquor Ammonii succinici. Liq. (Spiritus) Cornu

Cervi succinatus. Liq. Succinatis ammonici. Flüssiges bernsteinsaures Ammonium. Bernsteinsaurer Hirschhorngeist. PRINZENS gelbe Tropfen. [Spec. Gewicht = 1,045-1,055. — 1 Drachme $\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave:* die meisten Säuren und Basen; Salzbilder; viele Salze, die eine stärkere Säure oder Base enthalten.

Innerl. zu 20-30 Tropfen [auf eine Drachme gehn etwa 75], öfters tägl.; pur [etwa in Melissen-, Fenchel- od. gewöhnlichem Thee] oder in wässerigen od. geistigen Mixturen [Ry 656, 657; 238 (*Cera*), 419 (*Flor. Arnic.*), 700, 701 (*Mosch.*), 916 (*Rad. Seneg.*), 1070 (*Tinct. Opii simpl.*), 1100 (*Zinc. oxyd.*); vgl. auch *Aq. Laurocer.*, *Extr. Acon.*, *Tinct. Guaj. ammon.*, *Tinct. kalina*].

656.

Ry *Liq. Ammon. succin.*
Spir. sulph. aether. ana Dr. 1
(Ol. Cajeputi Gtt. 6).

M. D. S. 3stündl. 20-30 Tropfen. (Bei asthenisch-krampfhafter, namentlich retrograder Gicht, sporad. Cholera, Krämpfen, p. p.)

Liq. antarthriticus (Spir.) KLLERI;
Liq. Ammon. succin. aethereus der

PH. HANN., SLESV. (1 Unze $1\frac{1}{2}$,
 6 Unz. 9 Mgr.)

657.

Ry *Tinct. Castor. aether. Scr. 1*
 — *Falerian.*

Liq. Ammon. succin. ana Dr. $\frac{1}{2}$.

M. D. S. Alle $1-\frac{1}{2}$ St., umgeschüttelt, 20-30 Tropfen. (Bei krampfhaften Anfällen Hysterischer.)

Liquor Ammonii vinosus. Spiritus Salis Ammoniaci vinosus. Geistige Ammoniumflüssigkeit. Weiniger Salmiakgeist. [*Liq. Ammon. caust. 1, Spir. F. rftiss. 2.* — 1 Unze 2 Sgr.] *Cave* wie bei *Liq. Ammon. caust.*

Innerl. zu 15-30 Tropfen (u. mehr) öfters tägl., verdünnt oder in Mixturen [Ry 658].

Äusserl. zu Mund- u. Gurgelwässern [etwa Dr. 2-4 auf Unc. 6], als Riechmittel [weit erträglicher als der reine *Liq. Ammon. caust.*], zu Einreibungen u. Waschungen [verdünnt oder pur; z. B. 1 mit 4 *Spir. Angel. comp.* zum Waschen der Stirn u. Hände; VOGT bei *Febr. nervosa stupida* u. asthenischen Nervenzufällen], etc.

658.

Ry *Ol. Succini rft. Gtt. 1*
 — *Macidts Gtt. 2*
 — *Anisi*
 — *Caryophyllor.*
 — *Cinnam. acuti ana Gtt. 3*
Liq. Ammonii vinosi Unc. $\frac{1}{2}$.

M. D. S. Jeweilen 15-30 Tropfen, mit verflüstem Haferschleim. (Bei Anorexie, Flatulenz.)

Liq. Ammonii oleoso-aromaticus (Liq. oleosus Sylvi; Sal volatile oleos. Sylvi; Spir. Ammoniac aromaticus) PH. HANN. (1 Drachme 2 Mgr.)

Liquor Ferri muriatici oxydati. Oleum Martis per Deliquium. Liquamen Martis. [Mit den beiden letzteren Benennun-

gen bezeichnete man früher gewöhnlich das an der Luft zerflossene salzs. Eisen-
oxyd.] *Liquor Sesquichlorete Ferr.* Salzsaurer Eisenoxydauflösung. [Rothbraun. — Spec. Gewicht = 1,495–1,505. — 1 Drachme $1\frac{1}{3}$ Sgr.] *Cave* wie bei *Ferrum muriat. oxydatum*. — Innerl. zu 5–15 Tropfen einigemal tägl.; verdünnt, etwa mit einem aromatischen Wasser, in Mixturen. — Äusserl. zu Bädern [Unc. 1–3 (theuer)].

★ *Liquor Ferri muriatici oxydulati.* Salzsaurer Eisenoxydauflösung. [*Ferrum muriat. oxydul.* 1 in *Aq. destill.* 2. — Grün. — Spec. Gewicht = 1,250–1,260. — 1 Drachme $\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave* wie bei *Ferrum muriat. oxydul.* Man verordne ihn nicht auf längere Zeit, da er sich leicht zersetzt und salzsaur. Eisenoxyd niederfallen lässt. — Innerl. zu 10–20 Tropfen einigemal tägl.; verdünnt, etwa mit einem aromatischen Wasser, in Mixturen.

† *Liquor Ferri nitrici* PH. SLESV. [Eisenfeile in Salpetersäure unter gelinder Erwärmung aufgelöst; filtrirt. — 1 Unze 4 Sbl.] Etwa wie *Liq. Ferri muriat. oxydati* (?). [Mit Baumöl q. s. zum Liniment geschlagen; *Linim. Ferri nitr.* derselben Pharmak.; 1 Unze 4 Sbl.]

Liquor Hydrargyri muriatici corrosivi. Liquor mercurialis. [Sublimat u. Salmiak ana 1 Gran auf 1 Unze destillirten Wassers. — 1 Unze $\frac{1}{4}$ Sgr.] Nur äusserl. [vgl. S. 253, Note], etwa zu Waschungen, Injectionen.

Liquor Hydrargyri nitrici oxydati. Mercurius nitrosus calore paratus. Liquor Nitratis hydrargyrici. Salpetersaurer Quecksilberoxydflüssigkeit. Anstatt des *Liquor Bellostii* und der *Aqua grisea*. [Spec. Gewicht = 1,175–1,185. — 1 Unze 3 Sgr.] Es wird durch (viel) Wasser in lösliches saures und schwerlösliches basisches Salz zersetzt; das letztere bildet einen gelben Niederschlag [Salpeteraripith]; doch hindert dies nicht, es mit Wasser verdünnt zu geben; nur muss umgeschüttelt werden. Alle übrigen Verbindungen vermeide man.

Innerl. (selten, weil stark ätzend. — *Ad Guttas tres!*) zu 1–3 Tropfen, 1–2mal tägl., verdünnt mit destillirtem Wasser [so viel, dass mindestens 1 Essl. auf die Einzelgabe — die allenfalls noch mit Schleim genommen werden kann — kommt].

Äusserl. als Ätzmittel, zu [ätzenden] Einspritzungen [pur oder verdünnt], u. dgl.

Liquor Hydrargyri nitrici oxydulati. Mercurius nitrosus frigore paratus. Liq. Nitratis hydrar-

gyrost. Salpetersaure Quecksilberoxydflüssigkeit. [Spec. Gewicht = 1,100–1,110. — 1 Drachme $\frac{1}{2}$ Sgr.] Man gebe es nur pur.

Innerl. zu 1–3, steigend bis zu 5 Tropfen, 2mal tägl.; am besten bloss mit destillirtem Wasser [wie das vorige] verdünnt, und die Einzelgaben etwa mit Schleim. [Im Charité-Krankenhaus zu Berlin wurde es, wenn gegen hartnäckige syphilitische Übel, besonders Hautformen, Sublimat od. rother Präcipitat vergeblich angewandt worden, bei gutem Zustand der Digestionsorgane, bisweilen — bei dem gewöhnlichen Mercurialregimen — in folgender Art angewandt: tägl. $\frac{1}{4}$ St. nach dem Abendessen, anfangs 1 Tropfen, dann jeden 7ten Tag (also am 7ten, 13ten, 19ten, 25ten) um 1 Tropfen (also bis zu 5 p. dosi) gestiegen; vom 4ten Tage an auch tägl. $\frac{1}{4}$ St. nach dem Frühstück anfangs 1 Tropfen u. jeden 7ten Tag (also am 10ten, 16ten, 22ten, 28ten) um 1 Tropfen (also bis zu 5) gestiegen; — bis zum 30ten Tage inclusive, wo dann im Ganzen 165 Tropfen verbraucht.]

Ausserl. bisweilen zu Einspritzungen, Waschungen, Verbandwässern p. p. [weniger ätzend als das vorige].

Liquor Kali acetici s. Terrae foliatae Tartari s. Alkali vegetabilis acetatus s. Acetatis kalici. Essigsaure Kaliflüssigkeit. [1 Kaliacet. auf 2 Wasser. — 1 Drachme $\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave* wie bei *Kali acet.* — Innerl. zu Dr. $\frac{1}{2}$ –1 $\frac{1}{2}$, um auflösend, diuretisch —, zu Dr. 1 $\frac{1}{2}$ –3, um mehr auf den Darmcanal zu wirken; mehrmals tägl. In Mixturen [z. B. mit *Tinctura Rhei aquosa ana*, 2stündl. 2 Theelöffel: SCHUBARTH. Oder *Extr. Digitalis Gr. 8* in *Liq. Kali acet.* Unc. 2 gelöst, 2stündl. 1 Theelöffel. Oder *L. K. a.* Unc. 1 mit *Syr. Bals. Peruv.* Unc. 1 $\frac{1}{2}$, 4mal tägl. 2 Theelöffel mit 1 Weinglas + Salterser Wasser. — R_x 468 (*Hb. Digital.*)]. Oft ersetzt man es durch Saturationen, vgl. *Kali acet.*

Liquor Kali carbonici Oleum Tartari per Deliquium. [Mit dieser Benennung bezeichnete man früher das an der Luft zerfließende *Kali carbon.*] *Liq. Salis Tartari. Liquor Carbonatis kalici.* Weinsteinöl. Zerflossenes Weinsteinsalz. Kohlensäure Kaliflüssigkeit. [*Kali carb. e Tart. 1, Aq. destill. 2.* — 1 Unze 3 $\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave* wie bei *Kali carb. e Tart.*

Innerl. zu 5–20 Tropfen, 2–4mal tägl.; — bei Convulsionen zu 10–30 Tropfen alle 1 $\frac{1}{2}$ – $\frac{1}{2}$ St.; — bei Vergiftungen [vgl. *Kali carb. e Tart.*] zu Dr. 1–1 $\frac{1}{2}$; mit vielem Wasser, in kurzen Zwischenräumen; (bei Steinbeschwerden: vgl. *Kali carb. e Tart.*). In ähnlichen Verbindungen u. Formen wie *Kali carb. e Tart.* [R_x 659; 702 (*Mosch.*), 762 (*Ol. Morrhuae*)].

Selten ausserl. [Waschung: R_x 1054 (*Tinct. Canthar.*).]

659.

R_x *Liq. Kali carbonici* Dr. 2
Aq. destillat. Unc. 7

Syr. Cinnamonii Unc. 1.
M. D. S. 4mal tägl. 2 Essl.

Liquor Kali caustici. *Lixivium causticum s. purum (s. Saponariorum).* **Liquor Hydratis kalici.** Aetzkalkflüssigkeit; Aetzlauge. [Spec. Gewicht = 1,330–1,340; Gehalt an Aetzkali folglich (nach DALTON) ungefähr $\frac{1}{2}$ – $\frac{1}{3}$. — 1 Unze $2\frac{5}{8}$ Sgr.] *Cave* wie bei *Kali caust. sicc.* — Innerl. (nicht gern, des etwas ungleichen Gehalts wegen — \neq) u. äusserl. wie *Kali caust. sicc.*, nur in 3–4mal so grossen Gaben. [Salbe: s. *Rad. Soill.*]

****Liquor Myrrhae. Loco Liguaminis Myrrhae.**

Myrrhenextractauflösung. [1 Extr. Myrrh. in 5 destill. Wasser gelöst u. colirt. — 1 Unze $3\frac{1}{2}$ Sgr. — Nach der PH. HANN. (synonym: *Liguamen Myrrh.* und „*Oleum*“ Myrrh.) 1 Extr. in 2 Wasser; also 2mal so stark. (1 Drachme $1\frac{1}{2}$, 1 Unze 9 Mgr.) Nach der PH. SLESV. (dieselben Synonyme) 1 Myrrhe mit 4 Wasser digerirt, zur Colatur so viel Wasser zugesetzt, dass sie wieder das Gewicht von 4 erhält. (1 Unze 4 Sbl.)] *Cave* wie bei Extr. Myrrh.

Innerl. zu Dr. $\frac{1}{2}$ –2 einigemal tägl., in Mixturen.

Äusserl. zu Mund- u. Gurgelwässern [etwa Unc. 1 auf Unc. 6–8], Pinselsäften [etwa mit *Mel rosat. ana.* (Oder statt dessen den *Liq. Myrrhae cum Melle* PH. SLESV. — 1 Unze 8 Sbl. — par.)], Ohrtropfen [Ry 1094 (*Vüriol. alb.*)] u. a. Injectionen [Ry 808 (*Plumb. acet. crud.*); s. auch *Ichthyocolla*], Augewässern [Zu Bähungen (selten) Dr. 2–6 auf Unc. 4. — Zu Pinselwässern verdünnt u. par.], u. s. w. (Doch wendet man, ausser in Augewässern, öfter die Tinctur an.)

Liquor Natri caustici. *Lixivium natricum s. Sodae. Soda caustica liquida.* **Liquor Hydratis natrici.** Ätznatronflüssigkeit; ätzende Mineralalkalilauge. [Spec. Gewicht = 1,330–1,340; Gehalt an Ätznatron folglich (nach DALTON) ungefähr $\frac{1}{2}$. — 1 Unze $4\frac{5}{8}$ Sgr.] Wollte man versuchsweise dies noch fast gar nicht erprobte Mittel anwenden [es dürfte besonders innerlich oft als etwas milder dem Ätzkali vorzuziehen seyn], so hätte man es ganz wie *Liq. Kali caust.* zu behandeln. (\neq)

+ **Liquor Natri chlorati** PH. HANN. *Liqueur de Labarraque.* Chlornatronflüssigkeit. [1 Unze $1\frac{1}{2}$, 4 Unz. $4\frac{1}{2}$ Mgr.] Eine ziemlich concentrirte Auflösung des + *Chlorum Natri.* [vgl. den Art.]; danach äusserl. anzuwenden.

Liquor pyro-tartaricus. Spiritus Tartari. Acidum Tartari destillatum. Brenzliche Weinsteinflüssigkeit; Weinstainspiritus. [Spec. Gewicht = 0,995–1,005. —

1 Unze 3 Sgr.] *Cave* wie bei *Acidum pyro-lignosum*. — Innerl. zu 10–20 Tropfen öfters tägl., in Mixturen.

Liquor Saponis stibiati. Sulphur auratum liquidum. Tinctura Antimonii Jacobi s. saponata. Spiessglanzseifenflüssigkeit. [Spec. Gewicht = 1,100–1,110. — 1 Drachme $\frac{2}{3}$ Sgr. — *Liq. Sap. stib.* PH. SLESV., HANN., ist eine Auflösung von *Sapo stib.* 1 in *Tinct. kalin.*, *Aq. Cinnam. simpl.* ana 1 $\frac{1}{2}$; in ähnlichen Dosen wie das Präparat der PH. BOR. zu geben. 1 Unze 9 Mgr.] *Cave* Säuren, saure Salze u. Säfte [auch süsse, leicht gährende Säfte — Syrupe, Honige —, wenigstens in der wärmeren Jahreszeit]; Salzbilder; die meisten Salze [namentlich alkalisch-erdige, erdige und Metall-Salze]; Gerbstoff; Luft [deshalb nicht auf längere Zeit vorrätig].

Innerl. zu 10–20 (–30) Tropfen [man rechne 80 Tropfen auf die Drachme], einigemal tägl., pur oder in Mixturen [z. B. Dr. 3 mit *Tinct. Colocynth.* Dr. 1, 2–3mal tägl. 20–30 Tropfen: HEIM gegen Herpes; oder *Res. Guaj. nat.* Scr. 2 in Unc. $\frac{1}{2}$ des *Liq. S. s.* aufgelöst, 3mal tägl. 20–30 Tropfen, etwa in Fliederthee: AUGUSTIN bei chronisch-asthenischer Gicht; oder zu gleichen Theilen mit *Tinct. Guaj. ammon.*, etwa 4mal tägl. 30 Tropfen, u. s. w. — Ry 339 (*Extr. Acon.*)], jede Einzelgabe stark verdünnt [mit $\frac{1}{2}$ Tasse Schleim oder Thee].

Äusserl. entbehrlich.

Liquor Stibii muriatici s. Antimonii chlorati. Butyrum Antimonii. Causticum antimoniale. Liquor Chlorreti Stibii. Spiessglanz-Butter (–Öl). Chlorstibiumflüssigkeit. [Spec. Gewicht = 1,345–1,355. — 1 Drachme 18 Sgr.] *Cave* Salpetersäure; reine u. kohlensaure Alkalian u. alkal. Erden; Schwefellebern; Wasser, Weingeist.

Nur äusserl. (≠) als Ätzmittel, pur oder in Salben [Ry 660, 661; 530 (*Hydr. mur. corros.*)]. — Zu Augensalben (sehen) etwa Gtt. 2 auf Dr. 2].

660.

Ry *Opii pulv.* Gr. 15

Camphorae trit. Dr. 2

Liq. Stibii muriat. Dr. 1 $\frac{1}{2}$

Adip. suilli Unc. 1,

M. D. S. 2mal tägl. aufzutreiben (auf schwammige Auswüchse in Geschwüren — „wo indess doch andre Ärzte die Spiessglanzbutter nicht rühmen“).

CONRAD.

661.

Ry *Pulv. subtiliss. Cantharidum* Scr. $\frac{1}{2}$

— *Hydrarg. muriat. corros.* Dr. $\frac{1}{2}$

Liq. Stibii muriat. Scr. 1

Adip. suilli Dr. 2.

M. D. S. Auf Leinwandstreifen gestrichen aufzulegen. (Gegen Condylome.)

HORN.

Lithargyrum. Oxydum plumbicum. Bleiglätte (Silberglätte; Goldglätte). Bleioxyd. [1 Unze *subt. pulv.*

1½ Sgr.] Nur äusserl. (≠), jedoch selten magistral, zu Pflastern [officinell: *Empl. Litharg. simpl., Litharg. comp., adhæsiv., consolidans*], Ceraten [z. B. mit gelbem Wachs u. Hammeltalg *anæ* 1, Schweinefett 3½, in Tafeln gegossen: *Cerat. fuscum* PH. AUSTR.] u. Salben.

Macis. Muskatblüthe. [Hauptbestandtheile: äther. und fettes Öl. — 1 Drachme 1½, *subt. pulv.* 1½ Sgr.] Innerl. zu Gr. 5–10, mehrmals tägl., in Pulver [Ry 664 (*Magnes. carbon.*)], Morsellen, Pillen; seltner in Aufguss [etwa als Zusatz zu Species; oder als Thee, Scr. 1 – Dr. ½ auf 2 Tassen]. Oft als Corrigens.

Magnesia carbonica s. subcarbonica s. aërata s. alba s. effervescens s. Murias. *Magnesia Salis amari s. cathartici.* *Carbonas magnesicus o. Aqua et Hydrate magnesico.* Kohlensaure od. weisse Talk- od. Bitter-Erde; lockere, leichte, edinburger, englische Magnesia. [Blendend weiss (doch passen die Benennungen *alba*, weisse, auf *Magn. usta* eben so gut); äusserst leicht (I. S. 205). — 1 Drachme *pulv.* ½ Sgr.] Sol. 2500; kohlen-saures Wasser 48 [eine Auflösung in solchem, z. B. in † *Aq. carbonata*, in Selterser Wasser, nennt man wohl *Aqua Magnesiac*]. Cave Säuren u. saure Salze [wenn man nicht die Kohlensäure entbinden will]; Alkalien; alle löslichen Salze, deren Base mit Kohlensäure eine unlösliche Verbindung eingeht [z. B. Kalksalze]; Metallsalze [mit sanctionirten Ausnahmen].

Innerl. zu Scr. ½–1 einigemal tägl. In Pulvern [Etwas grosse Gaben würden in dieser Form sehr unangenehm zu nehmen seyn, wenn der Kranke sie nicht durch Anrühren mit vielem Wasser *ex tempore* zu einer Art Schüttelmixtur machte. — Ry 662, 663 (vgl. das officinelle Kinderpulver: *Pulv. Magnes. c. Rheo*), 664; 163 (*Bismuth. nitr. praec.*), 166 (*Bolus Arm.*), 217 (*Carbo ppt.*), 223 (*Carbo Spong.*), 384 (*Extr. Nuc. Vomicae spirit.*), 410 (*Ferr. pulverat.*), 493 (*Hb. Viol. tricol.*), 559 (*Hydrarg. stibiato-sulph.*), 614 (*Kali tartar.*), 911 a. (*Rad. Seneg.*), 924 (*Rad. Valerian. min.*), 937 (*Res. Guaj. nat.*), 993 (*Stib. sulphurat. nigr. laevig.*), 1010 (*Sulph. praecip.*), 1096 (*Zinc. oxyd.*). — Früh u. Abends Scr. 1 mit *Lign. Quass.* Gr. 5: TODE als säuretilgend u. magenstärkend. — Bisweilen als Pulverconstituens — vgl. I. S. 206 (*sub 2.*) u. 207 —; dann, falls nicht die Magn. zugleich als *Adjuvans* wirken soll, nicht mehr als 5 Gran auf eine Partialgabe, um diese nicht ohne Noth zu voluminös und dadurch unangenehm zu machen.), namentlich auch Brausepulvern [vgl. das officinelle *Pulv. aërophor. o. Magn. carb.* und I. S. 138. Ry 665, 666; 610 (*Kali sulphuric. dep.*). — 1 mit *Tart. depur.* 2: *Pulv. aërophor.* PH. P. (1 Drachme ½ Sgr.; theelöffelweise zu nehmen). — Die Pulver mit *Tart. depur.* (vgl. den Art.) brausen nur sehr schwach und langsam auf.], Trochisken, Bissen [so namentlich mit Rhabarber u. a. dgl. übel-schmeckenden Dingen; giebt man grössere Gaben von ihr in dieser Form, so wende man, damit die Bissen nicht zu voluminös werden, ein dünnflüssigeres, also mehr bindendes Constituens an, z. B. ein Extract von

Mellege-Consistenz, und vertheile jede Einzeldose auf ein Paar Blasen. So lassen sich grössere Gaben in dieser Form noch am besten nehmen. — Ry 615 (*Kali tartar.*), Latwergen [Ry 667], Schüttelmixturen [Ry 668, 669; 954 (*Sapo med.*)]; auch wohl zur Bereitung von künstlichen Mineralwässern [z. B. zu $3\frac{1}{2}$ Pf. in einer geräumigen Flasche befindlichen reinen Wassers *Acid. sulphur. dilut.* Dr. 10 u. unmittelbar darauf *Magn. carb.* Dr. 3 zugesetzt, worauf in 2 St. das Mineralwasser fertig ist, welches nun in wohl zu verstopfende Gläser abgegossen u. zu 8-10 Unzen, Morgens vor dem Frühstück, binnen $\frac{1}{2}$ St. getrunken werden soll: L. FRANK]. — Als Conspergens.

662.

Ry *Magnes. carbon.* Dr. 2

Flaved. Cort. Aurant.

Sem. Foeniculi

Sacch. albi ana Dr. $\frac{1}{4}$.

M. f. Pulv. D. S. 4-5 mal tägl. 1 Messerspitze oder 1 Theelöffel.

ROSENSTEIN's Ammenpulver.

Pulv. galactopius Rosensteini PH.

HANN. (1 Unze 5 Mgr.) ohne Zucker;

Pulv. Foeniculi compositus (galactop.

Rosent.) PH. SLESV. (1 Unze 8 Sht.)

mit nur halb so viel Pomeranzengelb und Fenchel.

663.

Ry *Croci Gr.* 15

Rad. Irid. Flor. Dr. 1

Sem. Carvi Dr. $1\frac{1}{2}$

Magnes. carbon. Dr. 2.

M. f. Pulv. D. in vitro. S. 5-6 mal tägl. eine kleine Messerspitze, etwa in Fenchelwasser zu nehmen.

ROSENSTEIN's Kinderpulver.

Ähnlich, durch geringeren Gehalt an Safran weniger different, durch Zusatz von Zucker angenehmer, ist *Pulv. Puerorum citrinus* PH. HANN. (1 Drachme $1\frac{1}{2}$ Mgr.):

Ry *Croci c. Spir. V. paux. triti* Gr. 10

Rad. Irid. Flor.

Sem. Anisi vulg.

Sacch. albi ana Dr. 1

Magnes. carbon. Dr. 3.

M. f. Pulv. D. in vitro. S. Wie das vorige. (Das Reiben des Safrans mit Weingeist soll den Farbstoff desselben extrahiren und gleichmässiger durch das ganze Pulver vertheilen.)

664.

Ry *Magnes. carbon.*

Rad. Colombo ana Dr. 2

Macidis Scr. 2.

M. f. Pulv. D. S. Alle 2-1 St. eine Messerspitze. VOGEL.

665.

Ry *Magnes. carbon.* Dr. $\frac{1}{2}$

Tart. depur.

Elaeos. Citri ana Dr. 2.

M. f. Pulv. D. in vitro. S. Brandepulver; theelöffelweise.

666.

Ry *Magnes. carbon.*

Elaeos. Foenic. ana Dr. 2.

M. f. Pulv. D. S. Einen Theelöffel voll mit etwas Wasser u. einem kleinen Esslöffel (verluesten) Citronensafts angerührt rasch einzunehmen (oder auch den zu Limonade gemachten Citronensaft zuerst und das Pulver hindardrin).

667.

Ry *Croci Gr.* 15

Sem. Anisi vulg. Dr. 1

Magn. carbon. Dr. $1\frac{1}{2}$.

Pulveratis adm.

Syr. Rhei q. s.

ut f. *Electuar. D. S.* Umgerührt theelöffelweise — für Kinder.

G. A. RICHTER.

668.

Ry *Magnes. carbon. pulv.* Dr. $\frac{1}{2}$

Tinct. Rhei aquos. Dr. 1

Aq. Ment. crisp. Dr. 6

Syr. Althaeae Unc. 1.

M. D. S. Umgeschüttelt alle $1\frac{1}{2}$ St.
1 Theelöffel. (Für ein Kind von 6 Mona-
ten bei Magensäure.) VoGT.

669.

Ry *Magnes. carbon. pulv.* Dr. 1

Aq. Ment. crisp. Unc. 3
Syr. Cort. Aurant. Unc. $\frac{1}{2}$.
M. D. S. Umgeschüttelt 2 stündl. 1 Essl.
(Gegen Sodbrennen.) BERENDS.

Magnesia sulphurica cruda. Rohes Bittersalz.
(Vgl. die Synonyme des folgenden.) [1 Unze $\frac{3}{4}$ Sgr.] *Sol.* 2. — *Cave*
wie beim folgenden. — Nur äusserl. (≠), zu Klystieren [Unc.
 $\frac{1}{2}$ - 1 (od. mehr), mit Öl (vgl. *Ol. Lini*), Essig od. dgl. in Verbindung. — Ry 1051
(*Tinct. Asae foet.*)]

Magnesia sulphurica depurata. *Sal amarum*
depuratum; *Sal catharticum amarum s. Anglicum s. Epsomense s. Sedlitzense s. Saldschützense.* *Sulphas magnesi-*
cus cum Aqua depuratus. Gereinigte schwefel-
saure Talk- oder Bitter-Erde; Bittersalz; englisches
od. Epsomer, Seidlitzer od. Saldschützer Salz. [1 Unze
 $1\frac{1}{2}$ Sgr. — Verwittert schwach; das verwitterte, † *Magn. sulph. dep. sicca* (1 Un-
ze $2\frac{1}{2}$ Sgr.) wird mitunter wie *Natrum sulphur. dep. siccum* (s. den Art.) ange-
wandt.] *Sol.* 2. — *Cave* Alkalien u. ihre Salze mit schwächeren
Säuren; Kalk- u. Baryt-Salze; essigsaurer Blei; Kalkwasser.

Innerl. als Digestivmittel zu Dr. $\frac{1}{2}$ - 1 mehrmals tägl.; als Ab-
führmittel zu Unc. $\frac{1}{2}$ - 2, in einige Portionen vertheilt. [Beste Corri-
gentien: Zucker mit Citronensaft, od. *Syr. Succi Citri*; nach einigen Neueren ver-
dünnte Schwefelsäure nebst vielem Zucker; für manche Kranken warme Milch.]
In denselben Formen wie *Natr. sulphur. dep. cryst.* [Ry 670, 671;
2 (*Doct. Colchici*), 436 (*Fol. Sonn.*), 884 (*Rad. Rhei*). Ausserdem vgl. die For-
meln 729-732 unter *Natr. sulph. dep. cryst.*, in denen statt dieses Salzes auch das
Bittersalz zweckmässig gegeben werden kann.]

Bittersalz spielt eine Hauptrolle in der nicht-mercuriellen Behand-
lung der Syphilis nach FRICKE, KLUGE u. A. So lässt KLUGE in der Regel
bei allen mit örtlichen, primären oder secundären, syphilit. Übeln der Geschlechts-
theile und ihrer nächsten Umgebungen Behafteten (nur nicht bei Complication mit
Wechselfieber, Scorbut, Schwangerschaft) in der ersten Woche einen Tag um den
andern, später jeden 3ten Tag, so viel Bittersalz, in Fenchelwasser aufgelöst, neh-
men, dass 3-5 flüssige Stuhlgänge erfolgen. Dabei karge, mehr vegetabilische
Diät (ausser bei Geschwächten und im spätern Zeitraum der Behandl.; — bei
Gewöhnung an geistige Getränke diese nicht ganz unterlassen), Ruhe (wenn im Bett,
besonders im Anfang der Behandlung; — bei allgemeiner Lues ist jede, insbe-
sondere heilsame), gleichmässig warme Temperatur, Reinlichkeit, mög-
lichst indifferente örtliche Behandlung. (Entstehen bei längerem Gebrauch des Sal-
zes aphthenartige Excoriationen im Munde: Aussetzen, gelind adstringierende oder
säuerliche Mundwässer, Betupfen mit Höllenstein.) Bei hartnäckigeren und bö-
sartigen secundär-syphilit. Formen statt des Bittersalzes (so wie statt des früher
in der Berliner Charité viel angewandten Zittmannschen Decocts) ein „*Decoctum*

Sarsaparill. composit.“, nämlich eine Tisane aus Sarsapar., *Rad. Cario. aren. u. Spec. ad Deo. Lignor.* PH. MIL. aus Dr. 2, Senna (*sub fin. coct.* zugesetzt) Dr. 1 (Colat. v. L. 1) tägl. zu verbrauchen, zur Hälfte warm, des Morgens im Bette, zur andern Hälfte kalt, des Nachmittags unter Umhergehn im Zimmer. Der Kranke bekommt davon in der Regel 2-3 Stuhlgänge tägl. (wo nicht, mehr Senna; bei zu starker Wirkung die Senna weglassen). — Kommen die Kranken mit Mercurialismus zur Behandlung, vorgängige Beseitigung desselben durch (gute Kost, wenn nöthig) Schwefel, Bäder von *Kali sulphurat.* (Unc. 1 - 1½) oder (namentlich bei hartnäckigen Hautkrankheiten) von Salpetersäure (Unc. 1-2). — Vgl. über KLUGE's Methode STRUNZ in *Med. Zeitg. d. Vereins f. Heilk. in Preuss.* 1836. Nr. 4.

(Zu Klystieren kann man *Magn. sulph. cruda* nehmen; s. jedoch Ry 439 (*Fol. Senn.*).)

670.

Ry *Magnes. sulph. depur.* Gr. 275
— *carbon.* Gr. 8-10.

Infunde in lagenam vitrea

† *Aq. Selteranae nativ.* Unc. 16.
Lagenam clausam repono in loco frigidiusculo, saep. agit., usque ad perf. solut.; tum cola celeriter per pannum linteum in lagenam lapideam. D. S.
Künstliches Saischützer Bitterwasser; weingläserweise. DÜBEREINER.

671.

Ry *Magn. sulphur. dep.* Unc. 1½
Natri carbon. aciduli Dr. 2
Aq. comm. L. 3.

Immitte in lagenam haud plane replendam, addo

Acidi sulph. diluti Dr. 3.
Lagenam statim rite claud. D. S.
Künstliches abführendes Mineralwasser; weingläserweise. SUNDELIN.

† *Magnesia stibiata* PH. SLESV. Anhg. [*Magnes. carbon.* 11, *Tert. stib.* 1. — 1 Drachme 1½ Shl.]

Magnesia usta s. calcinata s. caustica s. pura. Terra Salis amari. Magnesia. Gebrannte oder kaustische Talk- od. Bitter-Erde. [Pulver; blendend weiss; sehr leicht (I. S. 205). — 1 Drachme 1½ Sgr.] *Cave* Säuren u. saure Salze; Alaun, bernsteinsaures Ammonium; Metallsalze. Auch werden alkaloidische Stoffe [Opium, China u. s. w.] durch sie minder wirksam.

Innerl. zu Scr. ¼ - 1 einigemal tägl., in Pulvern [abgetheilte Pulver verordne man nicht auf längere Zeit vorrätig, weil sie allmählig wieder Kohlensäure aus der Luft anzieht; nicht abgetheilte kann man deshalb in Gläsern verabreichen lassen. — Vgl. übrigens *Magn. carbon.*], Trochisken [Ry 672], Biscui [unter denselben Cautelen wie bei *Magnes. carbon.*], Schüttelmixt^{d.} en [Ry 2 (*Aest. Colchici*), 967 (*Sem. Hyosc.*)].

acch 672.

Mag.
Ry *Magnes. ustae* Unc. 1
† *Chocoladae pulv.* Unc. 2
Sacch. albi Unc. 5

Mucilag. Gm. Tragacanth. q. s.
ut f. Trochisci pond. Scr. 1., Magnes. usta conspergendi, leniter torrendi. D. S. Gegen Magensäure öfters ein Paar Stück. CHEVALLIER.

Malthum Hordei. Gerstenmalz. [Hauptbestandtheile:

Zucker, Stärkmehl und Kleber, die beiden letzteren partiell verändert. — Man schreibt wohl, damit es sich besser extrahiren lasse, vor, es erst etwas zu quetschen oder zu mahlen (*Malthum contusum* od. *mola leuiter fractum*); doch thut das der Apotheker auch wohl von selbst. — 1 Unze $\frac{1}{3}$ Sgr.]

Innerl. ein Paar Unzen täglich, in Aufguss [Unc. 1-2 auf L. 1, etwa noch mit Zusatz von vegetabilischen od. mineralischen Säuren (Citronensaft, *Mixt. sulph. acida* od. dgl.), Rheinwein u. s. w.], Abkochung [etwa Unc. 2 mit L. 2 auf L. 1, tassenweise tägl. zu verbrauchen; mit ähnlichen Zusätzen. (*Decoct. Malhi* PH. MIL.: Unc. 2 mit L. 2 auf L. 1 $\frac{1}{2}$.) — Ry 673, 674], zu Molken [Ry 977 (*Serum Lact. dulcificat.*)].

Äusserl. abgekocht zu Klystieren [Ry 675], Bädern [die Abkochung von L. 2-6 zum Bade gethan; Arme können sich der Trebern des Malzes (Rückstand von der Bereitung der Würze in den Brauhäusern) bedienen (Abkochung von 3-4 Wassereimern voll zu Einem Bade)]; in Substanz zu Kataplasmen [entweder pur, weichgekocht; oder (nach WILLIAMS, bei bösartigen Geschwüren) mit kochendem Bier zum Brei gemacht, dieser auf Leinwand gestrichen, darüber noch gute Bierhefe ausgebreitet, dies in 24 St 2-3mal erneuert].

673.

Ry *Malhi Hordei contusi* Unc. 3
coq. c. Aq. comm. L. 3 ad Colat. L. 2,
cui addo

Succi Citri rec. expr. et colati Unc. $\frac{1}{2}$
Vini Rhenani Unc. 4.

M. D. S. Mit Zucker versüsst tassenweise. (Gegen Scorbut.) BERENDS.

674.

Ry *Malhi Hordei contusi* Unc. 6
coque c. Aq. comm. q. s. per $\frac{1}{4}$ hor., sub
fin. coct. addendo

Sem. Foenic. Scr. 4

Rad. Glycyrrh. Dr. 2

ad Colat. L. 4. D. S. In 2 Tagen zu verbrauchen. (COLLIN.)

675.

Ry *Malhi Hordei contusi*
Rad. Althaeae inc.

Sem. Hordei excoctis. ana Dr. 2.

M. f. Spec. Disp. tal. dos. nr. — D. S.
Eine Portion mit 2 grossen Tassen Wasser auf die Hälfte eingekocht zum Klystier.

Manganum oxydatum nativum. Manganesium. Magnesia nigra s. vitriorum. Superoxydum manganicum. Braunstein. Graubraunsteinerz. Manganhyperoxyd; schwarzes Manganoxyd. [1 Unze pulv. $\frac{1}{3}$ Sgr.]

Innerl. (≠) zu Gr. 3-10 einigemal tägl. (BRENA: bis zu einem Paar Drachmen tägl.), sehr fein gepulvert, in Pulver od. Pillen.

Äusserl. in Salben [Dr. 1-2 auf Unc. 1: BIEBT gegen Tinea. — Dr. 3 auf Unc. 1: GRILLE u. A. bei Erbgrind, Flechten, Krätze, Schankern]. Ausserdem zur Entwicklung des Sauerstoffgases [vgl. *Gas oxygenium*] u. des Chlorgases. Auch wird der Braunstein auf Schiffen dem Wasser zuge- mengt — einige Pfund auf jedes Fass — um es vor dem Verderben zu schützen.

Manna. Manna. [Hauptbestandtheile: Mannazucker (Mannit),

Schleimzucker und ein eigenthümlicher nuseusser und purgirender Stoff. — Man schreibt gewöhnlich die hellfarbige, angenehmer schmeckende *M. electa s. osensulata*, vor; doch für Arme, oder wo es nicht auf Eleganz ankommt (wie z. B. im Wiener Tränkchen, das doch schlecht aussieht und schmeckt), auch bisweilen die dunklere, stärker purgirende *M. Calabrinæ*. — 1 Unze resp. $6\frac{1}{2}$ u. $3\frac{1}{2}$ Sgr.] *Sol.* 3.

Innerl. als Demulcens Dr. 1-2 öfters tägl.; als Laxans Unc. 2-3 auf einige Portionen vertheilt [doch ist sie für Erwachsene selten zum Abführen hinreichend, wenn man nicht Salse oder andere kräftige Abführmittel damit verbindet. Nur etwa für Kinder bis zu 2 Jahren gebraucht man sie zu diesem Zwecke par, für ein neugebornes etwa zu Dr. $1-1\frac{1}{2}$ (in *Aq. Foenic.* Dr. 4-6 aufgelöst, alle $\frac{1}{2}-\frac{1}{4}$ St. 1 Theelöffel bis zur gehörigen Wirkung), für ein 2 jähriges etwa zu Unc. 1 (in *Aq. Foenic.* Unc. 4, alle $\frac{1}{2}$ St. 2 Essl.; vgl. Ry 1075 (*Tinct. Rhei aquosa*)). (Damit sie nicht Leibkneifen, Uebelkeiten od. dgl. mache, gern mit einem aromatischen Wasser od. einem Ölzucker. — Da sie leicht in saure Gährung geht u. dann die erwähnten unangenehmen Folgen wohl am ersten äussert, so verordne man sie in flüssigen od. halbflüssigen Formen, namentlich im Sommer, nicht auf längere Zeit; auch dürfte es eben deshalb oft nicht zweckmässig seyn, sie mit sauren Dingen, z. B. *Tart. depur.*, *Pulpa Tamarind.*, zu verbinden.) In Latwerge, Auflösung [in Wasser, Milch, Thee, Kaffee, Molken. — Die Auflösung ist zu coliren (I. 8. 134 Z. 5 v. u.). — Soll die Manna zu flüssigen Auszügen (z. B. von Senna, Rhabarber u. dgl.) kommen, so setzt man sie der Colatur zu, und colirt dann noch einmal, oder setzt sie doch wenigstens erst gegen das Ende der Extraction zu, denn wenn sie gleich anfangs zugesetzt wird, so löst sie sich zuerst auf, und verhindert dann das Wasser, die andern Substanzen gehörig zu extrahiren. Besonders wichtig ist die Beobachtung dieser Regel bei Abkochungen, denn das Kochen schwächt auch die abführende Kraft der Manna sehr. — Ry 676; 884 (*Rad. Rhei*), 1075 (*Tinct. Rhei aquosa*), 922 (*Rad. Tarax.*), 1021 (*Tamarindi*), 819 (*Pulpa Tamarind.*), 1030 (*Tart. natron.*)]. Will man die Manna, z. B. als Bechicum, pur geben, so ist die *Manna tabulata*, Ry 677 [in vielen Apotheken auch vorrätig zu finden], eine schickliche Form [da Pulver giebt man sie nicht gern, weil sie etwas Feuchtigkeit anzieht].

Selten äusserl. [Schnupfmittel; s. *Lae vaccin.*; Klystier: Ry 1051 (*Tinct. Asae foet.*)].

676.

Ry *Mannae elect.* Unc. 1
solve in

Aq. Foenic. Unc. 3
cola; 'adde

Liq. Ammon. anisati Scr. 1.
M. D. S. Stündl., umgeschüttelt, 1 Essl.
(Bei Katarrhalbeschwerden der Kinder.)

ROSENSTEIN. STARK.

677.

Ry *Mannae elect.* Unc. 6
Aq. comm. q. s.

ut leni igne liquefiant. Cola feruido et
infunde in modulum pro morsulis; refri-
gerat. discinde in tabulas ponderis Dr. 2.
— *D. S.* 2 stündl. $\frac{1}{2}$ - 1 Morvelle.

* *Massa Pilularum e Cynoglosso.* [*Rad. Cynogl., Sem. Hyosc., Opium ana 4, Myrrha 6, Oliban. 5, Styrax calam., Caryophylli u. Cass. cinnam. ana 2.* — Keine Pillenmasse, sondern ein Pulver, von dem 7 Gran ungefähr 1 Gran Opium enthalten. — 1 Drachme 1 Sgr.] Innerl. (*ad Granu quindecim!*) zu Gr. 2-7, selten (ausser bei Gewöhnung) mehr; einigemal tägl.; in Pulver, Pillen. — (Fast obsolet.)

Mastiche. Mastix. [Hauptbestandtheile: zweierlei Harz und wenig äther. Öl. — 1 Unze $5\frac{1}{2}$, *subt. pulv.* 7 Sgr.] Vgl. *Resinae.* — Selten noch innerl., zu Gr. 5-10, einigemal tägl., in Pulver, Pillen, Emulsion. — Häufiger äusserl., als Kaumittel [die türkischen Frauen kauen ihn häufig, um das Zahnfleisch zu stärken, die Zähne weiss zu erhalten, u. den Athem wohlriechend zu machen]; zu Mundwässern [Ry 678], Zahnpulvern [Ry 679], Zahnfleischlatwergen, Zahnkitt [Ry 680], Räucher-Species u. -Pulvern [theils zu bloss wohlriechenden, theils zu bei Rheumatismen, Oedemen u. d. kalten Geschwülsten anzuwendenden]; als Zusatz zu Pflastern, seltner zu Salben.

678.

Ry *Mastiches pulv.* Dr. 2

Bals. Peruv. Dr. $\frac{1}{2}$

Gm. Mimos. pulv. Dr. 2

fiant c.

Aq. Flor. Aurant. Unc. 6

l. a. Emulsio, cui adde

Tinct. Myrrhae Dr. 2.

M. D. S. Umgeschüttelt als Mundwasser.

(Bei üblem Geruch von cariösen Zähnen.)

679.

Ry *Mastiches*

Conchar. ppt. ana Dr. 2

Rad. Irid. Flor. Unc. $\frac{1}{2}$

Ol. Rosarum Gut. 3.

M. f. Pulv. subtiliss. D. in vitro. S. Zahnpulver.

LOCKSTAEDT.

680.

Ry *Mastiches pulv.* Dr. 2

Aether. sulphur. Dr. $\frac{1}{2}$.

Solve et decantha. D. in vase orific. modice amplè, bene clauso. S. Zahnkitt (ein aus roher Baumwolle gedrehtes Kügelchen damit getränkt in den zuvor gereinigten hohlen Zahn zu bringen).

HENRY.

Man könnte als Anodynum etwa noch 12 Tropfen eines äther. Öls oder Kreosot hinzufügen.

† *Medulla Bovis s. bovina.* Ochsenmark. Knochenmark. [Fettmasse, von zelligen Häutchen durchzogen. Consistenz des Hammelfalgs. Muss zum Gebrauch „ausgelassen“, d. h. geschmolzen und colirt, werden. — 1 Unze 3 Sgr.] Beliebt zu Pomaden [Ry 295, 361].

Mel (*crudum* — im Gegensatze des *despumut.*; doch wird *Mel crudum* auch oft in einem engeren Sinne als Synonym von *Mel flavum* — s. unten — gebraucht. Honig (roher). [Hauptbestandtheile: Krümelzucker und Schleimzucker.] *Cave:* s. I. S. 36 sub 14.

Innerl. bisweilen pur oder im Getränk, zu 2–3 Unzen tägl.; häufiger als Geschmackscorrigens oder als Involvens für scharfe Stoffe; als Constituens von Latwergen [I. S. 294, 296, 297], bisweilen auch Pillen, Bissen [I. S. 241, 243]; selten als Emulgens [I. S. 178 Z. 3 v. u.]. Für Mixturen, welche klar aussehen sollen, ist jedoch der rohe Honig [selbst der weisse] nicht geeignet.

Äusserl. zu Mund- u. Gurgelwässern [nur als Zusatz], Pinselsäften [meist als Grundlage], Klystieren [meist nur als Zusatz, Unz. $\frac{1}{2}$ –2; vgl. *Ol. Lini*. Doch rühmt WITKE ein lauwarmes Klystier von 2 Essl. Honig und 3 Tassen frischer Kuhmilch als besonders sicher ausleerend, sicherer als reizende Klystiere.], Stuhlzäpfchen [z. B. R₂ 728 (*Natr. sulph. crud.*)], Salben [was jedoch, mit einigen Ausnahmen (vgl. z. B. *Terebinth.*) nicht zu empfehlen (I. S. 171.)], Cataplasmen [vgl. *Farina Secalis* u. *Gas Acid. carbon.*], u. s. w.

Man unterscheidet 2 Sorten:

1. *Mel album s. virginium*. Weisser od. Jungfernhonig. [1 Unze 28gr.] Man giebt ihm als dem angenehmeren und eleganteren zum innern Gebrauch, auch zur örtlichen Anwendung im Munde, den Vorzug, ausser etwa bei Armen. [Bisweilen auch als Emulgens; vgl. *Mel despum.*]

2. *Mel flavum s. commune (s. crudum)*. Gelber, gemeiner od. roher Honig. [Etwas dicker als der vorige. — 1 Unze 1 $\frac{1}{2}$ Sgr.]

***Mel despumatum s. depuratum*.** Abgeschäumter od. gereinigter Honig. [Syrupsdicke. — 1 Unze 1 $\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. wie *Mel album* [nur mit Rücksicht darauf, dass er etwas dünner ist. Selten benutzt man ihn (eher schon den etwas dickeren weissen Honig) als Emulgens (I. S. 178 Z. 3 v. u.). — Zum Getränk mit Wasser in verschiedenen Verhältnissen (*Hydromel*)]. — Äusserl. zu Mund- u. Gurgelwässern, Pinselsäften, Zahnlatwergen.

***Mel rosatum*.** Rosenhonig. [Syrupsdicke. — 1 Unze 1 $\frac{5}{8}$ Sgr.] Innerl. u. äusserl. wie *Mel despumat.*

***Mica Panis albi. Medulla Panis*.** Semmel. Semmelkrume. [Hauptbestandtheile: Stärkmehl und Kleber. — 1 Unze *subt. pulv.* 1 $\frac{5}{8}$ Sgr.]

Innerl. zu Abkochungen [R₂ 268-(SYDENHAM's weisses Decoct)]; als Pillenconstituens [der Apotheker hat sie gewöhnlich nur alt und gepulvert vorrätig, auf Verlangen aber auch frisch. In jenem Zustande kann sie natürlich nur flüssige und weiche Dinge binden, frisch dagegen sowohl diese als auch pulverige in geringer Menge. Sie ist aber überhaupt ein schlechtes Constituens, weil — davon abgesehen, dass ihre Hauptbestandtheile oft zersetzend

wirken — die mit ihr constituirte Masse sehr bald hart und schwauffällig wird (wenn man die *Mica* frisch anwendet, noch an demselben Tage). Man kann zwar diesem Übelstande dadurch abhelfen, dass man noch etwas Zucker zusetzt; doch sind Pflanzenpulver (*Rad. Alth. p.p.*) jedenfalls bequemer und vorzuziehen].

Äusserl. zu Cataplasmen [namentlich zu kleinen, feinen Cataplasmen, z. B. um sie über die Augen zu legen. By 817 (*Poma acidula*); vgl. auch *Crocus*].

† *Millepedes* (-dae). *Aselli*. Keller-Esel, -Asseln od. -Würmer. Maueresel. Schaben. [Hauptbestandtheile: thierischer Leim und (?) salzsaure Salze. — 1 Unze *subt. pulv.* 5½ Sgr.] Innerl. zu 10–30 Gran einigemal tägl., in Pulver oder pulveraufnehmenden Formen. — Von den frischen etwa 8–24 Stück tägl. in Bolusform [zerstossen und mit *Succ. Junip. inspiss. q. s.*]; oder ein Presssaft [zu Dr. 2–4 auf den Tag. — Z. B. ½ Unze des Safts mit eben so viel *Liq. Kali acet.*, *Aq. Petrosel.* Unc. 4, Syrup Unc. 1; alle 2–1 St. 1–2 Essl.: RICTER. Oder 1 Unze Kellersesel zerstossen, mit 6 Unz. Rheinwein übergossen, ausgepresst, davon einigemal tägl. 2 Essl.]; Conserve.

Minium, *Crocus Saturni*. *Superoxydum plumbosum*. Mennige; Bleisafraun; Bleicinnober. Bleisuperoxyd. [Pulver. — 1 Unze *subt. pulv.* 1½ Sgr.] Cave Säuren; Salzbilder. — Nur äusserl. (†), zu Salben [z. B. Dr. 1 sehr fein gepulvert auf Unc. ½ *Ungt. rosat.*: v. GRÄFE, wenn bei feuchten Augenentzündungen das herabfließende ätzende Secret die Wangen entzündet u. excorirt, zum Bestreichen derselben], Pflastern [officinell: *Empl. fuscum*. — Unter der Benennung *Ceratum ad Fonticulos* hat die PH. AUSTR. ein Sparsdrap von einer Pflastermasse aus *Minium* 2, gelbem Wachs 3, Hammeltalg 1, Schweinefett u. Terpenthin ana ¾].

★ *Mixtura camphorata*. *Julep e Camphora*. Camphermixtur. [Campher (durch Weingeist gepulvert) 6 Gran mit Zucker 2½ Gran gerieben, allmählig 1 Unze siedendes destill. Wasser zugesetzt, nach dem Erkalten filtrirt. Die Hitze und der Zucker befördern die Aufnahme des Camphers vom Wasser; da aber nach dem Erkalten filtrirt wird, so bleibt nur so viel Campher in der Mischung als das zuckerhaltige Wasser kalt aufgelöst halten kann, und wieviel dies sey, lässt sich nicht genau bestimmen. Die Mischung ist klar. Das Präparat ist nur zu adjuvirenden Zusätzen, nicht als Hauptmittel, zu empfehlen. — 1 Unze ¾ Sgr.]

Mixtura oleoso-balsamica. *Balsamus Vitae Hoffmanni*. [*Ol. Lavand.*, *Caryophyll.*, *Cass. cinnam.*, *Cortic. Citri*, *Maicid.*, *Majoran.*, *Rutae*, *Flor. Aurant.* ana ¼, *Perubalsam* ¾, Spirit 60, macerirt u. durch Baumwolle filtrirt. — 1 Drachme enthält also ungefähr 2 Gran (3–4 Tropfen) äther. Öls u. ¼ Gran Balsam. — 1 Drachme ¾ Sgr. — Als Surrogat für *Arme Balsamus Vitae* PH. P.: *Ol. Lavand.*, *Borismar.*, *Bergamott.*, *Junip. Bacc.*; *Terebinth. laric.* ana ¾ (zusammen also 1½), *Spir. V. rft.* 60; ist jedoch etwas schwächer;

1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr. Zum äusserlichen Gebrauch, besonders in grösserer Quantität, kann man auch eine Mischung von *Bals. Peruv.* Scr. 1, *Ol. Rosim.* Scr. 2, *Spir. F. rffies.* Unc. 2 substituiren.]

Innerl. zu 10-20 Tropfen (u. mehr), mehrmals tägl., auf Zucker oder in Thee, Wein u. s. w.

Häufiger äusserl., als Riechmittel [Als Zusatz zu einem Nicotinpulver: Ry 849 (*Rad. Helleb. albi*)], zu Einreibungen [per, wo es nicht zu theuer; z. B. in der Umgegend des Auges (*HIMLY's Spir. ophthalm.*, Ry 746, ähnlich). — Dr. 2 mit *Ol. Cajep.*, *Aeth. sulphur.* ana Dr. $\frac{1}{2}$: FR. JÄGER zum Einreiben in der Supraorbitalgegend bei torpiden Zuständen des Sehorgans.], künstlichen Balsamen [Ry 681], Waschungen [Ry 153 (*Bals. Peruv.*)].

681.

Ry *Ol. Nucistae**Ungt. simpl.* ana Dr. 2.*Lent igne liquatis et semirefrigeratis adm.**Tinct. Opii simpl.* Scr. 1*Mixt. oleoso-balsam.* Dr. 1.

F. Ungt. D. S. In den Unterleib einzureiben. (Für Kinder, bei chronischen Durchfällen.) (WENDT.)

**** Mixture pyro-tartarica s. simplex.** Brenzlich-weinsteinsäure Mixture. [Concentr. Schwefelsäure 1, *Liq. pyro-tartar.* 8, *Spir. Angel. comp.* 12. — 1 Unze $2\frac{1}{2}$ Sgr. — Die *Mixt. pyro-tartarica camphorata* der PH. HANN. (1 Unze 4 Mgr.) entspricht genau diesem Präparat, während die *Mixt. pyro-tartarica* derselben Pharmak. (1 Unze $3\frac{1}{2}$ Mgr.) mit einem keinen Campher enthaltenden *Spir. Angel. comp.* (vgl. den Art.) bereitet ist und in etwas grösseren Dosen gegeben werden kann.] *Cave* Salpetersäure; Salzbilder; Basen; die meisten Salze; Schwefelmetalle. — Innerl. zu 20-40 Tropfen mehrmals tägl., in Thee [z. B. Flederthee] oder einem aromatischen Wasser oder Mixturen [Ry 682].

682.

Ry *Mixt. pyro-tartar.* Dr. $1\frac{1}{2}$ *Tinct. Pimpinell.* Dr. $\frac{1}{2}$ *Succi Sambuci insp. dep.* Unc. 1*Aq. Sambuci* Unc. 4.

M. D. S. 2stündl., umgeschüttelt, 1 Eal. (VOGEL.)

Mixture sulphurico-acida. Elixir acidum Halleri. *Aqua s. Spiritus Rubell.* *Spiritus sulphurico-acidus*, Schwefelsäure Mixture; HALLER's saures Elixir, etc. [1 concentr. Schwefelsäure auf 3 *Spir. Vini rffies.* — 1 Drachme $\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave* wie bei *Acid. sulph. dilut.* — Cautelen beim Einnehmen s. unt. *Acida*.

Innerl. (*ad Guttas viginti!* — *Absque aqua* \mp) zu 5-20 Tropfen öfters tägl. (etwa Dr. $\frac{1}{2}$ - 1 - $1\frac{1}{2}$ tägl. zu verbrauchen; man rechne 90 Tropfen auf die Drachme); in Tropfen [Ry 683] oder grösseren Mixturen, stark verdünnt und eingehüllt, also etwa mit ei-

nem Syrup und Schleim [Ry 684-686; 878 (*Rad. Radanh.*)]. Zum Getränk [Dr. $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ auf 1 Quart, mit *Syr. Ceras.* oder *Rubi Id.* Unc. 1-3].

683.

Ry *Mixt. sulphur.- acid.* Dr. 1
Tinct. Opit crocat. Scr. 1
 — *Cinnam.* Dr. 2.

M. D. S. Umgeschüttelt stündl. 20 Tropfen in verhärtetem Hafererschleim. (Bei starken Metrorrhagien.) Vgl. Ry 4063.

G. A. RICHTER.

684.

Ry *Mixt. sulphur.- acid.* Dr. 1-2.
Syr. Rubi Id. Unc. 2.
Aq. Cerasor. Unc. 5.

M. D. S. 2stündl. 1 Essl. (oder ohne das Kirschwasser, bloss mit dem Syrup, dann 2stündl. 1 Theelöffel) mit Hafererschleim.

685.

Ry *Sacch. albi* Dr. 6
 solve in
Aq. comp. Unc. 6
 adde

Mixt. sulphur.- acid. Dr. 3.

M. D. — Etwa 2stündl. $\frac{1}{2}$ - 1 Essl. (die im Original angegebenen Dosen sind viel zu gross).

Mixt. acida PH. MIL.

Für die Hospitalpraxis brauchbar, obwohl die Verdünnung durch Schleim der durch blosses Wasser vorzuziehen; in der Privatpraxis durch häusliche Verdünnung und Versüssung wohlfeiler darzustellen.

686.

Ry *Mixt. sulphur.- acid.* Dr. $\frac{1}{2}$
Decocti Rad. Salep (Scr. 1) Unc. 6
Syr. Rubi Id. Unc. 1.

M. D. S. 2stündl. 1 Essl. (Bei durch krankhafte Reizbarkeit bedingtem Nachtripper.)

WENDT.

Eine sehr ähnliche Composition: *M. s. a.* Dr. $\frac{1}{2}$, *Dec. R. S.* Unc. 5, *Syr. R.* Unc. 1- $1\frac{1}{2}$, während des Anfalls halbstündl. $\frac{1}{2}$ Essl., gebraucht SEILER gegen Pyrosis.

Mixtura vulneraria acida. Aqua vulneraria (s. scopetaria) Thedeni. Aq. vulnerar. acida. THEDEN'S Schusswasser, auch wohl THEDEN'S Arquebusade — sonst wird unter dem Namen Arquebusade gewöhnlich die *Aq. vulneraria vinosa* verstanden. [Verdünnte Schwefelsäure 1, Weingeist 3, Honig 2, Essig 6. — 1 Unze $\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave* wie bei *Acid. sulphur. dilut.* — Nural's Verbandwasser, pur [greift mit der Zeit die Leinwand an; deshalb ist der \dagger *Liq. discutiens* PH. MIL. (s. 8, 13) meist vorzuziehen] oder verdünnt.

* *Morphium. Morphinum.* Morphinum od. Morphin. (Opiumalkaloid.) [Bildet mit Säuren Salze. — 1 Gran 2 Sgr.]. *Sol.* In kaltem Wasser kaum auflöslich (1000?), in kochendem sehr schwer (405 od. 500), in kaltem Weingeist auch sehr schwer [absoluter Alcohol 40, kochend 30], in Äther nicht oder kaum; ziemlich leicht in wässerigen Alkali-Lösungen, Kalkwasser. — *Cave* Säuren [falls man nicht Salze bilden will. — Concentrirte Salpetersäure zerstört es]; Salzbilder; Chlorkalk, salzsaur. Gold, salpeters. Silber, Quecksilber-, Kupfer-, Blei- u. Eisen-Salze.

Innerl. (selten; $\frac{1}{2}$) in ähnlicher Dosis wie das folgende; in Pulver od. Auflösung [Ry 687].

Ausserl. zu Injectionen [Gr. 2 mit 1 Eidotter und Unc. 1-2 eines fetten Öls zusammengerieben; davon mehrmals tägl. (umgeschüttelt) kleine Mengen einzuspritzen: BRERA bei Otagie, bei starker Reizung der Harnröhre im entzündlichen Stadium des Trippers, bei hämorrhoidal. Stuhlzwang], Salben [ähnlich wie das folgende]; endermatisch [in der Regel in Pulverform; meist in etwas grösseren Dosen als innerl.; A. L. RICHTER rath jedoch, beim Morph. sowohl als bei dessen Salzen nur mit eben so kleinen Dosen als innerl. anzufangen und — besonders am Kopfe oder in der Nähe desselben — vorsichtig zu steigen].

687.

Ry Morphii Gr. $\frac{1}{4}$ Aq. destill. Unc. $1\frac{1}{4}$

Syr. Capivi Papav. Dr. 1.

Solve. D. S. Vor Schlafengehen auf einmal zu nehmen. (Bei hartnäckiger Schlaflosigkeit, heftigen Schmerzen.)

(BRERA.)

* *Morphium aceticum. Acet. morphic. Es-sigsäures Morpium.* [Weissliches, sehr bitteres Pulver. — 1 Gran 28gr.] Sol. In Wasser leicht löslich; etwas schwerer in Weingeist; nicht in Äther. — Cave stärkere Säuren; Salzbilder; reine u. kohlensaure Alkalien u. Magnesia; lodkalium; salzsaur. Natron, Eisen u. Gold; salpeters. Silber.

Innerl. (ad Grani quadrantem!) anfangs zu Gr. $\frac{1}{8}$ bis höchstens $\frac{1}{4}$; allmählig wohl bis zu Gr. $\frac{1}{2}$ oder selbst Gr. 1; einigemal tägl. In Pulver [selten], Auflösung [Durch einen kleinen Zusatz von Essigsäure verhindert man, dass es — durch Verlust eines Theils seiner Essigsäure — zum Theil unauflöslich werde. — Ry 688. Oder (weit schwächer) Gr. 1 in 3 Unzen Syrup, davon 3etündl. 1 Kaffeeöffel: MAGENDIE statt des Syr. Diacodion (oft bewirke auch schon ein einziger Kaffeeöffel, in ein wenig lauem Wasser vor Schlafengehen genommen, Schlaf)]; am häufigsten in Pillen od. Bissen [aber auch in diesen immer aufgelöst. — Ry 689-693].

Ausserl. in Klystieren [Gr. $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ u. allmählig mehr], Salben [Bei spasmodischen Harnröhrenstricturen Gr. $\frac{1}{2}$ - 1, mit etwas Fett zur Salbe gemacht, mittelst eines Catheters an die verengerte Stelle gebracht: LALLEMAND. — Gr. 4 auf Ungt. rosat. Unc. 1: BEHR gegen heftiges Brennen bei Zons.], Linimenten [z. B. Gr. 6 mit Ol. Amygdal. Dr. 1, (umgeschüttelt) einigemal tägl. einige Tropfen in die Augenbraugegend einzureiben: ROSAS bei verschiedenen schmerz- oder krampfhaften Augenleiden, z. B. Blepharospasmus, spasmod. Entropion, arthrit. Augenentzündung p.p. — Gr. 10 auf Ol. Amygd. Dr. 1 (umgeschüttelt): Derselbe zum Bestreichen der Geschwürsränder bei Augenlinderkrebs als Anodynum.]; auch anatripsologisch [z. B. nach C. A. L. KOCH Gr. 2, nach V. AMMON Gr. 6 mit $\frac{1}{2}$ Unze Zucker in Pulver, davon viertelstündl. eine kleine Messerspitze über den Augenbrauen mit Speichel einzureiben: in rheumatischen Augenentzündungen (besonders im ersten Zeitraum) und bei beginnendem grauen Star. Wo man die Kosten scheut, soll man statt dessen nach V. AM-

MON 2stündl. („ungewöhnlich häufig“) $\frac{1}{8}$ Gran mit etwas Opium und Zucker auf der Schläfe endermatisch appliciren] und sehr häufig endermatisch [wie *Morphium*].

688.

Ry *Morphii acetici* Gr. 4

solve in

Aq. destillat. Dr. 2

adde

Acidi acetici Gtt. 1

Spir. Vini alcohol. Dr. $\frac{1}{4}$.

M. D.—36 Tropfen enthalten ungefähr 1 Gran. („*Tinctura sedativa*“, als Ersatz der Opiumtincturen.)

(MAGENDIE.)

689.

Ry *Morphii acetici* Gr. 2

solve in

Aq. destillat. q. s.

adde

Succi Glycyrrh. depur. Scr. 2

Rad. Glycyrrh. glabr. pulv. q. s.

ut f. *Pilulae* 32. *Consp. Sem. Lycop. D. S.* 2-4 mal tägl. 2 (Gr. $\frac{1}{4}$) u. allmählig mehr.

690.

Ry *Morphii acetici* Gr. 1

solve in

Aq. destillat. q. s.

adde

Rad. Alth. pulv. Dr. 1

Mellis despumati q. s.

ut f. *Boli* nr. 6. *Consp. Sem. Lycop. D. S.* 2stündl. 1 Stück. (Bei gereiztem Nervensystem — so bei einer Lymphgefäßentzündung, bei der Manie u. s. w. — mit Nutzen angewandt.) (BRERA.)

691.

Ry *Morphii acetici* Gr. 1

solve in

Aq. destillat. q. s.

adde

Hb. Digitalis pulv. Gr. 8

Rad. Althaeae — Dr. 1

Mellis despumati q. s.

ut f. *Boli* nr. 6. *Consp. Sem. Lycop. D. S.* 2stündl. 1 Stück. (Zur Beruhigung des Blutsystems.) (BRERA.)

692.

Ry *Morphii acetici* Gr. 1

solve in

Aq. destillat. q. s.

adde

Sulph. stibiat. aurant. Gr. 2

Extr. Aconiti Gr. 4

Pulv. Rad. Alth. Dr. 1 $\frac{1}{2}$

Mellis despumati q. s.

ut f. *Boli* nr. 8. *Consp. Sem. Lycop. D. S.* 3stündl. 1 Stück. (Bei Lymphgefäßentzündung durch venerische Krankheit (?), bei Rheumatismen, Gicht u. s. w.) (BRERA.)

693.

Ry *Morphii acetici* Gr. 1

solve in

Aq. destillat. q. s.

adde

Rad. Ipecacuanh. pulv. Gr. 2

Extr. Hyoscyami Gr. 4

Rad. Alth. pulv. Dr. 1

Mell. despumati q. s.

ut f. *Boli* nr. 6. *Consp. Sem. Lycop. D. S.* 3stündl. 1 Stück. (Bei Amenorrhöe von erhöhter Sensibilität des Uterus.) (BRERA.)

+ *Morphium muriaticum. Hydrochloras morphicus.*

Salzsaures Morphinum. [Weiss; sehr bitter. — 1 Gran 2 $\frac{1}{2}$ Mgr.]
Sol. 16-20; heisses Wasser 1; in Weingeist leicht löslich. — Cave
Schwefel- u. Salpeter-Säure; Iod, Brom; reine u. kohlensaure Alkalien u. Magnesia; Iodkalium; (salzsaur. Natron, salzs. Gold?);

salpeters. Silber; Eisenoxydsalze. — Innerl. u. äusserl. in gleichen Gaben und ähnlichen Formen wie das Vorige.

**** Morsuli antimoniales Kunkelii.** Schwefelspiessglanzmorsellen. [Jede Morselle, 2 Drächmen schwer, enthält ungefähr 15 Gran *Stibium sulphurat. nigr. laevigat.*, nebst etwas süßem Mandeln, Zimmtcassie u. Cardamom. — 1 Unze 38 gr.] Für Erwachsene 1-4 Morsellen tägl., für Kinder [denen man sie unter dem Titel: „schwarze Bonbons“ recht gut beibringen kann] etwa Eine in ein Paar Stücke getheilt.

Moschus. Bisam. Musk. [Hauptbestandtheile: ein moderartiger Stoff, ein eigenthümliches bitteres Harz, Gallenfett, Ammonium, verschiedene Salze und ein eigenthümlicher fluchtiger Stoff. — 1 Gran $3\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerl. zu Gr. 2-10-20, alle 3-4 St. (Schon der Theure wegen versucht man, wo es die Zeit erlaubt, in der Regel erst die kleineren Gaben; versucht auch wohl anfangs noch Verbindungen oder das Alterniren mit andern erregenden, analeptischen Mitteln. — Geisteskranken muss man — freilich eine theure Cur — die höheren Gaben reichen. Auch Kindern darf u. muss man in schweren Fällen verhältnissmässig ziemlich starke Gaben reichen, z. B. bei *Asthma Millari* 2-4jährigen Kindern Gr. 2-6 *p. dosi*, bei Eklampsien u. dgl. Kindern in den ersten Paar Monaten Gr. $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ (halbtündl.), Kindern von 2 Monaten und darüber schon Gr. $\frac{1}{2}$ - 2, u. s. w.; selbst beim Keuchhusten, wo man zwar versuchsweise niedriger anfängt, werden oft so starke Gaben nöthig.) Beiste Geruchs- u. Geschmackscorrigentien: Zimmt, Muskatenblüthe, als Öl oder Tinctur. — In Pulver [vgl. I. S. 206 (Tabelle). *D. in charta cerata.* — In der Regel die beste Form, auch zu sehr rascher Bereitung geeignet, denn auch in allen übrigen Formen muss der Moschus fein verrieben seyn, und Capseln aus Wachspapier hat der Apotheker immer vorrätzig; die Bereitung einer Emulsion dauert länger. Ry 694, 695; 624 (*Lapid. Cancr.*)], Pillen [welche Form man zwar aus therapeutischen Gründen — als zu langsam wirkend — selten wählen wird. — Vgl. I. S. 245 Z. 2], Latwerge [wie bei *Castoreum.* — Nicht, wo es auf besonders rasche Wirkung ankommt. — Ry 696], Schüttelmixturen u. Emulsionen [die letzteren meist vorzuziehen (I. S. 313 Z. 7-8 v. u.); nur bisweilen, wo es auf die grösste Kile ankommt, die ersteren. — Ry 697-702; 645 (*Liq. Ammon. carb. pyro-ol.*). Oft passend bloss mit einem Syrup, z. B. Gr. 12 mit *Syr. Cinnam.* Unc. 1, umgeschüttelt theelöffelweise (in jedem Theelöffel 2 Gran)].

Äusserl. in Klystieren [wohl nur in äusserst seltenen Fällen, vielleicht nur bei verhindertem Schlingen, dürfte das in dieser Form enorm theure Mittel bisweilen unentbehrlich seyn. — Scr. 1 - Dr. 1; in Verbindung mit andern Mitteln natürlich noch weniger; passend mit *Amylum* (vgl. den Art.), damit das Klystier nicht alsbald wieder abgehe. Man verschreibe auch, da hier die Anwendung weniger rasch zu wiederholen ist als die innerliche, in der Regel nur Eine Gabe.]; endermatisch [zu Gr. 6-10-15 mit Erfolg versucht]; als Zusatz zu Zahnpulvern [bei üblem Mundgeruch; doch nicht recht passend, da der Geruch des Moschus Vielen eben so zuwider als Andern angenehm ist; jedenfalls höchstens Gr. $\frac{1}{2}$ auf 1 Unze Pulver, sonst wird der Geruch zu stark],

zu künstlichen Balsamen [Aber allenfalls schon in etwas grösserem Verhältnisse; doch verschreibe man, wenn man nicht schon weiss, dass der Kranke den Geruch gut erträgt, keine grosse Quantität. — Ry 766 (*Ol. Nucist.*)], zu Waschpulvern [*hæthetens* Gr. 1 auf Unc. 1]. — Als Präservativ gegen Keuchhusten (!) $\frac{1}{2}$ Gran Mosch. mit 1 Scr. Zimmtölzucker in Wachspapier auf der Herzgrube zu tragen: ECKENSTÆDT. — Auch lässt man wohl gegen Ungeziefer, Kleiderläuse, ein wenig Moschus (etwa mit einem voluminösen Pflanzepulver vermengt) in die Kleider einnähen.

694.

Ry Moschi Gr. 5

Elaeos. Cinnamomi Scr. 1.*M. f. Pulv. Disp. tales nr. 2. D. in charta cerata, sine S.**Citissime.*

Vgl. I. S. 123.

695.

Ry Opü Gr. $\frac{1}{2}$ *Moschi* Gr. 3*Gm. Mimos.* Scr. 1*Sacch. albi* Dr. 2.*M. f. Pulv. Div. in 6 part. aeq. D. in charta cerata. S. 3stündl. 1 Pulver. (Bei Keuchhusten ohne Fieber.)*

GÖLLIS.

696.

Ry Moschi Scr. 1

Rad. Valer. min. pulv. Unc. $\frac{1}{2}$ *Ol. Cajeputi* Gtt. 16*Syr. Rhoead.* Unc. $1\frac{1}{2}$.*M. f. Electuar. D. in pyxide alba epistom. subereo clausa. S. 4mal tägl., umgerührt, einen mässig starken Theelöffel voll.*

(VOGT.)

697.

Ry Moschi Gr. 12-24

Gm. Mimos. pulv. Dr. 1*stant c.**Syr. Flor. Aurant.* Unc. 1*Aq. Meliss.* Unc. 2*l. a. Emulsiq., cui adde**Aether. acet.* Scr. $\frac{1}{2}$.*M. D. S. Umgeschüttelt alle 2-1 St. 1 Essl.*

(SUNDELIN.)

698.

Ry Moschi Gr. 6

II.

Sacch. albi pulv. Dr. $\frac{1}{2}$ *terendo misce, sensim addendo**Aq. Rosar.* Unc. 3.*D. S. Umgeschüttelt esslöffelweise.**Julapium moschatum* PH. HANN.(1 Unze $10\frac{1}{2}$ Mgr.)*Da jeder Essl. nur 1 Gran enthält, so ist es wohl hauptsächlich nur für Kinder bestimmt. Einfacher aber wäre die Darreichung bloss mit einem Syrup, s. S. 320.*

699.

Ry Moschi Gr. 15

Elaeos. Menth. pip. Dr. 1*terendo sensim misce c.**Aq. Flor. Aurant.* Unc. 3*adde**Liq. Ammon. carb. pyro-ol.* Dr. 1.*M. D. S. Umgeschüttelt stündl. 1 Essl.*

VOGT.

Vgl. Ry 645.

700.

Ry Moschi Gr. 3-6

*terendo sensim misce c.**Syr. Alth.* Unc. 1*Aq. Foenic.* Unc. $\frac{1}{2}$ *adde**Liq. Ammon. succin.* Scr. 1.*M. D. S. Umgeschüttelt 2stündl. 1 Theelöffel. (Bei Keuchhusten u. a. Krampfkrankheiten der Kinder.)*

TOURNAI.

701.

Ry Moschi Gr. 3-4

*terendo sensim misce c.**Syr. Rhoeados* Unc. 1*Aq. Foenic.* Dr. 6*adde**Liq. Ammon. succin.* Scr. 1.

41

M. D. S. Umgeschüttelt alle $1\frac{1}{2}$ St.
1 Theelöffel. (Bei Krämpfen eines 6monatlichen Kindes.) (VOGT.)

702.

R_z Moschi Gr. 2

terendo misce c.

Syr. Alth. Unc. 1

Liq. Kali carbon. Scr. 1.

D. S. Umgeschüttelt alle $1\frac{1}{2}$ - 1 St. 1
Theelöffel. (Wie das vorige.)

★★ *Mucilago Cydoniorum.* Quittenschleim. [Quittenkörner (*Semen Cydoniorum*) 1 mit Rosenwasser 64 einige Stunden macerirt, dann colirt. — 1 Unze $\frac{5}{8}$ Sgr. — Man kann indess den Quittenschleim auch noch concentrirter bereiten lassen, in dem Verhältniss von 1:32, selbst von 1:24 (oder noch weniger), sobald man dem Apotheker dies nur angiebt, z. B. R_z *Mucilaginis Cydonior.* 6 Gr. 15 parand. Unc. 1 (1:32).] *Cave:* s. I. S. 36 sub 17.

Äusserl. theils pur [zum Aufstreichen auf entzündete, excoriirte Theile u. s. w.], theils als Zusatz zu Einspritzungen [R_z 386, 389 (*Extr. Opii*)], Augewässern [vgl. I. S. 358, 359. — Mit Recht aber tadeln manche Augenärzte, namentlich HIMLY, die häufige Anwendung des Quittenschleims (weil dieser sich leicht in der Mitte des Glases zusammenballt, ausser den Metallsalzen auch wohl noch manche andre Substanzen mitnimmt, und so ein unkräftiges Wasser zurücklässt), und bedienen sich häufiger der *Mucilago Gm. Mimos.*, die im Ganzen weit weniger, und namentlich weniger rasch, zersetzt. — R_z 1069 (*Tinct. Opii croc.*)], Waschwässern [vgl. I. S. 371], u. s. w.

★★ *Mucilago Gummi Mimosae.* Mimosenschleim. [*Gm. Mimos.* 1 in *Aq. destill.* 3 aufgelöst u. colirt. — Syrupusconsistenz. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. und äusserl.; vgl. *Gummi Mimos.* [Wo kein destillirtes Wasser und kein Coliren nöthig ist oder das Gummi gelegentlich mit andern Mitteln zugleich colirt werden kann, kommt man in der Regel wohlfeiler weg, wenn man die Auflösung magistral verordnet. Dabei kann man auch zugleich mit dem Auflösungsverhältniss variiren.]

★★ *Mucilago Salep.* Salepschleim. [1 auf *Aq. comm.* 96. — Die der PH. SLESV. in gleichem Verhältniss mit *Aq. destill.*; 1 Unze 1 8hl.] Vgl. *Rad. Salep.*

Myrrha. Myrrhe. [1 Unze gr. pulv. $6\frac{2}{3}$, sub^t. pulv. $7\frac{1}{3}$ Sgr.] Vgl. *Gummiresinae.* *Cave* [mit sanction. Ausnahmen] concentrirte Mineralsäuren, Weinsteinsäure; Salzbilder; kaust. Alkalien; Gold-, Silber-, Quecksilber-, Kupfer- u. Blei-Salze, Chloreisen.

Innerl. zu Gr. 5-15, 2-4mal tägl. In Pulver [s. *Gummiresinae.* — Gern mit Milchzucker. — Vgl. *Sem. Phellandr.*], Trochisken [vgl. *Gm. resinae*], Pillen od. Bissen [R_z 703, 704; 58 (*Aloë luc.*), 129 (*Asa foet.*), 310 (*Crocus*), 914 (*Rad. Seneg.*)], Latwerge, Schüttelmixtur od. besser Emulsion [R_z 705; 417 (*Ferr. sulph. cryst.*)].

Äusserl. zu Zahnpulvern [vgl. I. S. 218 sub 3). — R_z 220,

221 (*Carbo ppt.*), 1029 (*Tart. dep.*)], Zahnlatwergen [R₇ 287 (*Cort. Chin. fusc.*)], Zahnfleischlatwergen, Pflastern [vgl. *Gm. resinae*], Salben [R₇ 289 (*Cort. Chin. fusc.*), 1047 (*Terebinth.*)], Streupulvern [mit Kohle, China, Kamillen, Campher od. dgl. — R₇ 60 (*Aloë luc.*), 208 (*Camph.*), 308 (*Cort. Salic.*)]; — selten [weil die offic. Tinctur meist ausreicht] aufgelöst [in Kalkwasser, *Liq. Ammon. vinos.* oder *Spir. nitricæ æther.*, worin sie fast völlig auflöslich ist] zu Verbandwässern, Linimenten od. dgl. — Man benutzt auch ihre Dämpfe [nicht bloss zu Räucherpulvern (I. S. 197 Z. 4 v. u.), sondern auch z. B. indem man sie auf Kohlen wirft, zum Einathmen bei Brustkrankheiten; oder indem man sie mit Campher und Essig kocht, zum Einziehen bei brandigen Bräune].

703.

R₇ *Myrrhæ pulv.* Dr. 2½*Rad. Scillæ pulv.**Extr. Hyoscyami ana* Gr. 15— *Glycyrrh. q. s.*

ut f. *Pilulæ* 90. *Consp. Pulv. Rad. Irid. Flor. D. in vitro. S.* 3mal tägl. 6. (Zur Beförderung des Auswurfs bei Schleimasthma.)

704.

R₇ *Galbani depur.**Catechu pulv. ana* Dr. 1*Myrrhæ* — Dr. 2*Extr. Trifol. q. s.*ut f. *Pilulæ* 150. *Consp. D. in vitro. S.*

3mal tägl. 8. (Bei chronischen Schleimflüssen.) (RICHTER.)

705.

R₇ *Myrrhæ pulv.* Dr. 1*Gm. Mimds. pulv.* Dr. 2

fiant c.

Syr. simpl. Unc. 1*Inf. Flor. Chamom. vulg.* Unc. 6l. a. *Emulsio, cui addo**Ferri sulphur. cryst.* Gr. 15

antea in

Aq. Cinnam. simpl. Unc. 1*soluta. M. D. S.* Umgeschüttelt 3stündl.

2 Essl. (Bei Amenorrhæe.)

(P. FRANK.)

Natrum aceticum. Terra foliata Tartari crystallisata s. mineralis. Soda acetata. Acetas natricus cum Aqua. Essigsäures Natron; krystallisirte Blättererde. [Verwittert (*† N. a. siccum*). — 1 Drachme $\frac{5}{8}$, *siccum* 1½ Sgr.] *Sol.* 3. — *Cave* starke Säuren und diejenigen Salze solcher Säuren, welche eine schwächere Base als Natron enthalten; ferner Kalisalze mit schwächeren Säuren. — Innerl. zu Dr. ¼–1, einigemal tägl.; in Pulver, Auflösung. Das verwitterte zu Scr. 1–2 in Pulver.

Natrum carbonicum acidulum s. bicarbonicum s. neutrale s. perfecte saturatum. Bicarbonas natricus cum Aqua. Säuerliches od. gesättigtes kohlen-säures Natron. [Zusammensetzung und Reaction wie bei *Kali carbon. acidul.* — 1 Drachme 1½ Sgr.] *Sol.* 13. — *Cave* wie bei *Kali carb. acidul.* Innerl. zu Scr. ¼–1, mehrmals tägl.; in Pulvern, na-

mentlich Brausepulvern [vgl. *Pulv. aëroph.* o *Natro. carb. acid.* u. I. S. 138. — R_x 706, 707], Trachisken [R_x 708], Auflösungen z. B. Dr. 1-2 auf L. 1 + Seltersen Wasser oder eines andern Säuerlings, u. diese oder die doppelte Portion in einem Tage zu verbrauchen; als Ersatz der theureren *Aqua Supercarbonatis Sodae* PH. HANN. (einer Auflösung in künstlichem kohlensauren Wasser, die auch wohl *Aq. mephitica alcalina* genannt wird; — 1 Med. Pf. 18 Mgr.). — Auch wohl in einem säuerlichen Weis, z. B. Rheinwein, der dadurch massigend wird. — R_x 709, 710], künstlichen Mineralwässern [R_x 711, 712; 671 (*Magnos. sulphur. dep.*), 733 (*Natr. sulph. dep. crist.*)]; zum Getränk [R_x 713].

Zu Bädern, wozu man es vorgeschlagen hat, ist es zu theuer und leicht durch *Natron* (oder *Kali*) *carbon. crudum* und (aus Kreide u. Schwefelsäure entwickelte) Kohlensäure zu ersetzen.

706.

R_x *Natri carb. aciduli* Gr. 15

Elaeos. Citri Scr. $\frac{1}{4}$.

M. f. Pulv. Disp. tales nr. 4. D. S. Stündl. 1 Pulver mit 1 kleinen Essl. Citronensafts während des Aufbrausens zu nehmen; oder auch den Citronensaft, zu Limonade gemacht, voran, das Pulver mit etwas Wasser hinterdrein. (Wird von schwachen Digestionsorganen noch besser vertragen als das officinelle Brausepulver.)

707.

R_x *Opil* Gr. $\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{4}$

Natri carb. aciduli Gr. 15

Elaeos. Menth. pip. (od. *Cajeputi*) Scr. $\frac{1}{2}$ - 1.

M. f. Pulv. Disp. tales nr. 6. D. in charta cer. — Wie das vorige. (Etwas für einen Cholera-Kranken.)

708.

R_x *Natri carb. aciduli pulv.* Unc. 1

Sacch. albi pulv. Unc. 2

Ol. Menth. pip. (od. *Ol. Cass. cinam.*) Gtt. 6

Mircib. Gum. Tragac. q. s.

ut f. *Trochisci* nr. 96; *Pulv. Cinnam. acuti conspergendū, non torrendū, D.* — Bei beschwerlicher Verdauung viertelstündl. (3-5mal) 1 Stück. (Statt der d'ARCHESCHE oder VICHYschen Pastilles.)

709.

R_x *Natri carb. aciduli* Dr. 3

solve in

Aq. Meliss. Unc. 6

adde

Syr. Cinnam. Unc. $\frac{1}{2}$.

M. D. S. 4mal tägl. 1 Essl. (Bei Kropf.)

HUFELAND; nach PESCHIER.

710.

R_x *Natri carb. aciduli* Dr. 2 $\frac{1}{2}$

Extr. Gentian. Unc. $\frac{1}{4}$

solve in

Aq. Menth. pip. Unc. 5

adde

Spir. sulph. aether. Dr. 2

Tinct. Rhei aquos. Dr. 6.

M. D. S. Alle 3-2 St. 1 Essl. (Gegen Sodbrennen u. Dyspepsie vom Mißbrauch geistiger Getränke.) VOGT.

711.

R_x *Natri carb. aciduli* Dr. 3

Aq. comm. L. 3.

In lagena affunde

Acidi tartar. Dr. 1 $\frac{1}{2}$

antea in Aq. comm. q. s. solut. Lagenam statim rite obtura. D. S. Künstliches kohlensaures Wasser.

SUNDELIN.

712.

R_x *Natri carb. aciduli* Dr. 3 $\frac{1}{2}$

Aq. communis L. 3.

In lagena affunde

Acidi muriat. q. s.
ad saturand. Dr. 2½ Natri carb. acidu-
*li *).* *Lagenam statim rite obtura. D. S.*
 Weingläserweise. SUNDELIN.

*) Von unserer officinellen Salzsäure sind dazu Dr. 5½ erforderlichlich.

713.

R_x *Natri carb. aciduli Dr. 2**Aq. communia L. 3.**Immitte urceo murrhino; adde**Succi Citri rec. expr. et colati Gtt. 30*
et statim claude urceum. D. S. Zum Ge-
 tränk. (Vogt.)

In der Regel im Hause zu bereiten.

Natrum carbonicum (s. Sal Sodae s. Soda s. Alkali minerale s. Carbonas natricus cum Aqua) crudum. Rohes kohlenaures Natron; rohe Soda; rohes Sodasalz; rohes mineralisches Laugensalz; rohes Mineralalkali. [1 Unze $\frac{5}{8}$ Sgr.] *Sol. 2.* — Selten gebraucht, höchstens äusserl., zu Bädern [wozu in der Regel das kräftigere *Kali carbon.* vorgezogen wird. — Zu einem allgemeinen Bade Unc. 6-12 (od. mehr). Zu einem Fussbade Unc. 2-4; vgl. *Sem. Sinap.* — Die Leute können sich das unreine Präparat selbst genügend reinigen, indem sie die Auflösung desselben coliren.]

Natrum carbonicum depuratum. Natrum subcarbonicum. Alkali minerale depuratum s. aëratum s. mite. Sal Sodae depuratus. Soda depurata. Carbonas natricus cum Aqua depuratus. Gereinigtes kohlenaures Natron; mildes Natron; gereinigte Soda; Mineralalkali. [Verwittert, u. ist dann das folgende Präparat. — 1 Unze 2½ Sgr.] *Sol. 2.* — *Cave* wie bei *Kali carb. o Tart.*

Innerl. zu Gr. 12-24, mehrmals tägl.; etwa Dr. 1-1½ auf den Tag. [Gern mit bittern Mitteln.] In Auflösungen [R_x 714, 715; 834 *Rad. Caricis aren.*), 1036 (*Tart. stibiat.*)], namentlich auch zu Saturationen [s. I. S. 138], künstlichen Mineralwässern [R_x 716; 113, 114 (*Aq. hydrosulphur.*)]. (Zu Pulvern od. Pillen zweckmässiger das folgende Präparat.)

Äusserl. zu Mundwässern [vgl. S. 18 Z. 4], Injectionen [R_x 717], Waschwässern [theils kosmetischen, vgl. I. S. 226, 371; — theils mehr arzneilichen; z. B. gegen Prurigo der äusseren weiblichen Genitalien Scr. 1-4 (u. allmählig mehr, bis es Reiz hervorbringt) auf 32 Unz. Wasser, damit 3-4mal tägl. (erwärmt) zu waschen, die Waschungen auch noch 1½ Tage (od. länger) nach beseitigtem Zufall fortzusetzen: TROUSSEAU], zur Venen-Infusion [vgl. *Natr. muriat.*].

714.

R_x *Natri carbon. depur.**Extr. Absinthii ana Dr. 2**solue in**Aq. Menth. piper. Unc. 4.**D. S. 4mal tägl., umgeschüttelt, 1 Eaal.*

715.

R_x *Natri carbon. depur.*— *nitrici ana Unc. ½*

solve in

Aq. destillat. Unc. 8.

D. S. Stündl. 1 Essl. (Bei entzündlich-galliger Ruhr.)

VELSEN.

716.

Ry *Natri carb. depur.* Gr. 127

— *muriatici* Gr. 39

— *sulph. dep. cryst.* Gr. 191

solve in *Lagena plus* L. 6 *capace* in

Aq. comm. fervid. L. 3.

Solut. peracta adde

† *Aq. Selteranae nativ.* L. 3.

Lagena rite claud. *D. S.* Künstliches Karlsbader Wasser. KLAPROTH.

717.

Ry *Natri carb. depur.* Dr. 1

Sapon. medic. Dr. 2

solve in

Aq. destill. L. 1.

D. — Zum Einspritzen (um aus Harnsäure bestehende Blasensteine aufzulösen. Formel des Spitals zu Montpellier).

Natrium carbonicum depuratum siccum s. delapsum. Alkali minerale pulveratum. Carbonas natricus depuratus. Getrocknetes od. verwittertes mildes Natron od. Mineralalkali. [Pulver. — 1 Unze 5½ Sgr.] *Sol.* 5½. — *Cave* wie bei *Kali carbon. e Tart.*

Innerl. zu Gr. 4-8 mehrmals tägl. (etwa Scr. 1-Dr. ½ auf den Tag). [Gern mit bittern Mitteln.] In Pulvern [Ry 718; 900 (*Rad. Scill.*), 1033 (*Tart. stibiat.*); vgl. *Chitium sulph.*], namentlich auch Brausepulvern [zu denen jedoch häufiger *Natr. carb. acidul.* — Vgl. I. S. 138. — Ry 719], Pillen [Ry 720]. (Zu Auflösungen zweckmässiger das vorige Präparat.

Ausserl. zu Zahnpulvern [I. S. 217 sub 2)], Waschpulvern [I. §. 129. sub 1); §. 130. — Ry 443 (+ *Furf. Amygd.*)], Salben [z. B. mit *Carbo ppt. ana* u. 4 Theilen Rosensalbe; CASPER bei *Tinea*; es werden damit Abends die kahl geschorenen Stellen eingerieben, dann der Kopf mit einer Nachthaube od. einem Tuche bedeckt, u. am folgenden Morgen mit einer concentrirten Auflösung von schwarzer Seife rein gewaschen; dazu aller 8 Tage ein Purgans aus Calomel u. Jalape. — Oder Ry 721. Ry 722; 589 (*Kali hydroiod.*), 1086 (*Sulph. dep.*)].

718.

Ry *Hb. Conii macul.* Gr. 2

Natri carb. dep. sicci Gr. 4

Hydrarg. stibiato-sulphurati

Carbon. Spongiae ana Gr. 6

Sacch. albi Scr. ½.

M. f. Pulv. Disp. tales nr. 12. *D. S.*

Tägl. 3 Pulver. SCHUBARTH.

Sacch. albi Unc. ½.

M. f. Pulv. D. in vitro. S. Theelöffelweise in Wasser während des Aufbrauens zu nehmen. VOGLER.

720.

Ry *Natri carb. dep. sicci*

Sapon. medicati ana Dr. 1

Extr. Glycyrrh. q. s.

ut f. Pilulae 30. *Consp. Pulv. Croci.* *D. S.* 3 mal tägl. 3. (Bei Harnsteinen.)

BEDDOES.

719.

Ry *Natri carb. dep. sicci* Dr. 2

Tart. depur. Dr. 6

721.

Ry *Calcar. extinctae* Dr. 1
Natri carb. dep. sicci Dr. $1\frac{1}{2}$
Adipis suilli Unc. 1.

M. D. — (Bei *Tinea Capitis*, nachdem durch ein erweichendes Cataplasma die Krusten gelöst, die geschwürigen u. entblößten Stellen damit zu bestreichen.)

RICHARD.

722.

Ry *Extr. Opii pulv.* Gr. 5
Calcar. extinctae Dr. $\frac{1}{2}$
Natri carb. dep. sicci Dr. 1
Adipis suilli Unc. 1.
 M. D. — (Gegen die *Prurigo*-Arten.)
 BIRT.

† *Natrum causticum siccum. Alkali minerale causticum. Hydras natricus siccus.* Trockenes Ätznatron. Ätzendes mineralisches Laugensalz. Natriumoxydhydrat. [Sehr leicht auflöslich in Wasser, auch Weingeist. Zerfliesst an der Luft, erhärtet aber bald durch Anziehen von Kohlensäure zu kohlens. Natron. — 1 Drachme 3 Sbl.] Von diesem Mittel gilt in Beziehung zum *Kali caust. siccum* ganz dasselbe, was vom *Liquor Natri caust.* in Beziehung zum *Liq. Kali caust.* [vgl. S. 305].

Natrum muriaticum. Sal culinare s. commune s. usuale s. vescum s. fontanum s. Gemmae s. fossile. Chloratum Natrii. Salzsaueres Natron; Chlornatrium. Küchensalz, Kochsalz; Quell-, Soolen-, Berg-, Stein-, Boy-Salz. [1 Unze $\frac{1}{2}$, *subt. pulv.* $\frac{3}{4}$ Sgr.] *Sol.* 3. Auch in wasserhaltigem Weingeist löslich. — *Cave* Schwefelsäure, Salpetersäure; Alaun; viele Metall-Oxyde u. -Salze.

Innerl. zu Dr. $\frac{1}{2}$ – $1\frac{1}{2}$ mehrmals tägl.; in Pulver oder Auflösung [Ry 723; 402 (*Fel Tauri rec.*). — Unc. $\frac{1}{2}$ –1 in *Aq. comm.* Unc. 3, etüdl. 1 Essl.: in den ersten Stadien der Cholera, nach vorherigem Aderlass und gleichzeitig mit Frictionen, empfohlen, um galliges Erbrechen zu bewirken]. Auch zu künstlichen Mineralwässern [Ry 113, 114 (*Aq. hydrosulphur.*), 716 (*Natr. carb. depur.*)]. (Bei Blutungen gern in Pulver; bei dringendem Fall etwa alle $\frac{1}{4}$ St. 1 Theelöffel bis $\frac{1}{2}$ –1 Essl. des fein gepulverten Salzes; sonst seltenere u. mässigere Gaben.)

Ausserl. zu Gurgelwässern [selten; vgl. *Fruct. Caps. ann.*], Klystieren [Unc. $\frac{1}{2}$ –1 od. 1–2 Essl.; in Verbindung mit Seife, Ölen u. dgl.; vgl. *Ol. Lini.* Ry 365 (*Extr. Colocynth.*). — Bei Cholera der Kinder zu 3 Theelöffeln in 6 Essl. warmen Wassers.], Augenpulvern [Ry 724], Augenwässern [Zu Bähungen (selten) Dr. 1–4 auf Unc. 4. Zu Tropf- oder Pinsel-Wässern in concentrirter Lösung (so gegen Hornhautflecke: TITTMANN)], trockenen Umschlägen [abgeknistert (I. §. 84.) und erwärmt bei ödematösen Geschwülsten, Wasserkopf, Kropf p.p. — Bloss stark erwärmt, in Flanell eingeschlagen oder in einen wollenen Mannsstrumpf gefüllt, um den Hals zu legen: KIRBY bei Croup. (Der Umschlag muss so heiss seyn, dass die

Hand nicht darauf ruhen kann, und genau anschliessen. Sobald das Mittel starke Röthung, allgemeine Hautirritation und Schweiß hervorgebracht, unterhalte man die Diaphoresis durch innerliche Mittel, durch warmes Getränk p. p. Nach 12 St. kann man mit den innerlichen Mitteln nachlassen, auch die Hitze der Umschläge mässigen. Nach 2-3 Tagen darf man in der Regel, falls kein Recidiv eingetreten, zu drastischen Abführmitteln übergehn. Blutentziehung passe nur, wenn die Lungen stark mitleiden.)), Kataplasmen [seiten. — Leinsamenmehl und Semmel *ana* mit concentrirter Kochsalzlösung zum Brei gekocht (und etwa noch mit Meerzwiebelessig versetzt): gegen Hydrocele bei Kindern empfohlen; wenn es zu sehr reizt, einige Zeit dafür ein bloss erweichender Umschlag], Bähungen [besonders zu kältemachenden; vgl. I. S. 369. — Um Haare an Stellen, wo sie un-gelegen wachsen, wegzuschaffen, benetze man mit einer gesättigten wässerigen oder weingeistigen Auflösung die Stelle entweder geradezu oder mittelst kleiner Löffchen, wiederhole das Befeuhten nach jedesmaligem Eintrocknen schnell und oft, und setze diese Behandlung Wochen oder (bei starkem Haarwuchs) selbst Monate (!) lang fort: MERKEL.], Waschwässern [Ry 580 (*Kali carb. e Cin. clav.*)], Waschpulvern [I. S. 226 sub 3)], Bädern [zur Erhöhung der Thätigkeit der Haut und der peripherischen Nerven warm, zur Beruhigung bei erethistischen Nervenleiden kühl od. kalt. — Zu Einem Bade 2-4 Pfund (u. mehr). Zu einem Fussbade $\frac{1}{2}$ -1 Pfund], Salben [Ry 725]; zur Venen-In-fusion [LATA bei pnblosen Cholera-Kranken: *Natr. muriat. Dr. 2-3 u. Natr. carbon. dep. Scr. 2* in 96 Unz. Wasser (am besten destill. Wasser, allenfalls gereinigt. Regenwasser) von 110° F. Temperatur gelöst, hiervon (während das Wasser immer in derselben Temperatur erhalten wird) pfundweise langsam eingespritzt; um so mehr, je grösser der Collaps des Kranken; gewöhnlich alle 3-4 St. 40 Unzen, langsam und in Absätzen; zur Unterstützung innerl. reizende und ad-stringirende Mittel; nach LIZARS auch ähnliche Salzlösungen zum Getränk und in (sehr warmen) Klystieren, so wie rothmachende Einreibungen auf Rücken, Brust u. Unterleib. Dieses vehemente Verfahren (man hat mehrmals bis zu 20, ja in einem Falle binnen 53 St. 31 Pfund injicirt!) hat doch auffallend günstige (durch STEVENS's Untersuchungen über das Blut — s. SCHMIDT *Jahrb. d. gesamt. Med. Bd. 2. S. 242 ff.* — erklärliche) Erfolge aufzuweisen; es ist von Anderen zum Theil, aber ohne Verbesserung, modificirt worden].

723.

Ry *Natri muriat. Unc. 1**solvo in**Aq. comm. L. 3**addo**Succi Citri rec. expr. et colati Unc. 3**Sacch. albi q. s. ad grat. sapor.**M. D. S. Alle 4 St. 1 Weinglas.*

VOGEL.

Zweckmässiger im Hause zu bereiten oder doch zu versüssen.

724.

Ry *Natri muriatici**Conchar. ppt. ana Dr. 1.*

M. f. Pulv. subtiliss. D. S. 2-3mal tägl. mittelst eines feinen Pinsels etwas davon ins Auge zu bringen. (Gegen Leucomie. — Später nimmt man 2 Theile Kochsalz auf 1 Theil Austerschaln, endlich reines Kochsalz.) KRANZ.

725.

Ry *Ol. Nucum Juglandis Dr. 1**Natri muriat. Dr. 2**Fellie Tauri rec. Unc. 1½.*

Digere leni calore per 36 horas, tunc terendo misce exacte; f. Ungt. D. S. Umgerührt mit Werg aufzulegen. (Auf scrofulöse Geschwülste.) RONCALLI.

* *Natrium nitricum. Nitrum cubicum s. rhomboidale. Nitrus natrius.* Salpetersaures Natron. Würfelsalpeter. [Wird an der Luft feucht. — 1 Drachme $1\frac{1}{2}$ Sgr.] *Sol.* 2. *Cave* wie bei *Kali nitr. dep.* [Weinsteinsäure ausgenommen]; auch Kalisalze mit schwächeren Säuren. — Innerl. zu Gr. 15–30 alle 2–4 St.; in Auflösung [R. 726; 715 (*Natr. carb. depur.*)]. — Dr. 2–6 in 6–8 Unz. Althöndecoct, 2stündl. 1 Essl.; BONORDEN gegen (entzündliche) Ruhr].

726.

R. *Gm. Tragacanthae* Gr. 8–10*Natri nitrici* Unc. $\frac{1}{2}$ –1

solvo in

Decocti Rad. Althaeae Unc. 8.

D. S. Stündl. 1 Essl. (Bei Ruhr mit dem Charakter des gelinden Synochus mit Hinneigung zum Typhus.) MEYER.

+ *Natrium oxymuriaticum s. muriaticum oxygenatum (hyperoxygenatum) s. chloricum. Chloras natrius cum Aqua.* Chlorsaures (oxydirt- od. hyperoxygenirt-salzaures) Natron. [Nicht mit + *Chlorum Natri*, S. 122, zu verwechseln. — Wird an der Luft feucht. — 1 Drachme 8 Sbl.] *Sol.* 3; noch löslicher in Weingeist. — *Cave* stärkere Säuren; Kalisalze mit schwächeren Säuren; *Kali sulphuric. acid.*; Hitze.

Ausserl. [wohl sehr entbehrlich] zu Mund- u. Gurgelwässern [Dn. $\frac{1}{4}$ –2 auf Unc. 6], Waschungen [z. B. Dr. 2 auf Unc. 4: DARLING u. A. gegen *Pruritus genitalium*, besonders bei Weibern], Verbandwässern [z. B. Unc. $\frac{1}{2}$ auf Unc. 2, zum Pinseln und Auflegen mit Charpie: HERMES gegen Wasserkrebe].

Natrium phosphoricum. Soda phosphorata. Sal mirabile perlatum. Phosphas natrius cum Aqua. Phosphorsaures Natron; Perlsalz. [1 Unze $8\frac{1}{2}$ Sgr.] *Sol.* 4. — *Cave* Schwefelsäure, Salpetersäure, Salzsäure; kaust. Kali; Kalisalze mit schwächeren Säuren; alkalisch-erdige, erdige und Metallsalze; Kalkwasser. [Es eignet sich dieses Salz besser als manche andere gelind eröffnende zur Verbindung mit sauren Säften; vgl. *Tert. boraxat.*]

Innerl. zu Scr. 1–2 mehrmals tägl.; als Abführmittel zu Unc. 1–4, in einem Paar Portionen. In Pulvern [bestes Vehikel: ungesalzene Fleischbrühe (in der es dann die Stelle des Kochsalzes, dem es ähnlich schmeckt, vertritt). Z. B. Unc. 1 mit *Elavor. Macid.* Dr. 2, auf 2000 in zugegebener Fleischbrühe: SUNDLEIN als angenehm schmeckendes, nicht schwächendes, Abführmittel.], Auflösungen [z. B. mit einem Frucht-Symp. R. 727], auch wohl für Kinder in Lecksäften [z. B. Dr. 1 mit 2 Unzen Rosenhonig, 2stündl. 1 Theelöffel; bei Aphthen].

(Zu Klystieren ist das wohlfeilere Kochsalz vorzuziehen.)

727.

R. *Natri phosphorici* Unc. 1

solvo in

Aq. Cerasor. Unc. 4

adde.

Syr. Cerasor. Unc. 1.

M. D. S. Stündl. 1 Eeal. (Abführmittel für Damen.)

Natrium sulphuricum (s. *Sal mirabile Glauberi* s. *Sulphas natricus c. Aqua*) *crûdum*. Rohes Glaubersalz. [1 Unze $\frac{1}{3}$, gr. pulv. $\frac{2}{3}$ Sgr.] Sol. 3. — *Cave* wie beim folgenden. — Nur äusserl., zu Klystieren [Unc. $\frac{1}{2}$ - 1, mit Essig, Leinöl (vgl. den Artikel) u. dgl. in Verbindung. — R. 440 (Fol. Senn.)], Stuhlzäpfchen [R. 728]. (Zu kalten Bähungen lieber das wohlfeilere Kochsalz.)

728.

R. *Natri sulphurici crudi pulv.*
Saponis domestici pulv. ana Unc. $\frac{1}{2}$
Moll. commun. q. s.

ut f. *Suppositoria* nr. 4. D. in *charta cerata*. S. Mit Öl bestrichen zu appliren. (Für ein grösseres Kind; — für ein kleineres die einzelnen Zäpfchen etwa halb so gross.)

Natrium sulphuricum depuratum crystallisatum. *Sal mirabile* (s. *catharticum*) *Glauberi depur.* *Soda vitriolata. Sulphas natricus cum Aqua depuratus.* Gereinigtes schwefelsaures Natron od. Glaubersalz, Wundersalz. [Verwittert langsam u. ist dann das folgende Präparat. — 1 Unze 1 Sgr.] Sol. 3. — *Cave* kautisches Kali; Kalisalze mit schwächeren Säuren [*Tart. depur.* ausgenommen; wiewohl auch bei den übrigen Verbindungen der Art die Zersetzung der Wirkung gewiss nicht erheblich schaden würde, vgl. I. S. 39 sub a)]; besonders aber Kalkwasser, Kalk-, Baryt-, Blei-, Quecksilber- u. Silber-Salze.

Innerl. zu Scr. 1-2 mehrmals tägl.; als Abführmittel zu Unc. $\frac{1}{2}$ - 2 in einige Portionen vertheilt. [Den Geschmack corrigirt am besten Zucker mit etwas Säurem, z. B. Citronensaft, auch wohl verdünnter Schwefelsäure (wie beim Bittersalz).] In Auflösungen [Arme mögen es lothweise in der Apotheke kaufen u. es sich selbst in beliebig vielem Wasser auflösen. — Unc. 1 mit Fol. Senn. Dr. 1, gröblich zerstoßen (u. solcher Dosen wohl mehrere, abgetheilt), mit 3 Tassen Wasser anzubereiten; stündl. od. öfter $\frac{1}{2}$ Tasse; HUFELAND (*Species purgantes* PH. R.; 1 Unze 1 $\frac{1}{2}$ Sgr.) zur Ersparung der Infusionskosten noch zum Versenden für entfernte Kranke. — R. 729, 730; 596 (*Kali nitr. dep.*), 1021 (*Tamarindi*). — Unc. 1 in *Aq. comm.* Unc. 6; *Mixt. e Natro sulph. (Mixt. purgans)* PH. MIL.], Emulsionen [so namentlich gern bei Bleikolik. — R. 734, 732]; zu künstlichen Mineralwässern [R. 733; 716 (*Natr. carb. dep.*)]. (Zu Pulvern u. pulveraufnehmenden Formen das folgende, für die äusserliche Anwendung das vorige Präparat.)

729.

R. *Natri sulph. dep. cryst.* Unc. 1
solve in
Aq. comm. Unc. 5

adde

Syr. Succ. Ciri Unc. 2.
 M. D. S. Stündl. 1 Eeal., oder, will man rasch abführen, $\frac{1}{2}$ Tasse.

730.

R₇₃₀ *Natri sulph. dep. crist. Unc. 1½*
Sacch. albi Unc. 3
solse in
Aq. comm. Unc. 16
adde
Succi Citri rec. expr. et colati Unc. ½.
M. D. S. Als Getränk (abführende Li-
monade). BERENDS.
 Leicht im Hause zu bereiten.

731.

R₇₃₁ *Olei Amygdal. Unc. 1*
Vitella Ovor. 2
terendo sensim misce c.
Syr. Mannae Unc. 2
Aq. Foenic. Unc. 6
ut f. Emuls., in qua solve
Natri sulph. dep. crist. Unc. 1.
D. S. Stündl., umgeschüttelt, 2 Essl.

732.

R₇₃₂ *Ol. Ricini Unc. 1*
Vitella Ovor. 2
terendo sensim misce c.
Syr. Capit. Papav. Unc. 1
Aq. Foenic. Unc. 6
ut f. Emuls., in qua solve
Extr. Hyoscyami Gr. 6
Natri sulph. dep. crist. Unc. 1½.
M. D. S. Stündl., umgeschüttelt, 1-2
Essl. (Bei Bleikolik; aber auch zu an-
dern Zwecken.)

733.

R₇₃₃ *Natri carb. aciduli Dr. 2*
— sulph. dep. crist. Unc. 2
Aq. comm. L. 3
Solve in lagena; affunde
Acidi sulphur. diluti Dr. 2.
Lagenam statim ligno claude. D. S.
Künstliches abführendes Mineralwasser.
 SUNDELIN.

Natrium sulphuricum depuratum siccum s. de-
lapsum. Sulphas natricus depuratus. Getrocknetes
 od. verwittertes Glaubersalz. [Pulver. — 1 Unze 38gr.] *Cave*
 wie beim vorigen. — Innerl. in halb so grossen Dosen als das vo-
 rige; in Pulver [R₇₃₄], Bissen, Latwerge [R₇₃₅; 329 (*Elect.*
e Senna)].

734.

R₇₃₄ *Macidis Scr. 1*
Natri sulph. dep. sicci Dr. 2
Rad. Colombo Unc. ½.
M. f. Pulv. D. S. 2stündl. 1 Messer-
spitze. (Digestivmittel bei Verschlei-
mungen der ersten Wege.)

G. A. RICHTER.

735.

R₇₃₅ *Natri sulph. dep. sicci Unc. ½*
Pulpas Tamarind. Unc. 1
Syr. Succi Citri q. s.
ut f. Electuar. D. S. Stündl., umgerührt,
2 Theelöffel. (Oder für Arme statt des-
sen Unc. ½ mit Pulpa Prunor. depur.
q. s. zur Latwerge, stündl. drei Thee-
löffel.) Vgl. R₇₃₉.

Nuces Juglandis immaturae. Unreife Wall-
 nüsse. [Hauptbestandtheile: Wallnussbitter (s. S. 137) und ? Gerbstoff.]
Cave wie bei *Cortex Nucum Jugland. virid.* — Innerl. in
 leichter Abkochung [tägl. Unc. ½-1, mit Unc. 9 auf Unc. 6]. Diätetisch
 die eingemachten (überzuckerten, † *Confectio s. Conditum Nucum Jugl.*),
 vom Condit.

Nuces Vomicae. Krähenaugen. Brechnüsse. [Haupt-

bestandtheile: zwei Alkaloïde (Strychnin und Caniramin, das letztere früher Brucia genannt). — 1 Unze sublt. pulv. 28gr.] *Cave:* s. † *Strychninum*. — Innerl. (*Pulvis ad Grana duo!*) zu Gr. 1-2, allmählig steigend bis zu Gr. 5 od. selbst 10; anfangs nur 1-2mal, später wohl 3-4mal tägl. In Pulver [Ry 736], Pillen; nicht zweckmässig [wegen Unsicherheit der Wirkung] in Aufguss od. Abkochung.

736.

Ry *Nucum Vomicae*. Gr. 18-24

Rad. Ipecacuanhae Gr. 24

— *Rhei* Dr. 1

Concharum ppt. Ser. 2

Elaeos. Menth. pip. Dr. 2.

M. f. Pulv. Div. in 12 part. aq. D. in charta cerata. S. Alle 4-3 St. 1 Pulver mit warmem Melissenthees. (Gegen Magenkrampf.) VOGT.

Nux moschata. Muskatnuss. [Hauptbestandtheile: äther. und fettes Öl. — 1 Drachme sublt. pulv. 1½ Sgr.]

Innerl. zu Gr. 5-10, mehrmals tägl.; in Pulver [Ry 300 (*Cort. Pomor. Aurant.*)]. — Mit gerösteten Lorbeeren u. weissgebranntem Hirschhorn aus 1, Süßholz 3: *Pulv. Nucium moschatar. compositus s. antiscrofulosus Goeke* Ph. SLESV. Anbg. (1 Unze 8 Sht.), für Kinder von 2-4 Jahren zu 1 Theelöffel 2-3mal tägl., Morsellen, Pillen. Als Corrigen. Diätetisch zu verschiedenen Getränken.

Aüsserl. (theuer!) zu Zahnfleischlatwergen [selten. Ry 236 (*Catechu*)], aromatischen Umschlägen [gepulvert, mit Wachholderbeeren, Zimmt, Gewürznelken u. geriebenem Schwarzbrot vermischt u. mit Rothwein befeuchtet], Kräuterkissen [selten]; wohl sogar zu Bädern [Verschwendung; wohlfeilere aromatische Species thun gewiss dasselbe], etc.

OLEA AETHEREA s. volatilia s. destillata s. essentialia.

Ätherische, flüchtige, destillirte od. wesentliche Öle. [Von den empyreumatischen unten besonders.] — Sie lösen sich sehr leicht in Alcohol [die Auflösung (besonders concentrirt) wird mit Wasser milchig. — Ausnahmen *Ol. Citri Corticis*, *Rosae*, *Terebinth.* (vgl. die Artikel); auch die ätherisch-fetten Öle *Ol. Lauri* u. *Ol. Nucist.*], Äther und Kreosot auf. In Wasser sind sie sehr wenig auflöslich [Terpenthin-, Citronen-, Bergamott-, Pomeranzenschalen- und Pomeranzenblüth-Öl sogar ganz unauflöslich, obgleich sie dem Wasser Geruch mittheilen]; Zucker bindet ätherisches Öl, bewirkt dadurch eine etwas reichlichere und dabei gleichförmigere Aufnahme des Öls vom Wasser, und kann so für kleine Quantitäten äther. Öls die Rolle eines Emulgens spielen [vgl. *Elaeosacchara*]; sollen grössere Quantitäten äther. Öls mit Wasser verbunden werden, so bedarf es dazu kräftigerer Emulgentien [I. S. 179-180]. Sie lösen Campher, Fette, Wachs, Harze, Balsame, einige Alkaloïde, auch ein

wenig Phosphor, Schwefel etc. auf, und lassen sich mit mehreren organischen Säuren (Blau-, Essig-, Bernstein-, Benzoë-Säure etc.) verbinden. — Die meisten sind so dünnflüssig und leicht, dass man im Durchschnitt 100 Tropfen auf die Drachme rechnen kann; von den steiferen [bei denen wir die Consistenz immer angemerkt haben] etwas weniger; die steifsten [wie z. B. *Ol. Petrosel.*] würde man vielleicht zweckmässiger nach dem Gewicht dispensiren, doch ist dies noch nicht üblich, die Apotheker erwärmen sie deshalb ein wenig, um sie tröpfeln zu können. — *Cava*: s. I. S. 35 sub 9; auch Hitze, Luft, lange Aufbewahrung. Auch dürften bei mehreren sauer reagirenden äther. Ölen Basen zu caviren seyn, was zwar selten beobachtet wird. [Nach MARTIUS rüthen folgende mehr od. weniger das Lackmuspapier: *Ol. Anisi, Bergamott., Cajeputi* (das rectificirte nicht), *Calami* (bisweilen), *Carvi, Cass. cinnam., Cinnam. acuti, Citri Cort., Junip. Bacc., Lavand., Macid., †Sassafr., Terebinth., Valer.* Andere rüthen zwar das Lackmuspapier nicht, enthalten aber einen näheren Bestandtheil, welcher sich mit Basen verbindet und dadurch seine Flüchtigkeit verliert, während ein anderer Theil unverändert bleibt. So namentlich *Ol. Caryophyllor.* (aus welchem man eine Nelkenessenz dargestellt hat). Auch *Ol. Sinapis äther.* verbindet sich mit Basen, und verliert dadurch einen Theil seiner Wirksamkeit.]

Sie werden im Allgemeinen [nicht alle einzelnen] in folgenden Formen angewandt:

1. In Pulvern; entweder als Ölzucker [vgl. *Klaeosacchara*]; oder auch ohne Weiteres einer Pulvermasse zugesetzt [nicht über die I. S. 206 angegebenen Verhältnisse hinaus]. Die Pulver sind in Wachspapier oder, falls sie nicht dispensirt zu seyn brauchen, noch besser in einem verschlossenen Glase zu verabreichen.

2. In Zuckerwerkformen, vgl. I. S. 229; 231-32; 234, 235.

3. In Pillen u. Bissen. Sehr geringe Quantitäten [vgl. I. S. 241 Z. 14 v. u.] dürfen ohne Subaction aufgenommen werden [so oft zum Corrigen des Geruchs]. Grössere müssen subigirt werden [I. S. 240], falls nicht auch noch Harz, und zwar mindestens 4mal so viel als Öl, in der Masse ist. [Zwar geben erst 6 Harz mit 1 Öl für sich eine (übrige nicht schöne) Pillenmasse (vgl. I. S. 245 sub 5.), doch reicht auch schon eine geringere Quantität Harz hin, um das Auscheiden des Öls zu verhüten.] Ätherische Öle als Constituentien, wenigstens als alleinige, zu benutzen, ist — auch bei Harzen, wo es allenfalls angeht — unpassend, theils weil sie alle zu different dazu sind, theils aus dem I. S. 245 sub 5. angegebenen Grunde.

4. In Latwergen müssten grössere Quantitäten ebenfalls subigirt werden, doch nimmt man in der Regel nur geringe auf, bei denen es hinreicht, wenn sie mit den Pulvern oder den zähen Flüssigkeiten der Latwerge verrieben werden.

5. In Pflastern. Zwar leiden sie durch die Verarbeitung mit der heissen, höchstens halb erkalteten Masse [denn nur mit den wei-

cheren Pflastern (unserer 4ten Gruppe) lassen sich geringe Quantitäten ätherischer Öle schon kalt, durch blosses Malaxiren, verbinden]; dennoch ist ihre Anwendung in Pflastern oft wichtig und meist zweckmässiger als die der vegetabilischen Stoffe in Substanz. Mit 4–8 Theilen Harz verbunden geben sie gute Pflastermassen (I. S. 259), sind dann auch weniger flüchtig; sonst, wo es an Harz (oder einer entsprechenden Quantität Gummiharz) fehlt, darf man sie nur in geringerem Verhältniss [I. S. 260] aufnehmen, weil sie sonst nicht bloss die Bearbeitung der Masse erschweren, sondern auch sich an der Oberfläche ausscheiden und verflüchtigen würden. — Selten lässt man sie, auch wenn sie hauptsächlich die Masse mit constituiren, gleich mit der Pflastergrundlage zusammenschmelzen, weil sie dabei zu sehr verlieren würden, vielmehr setzt man sie fast immer erst der halberkalteten Masse zu (I. S. 263), falls man sie nicht mit einem officinellen Pflaster durch blosses Malaxiren (s. oben) verbinden kann.

6. In Salben [nicht über das I. S. 277 angegebene Verhältniss hinaus; am häufigsten jedoch nur als Geruchscorrigentien in noch viel geringerer Quantität: I. S. 172].

7. In flüssiger Form. Theils pur [„in Substanz“ — so z. B. *Ol. Terebinth.*; manche der schärferen auf Zucker geträpelt oder noch besser (weil der Zucker gekaut werden muss, was wohl heftiges Brennen im Munde, Thränen der Augen p. p. bewirkt) mit Zuckerwasser oder Haferschleim einzunehmen; manche äusserlich als Zahnmittel, zu Einreibungen, p. p. Pur wirken jedoch die ätherischen Öle weit reizender auf die Haut als die meisten geistigen oder ätherischen Flüssigkeiten, weshalb man sie für eine empfindlichere Haut gern mit solchen verdünnt.], theils durch geistige oder ätherische Flüssigkeiten verdünnt [Zum innerlichen Gebrauch ist es eine gewöhnliche — und wenn man sie in voller Dose anwenden will, die beste — Art, äther. Öle darzureichen, dass man sie in etwa 6 Theilen eines äther. Spiritus auflöst und dann tropfenweise, zu 10, 20 Tropfen, auf Zucker oder mit Zuckerwasser, Haferschleim, nehmen lässt. Ähnliche Verdünnungen der äther. Öle dienen oft zum äusserlichen Gebrauch, zu reizenden Injectionen, Einreibungen p. p.], theils mit wässrigen Flüssigkeiten [als Ölzucker oder durch Emulgiren (I. S. 179–180)] verbunden [Zum innerlichen Gebrauch sind die Emulsionen der äther. Öle nicht beliebt, weil der penetrante Geschmack der Öle (in grösseren Dosen — kleinere sind immer bequemer als Ölzucker zu administriren) mit dem milden Geschmack der übrigen, zur Emulsion dienenden Stoffe schlecht zusammenpasst; in der Regel zieht man es vor, sie — mit oder ohne geistigen, ätherischen Zusatz — tropfenweise, wie oben angegeben, nehmen zu lassen, oder giebt sie (der Geschmacks-Milderung wegen besonders zweckmässig) bloss mit Syrup abgerieben (was zwar eigentlich auch eine Emulsion ist, vgl. I. S. 183) oder auch wohl bloss mit einem fetten Öl als Lecksaft; oder mit fettem Öl und Syrup zugleich].

8. In elastisch-flüssiger Form. Es sind hauptsächlich die Dämpfe, deren Einwirkung man bezweckt, wenn man ätherische

Öle in der Umgegend des Auges anwendet [über die Steigerung der Intensität der Anwendung ist hier dasselbe zu beobachten wie bei den Ätherarten, s. S. 32]. Einige der wohlriechenderen benutzt man zu Räucherspiritus [L. S. 196, 197]. —

Die Dosen der ätherischen Öle zum innerlichen Gebrauch werden von vielen Schriftstellern übertrieben hoch angegeben, so dass sie zu den Dosen der Substanzen in einem unpassend grossen Verhältniss stehen. Glücklicher Weise geschieht dies mehr nur in Büchern als in Recepten, und es fällt nicht leicht einem Arzt ein, z. B. 3 Tropfen Zimmtöl oder Zimmtcassienöl *p. dosi* zu verordnen. Wir haben es nicht gewagt, in diesem Punkte allzusehr zu reformiren, rathen indess, sich in der Regel nur an die kleineren oder mittleren der von uns angegebenen Dosen zu halten, und wo in schwereren Fällen die grösseren nöthig scheinen, diese, wenigstens bei empfindlicheren Personen, immer verdünnt, auch wohl eingehüllt (in schleimigem Vehikel) zu geben; dies wird zumal bei denjenigen nöthig seyn, bei denen wir „Geschmack brennend scharf“ bemerkt haben.

Auch bei der Anwendung der äther. Öle als Geschmacks- oder Geruchs-Corrigentien wird oft eine zu grosse Quantität angesetzt, dadurch ein zu strenger Geschmack oder Geruch erzeugt, und so der Zweck verfehlt. Obwohl es schwer hält, hier genaue Regeln zu geben, da die Intensität der sinnlichen Wirkung bei den einzelnen Ölen sehr verschieden ist, so wird man doch an folgenden Regeln wenigstens einigen Anhalt finden: Man theile die als Corrigentien für die Sinne dienenden Öle in 3 Classen,

intensivste [*Ol. Caryophyll., Menth. pip., Rosar., (Amygd. amar.)*],
intensive [*Ol. Calami, Cass. cinnam., Cinnam. acuti, Macid., Majoran., Borismar., † Serpylli, Thymi*] und
weniger intensive [die übrigen],
und nehme von

den intensivsten	} auf 1 Unze einer trockenen oder flüssigen Composition	{ 1-2 Tropfen 2-3 — 3-6 — ;
den intensiven		
den weniger intensiven		

bei äusserlichen Mitteln mehr, etwa $1\frac{1}{2}$ mal so viel. [Speziellere Regeln für gewisse Formvarietäten haben wir an mehreren Stellen des ersten Theils gegeben. — Die hier angegebenen Quantitäten werden zur Erreichung des Zwecks in der Regel hinreichen (wo nicht ein sehr penetranter Geschmack oder Geruch zu bekämpfen ist) und es sicherer seyn, sich nach ihnen zu richten, als auf gut Glück grössere Dosen anzusetzen; doch ist damit nicht gesagt, dass nicht in einzelnen Fällen grössere Dosen passender oder doch noch passend seyn könnten, und es versteht sich von selbst, dass wo das Öl zugleich wesentlich mitwirken soll, man sich an

eine solche Regel gar nicht binden kann. Wenn die Pharmakopöen die *Elaeosacchara* so bereiten lassen, dass 24 Tropfen auf 1 Unze Zucker kommen, so ist dabei nicht bloss auf den Geschmack und Geruch der Composition Rücksicht genommen; es schmeckt z. B. ein in diesem Verhältniss bereitetes *Elaeosacch.* *Caryophyll.* noch sehr streng. — Um die äther. Öle als Geschmackscorrigentien nach den Arzneien nehmen zu lassen, empfiehlt sich die Zeltchen-Form; vgl. I. 8. 231.

Unter den aufgeführten intensiveren Ölen — so wie überhaupt unter den intensiver riechenden, wenn auch der Geruch nicht gerade angenehm und zum Corrigiren passend ist — werden auch am häufigsten diejenigen ausgesucht, die man zu äusserlichen Applicationen verwendet. So wählt man z. B. zu Riechmitteln *Ol. Cajeputi, Caryophyll., Menth. pip., Rorismar.*; zu Zahnmitteln *Ol. Cajeputi, Caryophyll., Origanet., Menth. pip., Cass. cinnam.*; zu kosmetischen Mitteln *Ol. Rosar., Cass. cinnam., Caryophyll., Thymi, †Serpill.* (doch häufig auch sehr oft die minder intensiven, aber sehr lieblichen: *Ol. Aurant., Flor., Bergamott., Citri Cort., Lavand.*); zu künstlichen Balsamen (ausser den ätherisch-fetten Ölen *Ol. Nucist. u. Lauri*) *Ol. Majoran., Caryophyll., Rorismar., Menth. pip., Cajeputi u. a.*; zu Einreibungen ums Auge *Ol. Cajeputi* (vor allen andern beliebt und nur bisweilen durch das viel wohlfeilere *Ol. Rorismar.* zu ersetzen), *Caryophyll., Rorismar., Majoran., Menth. pip., Thymi* — doch auch, wo man weniger intensiv einwirken will, *Ol. Menth. crisp., Lavand., Valerian., Rutae od. a.* —

Endlich mag man noch die höchst bedeutende Verschiedenheit im Preise der äther. Öle beachten [die beiden Extreme sind *Ol. Chamomill. simplex* und *Ol. Terebinth.*]; zwar richtet man mit manchen schon in den kleinsten Dosen etwas aus [1 Tropfen Rosenöl z. B. giebt 6 Unzen Wasser schon einen sehr angenehmen Geruch]; dennoch mag man, namentlich in äusserlichen Mitteln, sich mit *Ol. Chamomill. simpl. u. citrat., Cinnam. acuti, Aurant. Flor., Rosar.*, auch noch mit *Ol. Amygdal. amar. aeth., Valer., Myrrh., Majoran., Menth. crisp., Absinth. aeth., Rutae, Calami, Galbani* [in manchen Staaten auch noch mit andern, die vom Apotheker selbst bereitet, nicht gekauft werden] bei minder Wohlhabenden vorsehen. Dagegen empfehlen sich *Ol. Terebinth., Rorismar., Lavand., Thymi, Caryophyll., Citri Cort., Bergamott., Carvi* nebst den ätherisch-fetten *Ol. Lauri u. Nucist.* für die Armenpraxis [in welcher ausser den genannten nur noch das (nicht antheure) *Ol. Cajeputi* und bisweilen das *Ol. Junip. Baccar.* unentbehrlich seyn dürften].

OLEA COCTA u. infusa. Gekochte od. aufgelegene Öle. Nach der Ph. Bor. (zum Theil auch der Ph. Hann. und Austr.) werden *Hb. Absinth., Flor. Chamom. vulg., Fol. Hyoscyami, Hb. Hyperici* mit Baumöl abgekocht; nach der Ph. Slesv. die gedachten Pflanzenstoffe, so wie auch Canthariden, und nach Ph. Slesv. Anhg. auch *Hb. Corni macul., Hb. Menth. crisp.*, mit Baumöl im Wasserbade digerirt [nur auf die Präparate der Ph. Slesv. passt die

synonyme Benennung *infusa*]. Man sollte meinen, dass durch das Abkochen viel Wirksames, ja das Beste verloren gehen müsste, weshalb auch eine Zeitlang statt des ursprünglichen Abkochens häufiger das Infundiren (Digeriren) versucht wurde; aber die Erfahrung scheint dem Abkochen das Wort zu reden [vermuthlich bindet das fette Öl während des, übrigens nur langsam anzustellenden, Abkochens die flüchtigen Stoffe mehr als Wasser, und es wird durch das Abkochen eine grössere Menge in Öl auflöslicher Stoffe (namentlich Harz) gewonnen]. Doch ist für die Canthariden jedenfalls das Digeriren, wie es die PH. SLESV. vorschreibt, ausreichend und zweckmässig. Übrigens sind alle diese Präparate chemisch und katagraphologisch wie fettes Öl zu betrachten. Sie werden in der Regel nur äusserlich angewandt, zu Linimenten, Salben, Pflastern (selten), Injectionen; doch verdient das Cantharidenöl der PH. SLESV. auch innerlich angewandt zu werden, und das Bilsenöl hat man ebenfalls bisweilen innerlich versucht.

OLEA EMPYREUMATICA *s. empyreumatico-aetherea.*
Brenzliche od. brenzlich-ätherische Öle. Es gehören hierher Thieröl, Bernsteinöl und Steinöl. Das Nöthige über sie bei den einzelnen.

OLEA PINGUA *s. expressa s. unguinosa s. unctuosa.*
Fette, ausgepresste od. schmierige Öle. Es gehören hierher: *Ol. Amygdal., Cacao, Crotonis, Lini, Morrhuae, Nuc. Jugland., Olivar., Ovor., Papav., † Rapar., Ricini.* (*Ol. Lauri* u. *Nucistae* zum Theil, s. S. 332.) Sie sind alle specifisch leichter als Wasser, doch (mit Ausschluss des Cacaoöls) nicht um $\frac{1}{10}$, also nur so wenig, dass man keinen grossen Fehler begeht, wenn man den Esslöffel noch für $\frac{1}{2}$ Unze, den Theelöffel für 1 Drachme nimmt. — *Ol. Cacao* ist fest; *Ol. Croton., Morrhuae, Ovor.,* in geringerem Grade auch *Ol. Ricini,* sind dicklich, doch noch gut tropfbar; die übrigen dagegen ziemlich dünnflüssig [von der im gemeinen Leben genügend bekannten Consistenz], wenigstens sollen sie es bei der Verabreichung seyn; an der Luft aber trocknen *Ol. Lini, Nuc. Jugland. und Papav.* [so wie auch *Ol. Croton. und Ricini*] allmählig zu einer harzähnlichen, schmierigen Masse aus. — Die fetten Öle lassen sich in verschiedenen Verhältnissen mit absolutem Alcohol und mit Äther, leicht und in jedem Verhältniss mit äther. Ölen, dagegen mit wässerigen Flüssigkeiten nur durch Emulgiren, verbinden; sie lösen Wachs, Harze, Campher, Phosphor, Schwefel [diesen jedoch nur in der Hitze in ansehnlicher Quantität, wobei dann das Öl (unter Zersetzung) dick und dunkelgefärbt wird: „Schwefelbalsam“] u. s. w. auf, und verbinden sich mit den stär-

keren Basen [zum Theil schon in der Kälte] zu Seifen, wobei sich, wenn auch die Base in flüssiger Form angewandt wurde, oft die Consistenz der gemischten Flüssigkeit auffallend vermehrt [I. S. 326]. — Zu meidende Verbindungen s. I. S. 35 sub 10.

Sie eignen sich für feste Arzneiformen [ausser etwa das *Ol. Crotonis*] gar nicht, für Pillen u. Bissen höchstens in sehr geringer Menge [also auch fast ausschliesslich nur das *Ol. Crotonis*, bei welchem es, der sehr geringen Dose wegen, in der Regel nicht einmal der Subaction bedarf], für Latwergen nur subigirt [wodurch sie ungefähr Mellago-Consistenz erhalten]. Häufig dagegen nimmt man sie zu Pflastern [über Auswahl u. Quantitätsverhältnisse s. I. S. 259], Salben u. Linimenten [über die Auswahl vgl. I. S. 276; überall, wo man das Ranzigwerden möglichst vermeiden will, namentlich in Augensalben, wählt man gern *Ol. Amygd.* (namentlich das kalt ausgepresste, indem alle kalt ausgepressten Öle weniger leicht ranzig werden), *Ol. Cacao*, vgl. I. S. 283. Über die Quantitätsverhältnisse zu Salben vgl. I. S. 276; für Linimente bedarf es keiner quantitativen Angaben. Oft wendet man die Öle auch pur als Linimente an. In zum Einreiben ohne Verband bestimmten Salben und Linimenten für feine, reinliche Leute vermeidet man in der Regel die austrocknenden Öle, denn diese beschmutzen Haut und Wäsche sehr; man wählt also statt Lein-, (Mohn-) od. Nass-Öl lieber Mandel- od. Baum-Öl; nur bei Verbrennungen oder wo es sonst darauf ankommt, die fehlende Epidermis für den Augenblick gewissermassen zu ersetzen, wählt man wohl die austrocknenden]. — Um sie mit wässerigen Flüssigkeiten zu mischen, lässt man sie durch *Gm. Mimos.* oder Eigelb subigiren, zur unechten Emulsion machen [doch werden zum innerlichen Gebrauch die Emulsionen mit Eigelb leicht zu fett, unangenehm zu nehmen, also lieber mit *Gm. Mimos.*] und so zu verschiedenen Zwecken innerlich u. äusserlich anwenden. Für Lecksäfte ist es nicht immer nöthig, sie in Emulsionsform zu bringen, indem sie [namentlich *Ol. Amygdal.* oder *Papav.*] auch allenfalls die alleinige Grundlage eines Lecksaftes ohne Zusatz einer andern Flüssigkeit bilden können. — Auch ganz unvermischt wendet man sie an, innerlich jedoch in der Regel nur bei Armen oder bei Vergiftungen, öfter äusserlich zu Einreibungen [s. oben Linimente], Klystieren [namentlich *Ol. Lini* u. *Olivar.*] und anderen Einspritzungen [sie pur in die Harnblase zu spritzen, damit der Harn die Wände der Blase weniger reize, ist — ausser wo bloss der oberste Theil (*Fundus*) der Blase leidet — nicht recht zweckmässig, denn das Öl vermischt sich nicht mit dem Harn, sondern schwimmt oben auf; zweckmässiger sind zu diesem Behuf Emulsionen], u. s. w.

Oleum Absinthii aethereum. Ätherisches Wermuthöl. [Dicklich. — 1 Drachme 12 Sgr.] Innerl. zu 2-4 Tropfen einigemal tägl. — Auch wohl äusserl. zu Klystieren [R. 404 (*Fol. Tauri insp.*)], Einreibungen [in den Unterleib. R. 765 (*Ol. Nucist.*)]

Oleum Absinthii coctum s. infusum. Gekochtes od. aufgegossenes Wermuthöl. [1 Unze $1\frac{1}{3}$ Sgr.] Äusserl. zu Linimenten u. Salben.

+ **Oleum Absinthii terebinthinatum** PH. HANN. [Aus dem Wermuth mit Zusatz von Terpenthinöl destillirt. — 1 Drachme 6 Mgr.] Innerl. zu 5-15 Tropfen einigemal tägl. — Äusserl. zu Einreibungen u. dgl.

Oleum Amygdalarum. Mandelöl. [Der Zusatz *recenter paratum* od. *rec. expressum* ist für einen gewissenhaften Apotheker überflüssig, denn dieser lässt ohnehin sein Mandelöl nicht ranzig werden. Wohl aber schreibt man oft, um das Ranzigwerden im Hause des Kranken möglichst zu verhüten, namentlich in Augensalben, zweckmässig das *frigide expressum* vor. — Zum innerlichen u. äusserlichen Gebrauch das angenehmste unter den flüssigen fetten Ölen; für Arme jedoch innerlich durch *Ol. Olivar.* od. *Papaveris*, äusserlich (Augensalben bisweilen ausgenommen) durch *Ol. Rapar.* od. *Lini* zu ersetzen. — Trocknet nicht ein. — 1 Unze 6, *frigide expr.* $7\frac{1}{3}$ Sgr.]

Innerl. theelöffel- u. esslöffelweise [als Laxans eine Tasse voll — falls es ein Patient in solcher Menge hinunterbringen kann]; pur oder mit Fleischbrühe, oder in Emulsion [vgl. S. 338. — In der Regel Unc. 1 auf Unc. 6-8, doch auch auf Unc. 4-12 od. selbst-24, wenn die Emulsion etwa mehr zum Getränk bestimmt ist. — R_x 737-740; 238 (*Cera*), 243 (*Cetac.*), 787 (*Opium*). — Ungewöhnliche Darreichungsarten: R_x 239 (*Cera*), 244 (*Cetac.*), 996 (*Succ. Citri*)].

Äusserl. pur zu Einreibungen [gehen diese etwas ins Grosse (vgl. *Ol. Olivar.*), so wird doch das Mandelöl in der Regel zu theuer], Pinse- lungen u. s. w.; in Verbindungen zu Augen- u. a. Salben u. Linimenten [R_x 154 (*Bals. Peruv.*)].

737.

R_x *Ol. Amygdal.* Unc. 1
Gm. Mimos. pulv. Unc. $\frac{1}{2}$

fiant cum

Aq. comm. Unc. 8

l. a. Emulsio, in qua solve

Sacch. albi Unc. $\frac{1}{2}$.

D. S. Alle 3-2 St., umgeschüttelt, 1-2

Essl.

Emulsio oleosa RM. MILA.

738.

R_x *Ol. Amygdal.* Unc. 1

Gm. Mimos. pulv. Unc. $\frac{1}{2}$

terendo sensim misce c.

Syr. simpl. Unc. 1

Aq. Cerasor. amygdalatae Unc. 6.

D. S. Stündl., umgeschüttelt, 1 Essl.

739.

R_x *Ol. Amygdal.* Unc. 1

Gm. Mimosae pulv. Dr. 2

terendo sensim misce c.

Syr. Althaeae Unc. 2.

D. S. Stündl., umgeschüttelt, $\frac{1}{2}$ Essl.

740.

R_x *Ol. Amygdal.* Unc. $1\frac{1}{2}$

Vitell. Ovi unius

terendo sensim misce c.

Syr. Althaeae

Aq. Flor. Aurant. ana Unc. 1

Aq. Cerasor. Unt. 2.
M. D. S. Stündl., umgeschüttelt, $\frac{1}{2}$ Eeal.
 (Bei Katarren. — Eine zwar sehr

fette, aber doch nicht unangenehme Mischung.) (PH. GALL.)

Oleum Amygdalarum amararum aethereum.

Ätherisches Bittermandelöl. [Nähere Bestandtheile: ein eigenthümliches äther. Öl (Benzoylwasserstoff) und Blausäure. Schmeckt scharf, bitterlich-ätherisch, zugleich blausäureähnlich. — 1 Scrup. 7 $\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave s.* S. 333; ferner: Wasserstoffsäuren; Basen; Metall- [besonders Quecksilber-] Salze.

Innerl. zu $\frac{1}{4}$ –1 Tropfen (allmählig auch noch mehr), einigemal tägl., in verschiedenen Formen [R_x 741; 454 (*Helminthocort.*)]; am einfachsten in Alcohol od. Äther aufgelöst [z. B. 20 Tropfen mit *Spir. Fini rftiss.* Dr. 3, 4mal tägl. 10–20 Tropfen ($\frac{2}{3}$ –1 $\frac{1}{2}$ Tropfen Öl): BÖHN als gegen die heftigen Paroxysmen der Prosopalgie bisweilen hülfreich. — Eine Verbindung mit Weingeist und Wasser, die SCHRADER unter dem Namen *Aqua hydrocyanica vegetabilis* als Ersatz des nicht immer gleich starken Kirschlorbeerwassers vorschlug (*Ol. Am. am. aeth.* 1, *Spir. Fini rftiss.* 12, Wasser 132), und die zu 10–20 Tropfen (ungefähr $\frac{1}{18}$ – $\frac{1}{8}$ Gran des Öls) gegeben werden sollte, dürfte schwerlich als solcher Ersatz gelten; noch weniger eine andre von ihm unter dem Namen *Acidum hydrocyanicum vegetabile* vorgeschlagene Verbindung (*Ol. Am. am. aeth.* 1, Alcohol u. Wasser ana 9) als Ersatz der Blausäure].

Äusserl. zu Einreibungen [zu einigen Tropfen].

741.

R_x *Citrii sulphar. pulv.* Gr. 2–3
Pulv. aromat. Gr. 10
Ol. Amygdal. amar. aeth. Gtt. 1

Extr. Centaur. min. q. s.
ut f. Pilulas 10. *Cons. Pulv. Cass.*
cinnam. D. S. 1 St. vor dem Fieberanfall auf Einmal zu nehmen. (Statt R_x 106.) LOCKSTADT.

* *Oleum Anethi.* Dillöl. [1 Drachme 4 $\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. zu 2–4 Tropfen, einigemal tägl.

Oleum animale aethereum. Ol. anim. Dippelii.
Ol. C. C. rectificatum. Ol. pyro-animale depuratum. Ätherisches Thieröl; Dippelsches Öl; rectificirtes Hirschhornöl; Thieröläther. [Fast farblos; wird jedoch, unter allen Ölen am leichtesten, durch Licht und Luft braun u. dick; mit Terpenthinöl gemischt röthet es sich an der Luft. Geruch durchdringend, doch minder widrig als beim folgenden; Geschmack ebenfalls minder widrig. Reagirt alkalisch. Löst Campher, Phosphor, Harze u. s. w. auf; löst sich in jedem Verhältniss in Weingeist, Äther, wenig in Wasser. — 1 Drachme 3 Sgr.] *Cave* concentrirte Salpeter- u. Schwefelsäure [verdünnt zersetzen diese Säuren es nur langsam]; Salzbilder; Alkalien [seifenähnliche Verbindungen]; empfindliche Metallsalze; Licht. Man verordne auch nicht auf längere Zeit. — Bei der Verarbeitung zu Arzneiformen ist es wie äther. Öle zu behandeln. [Tropfenzahl etwa 140.]

Innerl. in acuten Fällen zu 5-15 Tropfen alle 2-4 St.; in chronischen zu 10-30 (-60) Tropfen 2-4mal tägl. Auf Zucker, in Mixturen [mit Naphthen, ätherischen Spiritus, ätherischen Ölen — tropfenweise. Z. B. mit *Spir. sulph. aeth. ana* zu 10-25 Tropfen (in acuten Fällen). Ry 50 (*Aeth. phosph.*). — Die grösseren Gaben in schleimigem Vehikel. — Als Auflösungsmittel des Phosphors: s. dort; Ry 797, 798], Emulsionen; selten in geringer Menge als Zusatz zu Pulvern, (Pillen) oder Bissen [weil man — wie von ätherischen Ölen — nicht viel in diese Form hinein bringen kann, u. dann auch der ungemainen Flüchtigkeit wegen].

Äusserl. [nur bei Reichen; sonst statt seiner das folgende] zu Klystieren [wie das folgende]; als Riechmittel; zu Linimenten u. Salben [seiner Theure wegen selten pur. Verbindungen mit fetten Ölen, mit *Linim. ammoniat.*, oder auch mit Spirituos, u. s. w. — Ry 742; 757 (*Ol. Hyosc. coct.*), 804 (*Phosph.*)].

742.

Ry *Ol. animal. aetheri* Dr. 1
— *Amygdalar.* Dr. 6

Saponis terebinthinati Une. $\frac{1}{4}$.
M. f. Linim. D. in vitro clauso et charta nigra obducto. S. Zum Einreiben.
SUNDELIN.

Oleum animale foetidum. Oleum Cornu Cervi. Ol. pyro-animale. Stinkendes Thieröl; Hirschhornöl; Knochenöl. [Dicklich; schwarzbraun. Geruch durchdringend und, wie der Geschmack, höchst widrig. Reagirt alkalisch. — 1 Unze $\frac{5}{8}$ Sgr.] *Cave* wie beim vorigen [Licht ausgenommen].

Innerl. [nur in chronischen Krankheiten] zu 5-20 (-50) Tropfen einigemal tägl.; am besten [als den Geruch u. Geschmack noch am erträglichsten corrigirend] mit einem [je nachdem er bloss als Corrigens oder als mitwirkendes Mittel dienen soll] mehr od. weniger grossen Zusatze von Äthereis [z. B. 1 mit 4 *Spir. sulph. aeth.*, alle 3-2 St. 15-30 Tropfen u. nach u. nach einige mehr: HORN bei chronischen Rheumatismen, besonders der Gelenke]; u. die grösseren Gaben noch in schleimigem Vehikel.

Äusserl. zu Klystieren [etwa Scr. 1, mit Wasser oder Kamillenaufguss p.p. emulgirt]; als Riechmittel [sein abscheulicher Geruch, ist bisweilen Hysterischen angenehm; *ex tempore* bereitet man ihn ihnen durch Anbrennen von Federn]; zu Linimenten u. Salben [Verbindungen wie beim vorigen. Ry 655 (*Liq. Ammon. caust.*)].

Oleum Anisi. Anisöl. [1 Drachme 2 $\frac{1}{2}$ Sgr.; *Elaeosacch.* 1 Drachme $\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave*: s. S. 333. — Innerl. zu 2-4 Tropfen (bei chronischen Metallvergiftungen zu 10-30 Tr. mit Mandelöl, Schleim: POPPE u. A.), einigemal tägl. Oft als Corrigens. — Äusserl. zu Klystieren [selten; 5-15 Tropfen], Linimenten [mit fetten oder äther. Ölen verbunden], Salben [z. B. mit Schweinefett q.s. gegen Kopfläuse.

Eine andre Applicationsart zu diesem Zweck: Rx 54 (*Aeth. sulph.*). Ohresalbe: Rx 232 (*Caston.*).

Oleum Aurantiorum Corticum. Pomeranzenschalenöl. [1 Drachme 7½ Sgr.] Innerl. zu 1–3 Tropfen einigemal tägl. — Oft als Corrigenens.

Oleum Aurantii Florum. **Oleum Neroli.** Pomeranztblüthöl. [1 Scrup. 11½ Sgr.] Innerl. zu 1–3 Tropfen einigemal tägl. — Oft als Corrigenens. — Äusserl. wie *Oleum Bergamottae*.

Oleum Bergamottae. Bergamottöl. [1 Drachme 1½ Sgr.] *Cave:* s. S. 333. — Selten innerl. zu einem Paar Tropfen. — Äusserl. seines Wohlgeruchs halber zu allerlei, namentlich kosmetischen Mitteln [Zahnpulver, Schönheits-Pulver u. Seifen, Pomaden etc.], Riechmitteln u. s. w.

Oleum Cacao. **Butyrum Cacao.** Cacaoöl. Cacaobutter. [Ceratconsistenz, noch etwas fester als Hammeltalg, aber doch weicher als Seife. — 1 Unze 10 Sgr.]

Innerl. zu Dr. ½–1 einigemal tägl., in Emulsion [s. I. S. 177. Namentlich wohl in kleinen Emulsionen als Lecksaft, z. B. Dr. 1 Öl mit *Pulv. Gm. Mimos.* Scr. 1 auf Unc. 1 Syrup (nimmt man mehr Cacaoöl, so wird eine Art Letzerge daraus; so s. B. in Rx 743)].

Äusserl. zu Stuhlzäpfchen [selten und sehr entbehrlich, da flüssiges fettes Öl (Klystier) bessere Dienste thut], Ceraten [I. S. 273], Salben [vgl. I. S. 276 (Tabelle u. sub 3.). Namentlich zu Augensalben, auch zu künstlichen Balsamen. Es wird weniger leicht ranzig als andere Fette, u. von manchen Augen besser vertragen als thierische Fette.]; auch lässt sich mit kaustischem Natron eine leichter als die gewöhnliche zu vertragende Seife für Personen mit zarter Haut daraus bereiten.

743.

Rx Olei Cacao Unc. 1

Gm. Mimosae pulv. Dr. 1
terendo in mortario calefacto sensim

misce c.

Syr. Amygdalarum Unc. 2.

D. S. Umgerührt theelöffelweise.

SUNDELIN.

Oleum Cajeputi. Cajeputöl. [1 Scrup. 1 Sgr.] Und

Oleum Cajeputi rectificatum. [1 Scrup. 1½ Sgr. — Da die

PH. BOR. durch die Vorschrift, dass das käufliche Öl, wenn es kupferhaltig ist, nur äusserlich angewandt werden dürfe, vor nachtheiliger Nebenwirkung sichert, so dürfte das rectificirte (das ziemlich farblos ist, während das käufliche grün od. gelblich) wohl keinen Vorzug verdienen.] *Cave:* s. S. 333.

Innerl. zu 1–3 (–6) Tropfen, die kleineren Gaben öfters, die grösseren ein Paar Mal tägl.; auf Zucker oder mit ätherischen Dün-

gen; in Pulver [R_y 744; 924, 925 (*Rad. Valer. min.*), 1096 (*Zinc. oxyd.*)], Pillen, Bissen, Latwerge [selten. R_y 696 (*Mosch.*)], Mixturen [R_y 51 (*Aeth. phosph.*), 656 (*Liq. Ammon. succin.*), 1071 (*Tinct. Op. simpl.*)].

Äusserl. [Surrogate: Verbindungen von Campher mit Rosmarin- od. Terpenthin-Öl u. dgl.] in Zahnpillen, Zahnlatwergen [R_y 789 (*Opium*)], Zahntropfen [pur oder in Verbindungen, in den Zahn gebracht, oder auch in die Backe eingerieben; — z. B. in der Formel R_y 1067 statt des Minzöls]; als Riechmittel [pur od. in Verbindungen. — Ein Riechpulver: R_y 89 (*Ammon. carb. crud.*)]; zu Injectionen [z. B. Ohrtropfen: R_y 197 (*Camph.*)]; auch wohl pur (vorsichtig!) auf Baumwolle ins Ohr gebracht]; als Augenmittel [nicht zu ersetzen: HIMLY. Vgl. S. 334 sub 8.]; zu Waschungen, Einreibungen [pur — z. B. in die Zunge (oder auch dafür einige Tropfen auf Zucker im Munde zergehen zu lassen), an den Schläfen, hinter den Ohren, in den Unterleib (gegen Würmer) etc. — einzureiben; oder mit Ölen, mit geistigen, ätherischen Flüssigkeiten p. p. — R_y 204 (*Camph.*), 757 (*Ol. Hyosc. coct.*), 776 (*Ol. Tereb.*)], Salben [R_y 807 (*Phosph.*)].

744.

R_y *Zinci oxydati v. hum. par.* Gr. 1
Conchar. ppt. Gr. 4
Rad. Valerian. minor. Scr. 1
Sacch. albi Scr. $\frac{1}{2}$

Ol. Cajeputi Gtt. 3.

M. f. Pulv. Disp. tales nr. 12. D. in charta cerata. S. 3 mal tägl. 1 Pulver mit dem Thee: R_y 1091. (Gegen Epilepsie.)
Vogt.

Oleum Calami. Kalmusöl. [Geschmack brennend scharf. — 1 Scrup. 3 Sgr.; *Elaeosacch.* 1 Drachme $\frac{2}{3}$ Sgr.] *Cave:* s. S. 333. — Innerl. zu 1–2 Tropfen einigemal tägl.

★★ ***Oleum camphoratum.*** Campherhaltiges Öl. [Campher 1 in *Ol. Papaveris rec. par.* 8; also Dr. 3 enthalten 1 Scrupel Campher; danach die Dose zu bemessen. — 1 Unze 2 $\frac{1}{2}$ Sgr.] Vgl. *Camphora*.

Innerl. in Emulsion [R_y 745].

Äusserl. zu Pinselungen [z. B. pur bei während der Schmier- und Hunger-Car entstandenen Mercurialgeschwüren im Munde: RUST], Zahntropfen [bei Zahnschmerz pur eingebracht] u. a. Injectionen [z. B. um ins Ohr gekrochene Insecten zu tödten, auch sonst bei Ohrschmerz u. dgl. eingetröpfelt oder auf Baumwolle eingebracht], Linimenten [offic. *Linim. ammoniato camphorat.* — 9 mit 2 Aq. Calcar.: *Linim. resolvers des Hôpit. St. Antoine* zu Paris. — R_y 1056 (*Tinct. Canthar.*)], Salben, Pflastern etc.

745.

R_y *Olei camphorati* Dr. 1 $\frac{1}{2}$ - 3
Gm. Mimos. pulv. Dr. 2
terendo sensim misce o.
Syr. Alth. Vnc. 1
Aq. Cerasor. Unc. 5

ut f. Emulsio, in qua solve

Extr. Hyoscyami Scr. $\frac{1}{2}$

Kalk nitrici dep. Dr. 2.

M. D. S. Umgeschüttelt 2 stündl. 1 Essl.
(Bei crethischer Gonorrhöe. — Vgl. R_y 189.)

† **Oleum Cantharidum infusum s. coctum** PH. SLESV.
 [Gröblich gepulverte Canthariden 1 mit Provencer Öl 4 im Wasserbade 6 St. digerirt; colirt und filtrirt. — 1 Unze 6 Shl.] Verdient innerl. versucht zu werden; etwa zu 1–3 Tropfen (und vorsichtig steigend mehr?) einigemal tägl., gut eingehüllt; entweder pur [die Einzelgaben in Schleim] oder mit einer grösseren Quantität eines fetten Öls verbunden [z. B. Scr. $\frac{1}{2}$ mit *Ol. Amygd. Unc. $\frac{1}{2}$, Gm. Mimos. pulv. Dr. 3, Wasser Unc. 4; 3mal tägl. 1–2 Essl. (Auszug von beinahe $\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{2}$ Gran Canthar.)]. — Äusserl. zu Einreibungen, Salben [mit Wachs q. s.], p. p.*

Oleum Carvi. Kümmelöl. [1 Drachme 1 $\frac{3}{4}$ Sgr.] *Cave:* s. S. 333. — Innerl. zu 2–4 Tropfen, einigemal tägl. Oft als Corrigens. — Äusserl. zu Einreibungen [mit Weingeist oder mit andern äther. od. fetten Ölen etc.], künstlichen Balsamen; als Zusatz zu Pflastern [namentlich *Emplastris stomachicis*].

Oleum Caryophyllorum. Nelkenöl. [Dicklich. Geschmack brennend scharf. — 1 Drachme 1 $\frac{1}{2}$ Sgr.; *Elaeosaceae*. 1 Drachme $\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave:* s. S. 333.

Innerl. zu 1–2 Tropfen einigemal tägl. [Pulver: R_x 233 (*Catechu*). Trochisken: R_x 874 (*Rad. Pimpinell.*).] Oft als Corrigens.

Äusserl. zu Zahnpulvern, Zahnpillen [R_x 788 (*Opium*)], Zahnlatwergen [R_x 287 (*Cort. Chin. fusc.*)], Zahntropfen [so kann z. B. in R_x 1067 statt *Ol. Ment. pip.* auch *Ol. Caryophyll.* genommen werden. — Auch pur eingebracht.], Riechmitteln, Einreibungen [mit geistigen Flüssigkeiten oder mit fetten Ölen p. p. verdünnt; auch wohl pur (z. B. in die gelähmte Zunge, vorsichtig, einzureiben). — R_x 746, 747], künstlichen Balsamen [R_x 765, 766, (*Ol. Nucist.*)], Pflastern [namentlich Magen- u. Unterleibspflastern; so zum officinellen *Empl. aromat.*], zu allerlei kosmetischen Mitteln, u. s. w.

746.

R_x *Ol. Caryophyllor.*— *Lavandul.*— *Succini rft. ana Gtt. 4**Bals. Peruv. Gtt. 6**Spir. Vini rft. Unc. $\frac{1}{2}$.*

M. et post sufficientem macerationem filtra per gossypium. D. S. Ums Auge einzureiben. (Gegen Augenschwäche.)

Spiritus ophthalmicus. HIMLY.
 Die beliebte Formel dürfte sich in der Wirkung von der officinellen *Mixt-oleo-*

eo-bals. wenig unterscheiden.

747.

R_x *Ol. Nucistae Dr. $\frac{1}{2}$* *terendo misce c.**Spir. Juniperi Unc. 2**adde**Ol. Caryophyllor. Dr. $\frac{1}{2}$.*

M. D. S. Umgeschüttelt einzureiben (z. B. in den Unterleib bei Durchfällen, in das Rückgrat bei Veitstanz u. s. w.).

ROSENSTEIN. CHRISTIEN.

Oleum Cassiae cinnamomeae. Zimmtcassienöl.

[Geschmack brennend scharf. — 1 Drachme $2\frac{1}{2}$ Sgr.; *Elaeosacch.* (*Cinnamom.*, s. S. 150) 1 Drachme $\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave:* s. S. 333. — Innerl. zu 1–2 Tropfen, mehrmals tägl. [Ry 748; Pulver: Ry 167 (*Borax*), 936 (*Rad. Zingib.*)]; bei Metrorrhagien (in verzweifelten Fällen) viel rascher hinter einander [z. B. 10 Tropfen in *Aeth. sulphur.* Dr. $\frac{1}{2}$, davon alle $\frac{1}{2}$ St. 10–15 Tropfen in etwas Thee oder Wein]. — Oft als Corrigen. — Äusserl. zu Zahnpulvern, Zahnlatwergen, Zahntropfen [bisweilen pur eingebracht], kosmetischen Mitteln u. s. w.

748.

Ry *Elaeos. Cinnamomi* (Gtt. 10) Dr. 2
Fitell. Ori unius
terendo sensim misce c.

Aq. comm. Unc. 2
— *Cinnam. simpl.*
Vini Hispanici ana Unc. 3.
D. S. Umgeschüttelt einigemal tägl.
 $\frac{1}{2}$ Weinglas. (BRANDE.)

Oleum Chamomillae citratum. Citronenölhaltiges Kamillenöl. [Aus Kamillenblumen 480 mit Zusatz von *Ol. Corticis Citri* 1 u. Wasser q. s. destillirt. — Saturirt blau. — Surrogat des noch theureren *Ol. Chamom. simplex.* — 1 Scrup. $16\frac{1}{2}$ Sgr.; *Elaeosacch.* (*Chamomillae* schlechweg, s. S. 150) 1 Drachme $2\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. in etwas grössern Gaben als *Ol. Chamom. simplex.* [Ry 246 (*Chinam. sulph.*). Vgl. *Tinct. Castor. aeth.*] — Äusserl. zu Einreibungen [etwa mit einem fetten Öl vermischt. — Ry 790 (*Opium*)] u. s. w.

Oleum Chamomillae coctum s. infusum. Gekochtes od. aufgegossenes Kamillenöl. [1 Unze $1\frac{2}{3}$ Sgr.] Äusserl. zu Klystieren [Unc. $\frac{1}{2}$ –1, emulgiert. — Ry 1068 (*Tinct. Opii croc.*)] u. a. Injectionsen, zu Linimenten u. Salben [wie *Ol. Hyosc. coct.* — Ry 204 (*Camph.*)], selten zu Pflastern [Ry 755 (*Ol. Camini*)].

Oleum Chamomillae simplex s. aethereum. Einfaches (reines, ätherisches) Kamillenöl. [Consistenz fast butterartig. — Intensiv blau. — 1 Scrup. $30\frac{5}{8}$ Sgr.] Innerl. zu 1–3 Tropfen einigemal tägl., auf Zucker oder mit Äther, in Pillen [Ry 355 (*Extr. Chamom. vulg.*)] u. s. w. [Als Zusatz zu Brechmitteln: vgl. *Rad. Ipecac.*] — Äusserl. das wohlfeilere *Ol. Chamom. citratum*.

* *Oleum Chamomillae terebinthinatum.* Terpen-
thinölhaltiges Kamillenöl. [Aus Kamillenblumen 60 mit Zusatz von *Ol. Terebinth.* 1 u. hinreichendem Wasser destillirt. — Hellblau. — 1 Drachme 6 Sgr.] Ist wohl weniger zum innerlichen Gebrauch [etwa zu 2–8 Tropfen] als zum äusserlichen, zu Einreibungen, Linimenten u. s. w. [wozu es sich durch seinen mässigen Preis empfiehlt] bestimmt.

Oleum Cinnamomi acuti. Zimmtöl. [Geschmack brennend scharf. — 1 Scrup. 11½ Sgr. — Man vergesse, namentlich beim Ölzucker, den Zusatz *acuti* nicht, wenn man dieses u. nicht das etwas weniger angenehme, aber wohlfeilere Zimmtcassienöl haben will, vgl. S. 150.] *Cave:* s. S. 333. — Innerl. zu ½–1½ Tropfen mehrmals tägl. Als Corrigen.

Oleum Citri Corticis. **Oleum de Cedro.** Citronenöl. Cedroöl. [In wasserhaltigem Alcohol schwerauflöslich; schon von *Spir. V. rftiss.* erfordert es 10 Theile. — 1 Drachme 1½ Sgr.; *Elucosacch.* 1 Drachme ½ Sgr. (Das durch Reiben von Citronen bereitete *Elucosacch.* ist bitterer, Manchem angenehmer, aber in seiner Stärke weniger bestimmt.)] *Cave:* s. S. 333.

Innerl. zu 2–4 Tropfen einigemal tägl. Oft als Corrigen [als Geschmacks Corrigen namentlich bei manchen, ekelhaft schmeckenden Arzneien, z. B. *Rad. Jalap.*, *Ipecac.*, Senna – Aufgüssen u. s. w.].

Aüsserl. als Augenmittel [*ex tempore* bereitet, indem man alle 2–4 St. aus einem frisch abgeschnittenen und vor das Auge gehaltenen Stück einer Citronenschale es auspresst und in das Auge spritzen lässt: WERLITZ bei verschiedenen asthenischen Augenkrankheiten: vgl. v. GRAFE u. v. WALTHER *Journ.* Bd. 13. S. 224 ff.]; ausserdem wie *Ol. Bergamottae* [namentlich auch, weil es den Haarwuchs befördern soll, zu Haarpomaden], [*Sabbe:* Ry 1104 (*Zinc. oxyd. v. hum. par.*)].

† **Oleum Conii coctum** od. [eigentlich] *infusum* PH. SLESV. Anhg. [1 Unze 3 Shl.] Aüsserl. etwa wie *Ol. Hyosc. coct.*

* **Oleum Crotonis.** Crotonöl. Granatillöl. [Einhält einen flüchtigen, sehr scharfen, heftig purgirenden, Stoff. — Dicklich; von brennend-scharfem Nachgeschmack. — 1 Scrup. 8½ Sgr., *Sol. Spir. V. rftiss.* 36; leichter in Schwefeläther. — *Cave:* s. I. S. 35 sub 10.; auch Wärme.

Innerl. (*ad Guttam unam!*) zu ½–¼–¼ Tropfen (nur in ganz verzweifelten Fällen, oder bei Geisteskranken bisweilen, zu 1–2 Tropfen) alle 3–2–1 St. [Es als ein gewöhnliches Abführmittel — wie wohl empfohlen — zu geben, kann wegen seiner ungemein heftigen u. unangenehmen Wirkung durchaus nicht gebilligt werden.] Am besten in gut einhüllenden Formen, also wohl weniger zweckmässig in Pulver [Ry 749] oder Trochiscen [falls diese nämlich zerkaut werden sollen; sollen sie aber ganz verschluckt werden, so verdienen wohl Pillen od. Bissen den Vorzug. — Ry 750], als mit einem milden fetten Öl vermischt [z. B. Gtt. 2 mit *Ol. Papav.* Unc. 2, eesöffelweise (ungefähr ½ Tropfen), statt des Ricinusöls: *Ol. Ricini artificiale* PH. P. (1 Unze 1½ Sgr.)] und auf diese Weise etwa noch zur Emulsion gemacht [Ry 753], oder mit einem Syrup, mit Syrup und Schleim [Ry 754] verbunden; oder wohl am allerbesten — um auch das Brennen im Munde und so viel als möglich die Uebelkeit u.

Vomiturition, die es gern macht, zu verhüten — in Pillen od. Bissen [etwa mit Seife, wodurch man es recht gleichförmig subigiren kann, Ry 751, 752]. Auch hat man vorgeschlagen, es in Alcohol (Gtt. 1 in Dr. 1) aufgelöst zu geben, oder hat eine Seife daraus gemacht [z. B. mit der Hälfte sogenannter Seifensiederlauge (CAVENTOU; dann zu Gr. 1-2 p. dost) oder mit Natron (MORSON). Es lässt sich auf diese Art die Gabe genauer bestimmen als nach Tropfen. Man kann die Seife in Pillen oder Auflösung geben]; doch brennen die Tinctur und die Seife eben so im Halse wie das reine Öl [und es dürfte ihnen deshalb wohl die Darreichung des letzteren in Pillen meist vorzuziehen seyn].

Aüsserl. zu Klystieren [1-2-4 Tropfen, nebst einem Paar Unzen Leinöl, mit Wasser, einer Althäenabkochung od. dgl., auch wohl einem Tabacksaufguss, emulgirt], Einreibungen [um ein künstliches Exanthem zu erzeugen (nicht aber in der Regel, um zu purgiren, denn dies erfolgt hierbei nur selten); rascher und milder wirkend als der Brechweinstein. Man reibt 2-20 Tropfen (nach dem Umfang der Stelle) 5 oder selbst 10 Minuten lang ein (bei torpider Haut mit Flanell, stark frottirend), und wiederholt dies in chronischen Fällen nach 24-12, in acuteren nach 6-3 St. Selten sind mehr als 2-3 Einreibungen nöthig. Bei reizbarer Haut (Kindern, Frauen) wende man das Öl verdünnt (etwa mit einem fetten oder äther. Öl, z. B. Mandel-, Terpenthin-, Rosmarin- od. Minz-Öl, ana) an; hier reicht auch oft schon Eine Application hin. Der Ausschlag entwickelt sich am schönsten und verläuft am gleichförmigsten auf zellgewebereichen Stellen. — Man hat auch Einreibungen von 1-2 Tropfen in die Zunge bei Fothergill'schem Gesichtsschmerz empfohlen, — wohl nicht nachahmenswerth.], Salben [selten. In Verbindung mit Opium zum Einreiben bei Gesichtsschmerz. Aber das reine Öl, s. oben, ist wohl vorzuziehen]. Die endermatische Methode giebt nur ungünstige Resultate.

749.

Ry Olei Crotonis Gtt. 2

— Foenic. Gtt. 4

Sacch. albi Scr. 8.

M. f. Pulv. Div. in 8 part. ñeq. D. in charta cerata. S. 2stündl. 1 Pulver.

SCHUBARTH.

750.

Ry Olei Crotonis Gtt. 2

Sacch. albi pulv. Dr. 1

Mucil. Gm. Tragac. q. s.

ut f. Trochisci, non torrendi, Pulv. Sem. Foenic. consperg., nr. 8. D. — 2stündl. 1 Stück bis zur Wirkung. (SEILER.)

751.

MEASED's Bandwurmcür,
Drei Tage hinter einander des Morgens
2 Tassen schwarzen Kaffees mit Zucker,

um 9 Uhr Sardellen- od. Häring-Salat mit vielem Öl u. Zwiebeln, Mittags Rindfleisch mit gekochtem Meerrettig, Abends frisch geriebenen Meerrettig mit Öl u. Essig. Am Morgen des 4ten Tages nächstern folgende Pillen:

Ry Olei Crotonis Gtt. 4

terendo bene misce c.

Saponis medic. pulv. Dr. $\frac{1}{2}$

tuno adde

Rad. Jalap. pulv. Dr. $\frac{1}{2}$

Extr. Filicis aether. Scr. 1

— Glycyrrhiz. q. s.

ut f. Pilulas 40. Consp. Pulv. Cass. cinam. D. S. Alle 2-1 St. 4-5 Stück. (Der Autor hat + Extr. Jalap. aquos., das sich hier wohl durch die Wurzel wird ersetzen lassen.)

Nebenbei an diesem Tage folgende Tisane:

b.

Ry *Helminthocorti**Rad. Filicis acrost.* ana Unc. $\frac{1}{2}$ *coq. c. Aq. camm. L.* 1 ad Colat. Unc. 8.*D. S.* Von Zeit zu Zeit $\frac{1}{2}$ Tasse.

752.

Ry *Olei Crotonis* Gtt. 2*terendo bene misce c.**Sapon. medic. pulv.* Scr. $\frac{1}{2}$ *tunc adde**Pulu. Sem. Foenic.* Dr. $\frac{1}{4}$ *Extr. Tereosaci liq. q. s.**ut f. Pilulae 24. Consp. Sem. Foenic.**D. S.* Alle 3-2 St. 2-4 Stück ($\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{2}$ Tropfen), — (Statt des Fenchelpulvers könnte

man auch zur Verstärkung der Wirkung

Jalapenpulver u. ein Paar Tropfen Fenchelöl,

statt des *Sapo medicat.* auch wohl*Sapo jalapin.* nehmen ad, dgl.)**Oleum Cumini.** Mutterkümmelöl. [1 Drachme $3\frac{1}{2}$ Sgr.]Innerl. zu 2-4 Tropfen, einigemal tägl. — Äusserl. wie *Ol.**Cassia* [z. B. mit Mandelöl auf den Unterleib einzureiben, bei Krampfkrankheiten

derselben. — Ry 755].

755.

Ry *Empl. Litharg. simpl.* Unc. $\frac{1}{2}$ *Ceras flavae* Dr. 1*Ol. Chastom. cocti* Dr. 2.*Leni cal. liquatis et ab igne remotis**adde**Ol. Cumini* Gr. $2\frac{1}{2}$ (Gtt. 5)*Pulu. subtiliss. Sem. Cumini* Dr. 2.*M. exacte, f. Empl. D. S.* Auf Leder

gestrichen auf den Unterleib zu legen.

(Bei Flatulenz, Tympanitis, hysterischen

Affectionen.)

Empl. Cumini PH. HANN.

(1 Unze 4 Mgr.)

Oleum Foeniculi. Fenchelöl. [1 Drachme $2\frac{1}{8}$ Sgr.; *Elaco-**sacch.* 1 Drachme $\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. zu 2-5 Tropfen einigemal tägl., in

den gewöhnlichen Formen, auch wohl mit einem fetten Öl [z. B. Man-

delöl] als Lecksaft. Als Corrigen. — Äusserl. zu Einrei-

bungen [mit geistigen Flüssigkeiten, andern ätherischen Ölen; — selten].

Oleum Galbani. Mutterharzöl. [1 scrup. 3 Sgr.] In-nerl. [selten] zu 2-5 Tropfen, einigemal tägl. [Ry 781 (*Ol. Faler.*)]

— Äusserl. als Riechmittel, zu Einreibungen [nament-

lich in den Unterleib, mit andern äther. oder fetten Ölen, flüchtigem Liniment

u. dgl.], Salben [selten. Ry 542 (*Hydrarg. muriat. nite*)].**Oleum Hyoscyami coctum s. infusum.** GekochtesBilsenkrautöl. [1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr.] Selten innerl., zu Scr. 1-Dr. $\frac{1}{2}$

753.

Ry *Olei Crotonis* Gtt. 3— *Amygdalarum* Unc. $\frac{1}{2}$ *Gm. Mimosae pulv.* Dr. 2*terendo sensim misce c.**Syr. Flor. Aurant.* Unc. 1*Aq. Chamomill.* Unc. 5.*D. S.* Umgeschüttelt 2stündl. 1 Essl. bis

zur Wirkung.

754.

Ry *Ol. Crotonis* Gtt. 1-2— *Chamomill. simpl.* Gtt. 2*terendo misce c.**Mucil. Gm. Mimos.**Syr. Amygdal.* ana Unc. $\frac{1}{2}$.*D. S.* Umgeschüttelt 2stündl. 1 Thee-

lößel.

LOCKSTAEDT.

p. dosi, in Emulsion [lieber eine Emulsion mit einem gewöhnlichen fetten Öl u. *Extr. Hyosc.* darin aufgelöst. — R_y 756]. Häufiger äusserl. zu Klystieren [Dr. 1–4, emulgirt] u. a. Injectionen [z. B. tropfenweise, erwärmt, in den Gehörgang], Linimenten u. Salben [theils pur, theils mit andern schmerzstillenden Dingen, theils als schmerz- u. krampfstillender Zusatz zu reizenden, z. B. 3 Theile mit 1 Theil *Liq. Ammon. caust.* als magistrates *Liniment. ammoniat.* (vgl. R_y 641); u. s. w. — R_y 757; 764 (*Ol. Nucist.*); vgl. *Extr. Bellad.*].

756.

R_y *Ol. Hyosc. cocti* Unz. $\frac{1}{2}$
Gm. Zimos. pulv. Dr. 6
terendo sensim misce o.
Syr. Alk. Unc. 1
Aq. Cerasor. Unc. 6.
D. S. Stündl., umgeschüttelt, 2 Essl. (Bei krampfhaften Bluthusten.) RICHTER.

757.

R_y *Ol. Nucistas* Dr. 2
 — *Hyosc. cocti* Dr. 3.
Leni col. liquatis admisce
Ol. animal. äther.
 — *Cajeputi ana* Dr. $\frac{1}{2}$.
D. in olla alba. S. In den Rückgrat einzureiben. (Bei Krämpfen.) VOGT.

**Oleum Hyperici coctum s. infusum.* Gekochtes Johanniskrautöl. [Durch Alkanna roth gefärbt. — 1 Unze 1 $\frac{3}{4}$ Sgr.] Äusserl. zu Linimenten, Salben [R_y 1047 (*Tereb.*)], als Verbandmittel u. s. w.

Oleum Juniperi Baccarum. Wachholderbeeröl.

[1 Drachme 6 Sgr. — *Aqua Junip.* PH. MIL. ist eine Auflösung von *Elaeosacch. Junip.* 1 in *Aq. comm.* 64.] *Cave:* s. S. 333. — Innerl. zu 2–4 Tropfen einigemal tägl. [R_y 758; 138 (*Bacc. Junip.*), 466 (*Hb. Digital.*), 899, 900, 909 (*Rad. Scill.*)] — Äusserl. zu Einreibungen [z. B. mit *Spir. Junip.* oder einem ähnlichen bei kalten Geschwülsten, Lähmungen u. s. w., mit einem fetten Öl bei Wurmzufällen in den Unterleib; etc.].

758.

R_y *Ol. Juniperi Baccar.* Ser. $\frac{1}{2}$
Spir. nitrico-aether.
Tinct. Digital. aether. ana Dr. 1.
M. D. S. 3 stündl. 20–30 Tropfen.

(Bewährtes Diureticum, das auch, da es den Magen nicht angreift, lange fortgebraucht werden kann.)

Tinctura diuretica PH. P.
 (1 Drachme 1 $\frac{1}{2}$ Sgr.)

Oleum Lauri s. laurinum. Lorbeeröl. Looröl.

[Ätherisch-fettes Öl von Salbenconsistenz: 1 Theil mit $\frac{1}{2}$ – $\frac{1}{2}$ Wachs zusammen geschmolzen giebt ein Cerat, mit 1–1 $\frac{1}{2}$ Wachs od. Harz ein Pflaster. — In Schwefeläther ist es vollständig auflöslich, in Weingeist haupttächlich nur der ätherische Bestandtheil. — 1 Unze 2 Sgr. Der wohlfeilste Stellvertreter aller „künstlichen Balsame.“] Nur äusserl., zu Pflastern [R_y 759], Ceraten, Salben [R_y 760; 1087 (*JASSER's* Krätzsalbe). Vgl. auch † *Ungt. pedicular.*], Linimenten.

759.

R_y *Rosin. Pini Bergund.* Dr. 3

Ol. Nucistas
 — *Lauri ana* Dr. 1

liquefactis admisce

Ol. Rorismar. Scr. 1.

F. Emplastr. D. S. Magenpflaster.

760.

Ry *Ungt. simpl.* Scr. 20

Cerae flavae

Ol. Lauri ana Scr. 2.

Leni igne liquecant et refrigeratis addo

Ol. Junip. Baccar.

— *Menth. crisp.*

— *Rorismar.*

— *Lavand. ana* Gr. $3\frac{1}{2}$ (Gtt. 5-6).

M. D. —

Ungt. nervinum s. aromaticum PH.

AUSTR.

Zweckmässiger wäre es, das *Ol. Lauri* nicht gleich mitschmelzen, sondern erst der erkalteten oder fast erkalteten Masse zuzumischen, was recht gut angeht. — Da die Composition viel schwächer als das unvermischte Looöl ist, auch wohl, selbst im Grossen bereitet, verhältnissmässig theurer wird, insofern man mehr davon braucht, so dürfte sie nur etwa dann passen, wenn der Geruch des unvermischten Looöls zu stark und nicht angenehm genug scheint und es auf einige Erhöhung des Preises nicht ankommt. In der Regel wird man aber, wenn man den Geruch des Looöls durch Verbindung mit Fett mildern will, doch nicht so viel Fett nehmen.

Oleum Lavandulae. Lavendelöl. [1 Drachme $\frac{2}{3}$ Sgr.]
Cave: s. S. 333. — Innerl. [ausser in der *Mixt. oleoso-balsam.*, selten] zu 2-4 Tropfen. — Aüsserl. seltner als eigentliches Medicament [HINLY's *Spirit. ophthalm.*: Ry 746], häufiger bloss als wohlriechender Zusatz zu allerlei, namentlich kosmetischen Mitteln.

Oleum Lini. Leinöl. — Innerlich verordne man immer das vom Apotheker selbst bereitete *O. L. recenter paratum s. expressum*. [Trocknet ein. — 1 Unze $1\frac{1}{8}$, *rec. expr.* 4 Sgr.]

Innerl. [selten] theelöffel- u. esslöffelweise; pur oder in Emulsion [wie *Ol. Olivar.*] oder mit Fleischbrühe.

Aüsserl. zu Klystieren [zu einfachen eröffnenden Hausklystieren ist das Leinöl mehr als Baum-, Mohn- u. Mandelöl beliebt, weil es etwas stärker auf den Stuhlgang wirken soll; doch nimmt man auch, wenn man kein Leinöl zur Hand hat, Baumöl od. Rüböl recht gern. Man nimmt von diesen Ölen 1-2 Unzen (2-4 starke Essl.) zu einem Klystier, mit 2-3 Tassen Wasser oder Kamillenthee, setzt auch wohl noch 1 Esslöffel Kochsalz, oder $\frac{1}{2}$ - 1 Loth weisse Hausseife, oder einige Esslöffel Honig, oder 2 Loth Zucker p. p. zu. Ein genaues Mischen dieser Ingredientien wie zum innerlichen Gebrauch ist nicht eben nöthig; man löst nur Seife, Salz od. Zucker in dem heissen Wasser od. Thee auf, zieht diese Auflösung und das Öl in die Spritze, schüttelt tüchtig durch einander und spritzt ein, sobald die Temperatur der Flüssigkeit so mässig geworden, dass man die Spritze an den Lippen leiden kann. — Vorschriften zu stärker ausleerenden Klystieren sind: $1\frac{1}{2}$ Loth Bittersalz, 2 Loth Sauerhonig, 2 starke Essl. Öl, 2 Tassen Haferschleim: BERENDS. Oder: 2 Loth Glaubersalz, 2 starke Essl. Öl, eben so viel Essig, eine grosse Tasse Haferschleim: SUNDELIN (schnell und kräftig wirkend, daher bei Hirnentzündungen, Schlagflüssen u. s. w.). Oder Ry 1051 (*Tinct. Asae foet.*). — Eine Vorschrift zu einem ausleerenden Klystier für sensible Individuen nach BERENDS: 3 Loth Zucker, 4 starke Essl. Baumöl, 2 Eidotter, eine grosse Tasse Kamillenthee; zu Salben u. Linimenten [vgl. S. 338. — 12 Unz.

mit 4–5 Eidottern, alle 2–1 St. aufzustreichen; MYNSICHT bei Verbrennungen. Vgl. R_x 9 (*Acet. plumb.*), auch *Aq. Calcar.*].

Oleum Lini sulphuratum. *Corpus pro Balsamo Sulphuris. Balsamum Sulphuris simplex.* Geschwefeltes Leinöl. Einfacher Schwefelbalsam. [1 Schwefel in 4 Leinöl aufgelöst. — Eine elastische schwarzbraune Masse, die sehr unangenehm riecht u. erwärmt Dämpfe von Schwefelwasserstoffgas ausstößt. — 1 Unze $1\frac{2}{3}$ Sgr.] Höchstens noch äusserl., zu Einreibungen [in kalte Geschwülste, Tophen u. s. w., oder mit *Petrol.*, *Tinct. Asae foet.*, Knoblauchsaff in Frosthöhlen], als Verbandmittel [bei schlaffen Geschwüren].

Oleum Macidis. Muskatoblüthöl. [1 Drachme $5\frac{5}{8}$ Sgr.] *Cave:* s. S. 333. — Innerl. zu 1–3 Tropfen mehrmals tägl. [z. B. mit 6 Theilen *Spir. sulph. aeth.*, 2stündl. 12 Tropfen: KRAUS zur Auflösung von Gallensteinen (statt des Terpenthinöls)]. Oft als Corrigens. — Äusserl. als Zusatz zu Einreibungen, künstlichen Balsamen [R_x 765 (*Ol. Nucist.*)] u. dgl.

Oleum Majoranae. Majoranöl. [Frisch dünnflüssig; alt zähe, von salbenartiger Consistenz. — 1 Drachme 14 Sgr.] Innerl. [außer etwa in der *Mixt. oleoso-balsam.*, selten] zu 1–3 Tropfen ($\frac{1}{2}$ –2 Gran) einigemal tägl. — Äusserl. als Zusatz zu Einreibungen, künstlichen Balsamen.

Oleum Menthae crispae. Krauseminzöl. [1 Scrup. $4\frac{1}{8}$ Sgr.] Innerl. zu 1–3 Tropfen, einigemal tägl. [R_x 247 (*Chinium sulph.*)] — Äusserl. [in der Regel zieht man hier das eindringlichere und minder theure *Ol. Menth. pip.* vor] zu Einreibungen, künstl. Balsamen, als Zusatz zu Pflastern u. s. w.

† **Oleum Menthae crispae coctum** od. [eigentlich] *infusum* PH. SLESV. Anhg. [1 Unze 3 Sbl.] Zu Linimenten, Salben.

* **Oleum Menthae crispae terebinthinatum.** [Das Öl aus der Krauseminze mit Zusatz von Terpenthinöl destillirt. — 1 Drachme 2 Sgr.] Nur äusserl., wie *Ol. Menth. crisp.*

Oleum Menthae piperitae. Pfefferminzöl. [1 Drachme $5\frac{5}{8}$ Sgr.; *Elaeosacch.* 1 Drachme $\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerl. zu 1–3 Tropfen, einigemal tägl.; auf Zucker, mit Äther, Hoffmannstropfen u. dgl., oder in Pulver [R_x 384 (*Extr. Nuc. Vom. spirit.*); vgl. *Hb. Menth. pip.*], Zuckerwerkformen [offic. Ro-

tuqae. — Marseille: Ry 833 (*Rad. Calami*), Mixturen [Ry 761; 1071 (*Tinct. Opii simpl.*)] u. s. w. Oft als Corrigan.

Aüsserl. zu Zahntropfen [Ry 1067 (*Tinct. Opii croc.*)], Riechpulvern [Ry 89 (*Ammon. carbon. crud.*)], Einreibungen [namentlich ums Auge, pur oder mit Äther, Cajeput-Öl u. dgl. — Reizt leicht zum Thränen, wirkt überhaupt sehr stark auf das Auge; daher vorsichtig anzuwenden, zuerst nur als Augendunsthed (I. S. 385). Ry 651 (*Liq. Ammon. caust.*), 804 (*Phosph.*); vgl. auch *Ol. Rorismar.*], Salben [Ry 765 (*Ol. Nucist.*), 806 (*Phosph.*)], als Zusatz zu Pflastern, u. s. w.

761.

Ry *Elaeos. Menth. pip.* (Gtt. 10) Dr. 2

solve in

Aq. Menth. pip. Unc. 5

adde

Spir. sulphurico-aetherel Dr. 1.

M. D. S. Stündl. 1 Essl. (Bei typhösen Fiebern mit Torpidität der Verdauungsorgane.)

RICHTER.

Eine Verbindung von 12 Tropfen *Ol. Menth. pip.* mit *Spir. sulph. aeth.* Dr. 1, stündl. 12 Tropfen auf Zucker, thut dasselbe und ist merklich wohlfeiler.

**Oleum Morrhuae s. Jecoris Aselli.* Leberthran.

Stockfischleberthran. Berger Leberthran. Kabliauthran. [Man unterscheidet 3 Sorten: 1) den weissen, weiss- od. hell-blanken (gelblich und klar — aus der frischen Leber durch die Sonnenwärme erhalten); 2) den braunen, braun- od. dunkel-blanken (übrigens klaren — aus der faulenden Leber durch die Sonnenwärme erhalten); 3) den empyreumatischen (dunkel in verschiedenen Farben, meist braun, trübe — aus der faulenden Leber ausgebraten). Nach einigen Angaben sollen die beiden letzteren, freilich besonders unangenehmen Sorten die wirksameren seyn. Die PH. HANN. führt nur die erste auf, die PH. BOR. nur die 2te, die PH. SLESV. die 1te und 3te. — Alle 3 Sorten sind dicklich. — 1 Unze 1 $\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerl. zu 1 Essl. 2-4mal (u. öfter) tägl. (Kindern u. Schwächlingen 1 Theelöffel - $\frac{1}{2}$ Essl.); pur [hinterher den Mund mit Pfefferminzwasser ausspülen oder ein Pfefferminzküchlein verzehren. Zur Unterstützung der Verdauung allenfalls in den Zwischenzeiten leichte bitter-aromatische Mittel. — CARRON DU VILLARDS lässt es eelöffelweise mit Bittermandelmilch nehmen, oder es auch mit einer gleichen Quantität Citronensaft zusammenschlagen, wodurch besonders das widrige Aufstossen sehr gemindert wird. — RICHTER (in Wiesbaden) gegen veraltete Hautkrankheiten: tägl. 6-10 Essl. des braunen; dabei schwerverdauliche, blähende, fette, stark gesalzene und besonders saure Nahrungsmittel zu meiden; Spirituosa höchstens mässig; so meist 6-12 Wochen.], seltner in Verbindungen [Ry 762].

Aüsserl. zu Klystieren [3-4 Essl.], Einreibungen [pur (u. B. bei *Tinea capitis favosa* früh u. Abends die Stellen damit einzureiben; dabei innerl. Holzthee: GUERARD) oder mit Äther, Ammonium (etwa als magistrales *Lérim. ammoniat.*)].

762.

Ry *Ol. Morrhuae Unc. 1*

— *Calami Gtt. 3*

Liq. Kali carbon. Dr. 2

Syr. Cort. Aurant. Unc. 1.

M. D. S. Umgeschüttelt früh u. Abends 1-2 Theelöffel. (Bei Rhachitis.)

FERR.

Oleum Myrrhae. Myrrhenöl. [Nicht mit dem nur so genannten *Ol. Myrrh.* der PH. HANN. od. SLESV. (S. 305) zu verwechseln. — 1 Scrup. 5½ Sgr.] Innerl. ein Paar Tropfen einigemal tägl. — Äusserl. zu Zahnpulvern [Ry 392 (*Extr. Ratanh.*)].

Oleum (Balsamum s. Butyrum) Nucistae. Muskatennussöl. Muskat-Balsam od. - Butter. Doch wird die Benennung *Balsamum Nucistae* jetzt von der PH. BOR. für ein Compositum (s. S. 83) gebraucht. [Ätherisch-fettes Öl von Ceratconsistenz, etwas brüchiger als Hammeltalg. — 1 Drachme ½ Sgr.]

Innerl. (selten) zu Gr. 5-10 mehrmals tägl., in Emulsion [I. S. 177. — Ry 763].

Äusserl. zu Linimenten u. Salben [künstlichen Balsamen. Ausser dem officinellen *Balsam. Nucist.* (S. 83), welches zum Einreiben fast etwas zu steif ist, mögen noch Ry 764-766 (von welchen 765 u. 766 stärker sind) Platz finden. — Ry 681 (*Mixt. oleoso-bals.*), 747 (*Ol. Caryophyllor.*), 757 (*Ol. Hyosc. coct.*)], Pflastern [namentlich Magenpflastern. Ry 759 (*Ol. Lauri*)].

763.

Ry *Olei Nucistae* Dr. 1
in mort. calefacto Equatas adde
Gm. Mimos. pulv. Dr. 2
et terendo sensim misce c.
Syr. Cort. Aurant. Unc. 1
Aq. Cinnam. simpl. Unc. 4.
D. S. 3 stündl., umgeschüttelt, 1 Essl.
(Bei Diarrhöe u. s. w.)

(SUNDELIN.)

764.

Ry *Ol. Nucistae* Dr. 1½
leni calore liquefactis admisce
Ol. Hyosc. cocti Unc. 1
— *Rorismar.* Dr. 1½.
M.D.S. Theelöffelweise in den Unterleib
einzureiben.

VOGT.

765.

Ry *Ol. Nucistae* Scr. 8
Bals. Peruv. Scr. 1
Ol. Absinth. aether.
— *Caryophyllor.*
— *Macidis*
— *Menth. pip.* ana Scr. ½.
M. D. —
Balsam. stomachicum PH. SLESV.
(1 Drachme 8 Sbl.)

766.

Ry *Ol. Nucistae* Dr. 2.
leni calore liquefactis admisce
Ol. Caryophyll. Scr. ½
Balsami Peruv. Dr. ½
Moschi Gr. 1.
M.D. in vitro orificio amplo, bene clauso.
S. In die Schläfengegend einzureiben.

Oleum Nucum Juglandis. Wallnussöl. Nussöl. [Trochnet ein. — 1 Unze 6, *frigido-expr.* 9 Sgr.] Selten innerl. [einige Essl. nüchtern verschluckt und Muskatwein nachgetrunken: Hausmittel gegen Bandwurm]. — Äusserl. pur zum Eintröpfeln bei Hornhautverdunkelungen [wo man das ranzig gewordene vorzieht], zu Einreibungen [z. B. bei Flechten 2-3mal tägl.: HUFELAND]; auch als Constituens von Linimenten u. Salben [z. B. Ry 725], namentlich fürs Auge [hier auch bisweilen, zumal ranzig, als mitwirkendes Mittel zu betrachten, namentlich wo die ranzige Säure sich mit Basen verbinden kann. — Ry 1105 (*Zinc. oxyd.*)]; vgl. *Hydrarg. oxydulat. nigr.*, *Liq. Ammon. caust.*].

Oleum Olivarum. Olivenöl. Baumöl. [Innerlich verordne man immer, bei Wohlhabenden auch äusserlich, das *Ol. Oliv. Provinciale*, Provençer Öl, das fast geruch- u. geschmacklos ist, während das gewöhnliche unangenehm riecht u. schmeckt. — Trocknet nicht ein. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$ Provinc. $2\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerl. theelöffel- u. esslöffelweise [bei *Arthritis vaga* zu Unc. $\frac{1}{2}$, 3–4 mal tägl.; wenn es nicht hinreichend auf die Darmausleerungen wirkt, noch mit etwas Kochsalz: *MALACARNE*, *MARINO* u. A. — Zur Schützung des Magens gegen chemisch oder mechanisch beleidigende Ingesta esslöffelweise so lange als nöthig]; pur [bisweilen mit Fleischbrühe] oder in Emulsion [In der Regel etwa Unc. 1 auf Unc. 6–8 (doch auch $\frac{1}{2}$ –12); man wählt jedoch, wenn man zum innerlichen Gebrauch ein flüssiges fettes Öl aus der Apotheke entnehmen will, häufiger (wenigstens für Wohlhabende) *Ol. Amygdal.* als das angenehmste. — Ungewöhnliche Composition: R_x 152 (*Bals. Peruv.*)].

Äusserl. theils pur zu Einspritzungen [z. B. gegen krampf- hafte Harnverhaltung], Einreibungen [z. B. gegen hektische u. colligative Schweisse alle 3–4 Tage einige Unzen: *NASSE* u. A. (bei Armen nur des Bes- schutzens der Wäsche wegen nicht angenehm); — bei den ersten Symptomen der Pestansteckung 1–2 mal tägl. 1 Pf. lauwarm stark u. schnell über den ganzen Kör- per einreiben, u. den Schweisse danach abwarten lassen: *BALDWIN*; — bei *Acetis* u. *Anasarca* wochenlang 2–4 mal tägl. $\frac{1}{4}$ –1 St. lang lauwarmes Öl auf Bauch oder Schenkel u. s. w. einreiben; — bei Krätze 2 mal tägl. 2 Unz.: *BOILEAU DE CA- STELNAU* (sollte dies nicht gefährlich seyn? vgl. *Ungt. sulphurat. comp.*); — und so noch gegen viele andre Krankheiten, wo es theils allgemein, theils und häu- figer nur örtlich wirken soll]; theils in Verbindungen zu Klystieren [wie *Ol. Lini*], Linimenten, als Constituens von Salben u. Pflastern.

Oleum Origani cretici. Spanisch-Hopfen-Öl. [Rothbraun. Geschmack brennend saftig. — 1 Drachme $2\frac{1}{2}$ Sgr.] Nur äus- serl., zu Zahnmitteln [auch pur in schmerzende Zähne], Ba- despiritus [R_x 767] u. s. w.

767.

R_x *Balsami Peruv.*

Ol. Origani cret. ana Dr. $\frac{1}{2}$

— *Lavandulae*

— *Rorismar.* ana Dr. 1

Spir. Angelic. comp.

— *Mastich.* —

— *Serpylli*

Spir. saponati ana Unc. 2.

M. D. S. Badespiritus (zunächst zum Ab- reiben des Körpers im Schneiderschen Staubbad bestimmt).

KLUGE.

Für minder Begüterte könnte man wohl, ohne die Wirksamkeit erheblich zu ver- ringern, die 3 ersten Spiritus, welche neben den äther. Ölen fast verschwanden, durch 6 Unz. *Spir. V. rft.* (oder im Hau- se zugesetzten Brennspiritus) ersetzen.

* **Oleum Ovorum.** Eieröl. [Dicklich. — 1 Drachme $3\frac{1}{2}$ Sgr.] Äusserl., bei leichten Excoriationen od. dgl. mittelst Charpie oder Leinwand aufgelegt oder aufgespritzt; auch wohl bei Hornhautflek- ken aufgespritzt. [Es eignet sich zu diesen Behafen durch seine Consistenz

besser als andre fetten Öle; nur wird es gar zu leicht ranzig, was indess bei Hornhautirübungen oft gerade erwünscht ist.] Gegen Grauerwerden der Haare prophylaktisch 1–2mal, therapeutisch 3–4mal wöchentlich auf den ganzen behaarten Kopf einzureiben: MERKEL.

Oleum Papaveris. Mohnöl. Innerlich verordne man immer das vom Apotheker selbst bereitete, *O. P. recentius paratum s. expressum*. [Trocknet ein, doch nicht so leicht als Nuss- u. Lein-Öl. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$, rec. expr. $3\frac{1}{2}$, frigide expr. 4 Sgr.] Innerl. wie *Ol. Amygdal.* (Äusserl. lieber *Ol. Amygdal.* oder bei minder Wohlhabenden *Ol. Olivar.*, † *Rapar.*)

* ***Oleum Petroselin.*** Petersilienöl. [Butterartig. — 1 Scrup. 2 Sgr.] Innerl. zu einigen Tropfen (1–2 Gran) einigemal tägl. Meist aber nur äusserl., in Salben [gegen Kopfläuse, wie *Ol. Anisi*].

** ***Oleum phosphoratum.*** Phosphorhaltiges Öl. [12 Gran Phosphor in 1 Unze Mandelöl gelöst u. decantirt, falls sich etwas Phosphor ausgeschieden hat. — 1 Unze 8 Sgr. — Ein, wie alle gesättigten Auflösungen des Phosphors (vgl. *Phosph.*) weder zum innerlichen (*ad Grana trīginta!*), noch selbst zum äusserlichen Gebrauch zu empfehlendes Präparat.]

† ***Oleum Raparum.*** Rüböl. [Trocknet nicht ein. — 1 Unze $1\frac{1}{8}$ Sgr. — Auch wo es nicht officinell, ist es doch wohl in jedes Apothekers Hause zu finden. Sollte es (vom Reinigen) einen geringen Gehalt an Schwefelsäure haben, so ist dieser jedenfalls für die Praxis ganz unerheblich.] Dürfte bei der Bereitung von Pflastern [I. S. 259], Salben [I. S. 276] und Linimenten vor dem gewöhnlichen *Ol. Olivar.* [nicht dem *Provinciale*] den Vorzug verdienen, indem es weniger leicht ranzig wird, nicht so unangenehm riecht und noch etwas wohlfeiler ist. Auch zu Klystieren [I. S. 343 Z. 1].

Oleum Ricini s. Palmae Christi s. Palmae liquidum. Ricinusöl. Castoröl. Wunderbaumöl. [Mit absolutem Alcohol und mit Äther in jedem Verhältniss mischbar. — 1 Unze $3\frac{1}{2}$ Sgr. — In der Armenpraxis bisweilen durch Salze in Ölmixturen, oder (noch wohlfeiler) durch gleichzeitigen oder abwechselnden Gebrauch von Baumöl u. Salzen, oder durch *Sapo jalapin.* (vgl. den Artikel) mit Mandelöl, oder durch *Ol. Crotonis* (vgl. den Art.) mit Mohnöl, zu ersetzen (freilich sehr unvollkommen).]

Innerl. zu Unc. $\frac{1}{2}$ –1 (1–2 Essl.) alle 2– $\frac{1}{2}$ St. Pur [wo man ökonomisiren will; nur nicht, wo man durch seinen üblen Geschmack Erbrechen zu erregen befürchten muss, wenigstens dann nicht ohne corrigirendes Vehikel. Die besten Vehikel sind: stark gesalzene Fleischbrühe; Kaffee. Auch ein Zusatz von etwas Citronensaft oder (wo nicht contraindicirt) Äther verhütet gewöhnlich Ekel und Vomiturition.] oder in Emulsionen [hierin jedoch meistens nur kleinere, durch andere Mittel, z. B. Salze, unterstützte Gaben, weil grössere leicht

zu voluminös und dadurch wieder unangenehm werden würden. In der Regel ist es zweckmässig, nicht mehr Schleim zum Emulgiren zu nehmen, als eben nöthig (I. S. 179), weil der Schleim die Wirkung des Öls nur beschränkt; man zieht deshalb auch wohl das Eigelb als Emulgens vor. Ein Zusatz von Süssholzsaft macht Manchen den Geschmack erträglicher. — Bisweilen bloss mit einem Syrup, z. B. mit *Syr. Amygd. ana.* — Oft noch krampfstillende Zusätze od. dgl. — R₇ 768; 732 (*Natr. sulph. dep. cryst.*), seltner anderen Mixturen [4 mit 1 Schwefeläther, alle 4–1 St. 1 Theelöffel: ALIBERT gegen Bandwurm. (Überhaupt ist das Ricinusöl ein beliebtes Beihülfsmittel bei Bandwurmcuren; vgl. *Rad. Filic.*, R₇ 450, u. s. w.)].

Äusserl. zum Klystier [hier wohl am öftersten durch wohlfeilere Mittel, Leinöl mit Salzen od. dgl. zu ersetzen. — 2–4 Real., wie *Ol. Lini* zu behandeln]; selten zu Augensalben [R₇ 1039 (*Tart. stib.*)], Einreibungen [vgl. *Tinct. Colocynth.*].

768.

R₇ *Ol. Ricini* Unc. 1
Fistulum Ori unius
terendo consim misce c.

Aq. Flor. Aurant. Unc. 2
Succi Citri rec. expr. et colati Dr. 2.
D. S. Umgeschüttelt auf Einmal zu nehmen.

Oleum Rosmarini *z. Anthos.* Rosmarinöl. [1 Unse 3½ Sgr.]

Innerl. zu 2–4 Tropfen.

Äusserl. zu Riechpulvern; als Augenmittel [z. B. 30 Tropfen nebst 20 Tropfen Pfefferminzöl mit ½ Quart zerkleineten Eises gemischt u. davon öfters etwas auf die geschlossenen Augenlider gelegt, bis es stark zu schmelzen anfängt; oder, wenn kein Eis zu haben, 4–5 Tropfen jener Öle in die Hände zu reiben und den Dunst gegen das Auge gehen zu lassen: WELLER bei nach beseitigten Congestionen zum Auge noch fortdauernder wahren Augenschwäche, Abnahme der Sehkraft]; zu Linimenten [R₇ 205 (*Camph.*), 653 (*Liq. Ammon. caust.*), 764 (*Ol. Nucist.*)]. — Badespiritus: R₇ 767 (*Ol. Orig. cret.*), Salben [namentlich künstlichen Balsamen: offic. *Ungt. Rosism. comp.*; R₇ 654 (*Liq. Ammon. caust.*)]. — R₇ 806 (*Phosph.*)], bisweilen zu Pflastern [namentlich Magenpflastern. R₇ 759 (*Ol. Lauri*); s. auch ein Beispiel I. S. 265–266]; u. s. w.

* **Oleum Rosarum.** Rosenöl. [Dicklich und schon bei +12° R. gestehend. In schwachem Weingeist schwer (vollkommen) auflösbar. — 1 Scrup. 10 Sgr.] Innerl. u. äusserl. in sehr geringer Quantität als Geruchs-, auch Geschmacks-Corrigens; besonders zu kosmetischen und bisweilen zu solchen Mitteln, die man absichtlich theuer machen will.

Oleum Rutae. Rautenöl. [1 Scrup. 3½ Sgr.] Innerl. zu 2–4 Tropfen einigemal tägl. — Äusserl. bisweilen zu Einreibungen [z. B. ums Auge] od. dgl.

Oleum Sabinae. Sadebaumöl. [1 Drachme $3\frac{5}{8}$ Sgr.] Innerl. anfangs nur zu $\frac{1}{2}$ –1 Tropfen 2mal tägl., dann vorsichtig steigend bis zu 2, selbst wohl 4 Tropfen 2–3mal tägl.; als Ölzucker, in Mixturen [Ry 769]; oft zweckmässig in etwas einhüllenden Formen: Pillen [Ry 444 (*Galban. dep.*), 484 (*Hb. Sabin.*)], Emulsion. — Äusserl. auf Baumwolle in cariöse Zähne; zu Einreibungen [z. B. mit einem fetten Öl in den Unterleib bei Würmern], Salben; Pflastern [z. B. Dr. 1 mit *Pulv. Hb. Sabin. Dr. 2, Empl. aromat. Unc. 1*, bei Atonie des Uterus, daraus entstehendem Blutfluss p.p. auf den Unterleib zu legen: KOPF].

769.

Ry *Ol. Sabinae* Dr. $\frac{1}{2}$ *Tinct. Colocynthis*— *Capsici annui ana* Dr. 1— *Arnicae* Dr. 2.

M. D. S. Zu 15–20 Tropfen („schon sehr starke Gaben“) 4 mal täglich — in Schleim, oder doch mit Wasser od. Wein verdünnt. (Gegen Lähmungen.)
HORN,

† ***Oleum Salviae.*** Salbeiöl. [1 Drachme 12 Shl., 10 Tropfen 1 Shl.] Innerl. zu 1–3 Tropfen einigemal tägl.

† ***Oleum Sassafras.*** Fenchelholzöl. [1 Drachme 6 Shl., 18 Tropfen 1 Shl.] *Cave:* s. S. 333. — Innerl. zu 1–2 Tropfen einigemal tägl.

† ***Oleum Serpylli.*** Quendelöl. [1 Drachme 4 Shl.] Wie *Ol. Rorismar.*

† ***Oleum Sinapis aethereum.*** Ätherisches Senföl. [Geruch so durchdringend, dass es zum Thränen reizt; Geschmack ebenfalls brennend scharf; erregt auf der Haut schnell Entzündung und Blasenbildung. — 1 Drachme (in der Hofapotheke zu Berlin) 27 Sgr.] *Sol.* 500. — *Cave* Salpetersäure, Salpeter-Salz-Säure, concentr. Schwefelsäure; Salzbilder; Alkalien; essigsaur. Blei u. Kupfer, salpeters. Silber, salzs. Gold, Quecksilbersalze. Man verordne, der grossen Flüchtigkeit wegen, nur mässige Portionen und schärfe die sorgfältige Bewahrung (an einem kühlen Orte, gut verschlossen) ein.

Innerl. etwa zu $\frac{1}{2}$ – $\frac{1}{3}$ Tropfen, gut eingehüllt. [2 Tropfen durch Gummi mit 6 Unz. Wasser emulgirt, versüsst, 2stündl. 1 Essl.: WOLFF bei Verschleimung des Magens und dadurch bedingter Anorexie.]

Äusserl. als Rubefaciens [verdünnt; nach WOLFF gewöhnlich 12 Tropf. in $\frac{1}{2}$ Unze *Spir. V. rft.*, seltner 20–24 Tropf. in $\frac{1}{2}$ Unze fetten Öls aufgelöst. Bei zarterer Haut, ferner im Gesicht, hinter den Ohren, am Halse, überhaupt wenn man eine minder starke Wirkung beabsichtigt, lässt man die geistige Auflösung einreiben; die Flüssigkeit verdunstet schnell u. lässt ohne lebhaften Rötze zurück, welche spätestens nach einigen St. wieder verschwindet; doch dauert die erhöhte Empfindlichkeit der Stelle länger, so dass man bei Wiederholung

der Application nach 4–6 St. eine andere Stelle wählen muss; es genügt, um eine fortdauernde Wirkung zu unterhalten, 2–3mal an Einem Tage das Mittel so anzuwenden. Bei derberer Haut, ferner am Stamm, an den Extremitäten, überhaupt wenn man eine stärkere Wirkung beabsichtigt, applicirt man die geistige Auflösung durch Auflegen von Leinwandstreifen, die man, falls der Kranke es aushält, so lange liegen lässt, bis sie trocken geworden, was durchschnittlich in 8 Minuten geschieht; diese Anwendungsart hat stärkeren Schmerz, lebhaftere Röthung, bisweilen selbst Blasenbildung, zur Folge; um in chronischen Krankheiten eine fortdauernde Wirkung zu unterhalten, genügt es, sie 2mal tägl. zu wiederholen; auch hier darf man dieselbe Stelle nicht an Einem Tage 2mal benutzen. — Man hat auch ein concentrirtes Seifenwasser (wässrige Auflösung des Öls), als rasch wirkendes Rubefaciens (mit Compressen aufgelegt), so wie zu Waschungen gegen Krätze, angewandt].

Oleum Succini crudum. Rohes Bernsteinöl.

[Dicklich; dunkelbraun; von widrigem Geruch; in Alcohol u. Äther partiell auflöslich; reagirt sauer. — 1 Unze 2½ Sgr.] *Cave* Basen. — In der Regel nur äusserl.: wie das folgende.

Oleum Succini rectificatum. Gereinigtes Bernsteinöl.

[Dünneflüssig; blassgelb; von scharfem Geschmack und durchdringendem Geruch; auflöslich in Alcohol u. Äther; reagirt sauer. — 1 Unze 4½ Sgr.] *Cave* Basen. — Innerl. zu 5–10–20 Tropfen mehrmals tägl., pur oder mit Äther, Hoffmannstropfen u. dgl., in Mixturen [R_x 770; 150 (*Bals. Copaiv.*)]. — Selten äusserl.: bei Zahn- oder Ohr-Schmerz auf Baumwolle in den leidenden Theil gebracht oder in der Nähe desselben eingerieben; zu Zahn-Pillen u. -Latwergen, Salben [R_x 542 (*Hydrarg. muriat. nite.*)], Einreibungen [HIMLY's *Spirit. ophthalm.*: R_x 746].

770.

R_x *Ol. Succini* rft. Scr. ½
miscere terendo in mortar. vitreo amplo c.

Spir. Nitri fumantis Dr. ½.

Miscellam solve in

Spir. Feni rftiss. Scr. 16.

D. S. 2stündl. 20 Tropfen im Hafer-schleim. (Nicht in einem metallenen Löffel zu reichen, vgl. *Acid. nitr.*)

Tinctura Moschi artificiale.

★ *Oleum contra Taeniam Chaberti.* CHABERT'S

Öl gegen den Bandwurm. [*Ol. Terebinth.* 3, *Ol. anim. foet.* 1, mit einander überdestillirt. — 1 Unze 3½ Sgr.] *Cave* wie bei *Ol. animale aether.*

Innerl. einige Theelöffel tägl. [Nach BREMSER auf folgende Weise. Zuerst seine Wurmlatwerge, R_x 965, 2–3mal tägl. 1 Theelöffel, bis die ganze Portion verbraucht ist. Dann das Chabertsche Öl, Morgens (nüchtern; nur wenn es Übelkeiten erregt, 1 St. nach dem Frühstück) und Abends zu 2 Theelöffeln in einem Mandvöll Wasser. (Nach RUDOLPHI weniger unangenehm in Fleischbrühe. — Zur baldigen Beseitigung des üblen Geruchs soll man ein Paar Mundvöll Wasser mit einem gewissen Drücken nachtrinken, zur Vertreibung des Geschmacks-er-

was Zimmt od. eine Gewürznelke küssen. Wirkt es zu stark, zeigt sich namentlich gleich nach dem Einnehmen leichter Schwindel, die Gabe vermindert; erregt es Brennen beim Stuhlgang oder Harnlassen, dagegen eine Mandel- oder Öl-Emulsion.) Sind nach 10–12 Tagen $2\frac{1}{2}$ –3 Unzen des Öls verbraucht, dann ein leichtes Purgans (etwa *Rad. Jalap. Scr. 1*, *Fol. Sennae Dr. $\frac{1}{2}$* , *Kali sulphur. dep. Dr. 1*, davon stündl. den 3ten oder halbstündl. den 6ten Theil). Darauf Fortgebrauch des Öls. — Es sollen 4–5, in hartnäckigen Fällen 6–7 Unzen zur Cur hinreichen, auch die Disposition zur Widererzeugung tilgen. Während der Cur sind Mehlspeisen, Hülsenfrüchte, fette Dinge, überhaupt Alles, was Schleimbildung u. Wurmerzeugung begünstigt, zu vermeiden. Der Wurm geht meist im Anfang der Cur, mehr od. weniger verwest, daher leicht zu erkennen, ab.]

Oleum Tanacet. Rainfarnöl. [1 Drachme $5\frac{1}{8}$, *Elaeosacch. 1 Drachme $\frac{1}{2}$ Sgr.*] Innerl. zu 2–4 Tropfen einigemal tägl.; — oft als Zusatz zu andern Wurmmitteln. [Ry 134 (*Asa foet. dep.*), 411 (*Ferr. pulverat.*), 450 a–c. (*Gutti*); s. auch I. 8. 230–31 (Morsellen mit *Sem. Cin. u. s. w.*)]. — Äusserl. zu Einreibungen [etwa mit einem fetten Öl vermischt], Salben [Ry 771; 61 (*Aloë luc.*)].

771.

Ry *Fell. Tauri inspiss.*
Extr. Jugland. Nuc. ana Scr. 4
Adipis suillii Unc. 1

[*leni calore mixtis et refrigeratis addo*
Ol. Tanacetii Dr. $\frac{1}{4}$.

M. f. Ungt. D. S. In den Unterleib einzureiben (bei wurmkranken Kindern).

DÖRRFURT.

Oleum (Essentia s. Spiritus) Terebinthinae. Terpenthinöl. Terpenthinspiritus. (Zum innerlichen Gebrauch, zu Klystieren und für Wohlhabende verordne man immer das *Ol. Tereb. rectificatum.*) [In wasserhaltigem Alcohol sehr schwer auflöslich. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$, *rst. 38gr.*] *Cave:* s. S. 333.

Innerl. zu 5–15 Tropfen 2–4mal tägl.; — um Bandwürmer abzutreiben, höchstens Dr. 2–3 einigemal tägl. [etwa nach KNOX: Dr. 2 Morgens u. Abends, einige Tage hinter einander; oder höchstens allenfalls nach OSANN: Morgens nüchtern halbstündl. 1 Essl., bis 2 Unzen verbraucht, u. den Tag über nicht eher leichte Nahrungsmittel, bis einige flüssige Stuhlgänge erfolgt. Aber nicht mit manchen Engländern bis zu 2 Unzen auf einmal!]; — gegen Neuralgien, besonders Hüftweh, nach MARTINET zu Scr. 1–Dr. $\frac{1}{2}$, 3–4mal tägl. [der Magen muss dabei vollkommen rein seyn; 4–6, höchstens 12 Tage reichen meist zur Heilung hin; längerer Gebrauch schade den Verdauungsorganen]; — bei Vergiftungen mit Blausäure nach EMMERT von Zeit zu Zeit 1 Theelöffel; — bei der Cholera hat man es bisweilen tropfenweise, häufiger theelöffelweise, alle $\frac{1}{2}$ – $\frac{1}{4}$ St., gegeben [am passendsten wohl etwa halbstündl. Dr. $\frac{1}{2}$ in einer Emulsion, wie Ry 773]. — (Gern lässt man etwas Schleim oder Fleischbrühe nachtrinken, oder um den Geschmack zu tilgen, ein wenig Citronensaft nehmen. Auch *Magnes. usta* soll den Geschmack besonders gut corrigiren.) — Ent-

weder, namentlich bei Armen, pur [die kleineren Gaben auf Zucker oder mit *Magnes. usta*], oder in Emulsionen [Ry 772, 773. Bisweilen bloss mit Honig, z. B. 1 mit 8 *Mel despum.* od. *rosat.* (umgeschüttelt) oder *Mel alb.* (umgerührt), theelöffelweise. — THOMPSON gegen Bandwurm: Dr. 2 auf 2 Unz. *Mel alb.*, 4mal tägl. 1-2 Theelöffel.] od. a. Mixturen [Ry 52 (*Aeth. sulph.*), 150 (*Bals. Copav.*)]; als Auflösungsmittel des Phosphors: Ry 799].

Äusserl. zu Gurgelwässern [1 mit 4 Gummischleim (umgeschüttelt): GEDDINGS bei übermässiger Mercurialsalivation], Zahnfleischlatwergen, Klystieren [etwa Dr. 1-2 (doch nimmt MARTINEZ gegen Hüftweh Unc. $\frac{1}{2}$ -1), durch Eigelb mit Wasser, Schleim od. dgl. emulgirt. — Ry 774] u. a. Injectionen [Ohrtropfen: Ry 35 (*Acid. pyro-lign. crud.*)]; als (schwaches, unzuverlässiges) Rubefaciens [gewöhnlich erwärmt, doch auch wohl kalt; entweder eingerieben und dann Flanell aufgelegt, oder auch mit Flanell übergeschlagen, oder diese beiden Applicationen mit einander verbunden; bisweilen noch mit Campher od. a. Mitteln verbunden], auch sonst zu Einreibungen, Waschungen u. Fomentationen [oft in Verbindungen mit Campher, Phosphor, Ammonium, Canthariden u. s. w. — Ry 775-780; 11 (*Acet. plumb.*), 44 (*Acid. sulphur. rst.*), 206 (*Camph.*), 793 (*Petrol.*), 1056 (*Tinct. Canthar.*)], zu Kataplasmen [z. B. bei Brand mit China- od. Eichenrinden- od. Kamillen-Pulver q. s. od. dgl. — Ry 288 (*Cort. Chin. fusc.*)], Linimenten u. Salben [z. B. 1 mit $\frac{1}{2}$ eines fetten Öls bei Verbrennungen (vgl. G. A. RICHTER *Arzneimittell.* II. S. 75); — 1 mit 4 *Ungt. Res. Pini Burg.*: GREENHOW bei Verbrennungen. — Ry 289 (*Cort. Chin. fusc.*), 654 (*Liq. Ammon. caust.*), 795 (*Petrol.*), 1046 (*Terebinth.*)], Pflastern [Ry 971 (*Sem. Sinap.*)]; als Verbandmittel [bei brandigen, cariösen u. a. Geschwüren, die stark gereizt seyn wollen, umgeschlagen oder eingetröpfelt, eingespritzt u. s. w.]. DEWEES heilte 3 Fälle von Harnruhr bei zahnenden Kindern unter 15 Monaten durch Besprengen der Kleider mit Terpenthinöl, u. daneben Sorge für gehörige Leibesöffnung.

772.

Ry *Ol. Terebinth. rst.* Unc. $\frac{1}{2}$
Vitellum Ovi unius
terendo sensim misce c.
Syr. Menthae
 — *Flor. Aurant. ana* Unc. 2.
D. S. Umgeschüttelt 3-4 mal tägl. 1 Essl.
 (etwa Dr. $\frac{1}{2}$).

773.

Ry *Ol. Terebinth. rst.* Unc. 1
Gm. Mimos. pulv. Unc. $\frac{1}{2}$
terendo sensim misce c.
Syr. simpl. Unc. 1
Aq. Menth. pip. Unc. 2.
D. S. Umgeschüttelt halbstündl. $\frac{1}{2}$ Essl.
 (etwa Dr. $\frac{1}{2}$).

774.

Ry *Ol. Terebinth. rst.* Unc. 1
Vitella Ovor. 2
terendo sensim misce c.
Decocti Sem. Aven. excoct. L. 2.
D. S. Den 4ten Theil, umgeschüttelt und etwas erwärmt, zum Klystier. (Bei hartnäckigen Verstopfungen, *Uterus* — wenn keine Katzündung zu befürchten.)

R. WILLIAMS.

775.

Ry *Ol. Terebinth.* Unc. 1
Vitella Ovor. 2
terendo sensim misce c.
Aq. Menth. crisp. Unc. 3.
D. S. Umgeschüttelt in Nieren- u. Bla-

sen-Gegend einzureiben. (Als *Diureticum*.)

VOGT.

Meist dürfte wohl die Einreibung des reinen Öls vorzuziehen seyn. — Noch schwächer als die VOGT'sche Formel und deshalb wohl gar nicht zu empfehlen ist das *Linim. diureticum* PH. HANN., mit 4mal so viel Wasser (Pfefferminzwasser).

776.

Ry *Kali carbon. e Cin. clav. Dr. 3*
Sapon. Hispan. albi rasi Unc. ½
solve in
Aq. destill. tepidae Unc. 5
adde

Ol. Terebinth. rst. Dr. 6

— *Cajeputi Dr. 4*

Spir. Junip. Unc. ½.

M. D. — Umgeschüttelt zu Waschungen, Einreibungen. (Bei Lähmungen, Wassersuchten, Geschwülsten, Entzündungs-Residen u. s. w.)

Liq. nervinus Peerbomii PH.

HANN. (1 Unze 3 Mgr., 4 Unz.
10 Mgr.)

777.

Ry *Fol. Nicotian.*

Hb. Digital. ana Dr. 1½

Aq. comm. fervid. q. s.

repose ad refrigerat.; Colat. Unc. 2 f. c.

Ol. Terebinth. Unc. ½

Fitello Ovi unius

l. a. Emulsio, in qua solvetur

Extr. Scillae Dr. ½.

D. S. 2-3 mal tägl., umgeschüttelt, 1 Theelöffelvoll in die Nierengegend einzureiben. (Bei Wassersuchten.)

J. K. SCHMIDT.

778.

Ry *Liq. Ammon. caust. Dr. 2*

Ol. Terebinth. rst. Unc. ½

Spir. Vini rftiss. Unc. 2.

M. D. S. Umgeschüttelt zum Waschen (ödematöser, nicht im mindesten schmerzhafter!), Theile). WEIKARD.

779.

Ry *Liq. Ammon. caust.*

Spir. camphorati ana Dr. 2

Ol. Terebinth. Unc. 1.

M. D. S. Umgeschüttelt zum Waschen. (Bei veralteten gichtischen Contracturen.)

ACKERMANN.

Auch zu Frictionen bei Cholera, wo Ry 653 zu stark scheint.

780.

Ry *Camphorae Unc. ½*

solve in

Spir. Vini rft.

Ol. Terebinth. ana Unc. 4.

D. S. Umgeschüttelt zum Waschen. (Bei Phthisias alter Leute.) HEBERDEN.

Oleum Terebinthinae sulphuratum. *Balsamum Sulphuris terebinthinatum.* *Bals. Sulph. (s. Vitae) Ru-landi.* Terpenthinölhaltiger Schwefelbalsam. [1 *Ol. Lini sulphurat.* auf 3 *Ol. Tereb.* — Rothbraun. — 1 Unze 2 Sgr.] Von den gemeinen Leuten bisweilen, unter dem Titel: Harlemer Öl, innerl. [gegen Steinbeschwerden] gebraucht, sonst nur noch äusserl. als Verbandmittel [bei fauligen, brandigen Geschwüren].

Oleum Thymi. Thymianöl. [1 Drachme 1 Sgr.] Wie *Ol. Rosismarini*.

Oleum Valerianae. Baldrianöl. [Reagirt durch Baldriansäuregehalt sauer. Wird durch Salpetersäure blau. — 1 Scrup. 6 Sgr.; *Elaeos.* 1 Dr. 1 Sgr.] *Cave* wie bei den äther. Ölen überhaupt; ausserdem [wenn

man recht vorsichtig eine Veränderung der Wirkung des Öls verhüten will, — namentlich in Auflösungen] Basen; kohlensaure Salze. — Innerl. zu 2-6 Tropfen (gegen Epilepsie 6-10-20 Tropfen — in einer einhüllenden Form), mehrmals tägl. (Oft mit Naphthen, Tincturen p. p.) [Pulver: Ry 1097 (*Zinc. oxyd.*). Pillen: Ry 131 (*Ass. foot. dep.*), 164 (*Bismuth. nitr. praec.*). Mixturen: Ry 49 (*Aeth. acst.*), 399 (*Extr. Valer.*), 797 (*Phosph.*).]

781.

Ry *Ol. Galbani* Gtt. 10
— *Valerian.* Scr. 1

Tinct. *Asae foot.* Dr. 3.

M.D. — Zu 15-30 Tropfen mit Schleim.
(Bei krampfhaften Zufällen Hysterischer.)
LOCKSTAEDT.

Olibanum. *Thuss.* Weihrauch. [1 Unze 2½, *subt. pulv.* 3½ Sgr.] Vgl. *Gummi-resinae*. — Selten noch innerl., etwa als mitwirkendes Constituens von Copaïyabalsam-Pillen (entbehrlich). Meist nur äusserl., zu Zahnpulvern [selten; in geringer Quantität], Räucherpulvern [theils zu bloss wohlriechenden, theils zu bei chronischen Rheumatismen, Wassersuchten u. dgl. anzuwendenden. — Offic.: *Spec. ad suffiend.*], Pflastern [so zum officinellen *Empl. aromat.* u. a. m. — Vgl. S. 222], Salben [Ry 1047 (*Tereb.*)].

Opium. Meconium. Laudanum. Succus Thebaïcus. Extractum thebaïcum. [Einer der 4 letzteren Benennungen bedient man sich bisweilen, wenn Laien das Opium fürchten; doch kann *Laudanum* mitunter zur Verwechslung mit *Laudan. liq. Sydenhami*, *Extr. thebaïc.* sehr leicht zur Verwechslung mit *Extr. Opii*, Veranlassung geben. — Zu dem Worte *Opium* machen die Ärzte oft den Zusatz *purum*, der indess, wo das Opium gepulvert angewandt wird, eigentlich überflüssig ist, höchstens dazu dient, die Zeile im Receipt zu verlängern. Denn nur zu flüssigen Auszügen nimmt der Apotheker wohl, wenn man nicht ausdrücklich *Opium pulveratum* vorschreibt, das Opium gröblich zerkleinert, *comminutum*, und dann noch mit fremdartigen Theilen durchmengt, also bei gleichem Gewicht weniger wirksam.] **Opium.** Mohnsaft: [Von den meisten Chemikern zu den Gummiharzen gerechnet. Hauptbestandtheile: 2 Alkaloïde (*Morphium* und *Codeïn*), 2 Subalkaloïde (*Opian* od. *Narkotin* und *Narceïn*), *Mekonsäure* und *Mekonin* (eine dem Seifenstoff ähnliche, stickstofffreie Substanz). — Weder in Wasser noch in Weingeist vollständig auflöslich; am vollständigsten noch, doch auch nicht vollkommen, in wässrigem Weingeist, z. B. in Malagawein oder in einer Mischung aus gleichen Theilen *Spir. V. rftiss.* u. Wasser (etwa Zimmtwasser). — 1 Drachme *subt. pulv.* 3½ Sgr.] **Cave** [wenigstens da, wo es darauf ankommt, jede Schwächung oder Veränderung der Wirkung mit Sicherheit zu verhüten; sonst, namentlich wo das Opium nur adjuviren soll, macht man freilich täglich Ausnahmen] starke Säuren; Salzbilder; reine u. kohlensaure Alkalien u. *Magnesia*; Iodkalium; salzsaur. Natron, Kalk u. Spiessglanz, essigs. Blei, Quecksilber-, Silber-, Kupfer- u. Eisen-Salze; Gerbstoff.

Innerl. (*pro adulto ad Grana duo! Pro infante infra quinque annos ÷*) zur Erzeugung kleinerer Wirkungen Gr. ¼ - ½, middle-

rer Wirkungen Gr. $\frac{1}{2}$ -1, stärkerer u. betäubender Wirkungen Gr. 1-3. In der Regel wiederholt man die kleinen Gaben alle 2-1 St.; die mittleren reicht man häufig nur 1mal oder ein Paar Mal des Tags, oder wiederholt sie doch nur alle 4-2 St.; über die Wiederholung der grossen Gaben lässt sich kaum etwas Allgemeines angeben, namentlich ihre Wirkung auf das Sensorium muss die Wiederholung bestimmen. — (Bei heftigen Krämpfen, Schmerzen, bei Tetanus, Wasserscheu, so wie bei langer Gewöhnung an das Mittel, muss man oft die angegebenen grössten Gaben noch weit überschreiten. Beim Tetanus beginne man etwa mit Gr. 2, und wiederhole diese Gabe, sie jedesmal um Gr. $\frac{1}{4}$ vermehrend, alle 2-1 St., bis Lösung des Krampfs oder Nar-kose eintritt, wozu oft 10, 15 u. mehr Gran erforderlich sind; ist Nar-kose erfolgt, so sucht man sie durch schwarzen Kaffee, Wein, ätherische Mittel zu beseitigen und beginnt dann die Opiumgaben wieder von Neuem, wieder mit Gr. 2 anfangend u. s. w. (Vgl. unten *Tinct. Opii simpl.*) — In solchen schweren Fällen von *Delirium tremens*, wo überhaupt Opium indicirt ist, etwa alle 2-1 St. Gr. 1-1 $\frac{1}{2}$ (nach NEUMANN mit *Natr. carbon. acidul.*). — Lassen die dringenden Zu-fälle — Schmerzen, Krämpfe — nach, die zu ungewöhnlich grossen Gaben Opium aufforderten, so muss man in gleichem Verhältniss mit den Gaben fallen, wenn das Opium nicht jetzt zu heftig, ja vergif-tend, einwirken soll. — Kinder vertragen, wie überhaupt von narkotischen Mitteln, so ganz besonders vom Opium, lange nicht so grosse Gaben, als verhältnissmässig von andern Mitteln; man giebt es ihnen daher, namentlich im ersten Lebensjahr, nur selten, wo es sich durch andre Nareotica, namentlich *Crocus*, nicht will ersetzen lassen, und zwar sicherer in Klystieren als innerlich. — Will man (bei Erwachsenen) die stärkeren Wirkungen des Opiums auf das Gehirn beschränken, so reicht man es gern in einer Tasse schwarzen Kaffees. Damit es nicht verstopfe oder zu sehr erhitze, bisweilen mit Salzen, z. B. *Kali sulphuric. dep.*) — In Pulver [R_x 782-784; 62, 63 (*Alum.*), 183 (*Camph.*), 233 (*Catechu*), 245 (*Chinium sulph.*), 291 *Cort. Chin. reg.*), 533 (*Hydr. mur. mite*), 621 (*Kino*), 695 (*Mosch.*), 707 (*Natr. carb. acidul.*), 810, 811 (*Plumb. acet. dep.*); vgl. auch *Secale cornut.* — 2stündl. Gr. 1 mit Gr. 2 *Ipecacuanha* u. Gr. 10 Zucker: v. HILDENBRAND gegen Säuferzittern.], Trochisken [selten und nur um anderer Mittel wil-len. R_x 858 (*Rad. Ipecac.*)], Pillen [*Pilulas ex Opio* PH. MIL.: 10 Gran mit Süßholzpulver u. Süßholzsafft ana Scr. 2, Wasser q. s., zu 40 Pillen. — *Massa Pilular. anodynorum* PH. HANN.: 10 Gran mit Süßholzsafft Scr. 2, Wasser q. s., zu 20 Pillen (1 Drachme 4 Mgr.). — R_x 785; 130 (*Asa foet. dep.*), 378 (*Extr. Hyosc.*), 812 (*Plumb. acet. dep.*), 860 (*Rad. Ipecac.*), 905 (*Rad. Scill.*)], Bissen [R_x 859 (*Rad. Ipecac.*)], Latwerge [nicht passend, der unbe-

stärksten Dose wegen, ausser wenn nur auf 1 oder 2 Gaben berechnet], Schüttelmixturen oder besser Emulsionen [Ry 786, 787; 1100 (*Zinc. oxyd.*)].

Ausserl. zu Zahnpillen [Ry 788], Zahnlatwergen [Ry 789], auch pur [Stückchen] in hohle Zähne gebracht; zu Zahnfleischlatwergen [Ry 236 (*Catechu*)], Klystieren [emulgirt (vgl. I. 8. 344); soll dies im Hause geschehen, so verschreibe man es in dispensirten Pulvern mit *Gm. Mimos.* — Nicht leicht (ausser in ungewöhnlichen Fällen, z. B. bei heftigen Krämpfen od. dgl.) mehr als Gr. 2, und dies alle 6–4 St. wiederholt. — Ry 518 (*Hydr. mar. corr.*). — SALZEN lässt als Palliativum bei Mastdarmkrebs früh und Abends eine Pille von 1–2 Gran Opium einbringen (oder auch statt dessen Klystiere mit *Tinct. Op. croc.* geben).], Räucherungen [ERRMÜLLER liess bei *Melancholia puerperarum* Morgens mit Scr. $\frac{1}{2}$, Nachmittags mit Scr. 1 in der Nähe des Bettes räuchern; die Wärterin hatte dabei einen Schwamm mit Essig im Munde und trank Kaffee], Augerpulvern [Ry 540 (*Hydr. mur. mite*)], Augewässern [selten; infundirt; z. B. Ry 312 (*Croc.*). — Gewöhnlicher die Tincturen oder das Extract], Augensalben [Gr. 5–10 (als Zusatz zu andern Mitteln oft noch weniger) auf Dr. 2. — Vgl. I. 8. 282. — Ry 552 (*Hydr. oxyd. rubr. ppt.*) u. a. Salben [I. 8. 278 sub 4. — Ry 792; 75, 76 (*Alum.*), 543, 545 (*Hydr. mur. mite*), 660 (*Liq. Stib. mur.*), 1081 (*Ungt. Hydr. cin.*)], Linimenten [Ry 790, 791. Auch anatripsologisch; z. B. des Abends Gr. 5–8 mit einigen Gran Zucker, sehr fein gepulvert, mittelst Speichel in der Umgegend des Auges einzureiben: JÜNGKEN bei schmerzhaften Augenkrankheiten mit erethischem Charakter. Vgl. *Extr. Aconiti* u. *Hydrarg. mur. mite*.], Pflastern [vgl. I. 8. 260, 261 u. ein Beispiel S. 266. — Officinell: *Empl. opiat.* — Ry 200 (*Camp.*), 333 (*Empl. de Galb. croc.*), 335 (*Empl. Hydrarg.*), 945 (*Resina Pini Burg.*), 1042 (*Tart. stib.*)]; endermatisch [in etwas grösseren Gaben als innerlich]; zur Venen-Infusion [Bei einem *Tetanus hystericus* injicirte COINDET 5mal hinter einander von 5 zu 5 Minuten jedesmal $1\frac{1}{2}$ Drachmen eines Opium-Aufgusses von Scr. 1 auf Unc. 1.]; selten; infundirt oder emulgirt oder in Schüttelmixtur, zu Verbandwässern, Injectionen [ausser Klystieren, s. oben] od. dgl. [Ry 548 (*Aq. phagedän. nigra*)].

782.

Ry *Rad. Ipecacuanh.* Gr. 2

Opü Gr. 4

Campthorae trit. Gr. 8

Sacch. albi Scr. 8.

M. f. Pulv. Div. in 8 part. aeq. D. in charta cerata. S. 2stündl. 1 Pulver.

SELLE.

783.

Ry *Opü puri*

Campthorae trit. ana Gr. 1

Rad. Ipecacuanh. Gr. 2

Sacch. albi Gr. 12.

M. f. Pulv. D. in charta cer. S. Mit warmem Fliederthee zu nehmen.

RICHTER.

784.

Ry *Opü* Gr. 4

Kali nitrici dep.

Sacch. Lactis ana Dr. $1\frac{1}{2}$.

M. f. Pulv. Div. in 6 part. aeq. D. S. Alle 3–2 St. 1 Pulver.

RICHTER.

785.

Ry *Opü pulv.* Gr. 5

Croc pulv. Gr. 15

Extr. Dulcam. q. s.
 ut f. *Pilulae* 20. *Consp. Pulv. Croci. D.*
in vitro. S. Mehrmals tägl. 1-2 Stück
 ($\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ Gran).

786.

Ry *Opii pulv.*
Rad. Ipecac. pulv. ana Gr. 3
Futella Ovor. 2
terendo sensim misce c.
Aq. comm. Unc. 1
 ut f. *Emuls.*, cui adde
Vini stibiat. Unc. $\frac{1}{2}$.
M. D. S. Umgeschüttelt 2stündl. 1 Thee-
 löffel. (Bei catarrhalischem Husten etc.)

787.

Ry *Opü pulv.* Gr. 2
Ol. Amygdal. Unc. 1
Gm. Mimos. pulv. Dr. 2
terendo sensim misce c.
Aq. Flor. Aurant. Unc. 2.
D. S. Auf 4mal, umgeschüttelt, zu neh-
 men (jedemal $1\frac{1}{2}$ Esslöffel). REIL.

788.

Ry *Opü pulv.* Gr. 5
Ol. Caryophyllor. Gtt. 3
Extr. Hyoscyami Gr. 5
 — *Belladonnae* Gr. 10
Rad. Pyrethri pulv. q. s.
 ut f. *Pilulae* 30. *Consp. Pulv. Rad. Py-*
rethri. D. in vitro. S. Eine Pille in den
 hohlen Zahn zu drücken. (RUST.)

* *Os Sepiæ.* Weisses Fischbein. Blackfisch-
 bein. [Besteht hauptsächlich aus kohlensaurem Kalk, mit wenig Knorpel und
 vielleicht etwas Iod. — Gewöhnlich wendet man nur den schwammigen oder po-
 rösen unteren Theil der Platten, *Medulla Ossis Sep.*, an, der ein feineres, weiche-
 res Pulver giebt. — 1 Unze *pulv.* 2 Sgr.] Nur noch zu Zahn-Pulvern
 u. - Latwergen [vgl. I. S. 217]; oder etwa noch zu Augenpulvern
 [q. v.]

Ova gallinacea. Hühnereier. [1 Stück 1 Sgr.] Diäte-
 tisch; selten auch mehr pharmaceutisch [vgl. *Zinc. sulphur.*]. — Ihre
 beiden Haupttheile:

789.

Ry *Camphorae trit.* Gr. 3
Opü pulv. Gr. 15
Ol. Cajuputi
Tinct. Canthar. ana Gtt. 4
Extr. Hyoscyami
 — *Belladonnae* ana Gr. 3
Aq. Opü q. s.
 ut f. *Electuarium spissius. D. in pyxide*
alba, subere clausa. S. Einer kleinen
 Erbse gross in den hohlen Zahn zu legen.
 (HANDEL.)

790.

Ry *Opü pulv.* Scr. 1 - Dr. $\frac{1}{2}$
Ol. Amygdal. Dr. 2
 — *Chamom. citrati* Dr. $\frac{1}{2}$.
M. terendo. D. in vitro. S. 5-6mal tägl.
 (umgeschüttelt) in die Augengegend, be-
 sonders über den Augenbraunen, einzu-
 reiben. (Gegen *Blepharospasmus* bei
 sehr sensiblen Personen.) (WELLER.)

791.

Ry *Opü pulv.* Scr. 1
Futella Ovorum 3
Ol. Amygdal. Unc. $\frac{1}{2}$.
Terendo M. D. S. Umgeführt einzu-
 reiben. CHALMER.

792.

Ry *Opü (c. pau. Aq. in pulv. red.)* Gr. 10
Aluminis subtiliss. pulv. Gr. 15
Adip. suilli Unc. $\frac{1}{2}$.
M. D. S. Verbandsalbe. (Bei atonischen
 Bubo-Geschwüren.) SIMON.

1. Albumen Ovi. Eiweiss. [Hauptbestandtheile: Eiweissstoff und viel Wasser. — In 10 Wasser löslich, auch mit geringeren Quantitäten Wassers mischbar, wird aber durch Hitze, so wie durch verschiedene Substanzen, welche sich mit dem Eiweissstoff verbinden (I. S. 36 sub 13.), unlöslich, so dass es gerinnt. — Das Weiss von 1 frisch gelegten Ei pflägt Dr. 10–12 zu wiegen.] *Cave:* s. I. S. 36 sub 13.; auch längere Aufbewahrung, besonders im Sommer.

Innerl. als Arzneimittel u. diätetisch verdünnt [Gegen Wechsel- fieber das Weiss von 3 Eiern in lauem Zuckerwasser kurz vor dem Anfall: SE- GUIN; oder das Weiss von 2 Eiern, zu Schaum geschlagen, mit Scr. $\frac{1}{2}$ Zimmt- pulver, 1 St. vor dem Anfall (nachdem gastrische u. a. Complicationen beseitigt): SEIDLER. — LEVACHER gegen Cholera: zum Getränk Eiweiss, zu Schnee ge- schlagen u. mit kaltem Zuckerwasser verdünnt (dabei Klystiere aus Eiweiss, mit einem lauwarmen Aufguss von Mohnköpfen verdünnt und geschlagen; bisweilen Blutegel auf das Epigastrium und warme erweichende Breiumschläge auf die Wan- den; in den ersten Tagen der Reconvalescenz weichgekochte Eier zur Nahrung). — Bei Vergiftungen, namentlich mit Sublimat, mit vielem Wasser verdünnt; vgl. den Anhang: Vergiftungen. — Wohl nicht zweckmässig als Nahrungsmittel atrophischer Kinder (mit Zimmtwasser verdünnt u. mit Zucker versüsst: WEIKARD)]. Zum Klären (I. §. 80).

Ausserl. zu Mundwässern [3 Essl. fein gestossenen Zuckers in 6 Eiweiss aufgelöst, dies mit $\frac{3}{4}$ Quart heissen Wassers unter Umrühren gemischt, dazu Aq. Flor. Aurant. Unc. 1; hiermit den Mund viertelstündl. auszuspülen, ausserdem 2stündl. 2 Essl. davon zu verschlucken: RENAARD gegen durch Quecksilber, be- sonders durch Sublimat hervorgerufenen Speichelfluss], Linimenten [z. B. mit Milchrahm und einem fetten Öl bei Verbrennungen, mit Branntwein beim Durch- liegen u. s. w. — R. 9 (Acet. plumb.)], Waschungen [selten. R. 78 (Alum.)], als anatripsologisches Vehikel u. s. w. — 40 Eiweiss zu Schaum geschlagen, dann 4 Unz. Bleiessig u. 4–5 Unz. Camphergeist zugesetzt, giebt ei- nen, bald steif werdenden, Kitt, dessen sich ROGETTA bedient, um mit leinen- nen Verbandstücken u. s. w. einen unbeweglichen Verbandapparat für Fracturen zu bilden (vgl. SCHMIDT *Jahrbh. d. gesamm. Med.* Bd. 4. S. 210). Die angege- bene Portion reicht für den Unterschenkel aus.

2. Vitellus (-um) Ovi. Eidotter. Eigelb. [Hauptbe- standtheile: Fettes Öl, Farbstoff und Eiweissstoff. — In Wasser nicht klar auflös- lich, aber leicht damit zu vermischen. — Der Dotter von 1 frisch gelegten Ei pflägt Dr. 5–6 zu wiegen.] *Cave:* s. I. S. 35 sub 10. u. 36 sub 13.; auch ver- ordne man im Sommer nur auf Einen Tag [weil das Eigelb leicht in Fäul- niss übergeht].

Innerl. als Emulgens [I. §. 88.]; sonst mehr diätetisch [par- tiewe mit Zucker, oder in Zimmtwasser gelöst mit Zucker, oder in Milch; bei Brust- krankheiten in Brustthee mit Candiszucker; bei chronischen Durchfällen mit Rum; in Fiebern, wo die Mundhöhle trocken, heiss, die Zunge excoriirt, nach G. A. RICH- TER mit Syr. Alth. ana 1 u. Candiszucker $\frac{1}{2}$ als (ein. sehr dicker) *Linctus*; u. s. w. — *Potus antatrophicus* PH. P.: $\frac{1}{2}$ –1 Eidotter mit einer Weinflasche voll Was- ser geschüttelt, bis die Flüssigkeit milchigt wird, dazu 1 Messerspitze Kochsalz; dies dem Kinde als gewöhnliches Getränk. — Andere Getränke s. im Anhang].

Äusserl. zur Application aufs Zahnfleisch [1 Dotter mit 1 Theelöffel gepulverten Candiszuckers und 1 Essl. Provencer Öl zusammengeführt, davon etwas auf einen Streifen Leinwand gestrichen und dieser längs der Geschwulst aufgelegt: PITSCHAFT zur Zertheilung, Erweichung und Ausheilung von Zahn-Geschwülsten u. - Geschwüren], zu Klystieren [nicht bloss als Emulgens, sondern auch bisweilen, um andere Arzneistoffe gleichsam einzuhüllen (daher wohl als Zusatz zu Klystieren für sensible Personen; vgl. z. B. *Ol. Lin.*), und hauptsächlich auch, um — bei gehinderter Ingestion durch den Mund — zu ernähren: zu diesem letzteren Behuf etwa 2 Dotter (nicht mehr) in 1 Tasse (auch nicht mehr) starker Fleischbrühe oder einer Salepauflösung, welche letztere besonders sicher vor dem baldigen Wiederabgehen des Klysters schützt. Vgl. *Rad. Salep.*], Linimenten [mit fetten Ölen, Terpenthinöl, Balsamen, Spirituosis u. s. w. in mannigfachen Verhältnissen vermischt. — R₂ 155 (*Bals. Peruv.*); vgl. *Ol. Lin.*]; selten als Salbenconstituens [I. §. 171].

* *Oxalium. Sal Acetosellae. Kali bioxalicum. Binoxalas kalicus cum Aqua.* Sauerkleesalz; saures sauerkleesaures Kali. [1 Unze 5 $\frac{2}{3}$ Sgr.] Sol. 40. — *Cave* Kalkwasser; Kalksalze; viele Metallsalze [besonders Blei-, Quecksilberoxydal-, Silberoxyd-Salze, salzs. Gold]. Man hat es wohl zu einigen Gran *p. dosi* als kühlendes Mittel, namentlich auch zum Getränk, verordnet; da es indess schon zu einigen Drachmen als tödtliches Gift wirkt, so dürfte man immer nur eine sehr kleine Quantität davon vorrätig verschreiben. Das Mittel wird aber auch durch *Acid. tartar.* ganz entbehrlich gemacht. — (≠)

OXYMELLA. Sauerhonige. — Die officinellen [*Oxymel Aeruginis* (S. 295) hier ausgeschlossen] sind sämmtlich aus 1 eines Essigs und 2 *Mel despum.* zusammengesetzt und durch Einkochen zur Consistenz eines Syrups oder flüssigen Honigs gebracht; klar. — *Cave:* s. *Aceta* u. *Mel.* — Sie eignen sich für flüssige Arzneien [aber nicht für Tropfenmixturen; nicht für Mixturen, in denen sie durch Beförderung der Gährung nachtheilig werden könnten (namentlich im Sommer); *Oxymel Colchici* und *scilliticum* ihres schlechten Geschmacks wegen nicht für Juleps] und unter den feuchtweichen besonders für die Latwerge [bei der man sie oft als Constituenten gebraucht (doch die beiden wirksameren, *O. Colch.* u. *scillit.*, nicht mit *q. s.* angesetzt, also in der Regel nicht als alleinige Constituenten). Für Pillen und Bissen dagegen würden sie noch schlechtere Constituenten seyn als Honig (I. S. 241); auch kann man sie in diesen Formen nicht als Hauptmittel geben, weil ihre Dose zu voluminös dazu ist]. Bisweilen gebraucht man sie, um Gummiharze (unvollkommen) aufzulösen; besonders das *Oxym. scillit.* [freilich eine für den Geschmack arge Combination].

† *Oxymel Armoraciae* PH. SLESV. Anhg. [Soll wie das *Oxymel Colchici* bereitet werden, obwohl diese Pharmacop. ein *Acetum Armorac.* nirgends aufführt. — 1 Unze 2 Sbl.] Innerl. unzenweise.

* *Oxymel Colchici.* Zeitlosensauerhonig. [*Acet.*

Colchici 1, *Mel despum.* 2. — 1 Unze 2½ Sgr.] Innerl. zu Dr. 2-6, einmal tägl.

Oxymel scilliticum. Meerzwiebelsäuerhonig.

[*Acet. scillit.* 1, *Mel despum.* 2. — 1 Unze 2½ Sgr.]

Innerl. zu Dr. 1-4, einmal tägl.; pur [z. B. als Brechmittel für kleine Kinder theelöffelweise], od. in Latwergen [R₇ 292 (*Cort. Chin. reg.*)], Mixturen [z. B. Unc. 1 mit *Tinct. Digital. simpl.* Dr. 1 u. ¼ Unzen Theeausguss, 2stündl. 1 Essl.: *Potio diuretica* der Charité zu Paris. — R₇ 139 (*Bacc. Junip.*), 1025 (*Tart. borax.*); vgl. *Tinct. Pimpinell.* Oft mit Gummiharzen, z. B. R₇ 83, 84 (*Anem. offic. dep.*)]. Oft als Zusatz zu diuretischen, anthelminthischen, expectorirenden und Brechmitteln [z. B. als Constituens einer Wurmlatwerge: R₇ 965 (*Sem. Cin.*); als Zusatz zu Brechmixturen: R₇ 866, 867, 871, 872 (*Rad. Ipec.*), 1038 (*Tart. stib.*)].

Äusserl. zu Mund- u. Gurgelwässern [nur als Zusatz, etwa Unc. 1 auf Unc. 6], Pinselsäften [selten], Klystieren [Unc. 1-2].

Oxymel simplex. Sauerhonig. [Essig 1, *Mel despum.* 2.

— 1 Unze 1½ Sgr.] Innerl. drachmen- u. unzenweise als Zusatz zu Mixturen [Unc. ¼-2 auf Unc. 6]; zum Getränk [Unc. 3-6 auf 1 Quart, z. B. einer dünnen Abkochung der Graswurzel oder Gersten-, Hafer-Schleim]. — Äusserl. als Zusatz zu Mund- u. Gurgelwässern [Unc. 1-2 auf Unc. 6], Klystieren [Unc. 2-4 zu Einem. R₇ 599, 600 (*Kali nitr. dep.*); vgl. auch *Ol. Lin.*].

* *Pampini Vitis cum Folis.* Weinranken mit den Blättern. [Hauptbestandtheile: Weinsteinäure und Äpfelsäure.] Man benutzt in der Regel nur das Extract, doch hat sich Rusz auch in Ermangelung desselben einer saturirten Abkochung der frisch abgebrochenen Weinranken mit Erfolg bedient.

Passulae (Uvae passae) majores und *minores.* Grosse u. kleine Rosinen (die erstern auch *Zibebae*, Zibeben, die letztern auch *Uvae Corinthiacae*, Korinthen). [Hauptbestandtheile: Krümelzucker, Schleimzucker, Gummi und Weinstein. — 1 Unze 1 Sgr.]

Innerl. in Abkochung [zum Getränk etwa L. ¼ mit 1½ Quart auf 1 Quart. — Man setzt sie auch wohl Species zur Veräussung bei; namentlich sind sie in dieser Art für Brustmittel in Frankreich beliebt].

Äusserl. die grossen Rosinen in Substanz [z. B. zur Zeitigung von Abscessen in der Mundhöhle: vgl. *Caricac.* — Oder mit Oel bestrichen als Stuhlzäpfchen für Kinder].

(Die Traubencur — um dies hier gelegentlich mitzunehmen — besteht darin, dass man die Kranken im Spätsommer oder Früh-

herbst bei fleissiger Bewegung im Freien, dieserhalb jedoch nur passend in südlicheren Gegenden [weil in nördlicheren, z. B. am Rhein, zur Zeit der Weinlese das Wetter meist schon zu herbstlich ist; also z. B. in Südfrankreich, oder besonders gern an südlichen Seeküsten oder an den Ufern grosser Landseen, z. B. des Genfer (Vevay, Lausanne u. s. w.), des *Lago di Garda*], wochenlang fast allein auf den Genuss der frischen Weintrauben beschränkt, nur noch nebenher etwas Weissbrod gestattet.)

****Pasta Cacao** (*s. Cacao ppt. s. Chocolata*) *cum Lichene Islandico*. Mooschocolade. [Durch *Kali carb.* entbitterter u. gepulverter *Lichen* 1, geröstete Cacao u. Zucker *ana* 6, gepulverter Salep $\frac{1}{2}$. — In Tafeln u. auch als Pulver vorrätig. — 1 Unze 3 Sgr.] Wie gewöhnliche Schokolade zuzubereiten; auf eine grosse Tasse (von 4-5 Unzen) nimmt man $\frac{1}{2}$ - 1 Essl., setzt auch wohl noch etwas Eiigelb zu.

****Pasta cosmetica**. Schönheitspaste; Waschpaste. [Ausgeschlaubte bittere u. süsse Mandeln *ana* 4, mit Rosenwasser zu einer sehr feinen Paste gemacht, dazu weisser Honig 1, Wallrath $\frac{1}{2}$, Campher $\frac{1}{12}$.] Etwa 2-3 Unzen auf Einmal zu verschreiben [Verabreichung in einer weissen Büchse; der Kranke verwende jedesmal einer Bohne gross od. mehr zum Waschen].

Pasta Glycyrrhizae s. Liquiritiae. Süssholzpaste. Brauner Lederzucker; braune Reglise. [Aus einem kalten Aufguss von *Rad. Glycyrrh. glabr.* mit *Gm. Mimos.* (Hauptbestandtheil) u. Raffinade bereitet. — 1 Unze 4 Sgr.] Als Zusatz zu Mixturen [wie die folgende, doch ist sie weniger angenehm], oder bei Husten, Heiserkeit, im Munde zergehn zu lassen [so namentlich für Kinder].

Pasta gummosa. Loco Pastae de Althaea. Gummipaste. Weisser Lederzucker; weisse Reglise. [Aus *Gm. Mimos.*, Raffinade, Eiweiss, mit ein wenig *Aq. Flor. Aurant.* u. s. w. — 1 Unze 4 Sgr.] In Wasser aufgelöst zu Getränken [Unc. 3-4 auf 1 Quart], auch wohl als Zusatz zu Mixturen [z. B. zur Einhüllung des Salpeters u. anderer scharf schmeckenden Mittel; oder zu Emulsionen, um sie noch schleimiger zu machen. — Rx 960. (*Sem. Cannab.*)].

Petroleum. Oleum Petrae. Steinöl. Bergöl. Und

Petroleum rectificatum. Gereinigtes Steinöl.

[Unauflöslich in Wasser; mit gewöhnlichem Weingeist giebt es eine milchige Flüssigkeit, aus der sich das Öl absondert (will man es mit Weingeist verbinden, so lasse man vor dem Gebrauch immer umschütteln); aber mit Äther, Äther- und fetten Ölen in allen Verhältnissen mischbar; löst Campher u. m. a. auf. — 1 Unze resp. 2 $\frac{1}{2}$ und 4 $\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave* besonders Salzbilder, namentlich Choler-

Innerl. (in der Regel das rectificirte) zu 5-15 Tropfen [bei Bandwurm mehr] einigemal tägl., pur [die Einzelgaben auf Zucker od. mit einem Syrup] oder in Mixturen [mit Äther, ätherischen Ölen, Tincturen (umgeschüttelt. Z. B. 1 mit $1\frac{1}{2}$ Tinct. Asae foet., 4mal tägl. 40 Tropfen: SCHWARZ gegen Bandwurm) od. dgl.], Pillen od. Bissen [doch hier nur in verhältnissmässig geringer Menge, unter denselben Beschränkungen, wie sie für äther. Öle gelten, s. S. 333, weil es sonst die Consistenz der Masse verdirbt, sich aussondert u. s. w.].

Ausserl. (in der Regel das rohe, gern mit Zusatz eines stark und gut riechenden äther. Öls; bei delicateren Personen jedoch lieber das weniger unangenehm riechende rectificirte oder selbst ein, in manchen Apotheken zu findendes, wiederholt rectificirtes, fast geruchloses) zu Ohrtropfen, Einreibungen [z. B. 1 mit 2 Liq. Ammon. caust. (stark umzuschütteln): RICHTER gegen torpide Frostbeulen; — Dr. $1\frac{1}{2}$ mit Spir. saponat. Unc. 1 (umzuschütteln): BAUNDERS gegen Frostbeulen, überhaupt zur Zertheilung asthenischer Geschwülste; — bei Wärmkrankheit mit Zwiebel- oder Knoblauchsaff; — bei Wassersucht mit Terpentinöl od. dgl. in Nieren- u. Blasen-Gegend; u. s. w.], Waschungen [mit Spirituosis, umgeschüttelt. — R_x 793, 794], Salben [R_x 795, 796; 61 (Aloë luc.); 202 (Camph.), 654 (Liq. Ammon. caust.)]; selten zu Pflastern [R_x 943 (Resina Pini Bérgr.)].

793.

R_x Ol. Terebinth. Dr. 1

Petrolei rfi. Unc. $\frac{1}{2}$

Spir. Junip. Unc. 4.

M. D. S. 2-3mal tägl., etwas erwärmt u. umgeschüttelt damit die Lendengegend zu waschen. (Bei Wassersuchten mit Torpidität der Harnorgane.) VOGT.

794.

R_x Petrolei Unc. $\frac{1}{2}$

Tinct. Opii simpl. Dr. 2

Spir. Lavandul. Unc. 1.

M. D. S. Waschwasser, umzuschütteln (für erfrorrene Zehen). SCHUBARTH.

795.

R_x Sebi ovilli Dr. 2

Ungt. simpl. Dr. 6.

Liquelactis et semirefrigeratis admisce
Petrolei rfi.

Ol. Terebinth. ana Dr. 1.

D. — In Unterleib u. Lendengegend einzureiben. (Bei hydropischen Affectionen.) (VOGT.)

796.

R_x Camphorae Scr. $\frac{1}{2}$

solus in

Petrolei Dr. $1\frac{1}{2}$

adde

Ungt. cerei Dr. 6.

M. D. S. Frostsalbe. SUNDÉLIN.

Phosphorus. Phosphor. [1 Drachme $3\frac{1}{2}$ Sgr.] Ist auflöslich in Weingeist [schwierig, für die Praxis unbrauchbar], Äther [vgl. Aeth. phosphorat. Es ist dort bemerkt, dass man in reinem Äther aufgelöst den Phosphor nicht füglich in voller Gabe geben könne; will man dies, und will doch zugleich Äther dabei haben, so kann man den Phosphor in einer Verbindung von äther. Öl und Äther auflösen; vgl. R_x 798], ätherischen Ölen [die Auflöslichkeit in den verschiedenen äther. Ölen ist verschieden, und die Angaben der Auto-

ren bei den einzelnen sind etwas schwankend, doch kann man annehmen, dass von den meisten ätherischen Ölen die Unze 4-6 Gran, vom Terpenthin- oder Rosmarin-Öl 8 Gran, vom *Ol. animale aether.* sogar 12-16 Gran auflöst, und fetten Ölen [auch hier differiren die Angaben der Autoren über die Auflöslichkeit sehr, doch kann man unbedenklich annehmen, dass sich Gr. 10 Phosph. in Unc. 1 irgend eines fetten Öls, z. B. Mandelöl od. Mohnöl, auflösen]. Man verschreibe übrigens nie eine ganz gesättigte Auflösung, weil sich sehr leicht (vgl. *Aeth. phosphbr.*) etwas Phosph. ausscheidet, was, selbst beim äusserlichen Gebrauch, gefährlich werden kann. — *Cave* Licht; unzweckmässige [vgl. I. §. 20.] oder lange Aufbewahrung. Beim innerlichen Gebrauch meide der Kranke auch saure oder leicht Säure im Körper erzeugende Speisen. Wendet man den Phosph. äusserlich an, so muss man den Kranken warnen, sich keiner Flamme zu nähern, weil sich schon in einiger Entfernung von derselben der Phosph. entzünden würde.

Innerl. (\neq) zu Gr. $\frac{1}{16}$ - $\frac{1}{8}$, vorsichtig steigend bis zu Gr. $\frac{1}{4}$, bei chronischen Krankheiten 2-3 mal tägl., bei acuten (die kleineren Gaben) alle 2-1 $\frac{1}{2}$ St., so jedoch, dass nie mehr als höchstens Gr. 2 tägl. verbraucht werden. Nie in festen oder festweichen Arzneiformen, sondern immer nur aufgelöst, in Äther, ätherischen oder fetten Ölen [namentlich Mandel- od. Mohn-Öl], und diese Auflösungen dann entweder in Tropfen [so namentlich die Auflösungen in Äther od. äther. Öl; die Einzelgaben dann in schleimigem Vehikel zu nehmen. Diese Darreichungsart ist jedoch nur bei zuverlässigen Leuten passend. — Ry 797-800], oder die Auflösungen in fettem Öl [nicht die in ätherischem] mit Wasser durch *Pulv. Gn. Mimos.* zur Emulsion gemacht [Ry 801, 802].

Äusserl. als Causticum [PAILLARD empfiehlt, Stückchen Phosphor von der Grösse einer halben Linse auf die Haut zu legen und durch eine glühende Stricknadel anzuzünden, — als Ableitungsmittel bei chronischen Entzündungen von innern Eingeweiden, Muskeln, Gelenken u. Knochen. Es brenne dies weit rascher ein, die Vorbereitungen seyen weniger ängstigend, der Schmerz dauere weniger lange, als bei der Moxa, u. man könne bequemer mehrere Caustica zugleich appliciren]; sonst ebenfalls immer aufgelöst, aber nicht in Äther [weil dieser wenig Phosph. aufnimmt und zu leicht verdunstet, so dass sich der Phosph. sehr leicht während des Einreibens entzünden könnte!], eher schon in äther. Öl [Ry 801], gewöhnlich aber und am besten in fettem Öl oder Fett [Die Auflösungen in fettem Öl od. Fett haben einen knoblauchartigen Geruch und leuchten, auf die Haut gebracht, im Finstern — was wohl den Kranken ängstigt; ein geringer Zusatz eines ätherischen Oels (Zimmt- u. Nelken-Oel ausgenommen) hebt diese beiden unangenehmen Eigenschaften auf, und zwar eignen sich am besten zu diesem Behuf *Ol. Rosmar.* bei Armen, *Ol. Bergamott.*, *Ol. Citri Cortic.* bei Wohlhabenderen; man braucht von diesen Oelen nur $\frac{1}{16}$, höchstens $\frac{1}{10}$ der Phosphorauflösung zuzusetzen, also auf 1 Unze etwa 16-30 Trop-

fen, d. b. Scr. $\frac{1}{2}$ -1 (Ry 805-807). Auch Campher (Ry 803) hebt das Leuchten mehr oder weniger auf.], und diese Auflösungen dann zu Linimenten [Ry 803-805. — Das einfachste Phosphorliniment ist eine Auflösung in einem fetten Oel, mit einem geringen Zusatze eines äther. Oels.] u. Salben [Ry 806, 807], so dass etwa Gr. 2-8 Phosph. auf 1 Unze Liniment oder Salbe kommen.

797.

Ry Phosphori Gr. 1

solve in

Ol. Valerian. (od. *Cnjepuli*) Scr. 1

— *animal. aether.* Dr. 1.

D. in vitro charta nigra involuto. —

Zu 5-15 Tropfen (fast $\frac{1}{30}$ - $\frac{1}{10}$ Gran) mit Haferschleim.

798.

Ry Phosphori Gr. 2

solve in

Ol. anim. aether. Dr. $1\frac{1}{2}$

Aether. sulphur. Dr. 1.

D. in vitro charta etc. — Alle 2- $4\frac{1}{2}$ St. 12-25 Tropfen (etwa $\frac{1}{18}$ - $\frac{1}{8}$ Gran) mit Haferschleim.

799.

Ry Phosphori Gr. 2

solve in

Ol. Terebinth. rsl. Dr. 3.

D. in vitro charta etc. S. 4 mal tägl. 15 Tropfen (etwa Gr. $\frac{1}{18}$) in einer Tasse Althäendecoct. (Gegen hartnäckige Wechselstieber.) (HUFELAND.)

800.

Ry Phosphori Gr. 1

solve leni calore in

Ol. Amygdal. Dr. 2

adde

Ol. Calami Gtt. 10.

M. D. in vitro charta etc. — Zu 10-15-20 Tropfen (reichlich $\frac{1}{18}$ - $\frac{1}{8}$ Gran) mit Schleim.

801.

Ry Phosphori Gr. 1

solve leni calore in

Ol. Papav. rec. par. Dr. $1\frac{1}{2}$

adde

Gm. Mimos. pulv. Dr. 1.

et terendo sensim misce c.

Syr. Flor. Aurant. Unc. 1

Aq. Cerasor. Unc. 2.

D. S. Umgeschüttelt 2stündl. $\frac{1}{2}$ -1 Essl. (Gr. $\frac{1}{12}$ - $\frac{1}{6}$).

802.

Ry Phosphori Gr. 1

solve leni calore in

Ol. Amygdal. Unc. $\frac{1}{2}$

adde

Gm. Mimos. pulv. Dr. 2

et terendo sensim misce c.

Syr. Zingib. Unc. 1

Inf. Rad. Serpent. Fürg. (Unc. $\frac{1}{2}$) Unc. 4

ut f. Emuls., cui adde

Spir. sulphur.-aeth. (od. *Liq. Ammon. succin.*) Dr. 1.

M. D. S. Umgeschüttelt alle 2-1 St. 1 Essl. (fast $\frac{1}{12}$ Gran).

LOCKSTAEDT.

803.

Ry Phosphori Gr. 7

solve leni calore in

Ol. Amygdal. Unc. 1

adde

Camphorae Scr. 2

et denuo solve. *D. S.* Zum Einsreiben.

Liniment. (Oleum) phosphoratum

PH. HANN. (1 Unze 10 $\frac{1}{2}$ Mgr.)

804.

Ry Phosphori Gr. 2

solve in

Ol. animal. aether. Dr. 2

— *Menth. pip.* Dr. $\frac{1}{2}$ -1.

D. — In der Augengegend einzureiben. (Gegen nervöse Amblyopie und Amas-

rese, auch gegen Lähmung der Augen-
lieder.) LÖBENSTEIN-LÖBEL.

805.

Ry Phosphori Gr. 4

solvs in

Ol. Papav. rec. par. Dr. 6

adde

Liq. Ammon. caust. Dr. 2

Ol. Terebinthinas rft. Scr. $\frac{1}{2}$.

M. D. — 2 mal tägl., umgeschüttelt,
 $\frac{1}{2}$ -1 Theelöffel in den gelähmten Theil
einzureiben. (Liniment ammoniato-phos-
phoratum.)

806.

Ry Phosphori Gr. 3

solvs leni calore in

Ungt. simpl. Unc. $\frac{1}{2}$.

Solutioni refrigerat. admisce torendo

Ol. Menth. pip. Scr. $\frac{1}{2}$

— Rosimar. Dr. $\frac{1}{2}$.

F. Ungt. D. S. Zum Einreiben.

LOCKSTAEDT.

807.

Ry Phosphori Gr. 5

solvs leni calore in

Ol. Olivar. Unc. $\frac{1}{2}$

admisce

Cerae alb. antea liquefact. Dr. 2

et post refrigerat.

Camphorae Gr. 10, in

Ol. Cajeputi Dr. 1

antea soluta. F. Ungt. D. S. Zum Ein-
reiben.

LOCKSTAEDT.

★★ *Pilulae Jalapae s. purgantes*. [Sapo jalap. 3, Rad.
Jalap. 1, daraus zweigranige Pillen. — 1 Drachme 4 Sgr.] Als Reizmittel
2 Stück einigemal tägl.; als Purgans etwa 10 Stück 2stündl., ein Paar
Mal hinter einander.

Piper album. Weisser Pfeffer. [Hauptbestandtheil: Pi-
perin (krystallisirbarer, in Wasser fast unlöslicher, auch in kaltem Weingeist
schwerlöslicher Stoff). — 1 Unze 2, sub. pulv. 3 Sgr.] Und

Piper nigrum. Schwarzer Pfeffer. [Hauptbestandthei-
le: Piperin und äther. Oel. — Etwas kräftiger als der weisse Pfeffer; daher na-
mentlich bei Wechselfiebern und zum äussern Gebrauch vorzuziehen; zum mehr
diätetischen Gebrauch dürfte dagegen der weisse den Vorzug verdienen. — 1 Unze
 $1\frac{1}{2}$, sub. pulv. 2 Sgr.]

Innerl. in Substanz zu 5-20 Körnern (ganz zu verschlucken),
ein- od. einigemal tägl. [z. B. gegen Wechselfieber (doch nicht gegen Früh-
lingsfieber!) in der Apyrexie 3-4mal tägl. 15 schwarze Pfefferkörner: L. FRANK;
— frischer Punsch mit 10-20 schwarzen Pfefferkörnern jedesmal beim Eintritt
des Anfalls: KRIMER bei (einer Epidemie von schwer zu bekämpfenden) Wech-
selfiebern]; gepulvert zu Gr. 5-20 einigemal tägl., auch wohl in Pil-
len [samentlich als Zusatz, wenn leicht feucht werdende, zerfliessliche Substan-
zen darin sind, um sie trocken zu erhalten] oder in spirituösem od. weini-
gem Aufguss.

Äusserl. als Kaumittel [bei Zungenlähmung. — Bei Erschlaffung
des Zäpfchens taucht man dies wohl einigemal tägl. in einen mit gepulvertem Pfeffer
gefüllten Löffel.], zum Gurgelwasser [etwa mit Wein digerirt];
bei Kopfläusen gepulvert in die Haare gestreut; als schärfender Zusatz zu
Sinapismen [etwa 1 auf 2 Senf. — Ry 973 (Sem. Sinap.)].

† *Pix alba s. Burgundica s. Graeca*. Weisses, burgundisches od. griechisches Pech. [1 Unze 1 Shl.] Zu Pflastern [wie *Rosina Pini empyreum. solida*].

Plumbum aceticum crudum. Saccharum Saturni. Acetas plumbicus cum Aqua crudus. Rohes essigsaureres Blei. Roher Bleizucker. [1 Unze 1½ Sgr.] *Sol.* u. *Cave* wie beim folgenden.

Äusserl. (≠) zu Einspritzungen [Ry 808. — Für die Harnröhre lieber *Plumb. acet. depurat.*], Umschlägen u. Waschungen [wozu jedoch häufiger *Acet. plumbic.* od. *Aqua plumbica*. — Ry 809. — Die PH. MIL. hat einen *Liquor Plumbi acet.* (Dr. ½ auf *Aq. comm.* L. 1) als „Ersatz“ der *Aq. plumbica*, aber das basisch-essigsaurere Blei in der letzteren wirkt gewiss oft vorteilhafter als das neutrale nebst den anderen, in Folge der Zersetzung durch die *Aq. commun.* sich bildenden Bleisalzen in jenem *Liquor.*], Bädern [selten. Unc. 1, bei Krebsbubeln im Ludwigshospital zu Paris gebräuchlich], Salben [selten, da Bleisalben officinell sind, mit denen man bequem andre Mittel verbinden kann. Ry 126 (HELLMUND's Salbe)]. — Zu Moxen [ein Streifen nicht oder schwach geleimten Papiers (Druckpap.) in eine Auflösung (die nicht einmal gesättigt zu seyn braucht) getaucht, wieder getrocknet; dann ein einige Linien hoher Cylinder daraus gerollt (je fester gerollt, desto langsamer brennt er) und während der Application durch eine Nadel mit hölzernem Griff od. dgl. (etwa eine Nähnadel in das Mark eines jungen Baumzweigs und in die Moxa eingestochen) festgehalten; man kann eine solche Moxa auf mehreren Stellen appliciren, da das Glühen einige Minuten anhält].

808.

Ry *Plumbi acet. crudi* Dr. ½ (- 1)
solvs in

Aq. destill. Unc. 6
adde

Liq. Myrrhas

Tinct. Opii simpl. ana Dr. 2.

M. D. — Wenig erwärmt und umgeschüttelt 2-3 mal tägl. einzuspritzen. (Bei sehr hartnäckigem *Fluor albus*.)

809.

Ry *Plumbi acet. crudi* Scr. 1
solvs in

Aq. Rosar. Unc. 8
adde

Sulphur. præcipit. Dr. 2.

M. D. S. Umgeschüttelt als Waschwasser. (Gegen hartnäckige flechtenartige Hautausschläge, besonders in der Nähe des Auges.) RELL.

Plumbum aceticum depuratum. Saccharum Saturni dep. *Acetas plumbicus cum Aqua dep.* Gereinigter Bleizucker. Essigsaureres Bleioxyd. [1 Unze 3½ Sgr.] *Sol.* 1½; auch in Alcohol auflöslich. — *Cave* [mit zahlreichen sanctionirten Ausnahmen] Hydrothionsäure, Kohlensäure, Ameisensäure, stärkere Säuren: Salzbilder; kaust. Kali u. Natron; Kalkwasser; viele Salze [kohlen-saurer u. salz. Alkalien; schwefels. u. phosphor. Salze; Oxalium; Borax]; Seifen; Schwefellebern; Gerbstoff; eiweiss- od. käse-haltige Substanzen [z. B. Eigelb, Milch]; die meisten Ex-

tracte; Pflanzenschleim [nicht *Gm. Mimos.*], Stärkmehl; *Aq. comm.* — Viele Pflanzenpigmente verändert der Bleizucker [z. B. das der Veilchen in Grün, die von *Malva arbor.*, *Flor. Rhoead.*, in Dunkelviolet, das der Rosen in Gelb u. s. w.].

Innerl. (*ad Granum unum!*) zu Gr. $\frac{1}{4}$ -1, 2-4mal tägl; bei Hämorrhagien auch wohl in noch grösseren Gaben und häufiger [z. B. Ry 811]; gern mit etwas Opium. In Pulvern [Ry 810, 811], Pillen [zweckmässig dazu in destill. Wasser aufgelöst. — Ry 812], Auflösungen [Ry 813], Emulsionen [Ry 814].

Ausserl. zu Mund- u. Gurgelwässern [man warne den Kranken vor dem Verschlucken. — Scr. $\frac{1}{2}$ od. mehr auf Unc. 6; es werden davon die Zähne schwarz, doch soll man dies durch ein Zahnpulver aus China, Schwefel u. Weinstein beseitigen können], Einspritzungen [z. B. für die Harnröhre Gr. 1-3 auf Unc. 1. — Ry 815], Augengewässern [Zu Bähungen (z. B. um bei Blättern die Augen zu schützen) Gr. 4-12 auf Unc. 4. Zu Tropfwässern Gr. 1-3 auf Unc. $\frac{1}{2}$. — Ry 816], Augensalben [Gr. 2-10 auf Dr. 2; zweckmässig vorher in destill. Wasser aufgelöst oder doch (die grösseren Quantitäten) mit Wasser oder Öl fein gerieben. — Gr. 10 mit Campher Gr. 4, auf Butter Dr. 2: ANDREAE gegen *Blepharitis glandulosa* und *impetiginosa*. — Ry 554 (*Hydr. oxyd. rubr. ppt.*)]. Augenkataplasma: Ry 817 (*Poma acidula*). (Zu Waschungen, Umschlägen, manchen Einspritzungen ist das vorige Präparat rein genug.)

810.

Ry *Plumbi acet. depur.* Gr. 6
Opü Gr. 3
Sacch. Lactis Dr. 2.
M. f. Pulv. Div. in 12 part. aeq. D. S.
 Fröh u. Abends 1 Pulver.

G. A. RICHTER.

811.

Ry *Opü* Gr. $\frac{1}{4}$
Plumbi acet. depur. Gr. 2 (-3)
Natri acet. sicci Gr. 3
Sacch. Lact. Gr. 5.
M. f. Pulv. Disp. tales Ar. —. D. S.
 Alle 2 (-1 - $\frac{1}{2}$) St. 1 Pulver, trocken, in eine etwas weiche Oblate eingewickelt, zu verschlucken. (Bei lebensgefährlichen Hämorrhagien; — der Gebrauch nur so lange als Gefahr, höchstens aber bei 2stündlicher Anwendung 2 Tage lang, fortzusetzen.) (KRIMER.
 Die Originalvorschrift enthält *Kali acet.*, aber dies zerfliesst.

812.

Ry *Plumbi acet. depur.* Gr. 5
solve in Aq. destill. q. s., adde
Opü pulv. Gr. 10
Extr. Millefol. Dr. 1
Pulv. Rad. Glycyrrh. q. s.
ut f. Pilulae 60. Consp. Sem. Lycop. D.
S. Alle 4 St. 3 Stück. (In manchen Fällen von Lungenschwindsucht, Blutspeien, atonischer Metrorrhagie.) JAHN.

813.

Ry *Plumbi acet. depur.* Gr. 3
Succi Glycyrrh. dep. Dr. $1\frac{1}{2}$ -2
solve in
Aq. Cerasor. Unc. 4
adde
Tinct. Opü croc. Scr. 1 - Dr. $\frac{1}{2}$.
M. D. S. Alle 5-3 St., umgeschüttelt,
 1 Essl. (Bei Pneumonie nach vorangeschickten Blutentziehungen; auch bei Lungenschwindsucht. — Bei aufgeregtem Blutssystem statt des Kirschwassers ein, passend mit destill. Wasser bereite-

tes, Inf. Hb. Digit. (Dr. $\frac{1}{2}$) Unc. 4.)
RITSCHER.

814.

Ry Ol. Amygdal. Unc. $\frac{1}{2}$
Gm. Mimos. pulv. Dr. 2
terendo sensim misce c.
Syr. simpl. Unc. $\frac{1}{2}$ et
Aq. Cerasor. Unc. 4
in quibus antea soluta sunt
Plumbi acet. depur. Gr. 2.
D. S. Alle 3 St., umgeschüttelt, 1 Eaal.

815.

Ry Plumbi acet. depur. Gr. 6
solve in
Aq. destill. Unc. 3
adde
Aq. Laurocer. Dr. 3.
M. D. — (Zum Einspritzen in die Harp-
röhre.) SCHUBARTH.

816.

Ry Plumbi acet. depur. Dr. 1
solve in

Aq. destill. Unc. 2-4
adde

Liq. Kali caust. Scr. 2.
M. D. S. Umgeschüttelt zum Bähnen der Augen. (Bei Augen- u. Augenlieder-Entzündungen, wo ein reines basisches Bleisalz wünschenswerth ist [so bei Augenentzündungen mit scharfem Thränenfluss, um die Schmerzen fast augenblicklich zu heben]. Es bildet sich essigsaures Kali, und sechstel-essigsaures Bleioxyd [noch basischer als der Bleiesig] fällt nieder; dieser Niederschlag ist übrigens so zart, dass er das Auge durchaus nicht drückt. Es heile diese Mischung acute Augenentzündungen, wenn sie idiopathisch seyn, radical; bei dyskrasischen sey sie wenigstens ein treffliches Palliativ. Bei grosser Reizbarkeit der Augen solle man noch Aq. Amygdal. amar. oder Laurocer. Dr. 1-2 zusetzen, wodurch die Heilung [ohne dass ableitende Mittel nöthig] ungemein befördert werde.) TUNNERMANN.

Plumbum carbonicum. Carbonas plumbeus.

Kohlensaures Bleioxyd. [Pulver. — 1 Drachme 1 Sgr.] Statt des oft verfälschten käuflichen Bleiweisses scheint die PH. BON. dies reinere, vom Apotheker selbst angefertigte [das zwar auch wesentlich chemisch verschieden ist, nämlich reines neutrales kohlensaures Bleioxyd; doch wird der pharmakodynamische Unterschied wohl nicht erheblich seyn], einführen zu wollen. Es wäre also dann wie *Cerussa* anzuwenden. [Zur Pflasterbereitung zwar eignet es sich nicht, indem es eine schmierige Masse giebt, doch kommt dies für die magistrale Rezeptur wenig in Betracht, da die officinellen Pflaster mit kohlensaurem Blei — *Empl. Ceruss.*, *R. consolidans*, *† R. defensiv. rubr.* PH. HANN. — wohl immer ausreichen.]

Poma acidula. Fructus Mali. Säuerliche Äpfel.

[Hauptbestandtheile: Äpfelsäure, Gallertsäure, Zucker. — Die PH. BON. empfiehlt die „Rostocker“, die auch „Stettiner“ heissen; doch sind auch die „Reinetsen“ zu medicinischem Gebrauch passend, mehr als die von manchen Schriftstellern empfohlenen „Borsdorfer“, die zu klein und nicht sauer genug sind.]

Innerl. zu Abkochungen [als kühlende u. erquickende Getränke; im Hause zu bereiten; s. den Anhang: Getränke]; diätetisch zu Compots, Gallerten etc., zu Cider [der freilich selten so gut, dass er von ärztlicher Seite empfohlen werden könnte].

Ausserl. zu Breiumschlägen [theils die geschabten Äpfel ab-

lein, z. B. bei leichten Verbrennungen; theils in Verbindungen. — Ry 817. — Bei schmerzhaften blinden Hämorrhoiden erleichtert wohl das Auflegen eines auf Leinwand gestrichenen Breies von mit Rothwein gekochten Äpfeln. — U. s. w.].

817.

Ry *Plumbi acet. depur.* Scr. $\frac{1}{2}$

Croci Scr. 1

Micas Panis albi *) Unc. 1

Pomor. acidul. rasorum Unc. 2.

Coque c. Lactis vaccini q. s. ad consistentiam Cataplasmatidis. D. in vitro orific. amplo. S. Auf die Augen zu legen.

(Bei Augenentzündungen im ersten Stadium.)

*) Statt der Semmelkrume auch bis-
weilen *Fol. Hyosc. inc.* in gleicher Quan-
tität, die dann wohl die Hauptwirkung
haben möchten.

Rust.
Dass die Composition unchemisch ist,
thut der Wirkung keinen Eintrag.

Poma Aurantii immaturi. *Fructus Aurantiorum immaturi.* Unreife Pomeranzen. [Hauptbestandtheile: Äther. Oel und bitterer Extractivstoff. — 1 Unze 1 Sgr., *bont. 1½, sub. pub. 1½ Sgr.*] **Cave** wie bei *Cort. Pom. Aurant.* — Innerl. zu Scr. 1-2; eini-
gemal tägl.; in Pulver, Latwerge; Aufguss [in der Regel in kaltem weinigen Aufguss, etwa tägl. Dr. 4-6 auf Unc. 4-6]. Diäte-
tisch zu Getränken [Bischof, Cardinal, Pabst — s. den Anhang]; auch
eingemacht [vielen angenehmer als die eingemachten Pomeranzenschalen,
doch nicht überall zu haben, besonders gut aber in Leipzig]. — Ausserrl.
in Substanz zum Unterhalten von Fontanellen [man sucht dazu die
Kleinsten aus].

Poma Citri s. Bergamottae. *Citrea. Mala citrea. Li-
mona. Limettae.* Citronen. Bergamotten. Limonen. Li-
metten. S. *Cortex u. Succus Citri.*

Poma (Fructus) Colocynthidis. *Colocynthides.* Ko-
loquinten. [Hauptbestandtheil: ein eigenthümlicher Bitterstoff. — 1 Unze
6½ Sgr.] Man verordnet in der Regel nur das Mark der Frucht;
ohne die Samen: *Pulpa Colocynthidis u. seminibus libe-
rata et concisa.* — **Cave** Salzbilder; (Alkalien); mehrere Me-
tallsalze [namentlich schwefelsaures Eisen u. Kupfer, salpeters. Silber u. Queck-
silber, Eisen- u. Quecksilber-Chlorid, Bleizucker]; Gerbstoff.

Innerl. (*Pulvis ad Granum unum!*) als Reizmittel zu
Gr. $\frac{1}{2}$ -2; als gelind eröffnendes Mittel zu Gr. 4-10; einigemal tägl.;
in Aufguss, häufiger in Abkochung [mit Wasser ad. Bier, s. H.
Dr. 1 mit 12 Unz. (besser wohl nur 9 Unz.) Bier auf 6 Unz., 3mal tägl. 1-2 Mal
mit Zucker: HUFELAND als Diureticum bei Wassersucht. — Ry 818]. (Zu
Pulvern und pulveraufnehmenden Formen nehme man *Colocynthis
praeparata.*)

Ausserrl. abgekocht zum Klystier [etwa Scr. $\frac{1}{2}$ -Dr. $\frac{1}{2}$].

818.

Ry *Pulpae Colocynth. a Seminibus purgat. et concia.* Dr. 1
Aq. comm. bullient. Unc. 6
ebulliant per 6 minutas; Colat. refriger. adde

Spir. sulphurico-aeth. Dr. 1*Syr. Cort. Aurant.* Unc. 1.

M. D. S. 3 mal tägl. 1 Essl. (Bei Wassersucht, besonders der Brust u. des Bauchs, mit torpidem Zustande, u. s. w.)
 (SYDENHAM. BUCHHAVE.)

* *Pulpa Cassiae* [*praeparata.* Dieser Zusatz wird nöthig oder doch passend seyn, um das auf S. 318 der Ph. Bor. aufgeführte, wie *Pulpa Tamarindor.* bereite, Cassienmuss von der auf S. 274 aufgeführten rohen *Pulpa Cassiae* oder *Cassia Fistula*, Cassienmark, Rohr- od. Purgir-Cassia, zu unterscheiden]. Cassienmufs. [Hauptbestandtheile: Zucker und ein eigenthümlicher Extractivstoff. — 1 Unze 8 Sgr.] Innerl. drachmen- u. unzenweise als Zusatz zu Abführmitteln [statt der Manna], in Latwergen u. Schüttelmixturen [vgl. *Pulpa Tamarind.* — Ry 437 (*Fol. Senn.*)].

Pulpa Prunorum depurata. (Uneigentlich) Roob *Prunorum.* Gereinigtes Pflaumen- od. Zwetschenmufs. [Hauptbestandtheile: Zucker und Pflanzensäuren. — 1 Unze 1½ Sgr.] Innerl. zu Latwergen [Ry 433 (*Fol. Senn.*)]; vgl. auch *Natr. sulph. dep. sicc.* u. *Tart. depur.*].

Pulpa Tamarindorum. Tamarindenmufs. [Enthält schon so viel Zucker als zur Versüssung nöthig. — 1 Unze 2 Sgr. — Surrogat s. unter *Tart. depur.*].

Innerl. esslöffelweise, doch selten pur, meist mit andern Abführmitteln, in Latwergen [Ry 362 (*Extr. Chin. fusc. frig. par.*), 735 (*Natr. sulph. depur. sicc.*), 1026 (*Tart. depur.*)] od. Schüttelmixturen [wenn man es in Mixturen aufnimmt, diese noch einmal colliren zu lassen — wo dann freilich kein Umschütteln mehr nöthig — ist in der Regel nicht zu empfehlen, weil ein guter Theil des Wirkbaren dabei verloren geht. — Ry 819, 820; 357 (*Extr. Chamom. vulg.*)]. (Zu Abkochungen die Tamarinden in Substanz. — Molken: s. *Serum Lact. tamarind.*)

Ausserl. zu Klystieren [doch selten; für den Mastdarm ist es ein zu mildes Mittel; man macht wohl zu Salzklystieren einen Zusatz von einem Paar Unzen (Schüttelmixtur)].

819.

Ry *Mannae elect.* Unc. 1
solve in
Aq. Chamom. Unc. 9
cola, adde

Pulpae Tamarindorum Unc. 3.
M. D. S. Umgeschüttelt tassenweise.

SELLE.

820.

Ry *Tart. boraxati* Unc. 1
Elaeos. Flavedinis Curi Dr. 3
solve in
Aq. comm. Unc. 12
adde

Pulpae Tamarind. Unc. 3.
M. D. S. Umgeschüttelt 2 stündl. 2 Essl.
 [Die hierin entstehende Zersetzung ist unbedeutend; vgl. *Tart. borax.*]

*****Pulvis aërophorus e Magnesia carbonica.***

Brausepulver aus Magnesia. [*Magn. carb.* 2, *Acid. tart.* $\frac{1}{2}$, *Elaeos. Cūri* 1. Enthält mithin (vgl. I. S. 138) beträchtlich mehr Magnesia als durch die Weinsteinsäure gesättigt wird. — 1 Drachme $\frac{5}{8}$ Sgr. — (PH. MIL.: mit *Sacch. alb.*) Zu Scr. $\frac{1}{2}$ –1 [Gr. 12 sind ungefähr 1 Theelöffel] alle 2–1 St. [Man kann, wenn man die Formel magistral verschreibt, mit den Verhältnissen der Ingredientien variiren, z. B. wenn man noch mehr kühlend und abführend wirken will, etwas mehr Weinsteinsäure nehmen; oder auch statt der Weinsteinsäure *Tart. depur.* oder Citronensaft; vgl. *Magnes. carbon.*; ℞ 665, 666.]

*****Pulvis aërophorus e Natro carbonico acidulo.*** Brausepulver aus saurem kohlen sauren Natron. [*Natr. carb. acidul.* 3, *Acid. tartar.* u. Zucker *ana* 2. Enthält mithin (vgl. I. S. 138) ein Geringes mehr Natron als durch die Weinsteinsäure gesättigt wird. — 1 Drachme $1\frac{1}{2}$ Sgr. — (PH. MIL.: *Natr. c. a.* Gr. 15, *Acid. tartar.* Gr. 14, *Sacch. alb.* Gr. 10 — dies *pro dosi.* Enthält 2 Gran überschüssiger Weinsteinsäure.) Zu Dr. $\frac{1}{2}$ –Scr. 2 alle 2– $\frac{1}{2}$ St. [pur oder etwa noch mit *Ol. Cūri Cort.* Gtt. 1. Auch hier darf man natürlich, indem man die Formel magistral verschreibt, mit den Verhältnissen der Ingredientien variiren. — Vgl. ℞ 706, 707]. — Vgl. I. S. 137.

*****Pulvis antepilepticus.*** (Gehässige Benennung, die man ungern aufs Recept setzen wird.) [*Viscum alb.* 2, *Rad. Paeoniae, Conch. ppt.* *ana* 1; wenn es verlangt wird, noch mit Zusatz von etwas Blattgold. — 1 Drachme $\frac{1}{2}$ Sgr.; mit Blattgold theurer. — Ähnlich *Pulv. Visci comp.* PH. SLESV. (*Visc.*, *Magnes. carb.*, *Rad. Paeon.* *ana* Unc. 1, *Rad. Irid. Flor.* Unc. $\frac{1}{2}$, *Fol. Auri concisa nr.* 6; — 1 Drachme 2 Sbl.)] Innerl. zu Dr. $\frac{1}{2}$ –1, mehrmals tägl.

Pulvis aromaticus. Gewürzhaftes Pulver. [*Zimmetcassie* 4, *Cardamom* 2, *Ingwer* u. *weisser Pfeffer ana* 1. — 1 Drachme $\frac{5}{8}$ Sgr. — *Pulv. aromat.* PH. P. enthält (minder zweckmässig) *Alant*, *Kalmus*, *Ingwer*, *Anis*, *Pomeranzenschale*, *schwarzen Pfeffer ana* 1, *Würznelken*, *Zimmetcassie ana* $\frac{1}{2}$. (1 Unze $2\frac{1}{2}$ Sgr.)] Innerl. zu Gr. 5–15 mehrmals tägl., in Pulver od. pulveraufnehmenden Formen; oft nur als Zusatz od. Geschmacks-correctis zu andern Mitteln, in kleineren Gaben.

****Pulvis cosmeticus.*** Schönheitspulver; Waschpulver. [*Ausgeschlachte bittere* u. *süsse Mandeln ana* L. $\frac{1}{2}$, *Wallrath* Unc. $\frac{1}{2}$, *Rad. Irid. Flor.*, *weisser Bolus ana* Unc. 2, *Benzoë*, *Kali carb. e Cin. clav. ana* Dr. $\frac{1}{2}$, *Ol. Flor. Aurant.*, *Lavand.*, *Caryophyll.* *ana* Gtt. 15. — Man verschreibe, versteht sich, keine so grosse Totalquantität, sondern nur unzenweise.]

*****Pulvis dentifricius.*** Zahnpulver. [*Conch. ppt.* Dr. 6, *Rad. Irid. Flor.* Dr. 1, durch einen aus 5 Gran Cochenille nebst 8 Gran Alaun (zur Erhöhung der Farbe) mit hinreichendem siedendem Wasser bereiteten Aufguss befeuchtet u. gefärbt; dazu nach dem Austrocknen 3 Tropfen Würznelkenöl. — Schön roth. — 1 Unze 4 Sgr.]

Pulvis Glycyrrhizae (Liquiritiae) compositus.

Pulv. pectoralis. Brustpulver (CURELLASches). [*Sulphur dep.* 2, *Fol. Senn.*, *Rad. Glycyrrh.* ana 3, *Anis* 1, *Zucker* 18. — 1 Drachme enthält $6\frac{2}{3}$ Gran Senna, $4\frac{4}{9}$ Gran Schwefel. — 1 Unze $2\frac{1}{3}$ Sgr. — Das gleichnamige Pulv. der PH. HANN. u. SLESV. enthält mehr Senna u. statt des Anis Fenchel.]

Innerl. zu 1–2 Theelöffeln, 4–6mal tägl. [mehr od. weniger, je nachdem es mehr od. weniger zugleich abführen soll].

Merklich stärker, zugleich mehr Brustmittel, weniger Abführmittel, folglich in geringeren Dosen zu geben, aber auch weniger angenehm, ist **Pulv. pectoralis** PH. P.: Schwefel 6, Senna 3, *Rad. Glycyrrh.*, *Irid. Flor.*, *Sem. Foenic.* ana 4; hier enthält 1 Drachme $8\frac{4}{9}$ Gran Senna, $17\frac{1}{9}$ Gran Schwefel; — 1 Unze $2\frac{1}{8}$ Sgr.; — 3–4mal tägl. 1 Theelöffel. — Ähnlich **Pulv. Liquirit. comp. (pectoral.)** PH. MIL.: Schwefel 2, Senna 1, Süßholz 5, Anis 2; hier enthält 1 Drachme 6 Gran Senna, 12 Gran Schwefel; — 1 Unze $2\frac{1}{2}$ Sgr.; — 3–4mal tägl. 1 gehäuften Theelöffel.

Pulvis gummosus. (Statt der alten *Species Diatrageacanthae*.) [*Gm. Mimos.* 3, *Rad. Glycyrrh. echin.* 1, *Sacch. alb.* 2. — 1 Drachme $\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. selten als eigentliches Arzneimittel (theelöffelweise alle 2–1 St.), oft aber als Pulverconstituens [namentlich bei besonders schweren oder leichten Substanzen — I. §. 112 sub 1) 2) —, bei scharf schmeckenden — I. S. 45 — u. s. w.].

Pulvis Ipecacuanhae opiatus. Pulvis Doweri.

Dowersches Pulver. [*Opium*, *Rad. Ipecac.* ana 1, *Kali sulphuric. dep.* 16. — Die Ipecacuanha mindert die narkotische Eigenschaft des Opiums. — 1 Drachme $\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. (*ad Grana viginti!*) etwa zu Gr. 9 ($\frac{1}{2}$ Gran Opium) einigemal tägl., oder zu Gr. 18 (Gr. 1) nur Einmal tägl. vorm Schlafengehn. [Oft variirt man mit der Composition, indem man sie magistral verschreibt, nimmt z. B. statt des *Kali sulphur.* Zucker, einen Ölzucker, ändert die Verhältnisse der beiden Hauptbestandtheile, oder macht Zusätze von Campher, Goldschwefel od. dgl. Oder man macht das Pulver durch Zusatz von *Extr. Dulcam.* od. dgl. zum Bolus u. s. w. Vgl. R_y 782, 783, 858, 859; auch *Extr. Acon.* — **Pulv. Ipec. opiat. (P. Doweri)** PH. MIL.: Opium, Ipecac. ana 1, *Kali sulphuric. dep.* 8, Zucker 10; also in 20 Gran 1 Gran Opium enthaltend.]

***Pulvis Magnesiae cum Rheo. Pulvis pro Infantibus.** Kinderpulver. [Dr. 1 enthält ungefähr: *Magn. carb.* Gr. 31, *Rad. Rhei* Gr. 8, *Rad. Irid. Flor.* Gr. $5\frac{1}{2}$, *Elaeos. Foenic.* Gr. $15\frac{1}{2}$. — 1 Unze 6 Sgr.] Für ein einjähriges Kind etwa zu Gr. 6–8 [eine Messerspitze oder $\frac{1}{2}$ Theelöffel] alle 2–1 St. [Etwas stärker ist **Pulv. Magnes. c. Rheo (Pulv. Infantum)** PH. SLESV.: *Magnes. carb.* Unc. $2\frac{1}{2}$, *Rad. Rhei* Unc. $1\frac{1}{2}$, Zucker Unc. $\frac{1}{2}$, *Ol. Foenic.* Gtt. 15; — 1 Unze 12 Sbl. — Noch $\frac{1}{2}$ Unze *Sapo medic.* dazu, dann: **Pulv. Infantum Hensleri** derselben Pharmakop. — **Pulvis Puerorum** PH. P.: *Magn. carb.* Unc. 1, *Rad. Rhei* Dr. 2, *Rad. Valer. min.* Dr. $\frac{1}{2}$, *Elaeos. Foenic.* Unc. $\frac{1}{2}$; — 1 Drachme $\frac{2}{3}$ Sgr.; — dazu bisweilen noch *Croc.* Scr. $\frac{1}{2}$ –1.]

***Pulvis sternutatorius.** *P. st. viridis* der PH. HANN.

[Mairan 3, Katzenkrent, Maiblumen, Florent. Veilchenwurz ana 1. — 1 Drachme $\frac{1}{2}$ Sgr.] *Ad libitum*. [*Pulv. errhipus* PH. P.: Mairan, Lavendel, Zucker ana Dr. 1, Maiblumen, span. Seife ana Dr. $\frac{1}{2}$, *Ol. Bergam.*, *Caryophyll.* ana Gd. 2. — 1 Drachme $\frac{1}{2}$ Sgr.]

****Pulvis temperans.** Niederschlagendes, kühlendes Pulver. [*Kali sulphuric. dep.* u. *Kali nitr. dep.* ana. — 1 Drachme $\frac{1}{2}$ Sgr. — *Pulv. temperans* PH. BLESV. (*Kali citr. dep.* u. *Tart. dep.* ana; — 1 Drachme 1 Sbl.) hat den Nachtheil, dass es sich minder leicht auflöst.] Innerl. zu Scr. $\frac{1}{2}$ –1 alle 2–4 St., in Pulver, Auflösung.

821.

Ry *Pulv. temperantis* Dr. 2
solve in

Aq. Cerasorum Unc. 4

adde

Oxymell. simpl. Unc. $\frac{1}{2}$.
M. D. S. Stündl. 1 Essl.

SCHUBARTH.

***Radix Alcaninae (spuria).** Alkannawurzel. [1 Unze conc. $1\frac{1}{2}$ Sgr.] Zum Färben von Salben, Ceraten [I. §. 172].

Radix Althaeae. Eibischwurzel. Altheewurzel. [Hauptbestandtheile: Schleim, Stärkmehl, Asparagin (od. Althäin — indifferente stickstoffhaltige Substanz) und Zucker. — 1 Unze conc. $1\frac{1}{2}$, *subt. pulv.* $1\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave* Salzbilder [besonders Iod]; viele Salze, besonders Blei-, Quecksilber- [vgl. jedoch *Hydr. mur. corr.*, S. 253], Silber-Salze; Gerbstoff. Auch verordne man die flüssigen Auszüge, weil sie leicht in Gährung gehn, nicht auf längere Zeit vorrätig. Starke Säuren und Salzbilder verdünnen durch allmähliche Zersetzung den Schleim.

Innerl. selten in pulveraufnehmenden Formen [*Tabulae Alth.* PH. AUSTR., mit 8 Theilen Zucker u. Tragantenschleim *q. s.* nach Art der Trochisken bereitet. Eine andere Trochiskenformel: I. S. 236. — Als Pillen- od. Bissen-Constituens (bindet sehr viel Flüssigkeit, und giebt fast schon mit blossem Wasser eine erträgliche Masse). Als Conspergens (I. S. 185).]; meist in Aufguss, Ebullition [Ry 961 (*Sem. Cannab.*)] oder, am häufigsten, Abkochung [Sie darf nicht lange gekocht werden, sonst wird der Schleim partiell verändert und die Abkochung kratzend und widrig; will man sie daher zu länger zu kochenden Dingen, z. B. zu Holztränken, setzen, so geschehe dies erst *sub finem coctionis*. — Zum Getränk etwa Dr. 3–4–(höchstens) 6 mit L. $3\frac{1}{2}$ auf L. 3 (concentrirter ist es unangenehm schleimig); dazu Zucker, Syrup, Honig; oder etwas *Rad. Glycyrrh.* mit aufgewallt. Als stärkere Arznei oder als Vehikel anderer Arzneien wohl noch concentrirter: Dr. 1–2 mit Unc. 8 auf Unc. 6; dann meist nur esslöffelweise. Wenn die PH. MIL. ihr (sehr concentrirtes) *Decoct. Alth.* (Unc. $\frac{1}{2}$ mit Unc. 16 langsam zur Colat. von L. 1 gekocht) tassenweise zu geben rath, so ist dies nicht mehr angenehm. — Setzt man eine starke Säure, z. B. Salzsäure, dazu, so kann man sämtliche Abkochungen mit doppelt so viel Substanz, als wir im Obigen angegeben, anfertigen lassen. — Ry 822]. In Berlin, bei Mische und bei Pollack, ist eine Althee-Schocolade käuflich.

Ausserl. abgekocht [meist etwas concentrirter als zum innerlichen Ge-

brauch, doch auch nicht leicht stärker als Dr. 2-3 mit Unc. 8-9 auf Unc. 6] zu Mund- u. Gurgelwässern [etwa mit Milch abgekocht], Klystieren [Dr. 2-3 mit einem Paar Tassen Wasser oder Milch leicht abgekocht. R_x 675 (*Malth. Hord.*); vgl. auch *Rad. Valer. min.*] u. a. Einspritzungen; zu Augen-Waschungen u. Bähungen [in der Regel nur als Vehikel anderer Mittel; etwa Scr. 2 mit Unc. 6 auf Unc. 4], auch zu anderen Umschlägen [in denen zwar, wie in manchen andern beliebten äusserlichen Applicationen der schleimigen Mittel, das lauwarme Wasser wohl das hauptsächlich Wirksame seyn wird]; zu Bädern [wohl sehr entbehrlich], zur Entwicklung von Dämpfen [zum Einathmen u. s. w. Da aber ihre Hauptbestandtheile nicht flüchtig sind, so sind dies fast nur Dämpfe von warmem Wasser].

822.

R_x *Rad. Althaeae*

— *Levistici* ana Unc. 1

— *Glycyrrh. glabr.* Dr. 3.

Conc. M. D. S. 2 gehäufte Essl. voll mit $1\frac{1}{2}$ Quart Wasser aufzuwallen; die Colatur den Tag über zu trinken. (Bei Gonorrhöe im entzündlichen Stadium, wenn zugleich die Verdauung schwach.)

Radix Angelicae. Angelik-, Engel-, Heiligegeist-, Brust- oder Luft-Wurzel. [Hauptbestandtheile: äther. Öl, aromatisch-scharfes Weichharz und bitterer Extractivstoff. — 1 Unze *conc.* $1\frac{1}{8}$ gr. *pulv.* $1\frac{1}{2}$, *subt. pulv.* $1\frac{1}{4}$ Sgr.]

Innerl. zu Scr. $\frac{1}{2}$ -Dr. $\frac{1}{2}$, mehrmals tägl.; in Pulver [in dieser Form jedoch, wie in pulveraufnehmenden — Latwerge, Bissen u. s. w. — nur etwa bei chronischen Krankheiten und Wechselfiebern; meistens vielmehr] im Aufguss [wässrigen oder geistigen oder weinigen; etwa Unc. $\frac{1}{2}$ auf Unc. 6, alle 2-1 St. 1 Essl. — *Inf. Angel. PH. MIL.*: Unc. $\frac{1}{4}$ mit 8 Unz. siedenden Wassers $\frac{1}{2}$ St. digerirt; Colat. von 6 Unz. (Es ist nicht zweckmässig, dass ausser der Colatur auch noch die Quantität des Aufzugessenden bestimmt ist.) — R_x 823; 928 (*Rad. Valer. min.*). Die Farbe eines gesättigten Aufgusses ist schön rothgelb.] oder in Ebullition [R_x 283 (*Cort. Chin. fusc.*)].

Äusserl. zu Kräuterkissen u. dgl. [vgl. I. S. 199]; infundirt oder ebullirt zu Klystieren [selten. — R_x 194 (*Campb.*)].

823.

R_x *Rad. Angelic.* Unc. 1

Vini Gallici albi L. 1.

Digere per nycthemerum; Colat. adda Tinct. Calami Dr. 6,
M. D. S. 2 mal tägl. $\frac{1}{2}$ Weinglas. (Bei chronischen Krankheiten.)

† *Radix Ari s. Aronis.* Aronwurzel. [Hauptbestandtheile: ein flüchtiger, leicht zerstörbarer Stoff und Stärkmehl. — 1 Unze $1\frac{1}{8}$, *subt. pulv.* $1\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. zu Gr. 10-15 einigemal tägl., in Pulver [*Pulv. Ari compositus* (*Pulv. Birkmanni*) *PH. SLEEV.* (1 Unze 6 Sgr.); *Rad. Ari* 4, Kalms und Pimpinelle ana 2, *Lap. Cancr.* 1, Zimmt $\frac{3}{4}$, *Natr. carb. dep.* $\frac{1}{2}$; meerserpitzen- od. theelöffelweise. — *Pulv. stomachicus PH. P.* (1 Unze 3 Sgr.); *Rad. Ari*, *Gentian. rubr.*, *Calami* ana 1, Ingwer, Pomeranzenschale, Doppelpals ana $\frac{1}{2}$, *Ol. Carvi* $\frac{1}{8}$; theelöffelweise.] etc.

Radix Armoraciae s. Raphani rustici s. marini. Meerrettig. Kreen. [Hauptbestandtheile: ein eigenthümliches, höchst scharfes und flüchtiges äther. Öl, Zucker und Stärkmehl. — Wird im Herbst gesammelt und ist nur frisch recht wirksam, doch hält er sich, im Koller unter feuchtem Sande aufbewahrt, bis gegen den Sommer hin frisch. Nach der Vorschrift der PH. BOR. u. SLESV. soll ihn der Apotheker immer nur frisch anwenden. — 1 Unze rec. $\frac{1}{2}$ 8gr.] *Cave:* s. † *Ol. Sinap. aether.* und I. S. 36 sub 15.

Innerl., geschabt [gewöhnlich auf einem Reibeisen] und mit Zucker versüßt, oder auch mit Essig angerührt, zu Dr. 2-4 ein Paar Mal tägl. [bekannter diätetischer Gebrauch]; oder der Preßsaft in ähnlichen Gaben [Ry 824]; oder im Aufguss [etwa Unc. 1-2 auf den Tag; in der Regel (weil sehr leicht zu extrahiren, und weil beim Digeriren weniger äther. Öl erhalten wird) macerirt, mit Wasser, Bier oder Wein; etwa 1 Unze auf 1 Pf., tassenweise. Ry 825-826. — FUNKE zur Verhütung von Wechselfiebertückfall: 3-4 Oberlassen voll frisch geriebenen Meerrettigs mit 1 Flasche Rothweins macerirt; 3-4 mal tägl. ein „kleines Stutzgläschen“; so mehrere Wochen; in der späteren Zeit gewöhnlich noch 1 Loth Pomeranzenschale zur Maceration. — THOMSON gegen chronische Heiserkeit: Dr. 1 mit 2 Unz. Wassers infundirt, die Colatur mit Zucker versüßt; öfters 1 Theelöffel langsam zu verschlucken].

Ausserl. in Substanz als Kaumittel [bei Zungenlähmung od. dgl.]; geschabt [gerieben] und [gewöhnlich mit Essig] zum Brei gemacht als Rubefaciens [wirkschneller aber weniger intensiv u. andauernd als Senf. Oft in Verbindung mit Senf od. dgl. — Wie der Senfsteig anzuwenden; vgl. *Sem. Sinap.* u. Ry 973]; infundirt zu Fussbädern [2-4 Unzen, geschabt]; der ausgepresste Saft zu Waschungen [bei Sommer- u. Leberflecken, ein Paar Mal tägl.; nach manchen häuslichen Vorschriften noch mit Essig oder Citronensaft oder Buttermilch vermischt, zweckmäßiger aber wohl par].

824.

Ry *Succi rec. expr. Rad. Armorac. Dr. 6*
 † — — — *Hb. Nasturtii aquat.*
 † — — — *Fol. Aetiosas ana*

Unc. 1.

Succos colatos et decantatos misce. D.

— Wie Ry 461 zu gebrauchen.

Die Formel ist nur im Frühling, höchstens noch im Frühsommer, zu verordnen.

825.

Ry *Rad. Armorac. ras. Unc. 2*
Sem. Sinapis cont. Unc. 1
 † *Cerevisias L. 3.*

Macera per horas 8; Colat. adde

Syr. Cort. Aurant. q. s.

ad saporem dulcem. M. D. S. Tassenweise. (Bei Wassersucht.)

SCHUBARTH.

826.

Ry *Rad. Armorac. ras. Unc. 5*
 † *Cerevisias L. 2*

macera per nycthemerum; Colat. adde Syrupi commun. Unc. 1.

M. D. S. In 2 oder 1 Tage, tassenweise, zu verbrauchen. (Ein wohlfeiles und ungemein kräftiges Mittel zur Beförderung der Harnausscheidung bei Schwerharnen, Harnverhaltung, Wassersuchten, Verschleimung der Harnwege, schleimigem Asthma.)

Cerevisia Armoraciae PH. P. Letztete RADIUS (der gewöhnlich nur 3 Unz. Meerrettig und oft keinen Syrup. nahm) auch gegen Mercurialsorbat und Mundfäule grosse Dienste.

827.

Ry *Hb. Cochlear. rec. inc.* Unc. 1½*Rad. Armorac. ras.* Unc. 2*Turion. Pini incis.* Unc. 1† *Cerevisiae* L. 4.

Macera per 48 horas. Colat. D. S. 3mal
tägl. oder öfter in ein Weinglas. (Antiscor-
butisch.) PLENCK.

Der *Cochlear.* wegen nicht überall, und
nur im Frühjahr, zu verordnen.

828.

Ry *Rad. Zingib. incis.* Dr. 2*Ferri pulsat. Unc.* 1*Rad. Armorac. ras.* Unc. 3*Vini Gallici, albi* L. 2.

Macera per 12 horas („besser wohl
ein Paar Tage“). *Cola et filtra. D. S.*
4 mal tägl. ½-1 Tasse. (Bei Scorbut,
Mischleucht u. dgl.) AUGUSTIN.

Radix Arnicae. Wohlverleihwurzel. [Haupttheile (und *Cave*) wie bei *Flor. Arn.* — 1 Unze conc. 1½, subit. pulv. 1½ Sgr.]

Innerl. zu Scr. ½-1-Dr. ½, mehrmals tägl. In Pulver,
Bissen, Latwerge, in Aufguss [nächstweilen zweckmässig, wenn
es besonders um das äther. Öl zu thun ist; and dann wohl am passendsten mit Wein;
½ St. lang, digerirt. — Ry 829. — Unc. ½ mit 6 Unc. siedenden Wassers ½ St. di-
gerirt, in der Colat. 1 Dr. *Gm. Mānes.* aufgelöst; 2stündl. 4 Essl.: AUGUSTIN
bei Torpor des Darmcanals, Borborygmen, asthen. Meteorismus]; meist aber
in Abkochung [Dr. 2-Unc. 1 mit Unc. 9 auf Unc. 6, 2stündl. 1 Essl. —
Bei Durchfällen kann man es mit *Rad. Colombo* oder *Cort. Cascarill.* im einfachen
Decoct oder auch in einer Decocto-Ebullition, so dass die letzteren beiden Stoffe
nur erhaltet werden, verbunden, s. Ry 830] oder in Decocto-Ebulli-
tion [mit 2 verschiedenen Portionen Substanz: I. 162 sub 8)].

Ausserl. bisweilen als Streupulver [bei Brand].

829.

Ry *Rad. Arnicae* Unc. ½*Aq. comm. ferv. q. s.*

digere per ½ hor.; in Colat. Unc. 8 solve
ebulliendo

Rad. Salep pulv. Dr. ½, anteq. c.*Aq. comm. frig. paucillo trit.**et post refrigerat. adde**Tinct. Opii croc. Scr.* 1*Syr. Cert. Aurant. Unc.* 1.*M. D. S.* Stündl. 1-2 Essl. (Bei Ruhr.)

(REMER.)

830.

Ry *Rad. Arnicae* Dr. 2-4

coq. c. Aq. comm. Unc. 9, sub fin. bott.
addendo

Cort. Cascarill. gr. pulv. Dr. 2*ad Colat. Unc. 6, vii refriger. adde**Tinct. Cert. Aurant. Dr.* 2*Syr. simpl. Unc.* 1.*M. D. S.* 2 stündl., ungekühlt, 1 Essl.

*** Radix Artemisiae.** Beifusswurzel. [Nach der Ph.

BOR. u. HANN. sind nur die dünneren Äste (Wurzelfasern, *fibulae*) anzuwenden.
— 1 Unze conc. 2 Sgr., subit. pulv. 3 Sgr.]

Innerl. zu Scr. ½-Dr. 1 u. mehr; in Pulver [Gegen Epilepsie
nach BURDACH (in Triebel) das frisch bereitete Pulver; wenn es möglich ist, ½ St.
vor dem Paroxysmus, sonst nach demselben; bei jungen erwachsenen Personen von
mittlerer Reizbarkeit Dr. ½, bei weniger reizbaren Kranken Gr. 35-40, zur ersten
Gabe; das Pulver wird mit etwas erwärmtem schwachen Bier eingenommen, der
Kranke legt sich sogleich zu Bett, trinkt noch etwas vom demselben Bier und wartet

den Schweiß ab, hütet sich auch nachher vor Erkältung (u. Erhitzung, z. B. durch Getränke). Wiederholung des Verfahrens, so lange Spuren der Epilepsie es nöthig machen, doch nicht gern täglich, sondern nur einen Tag um den andern. Ist jedoch auf die erste Gabe nur spät oder wenig Schweiß erfolgt, dann schon am folgenden Tage eine zweite etwas grössere: bei Individuen der ersteren Art Gr. 35–40, bei weniger reizbaren Gr. 45. Wirkt auch das noch nicht hinlänglich, nöthigenfalls noch eine 3te stärkere Gabe, bei Individuen der letzteren Art bis zu Dr. 1½. Erfolgt in seltenen Fällen auch hierauf noch kein Schweiß, so soll man diesen durch *Liq. Ammon. succin.* in einem Aufguss von *Rad. Valer. min.*, *Serpentar.* oder *Flor. Arnic.* befördern. Wo jedoch der Schweiß so schwer erfolgt, ist von dem Mittel wenig zu erwarten. Bei täglich 3–5mal und öfter eintretenden Epilepsien, die so wenig Zwischenräume lassen, dass keine vollständige Besinnung eintritt, soll man am ersten Tage zwei, dann bis zum 3ten Tage eine, nachher einen Tag um den andern eine etwas starke Gabe reichen. Bei der häufig bei Knaben vorkommenden, regelmässig Morgens u. Abends einen Anfall machenden, nicht sehr heftigen Epilepsie soll man einige Wochen lang wöchentlich 2–3mal allmählig steigende Gaben reichen, u. zugleich aromatische Bäder anwenden. — Bei andern chronischen Krampfkrankheiten junger Leute u. Kinder kann man das Pulver etwa zu Scr. ½–1 alle 4–3 St., mit Theegetränken, reichen. — Einen Abend um den andern 1 Theelöffelvoll in Warmbier: FRITSCH gegen Veitstanz eines 10jährigen Kindes. — Bei *Eclampsia infantum* in der Periode der 1ten Dentition giebt BIERMANN das Pulver Kindern bis zu 1 Jahr in folgenden („in der Regel wohl sehr schwachen“) Dosen: zuerst Gr. ½, nach 1 St. Gr. 1, und wieder nach 1 St. Gr. 2; sind die Kinder gegen 2 Jahr alt oder darüber, dann (ohne solche Steigerung) stündl. Gr. 1–2; meist reichen 3 Gaben hin, sonst ist das Mittel zu Gr. 1–2 alle 2 St. fortzugebrauchen.; selten in Aufguss [als Thee bei hysterischen Krämpfen: HEUN] oder Abkochung [1 Unze ½ St. lang abgekocht, Colat. v. L. 1, alle 2 St. ½ Tasse: v. HILDENBRAND gegen Epilepsie].

Radix Asari. Haselwurzel. [Hauptbestandtheile: äther. Öl, Haselwurzcampfer (Asar od. Asarin, sehr scharf) und bitterer Extractivstoff (ebenfalls Asarin genannt). — 1 Unze conc. 1½, gr. pulv. 1½, sublt. pulv. 1½ Sgr.]
Cave Salpetersäure; Salzbilder; Alaun; empfindliche Metallsalze [namentlich Eisenoxydsalze, Bleissig]; Gerbstoff.

Innerl. als Reizmittel zu Gr. ½–2, einigemal tägl.; als Brechmittel zu Scr. ½–1 in einem Paar Dosen rasch hinter einander [wohl noch mit etwas *Tart. stib.*; doch ist sie als Brechmittel immer unsicher, schlägt leicht durch]. In Pulver [so namentlich gern als Brechmittel; aber sehr fein gepulvert], Aufguss [wässrigem oder weintigem. Als Reizmittel (selten) etwa Scr. 1–2 auf Unc. 6, 2stündl. 1 Essl. Als Brechmittel Dr. 1–2 auf 2 Unz. Wein oder Wasser, viertelstündl. 1 Essl.], Abkochung [diese wirkt, namentlich lange gekocht, nicht mehr brechenenerregend, nur purgirend. Etwa Scr. 1 bis Dr. 1–2 mit Unc. 6 auf Unc. 3, 3mal tägl. 1 Essl.].

Ausserl. zu Schnupfpulvern [kommt z. B. zum Schneeberger Schnupftaback].

Radix Bardanae. Klettenwurzel. [Hauptbestand-

theile: Iaulia (Stärkmehl-Varietät), Zucker, Bitterstoff und Gerbstoff. — 1 Unze conc. 1 Sgr.] Innerl. zu Unc. 1 u. mehr auf den Tag; abgekocht [etwa mit L. $1\frac{1}{2}$ (-2) auf L. 1, mit Honig oder Süßholzsaff. Ry 298 (*Cort Mezer.*), 637 (*Lign. Guaj.*), 610 (*Lign. Sassafr.*)], selten infundirt. — Äusserl. höchstens noch zu Umschlägen [concentrirter abgekocht als zum innerlichen Gebrauch; auf Geschwüre, oder gegen das Ausfallen der Haare auf dem Kopf u. s. w. — Ry 174 (*Bulbi Allii sativi*)].

Radix Belladonnae. Belladonnen-, Tollkraut-, Tollbeeren-, Tollkirschen-, Wolfskirschen-Wurzel. [Hauptbestandtheile: Atropin und Stärkmehl. — 1 Unze conc. $1\frac{1}{2}$, sublt. pulv. $1\frac{1}{2}$ Sgr.] Cave wie bei *Herba Bellad.*

Innerl. (*Pulvis ad Grana quatuor!*) zu Gr. $\frac{1}{2}$ - 2 (-3) und allmählig mehr, 1-2mal tägl. [weniger gern, ausser etwa bei Kindern u. in manchen besondern Fällen, kleinere Gaben öfter]. In Pulver [Ry 831. — Als Prophylacticum gegen Scharlach s. *Extr. Bellad.* — 2-3mal tägl. Gr. 1 mit etwas China oder Chinin: HUFELAND gegen hartnäckige Wechselfieber. — Eben so oft Gr. 1 mit *Rad. Rhei* Gr. 4: Derselbe bei verschiedenen chronischen Leber- u. Milzleiden, auch verschiedenen Krampfkrankheiten. — MÜNCH's prophylaktische (und curative) Methode gegen Wasserscheu nach Hundbiss; ausser der örtlichen Behandlung der Wunde (Auswaschen mit Salzwasser, Essig oder Harn, ausbluten lassen, mit Digestivsalbe verbinden u. nur, wenn sie zu schnell zuheilen wollte, mit Salbe von rothem Präcipitat; — auch die bloss vom Speichel des Hundes besudelten Stellen werden so abgewaschen) erhält der Gebissene (nachdem etwanige Sordes durch ein Brechmittel, Plethora durch ein Aderlass beseitigt) so bald als möglich eine Gabe *Rad. Bellad.* in Pulver, nach 48 Stunden eine zweite, nach wieder 48 St. eine dritte. Die Pulver werden mit dünnem Haferschleim oder kaltem Wasser genommen u. vorher 2 St. lang in Wasser eingeweicht; Kindern kann man sie mit Honig od. dgl. vermischen; der Kranke wartet den Schweiß sorgfältig im Bett ab und unterstützt ihn durch Kamillenthee. Die (sehr starken) Gaben bestimmt MÜNCH nach dem Alter und nach Graden folgendermassen (Frauen verhältnissmässig weniger, eben so alten Leuten über 50 Jahr):

Bei einem Alter an Jahren	1	2	3	4-5	6-7	8-9	10-11	12-13	14-16	17-50
1te Gabe: Gran	1	2	2	$2\frac{1}{2}$	4	$4\frac{1}{2}$	5	6	$6\frac{1}{2}$	10
2te Gabe: Gran	$1\frac{1}{2}$	2	$2\frac{1}{2}$	3	$4\frac{1}{2}$	5	$5\frac{1}{2}$	7	$7\frac{1}{2}$	12
3te Gabe: Gran	$1\frac{1}{2}$	2	3	$3\frac{1}{2}$	5	6	$6\frac{1}{2}$	8	$8\frac{1}{2}$	14

Meist reichen diese 3 Gaben hin; wenn aber nach der 3ten noch Spannung, Ziehen in der Wunde empfunden wird, diese noch nicht ganz trocken, sondern entzündet

und geschwollen ist, so werden nach Verlauf von 72 Stunden nochmals 5 Dosen, immer wieder in Zwischenräumen von 48 St. gereicht, aber höchstens noch um Gr. $\frac{1}{2}$ gestiegen. Sollte während des Gebrauchs die Wuth ausbrechen, oder wenn sie schon früher ausgebrochen war, so muss der Kranke im Bett gehalten werden, um den Schweiß zu befördern; man gebe ihm das Mittel nöthigenfalls in Latwergen- oder Bolus-Form; lässt die Wuth nach 1 oder 2 Pulvern nicht nach, so muss eine Ader geöffnet und die Gabe der Belladonna verstärkt werden.], Pillen [R₄ 832], Aufguss [Scr. $\frac{1}{2}$ - Dr. $\frac{1}{2}$ auf Unc. 3, 2mal tägl. 1 Essl.].

Selten äusserl. [Mit *Elect. Theriac.*, *Tinct. Opii croc.* ana Scr. 1, *Gm. Mimos. pulv.* Dr. 3, Wasser q. s., zu einer steilen Latwerge, diese auf Leder gestrichen auf die Herzgrube zu legen: GOELIS gegen Keuchbusten; — einen fingerbreiten Streifen über die Augenbraunen zu legen: RADIUS bei grosser Gereiztheit der Augen, bei gichtischen u. scroful. Ophthalmien.]

831.

Ry *Rad. Belladonnae* Gr. 2 (u. steigend mehr)

— *Ipecacuanhae* Gr. $1\frac{1}{2}$ - 2

Sulphuris depur.

Sacch. Lactis ana Dr. $\frac{1}{2}$.

M. f. Pulv. Div. in 8 part. aeq. D. in charta laevigata. S. 4mal tägl. 1 Pulver mit Zuckerwasser od. dgl. (Bei

Keuchbusten eines 3-4 jährigen Kindes.)
(KOPF.)

832.

Ry *Rad. Belladonn. pulv.* Gr. 8

Hb. Sabinae pulv. Dr. $\frac{1}{2}$

Extr. Millefol. q. s.

ut f. Pilulae 30. Consp. Pulv. Croci. D. in vitro. S. 3mal tägl. 2.

+ *Radix Bistortae* s. *Colubrinae* s. *Serpentariae vulgaris*. Natter-, Schlangen-, Gift- od. Krebs-Wurzel. [Hauptbestandtheile: Gerbstoff u. Stärkmehl. — 1 Unze 2, pulv. 3 Sbl.]
Wie *Rad. Tormentill*.

+ *Radix Brassicae Rapaе (recens)*. *Rad. Rapaе (sativae)*. *Rapa*. Weisse od. gemeine Rübe. [Hauptbestandtheile: Zucker und scharfes äther. Öl (wenig). — 1 Unze $\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerl. in Aufguss od. Abkochung [mit Zucker versüsst]; häufiger noch der Presssaft [namentlich aus den mit der Schale zerschnittenen Rüben gepresst und wohl noch etwas gekocht und mit Honig versüsst, theelöffelweise].

Äusserl. in Abkochung [etwa bloss die Schale abgekocht; zur Colatur etwa noch $\frac{1}{6}$ Essig; zu warmen Bähungen oder (mehrmals tägl. anzuwendenden) Bädern bei Frostbeulen; seltner als Gurgelwasser], Presssaft [wie für den innerlichen Gebrauch zubereitet; gegen Aphthen]; oder weich gekocht und zerrieben [auf Frostbeulen]; oder roh zerrieben [bei Verbrennungen].

Radix Bryoniae. Gichtrübe. Zaunrübe. Hundskürbis. [Hauptbestandtheile: ein eigenthümliches Extractivstoff (Zaunrübenbitter oder Bryonin; leichtlöslich in Wasser u. Weing-Jer/u. Stärkmehl. — 1 Unze conc. $1\frac{1}{2}$, subf. pulv. $1\frac{3}{4}$ Sgr.] *Cave* Salzbilder; empfindliche Metall-

salze [namentlich Eisenoxydsalze; essigsaures Blei]; Gerbstoff. (Auf des Stärkmehl ist weniger Rücksicht zu nehmen.)

Innerl. zu Gr. 5-20 einigemal tägl.; in Pulver [mit Schleim oder Milch zu nehmen]; häufiger im Aufguss [Dr. 2-4 auf Unc. 6 (Wasser oder, besonders empfehlenswerth, Wein), 2stündl. 1 Essl.]; oder den Presssaft [im Herbst; zu Dr. 1-2 einigemal tägl.].

Ausserl. legt man wohl die frische Wurzel zerschnitten u. zerquetscht auf 84ematJae oder rheumatische u. a. Anschwellungen, oder schlägt eine Abkochung der trocknen Wurzel über.

+ *Radix Caïncae s. Cahincae, s. Serpentarige Brasiliensis*. Caïnca wurzel. [Hauptbestandtheile: Caïnca-Säure (Calceabitter, Caïncanium) und Chioceocin (identisch? mit Kmetin). — 1 Unze conc. $3\frac{1}{8}$, sub. pulv. $3\frac{1}{8}$ Sgr.] Cave concentr. Säuren; Salzbilder; Alkalien; empfindliche Metallsalze; Gerbstoff. — Man verordne nur die Rinde der Wurzel [das Holz ist unkräftig]. — Innerl. zu Gr. 5-10, 3mal tägl. In Pulver; häufiger in flüssigem Auszug [Dr. $\frac{1}{4}$ - $1\frac{1}{2}$ (-2) auf den Tag, und zwar passender in Aufguss (oder in Ebullition) als in Abkochung].

Radix Calami (aromatici s. vulgaris) s. Acori (veri)*.

Kalmus-, Anker-, Zehr- od. Magen-Wurzel. [Hauptbestandtheile: äther. Öl, scharfes Harz, bitterer Extractivstoff und Stärkmehl. — Der Apotheker hat sie gewöhnlich geschält (*decorticata* oder, weniger passend, *mundata*) und ungeschält („*immunda*“); der grösseren Sauberkeit und gleichmässigeren Farbe wegen schreibt man, namentlich in Pulvern und pulveraufnehmenden Formen, gewöhnlich die geschälte vor. — 1 Unze *immunda* conc. $\frac{3}{8}$, *mundata* conc. $\frac{5}{8}$, sub. pulv. $1\frac{1}{8}$ Sgr. — Durch Wohlfeilheit und Wirksamkeit ein treffliches Surrogat vieler ausländischen Arome.]

Innerl. zu Gr. 20-30 einigemal tägl. [Obwohl der Geschmack des Kalmus den Meisten angenehm und deshalb zur Geschmacksverbesserung brauchbar ist, so hüllt man doch oft, namentlich in Pulvern, die Schärfe desselben gern etwas ein, etwa durch Süssholz od. *Pulv. gummos.*] In Pulver [so besonders bei Wechselfieber, mit China, Weidenrinde, *Caryophyllata* od. dgl.], Morsellen [Ry 833], Latwerge [Ry 228 (*Cass. cinnam.*)], Aufguss [am zweckmässigsten Digestionsaufguss; Dr. 4-6 auf Unc. 6 Wasser oder Wein, 2stündl. 2 Essl. (*Inf. Cal. PH. MIL.* wie ihr *Inf. Angelic.*, S. 382.) Bisweilen als Thee, Dr. 1-2 auf ein Paar Tassen. — Ry 486 (*Hb. Sabin.*)] oder Decocto-Ebullition [mit 2 verschiedenen Portionen Substanz: I. S. 162 sub b)]. Diätetisch überzuckert, *Conditum s. Confectio Calami* [zum Theil in den Apotheken (1 Unze 3 Sbl.), sonst bei den Conditoren zu finden (besonders gut ist der viel verschickte Leipziger)]; — quentchenweise mehrmals tägl.].

*) Nicht mit *Rad. Acori G. variis*, welches die Wurzel von *Iris Pseudacorus* LINN. ist, zu verwechseln.

Äusserl. zu Zahnpulvern [Ry 221 (*Carbo ppt.*), 267 (*Conch. ppt.*)], Streupulvern; in wässerigem oder geistigem Aufguss [den sich der Kranke selbst bereiten kann] zu stärkenden Waschungen u. Bädern [Zu einem allgemeinen Bade L. 1–2. Ry 480 (*Hb. Menth. pip.*)]. Arme können zu diesem Behuf sich den Kalmus im Spätherbst oder Frühjahr selbst sammeln].

833.

Ry *Sacch. albi* Unc. 6coq̃e c. Aq. comm. q. s. ad consistent.
tabulandi, addo*Rad. Calami mundat. pulv.* Dr. 6*Sem. Foeniculi pulv.* Dr. 2*Ol. Menth. piper.* Scr. $\frac{1}{2}$.*M. f. l. a. Morsuli ar.* 30. D. S. 3mal
tägl. 1 Stück.

Radix Curicis arenariae s. Graminis rubri [nicht mit der vorzugeweise so genannten *Rad. Graminis* zu verwechseln]. Sandriedgraswurzel. Sandsegge. Rothe Queckenwurzel. Deutsche Sarsaparille. [Hauptbestandtheile: ein kratzender Extractivstoff (Balsambarz?), äther. Öl und Stärkmehl. — 1 Unze conc. 1 Sgr.] Innerl. zu Unc. 1–2 tägl., in Tisänenform [gewöhnlich in Abkochung (Ry 834); doch wohl zweckmässiger wie *Rad. Sarsaparill.* (vgl. den Art.) im Digestionsaufguss].

834.

Ry *Rad. Curicis arenariae* Unc. $\frac{1}{2}$ *Cort. Ulmi inter.* Scr. 2

coq̃e c.

Aq. comm. L. 4,

sub finem coctionis addendo

Rad. Glycyrrhiz. Dr. $\frac{1}{2}$

ad Colat. L. 2, in qua solve

Sal. Thermar. Carolin. Dr. 1*Natri carbon. depar.* Dr. $\frac{1}{2}$.D.S. Tassenweise in einem Tage zu ver-
brauchen. (So 3–4 Wochen lang. —
Gegen Flechten.) HEIM.

+ *Radix Carlinae (humilis) s. Cardopatae.* Eberwurzel. [Hauptbestandtheile: äther. Öl, Harz u. Inulin. — 1 Unze conc. 1 Sgr.] Innerl. zu Scr. $\frac{1}{2}$ –1, 3mal tägl.; in Pulver, Latwerge, wenigem Aufguss.

Radix Caryophyllatae s. Gei urbani. Nelken- od. Benedict-Wurzel. Garoffel. [Hauptbestandtheile: äther. Oel, Gerbstoff (eisenbläuender), Gallussäure u. Stärkmehl. Der Auszug wird durch Kalkwasser violett-roth getrübt, später gefällt; durch *Spir. nitrico-aeth.* wird er violett, und wenn noch Chinaabkochung dazu kommt, schmutzig grün. — 1 Unze conc. 1 $\frac{1}{2}$, sub. pulv. 1 $\frac{1}{2}$ Sgr. — Als Mitsurrogat der China: s. S. 129.]

Innerl. zu Dr. $\frac{1}{2}$ –1, 3–4mal tägl.; in Pulver u. pulveraufnehmenden Formen [so namentlich gegen Wechselfieber. — Ry 835, 836]; Aufguss [namentlich Digestionsaufguss; doch auch bisweilen im kalten, wässerigen oder weinigen. Tägl. etwa Dr. 6–Unc. 1 $\frac{1}{2}$ auf Unc. 6–8. (*Inf. Car. PH. MIL.* wie ihr *Inf. Anglic.*, S. 382.) — Vgl. *Rad. Faler. min.*], Abkochung [tägl. etwa Dr. 6–Unc. 1 $\frac{1}{2}$ mit L. 1 $\frac{1}{2}$ auf L. 1], Decocto-Ebullition [mit 2 verschiedenen Portionen Substanz: I. S. 162 sub b)].

835.

Ry Kino

Cass. cinnam. ana Dr. 1

Rad. Caryophyllat.

Gm. Mimos. ana Dr. 3

Sacch. albi Unc. $\frac{1}{2}$.

M. f. Pulv. D. S. Alle 3-2 St. 1 Theelöffel mit Wasser. (Bei Durchfällen.)

VOGEL.

+ *Radix Chelidonii majoris* (recens). Schöllkrautwurzel. Wie *Herba Chelid. maj.*

+ *Radix Chinae* (ponderosa). Chinawurzel. [Hauptbestandtheile: ein reizender, kratzender, bitterlicher Extractivstoff, ?Gerbstoff u. Stärkmehl. — 1 Unze 2, pulv. 3 Hl.] Innerl. wie *Rad. Caric. aren.* [Ry 894 (*Rad. Sarsap.*).]

+ *Radix Cichorei* (agrestis s. silvestris). Wegwartwurzel (wilde). [Hauptbestandtheil: Bitterer Extractivstoff. — 1 Unze conc. $1\frac{1}{2}$ Sgr.] Wie *Rad. Taraxaci*.

Radix (*Buthus*) *Colchici*. Zeitlosenwurzel. [Hauptbestandtheile: Colchicin (Alkaloid) u. Stärkmehl. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr.] Cave wie bei *Hb. Belladonn.* — Innerl. zu Gr. 2-6 einigemal tägl., in Pulver, Pillen [s. B. 3mal tägl. Gr. 3, steigend bis zu Gr. 5, mit Seife p.p.: RITTON bei Leukorrhöe], Aufguss. Beliebter jedoch sind die Präparate: *Acetum*, *Oxymel*, u. besonders das aus der frischen Wurzel bereitete *Vinum Colchici*.

Radix Colombo s. *Columbo*. Kolombowurzel. [Hauptbestandtheile: Columbin (krystallisirbare, sehr bittere, ?giftige, in kaltem Wasser od. Weingeist wenig lösliche, chemisch-indifferente Substanz) und sehr viel Stärkmehl. — 1 Unze conc. $2\frac{2}{3}$, sub. pulv. $3\frac{1}{2}$ Sgr. In der Armenpraxis oft durch *Lichen Isld.* oder ein Bitteres Mittel mit Zusatz von Schleim zu ersetzen.]

Innerl. zu Gr. 15-30 alle 4-3 St. in Pulver [unangenehm. — P. FRANK gegen atonische Diarrhöe: 4stündl. Scr. 1 mit *Elaeos. Macid.* Scr. $\frac{1}{2}$. — Ry 664 (*Magnes. carb.*), 734 (*Natrum sulph. dep. sicc.*)], Pillen u. Bissen [Mit *Fel Tauri insp.*; PERCIVAL bei mangelhafter, u. fehlerhafter Gallensecretion. — Ry 20 (*Acid. muriat.*)], Latwerge [quillt stark]; in Aufguss [mit Wasser od. Wein; hauptsächlich bitter, kaum schleimig; sehr leicht verderbend, deshalb nicht auf lange. — Unc. $\frac{1}{2}$ - 1 auf Unc. 6, 2stündl. 1 Rosl. — Ry 837, 838], Abkochung [diese ist um so weniger bitter, um so mehr bloss schleimig, je länger man kochen lässt. Also Unc. $\frac{1}{2}$ - 1 mit Unc. 8-12 (nach der Verschiedenheit des Zwecks) auf Unc. 6, 2stündl. 1 Rosl. (*Decoct. Col. PH. MIL.*: Unc. $\frac{1}{2}$ mit Unc. 9 auf Unc. 6.) — Ry 839; 629 (*Lich. Isld.*), 985 (*Spir. Nitri*]

836.

Ry Rad. Caryophyllat. pulv. Unc. $\frac{1}{2}$ - 1Cass. cinnam. pulv. Dr. $\frac{1}{2}$ - 1

Syr. Cort. Durant. q. s.

ut f. Electuar. D. S. 3stündl., umgerührt, 1-2 Theelöffel. (Gegen leichte Wechselheber.)

fumans], Infuso-Decoct [ein Beispiel (mit *Cort. Cascar.*): I. 8. 164] od. Decocto-Ebullition [I. 8. 162 *sub b*). Namentlich, wenn man eine geringere Quantität der Wurzel anwendet, ist solche Decocto-Ebullition wohlfeiler als ein Infuso-Decoct].

837.

Ry *Rad. Colombo* Unc. 1
Flaved. Cort. Aurant. Curassav.
 Unc. $\frac{1}{2}$
Vini Malacensis q. s.
digere per 12 horas ad Colat. Unc. 6,
cui refrigerat. adde
Spir. sulphurico-aether. Dr. 1.
M. D. S. 2stündl. 1 Essl.

838.

Ry *Rad. Colombo* Dr. 6
Aq. comm. fervid. q. s.
digere per horam ad Colat. Unc. 6, *cui*
adde
Rad. Salep pulv. et c. pauillo Aq.
comm. frigid. antea tritae Scr 1

ebulliant per aliquot minutas; adde
Syr. simpl. Unc. 1, in qua antea so-
luta sunt
Extr. Opii Gr. 3.
M. D. S. 2stündl., umgeschüttelt, 1 Essl.

839.

Ry *Rad. Colombo* Unc. $\frac{1}{2}$
coque c. Aq. comm. Unc. 10, sub fin.
coct. addendo
Cort. Cascarill. gr. pulv. Dr. 2
ad Colat. Unc. 6, cui refrigerat. adde
Tinct. Cort. Aurant. Dr. 2
Syr. Cinnam. Unc. 1.
M. D. S. 3stündl., umgeschüttelt, 1 reich-
lichen Essl. (Gegen Atonie des Darm-
canals, atonische Diarrhöen.)

BERENDS.

Radix Curcumae. Gilbwurzel. Kurkume. [Hauptbestandtheile: äther. Oel und harziger gelber Farbstoff (Curcumin), der durch Alkalien braunroth, durch Boraxsäure roth wird. — 1 Unze *gr. pulv.* $1\frac{1}{6}$, *subt. pulv.* $1\frac{1}{2}$ Sgr.] Wollte man sie innerl. anwenden, dann etwa wie *Rad. Zedoar.*; meist aber gebraucht man sie nur noch als Ingrediens von Niesepulvern, als gelb färbenden Zusatz zu Pulvern, Salben, Ceraten p.p.; selten zum Conspergiren.

***Radix Cynoglossi.** Hundszungenwurzel. [Hauptbestandtheile: ein flüchtiger narkotischer Stoff (?) und Schleim.] Nur noch zu der [sehr entbehrlichen] *Massa Pilularum e Cynogl.*

† **Radix Dauci (sativi).** Möhre. Mohrrübe. Gelbe Rübe. Carotte. [Hauptbestandtheile: Zucker, Farbstoff (Carotin), Gallertsäure und wenig äther. Oel. — Nur frisch angewandt.] Innerl. im Presssaft. Diätetisch die rohen Möhren, besonders des Morgens, nüchtern. — Äusserl. der Presssaft [gegen Aphthen]; die geschabten Möhren zu Kataplasmen [pur u. ohne weitere Vorbereitung, wenn man dadurch kühlen will; beabsichtigt man aber die Entwicklung von Kohlensäure, so ist es rathsam, die geschabten Möhren zuvor 6-8 St. in einer Temperatur von 18-20° R. stehen zu lassen; auch setzt man dann wohl noch $\frac{1}{8}$ Roggen- oder Weizen-Mehl zu, was die Gährung befördert und den Brei mehr zusammenhaltend macht, oder auch einen andern von den unter *Gas Acidi carbon.* aufgeführten Stoffen].

Radix Filicis (maris). Farrnkraut- od. Johannis-kraut-Wurzel. [Hauptbestandtheile: ein eigenthümliches fettes Oel (vgl. *Extr. Filicis aether.*), Harz, Gerbstoff, Zucker u. Stärkmehl. — Das Pulver wird nach der Vorschrift der meisten Pharmacopöen, um der sauberen, gleichmässigeren Farbe willen, aus der abgeschälten (*excoctata*, „*mundata*“) Wurzel bereitet, und gewöhnlich nimmt man diese auch zu den flüssigen Auszügen. — 1 Unze *excoct. conc.* 2, *subt. pulv.* 2½ Sgr.]

Innerl. drachmenweise; in Pulver [z. B. um den Bandwurm abzutreiben, früh nüchtern 3 Drachmen gepulvert, 2 St. darauf ½ Unze Ricinusöl, u. diese Gabe halbstündl. wiederholt, bis 3 Unzen Oel verbraucht: ODIER. — Oder nach MAYOR: Abends 3–4 Dr. des Pulvers in einem Tränkchen aus 3 Unz. Melissenwasser u. 1 Unze + Gummisyrup; am nächsten Morgen 1½ Unz. Ricinusöl, — Oder nach C. VOGEL: der Kranke nimmt Abends eine mit Butter sehr fett gemachte Schwarzbrodsuppe, 1 St. nachher ein Klystier aus einer concentrirten Althäenabkochung mit ½ Löffel Kochsalz u. 1 Loth Baumöl, und legt sich zu Bett. Er muss das Klystier bei sich zu halten suchen, u. wenn es abgehn sollte, ein zweites nehmen. 1 Stunde später isst er ¼ Pf. mageren rohen Schinken und 2 Sardellen, beides fein zusammengehackt, u. darf darauf nicht trinken. Am Morgen darauf im Bette Dr. 1 gepulverte Farrnkrautwurzel in einer Tasse Lindenblüthenthees. 2 St. darauf ½ Unze Ricinusöl mit einer Tasse desselben Thees, u. diese Gabe halbstündl. wiederholt, bis der Wurm abgegangen oder 3 Unzen des Oels verbraucht sind. Gleich nach der ersten Gabe des Oels Bewegung im Zimmer. Sobald der Wurm abgegangen, etwas gute Fleischbrühe. (RUST's *Magaz.* Bd. 26. Heft 3. 1828.) — Weniger zweckmässig scheint die ältere Methode von STOLL, worin das Ricinusöl der Farrnkrautwurzel vorangeht: 3 Tage hindurch bei dünner Diät, aber fetten Suppen, 3mal tägl. 1 Essl. Ricinusöl; am 4ten Tage 2stündl. 2 Dr. der Wurzel; am 5ten Abführen mit Bittersalz. — Oder um Gewissheit über die Gegenwart eines Bandwurms zu erhalten, früh nüchtern 2–3 Dr., einige Stunden darauf ein leichtes Abtühnmittel, worauf, wenn ein Wurm vorhanden, einige Glieder abgehn sollen, falls dies nicht etwa schon kurze Zeit vor dem Versuch geschehen ist: BREMSER], Latwerge [R. 966 (*Sem. Cinac.*), 990 (*Stann. rasp.*)], minder zweckmässig in Abkochung [R. 840; 751. b. (*Ol. Croton.*)], Aufguss [selten; vgl. *Formicac.*].

840.

R. *Rad. Filicis excoct.**Helminthochorti ana* Dr. 6*Ichthyocolae* Dr. 1*coq. c. Aq. comm.* Unc. 8 *ad Colat.* Unc. 3,
*cui addo**Extr. Filic. aeth.* Scr. 1, *antes cum**Syr. Moror.* Unc. 1*mixtum. F. l. a. Gelatina. D. S.* An Einem Tage zu nehmen (den folgenden Morgen ein Abführmittel aus Scammonium und Calomel — gegen Bandwurm).
(MARSELLINI.)

Radix Galangae. Galgantwurzel. [Hauptbestandtheile: äther. Oel und ein sehr scharfes aromatisches Harz. — 1 Unze 1¾, *conc.* 2, *subt. pulv.* 2½ Sgr.] Innerl. zu Scr. ½–1, einigemal tägl.; am besten in Pulver [kratzt zwar sehr. — R. 841], Morsellen oder Latwerge; doch auch im Aufguss [namentlich Digestionsaufguss; mit Wasser, besser noch Weingeist od. Wein; etwa Unc. ½ auf Unc. 6, 2stündl. 1 Essl.

— Ry 842; 909 (*Rad. Scill.*), Ebullition, minder zweckmässig in Abkochung. — Äusserl. als Kaumittel [bei Zungenlähmung], zu Zahntincturen [Ry 117].

841.

Ry *Rad. Galangae* Scr. $\frac{1}{4}$
Cardamomi minor. Gr. 4
Sacch. albes. Gr. 16.
M. f. Pulv. Disp. tales nr. 8. D. in charta cer. S. 4mal tägl. 1 Pulver mit Wein. SCHUEARTH.

842.

Ry *Rad. Galangae*
Flaved. Cort. Aurant. Curassav.
Cass. cinnam. ana Unc. $\frac{1}{4}$
Vini Gallici rubri q. s.
digere per nycthemeron; Colat. L. 1 refrigerat. adde
Spir. sulphur.-aeth. Dr. 2.
M. D. S. 3-4mal tägl. 2 Reel. Voet.

Radix Gentianae rubrae s. luteae. Enzianwurzel. [Hauptbestandtheil: Gentianin (Enzianbitter; krystallisirbare, aromatisch und sehr bitter schmeckende, in kaltem Wasser wenig, in heissem, so wie in Weingeist, auch Äther, leicht lösliche, chemisch-indifferente Substanz). — 1 Unze $\frac{5}{8}$, conc. $1\frac{1}{2}$, subf. pulv. $1\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerl. zu Scr. $\frac{1}{4}$ - Dr. $\frac{1}{4}$, einigemal tägl., in Pulver [unangenehm], Bissen [Ry 59 (*Aloë luc.*)], Latwerge, Aufguss [wässrigem oder kaltem weinigen; etwa Dr. 2-3 auf den Tag, mit 3 Unzen Wasser, esslöffelweise; oder mit 6 Unzen französischen oder spanischen Weins, 4mal tägl. $\frac{1}{2}$ Weinglas. — Ry 843, 844], Abkochung [etwa Unc. $\frac{1}{2}$ mit Unc. 12 auf Unc. 8-9 (längeres Kochen giebt einen sehr widrigen Geschmack), esslöffelweise].

Äusserl. bisweilen zu Fontanellkugeln.

843.

Ry *Rad. Gentianae rubr. Dr. 3*
Flaved. Cort. Aurant. Curass. Dr. 1
Aq. comm. bullient. L. 1
digere per horam. Colat. refriger. adde
Tinct. Corticum Aurantior. Dr. 2.
M. D. S. 2-3mal tägl. $\frac{1}{2}$ Tasse. SCHUEARTH.

844.

Ry *Rad. Gentian. rubr. Unc. 2*
Flaved. Cort. Aurant. Curass. Unc. 1
Cass. cinnam. Unc. $\frac{1}{4}$.
M. f. Pulv. gross. D. S. Mit 1 Quart weissen Franzweins 24 St. zu maceriren; von der ausgepressten Colatur 4mal tägl. $\frac{1}{2}$ Weinglas.

Radix Glycyrrhizae echinatae und

Radix Glycyrrhizae glabrae. Beide auch: *Rad. Liquiritiae*. Liquiritienwurzel. Süßholzwurzel; Süßholz. [Hauptbestandtheile: Glycyrrhizin (Glycyon; Süßholzzucker; süßes Extractivstoff; sehr süß und etwas kratzend schmeckende, in kaltem Wasser schwer, in heissem, auch in Weingeist, leicht lösliche, chemisch-indifferente Substanz) und Stärkmehl. — *R. G. glabrae* soll nach der PH. BOR. den Vorzug verdienen; indess dieser ist nicht eben erheblich, und da *R. G. echinatae* geschält ist, so zieht man sie (wie dies auch die PH. BOR. selbst bei *Pulv. gummos. u. Pulv. Glycyrrh. comp. thut*) für Pulver, die man schön gelb haben will (wenn die Rinde mit gepulvert, wird das Pulver mehr graulich), vor, in anderen Formen dagegen die *R. G. glabrae*. Andere Pharmacopöen führen die *R. G. echinatae* als *Rad.*

Liquir., „decorticata“ od. „mundata“ auf. — *R. G. echin.* sub. pulv. 2 Sgr.; *R. G. glabr. conc.* 1, gr. pulv. 1½ Sgr.] *Cave* [mit zahlreichen sanctionirten Ausnahmen] die bei *Extr. Glycyrrh.* erwähnten Stoffe.

Innerl. zu Scr. 1–Dr. ¼ mehrmals tägl. Öfter jedoch nur als Vehikel u. Corrigens andrer Arzneien [als Geschmackscorrigens: vgl. I. S. 46] in gewöhnlich geringerer Quantität. — In Pulver [Ry 998 (*Sulph. dep.*)], Trochisken u. Bacillen [Ry 845], Pillen, Bissen; Aufguss [*Inf. Liquir.* PH. MIL. wie ihr *Inf. Angelic.*, S. 382. — Zu Aufguss-Species setzt man, wenn die *Liquir.* bloss als Geschmackscorrigens dienen soll, nicht leicht mehr als ½ des Ganzen, ausser bei Liebhabern des Geschmacks; mehr dagegen wohl zu Brustspecies oder überhaupt zu Species, in denen sie mitwirken soll.], seltner Abkochung [doch nur gelinde gekocht, denn längeres Kochen giebt einen kratzenden Nachgeschmack; will man sie daher z. B. zu Holstränken setzen, so geschehe dies erst *sub finem coct.* (Desecto-Ebullition); soll die Abkochung im Hause des Kranken bereitet werden, so ist es noch bequemer, sie lieber mit *Succo Glycyrrh. dep.* versüssen zu lassen]. Als Conspersgens.

Ausserl. als Kämmittel [sie stillt, gekaut oder auch nur im Munde gehalten, Durst, ist daher wohl Wassersüchtigen u. A. angenehm].

845.

Ry *Croci pulv.* Dr. ¼
Rad. Iridis Florent. pulv. Dr. 1
 — *Glycyrrh. glabr. pulv.* Unc. ½
Sacch. albi pulv. L. ¼
Mucil. Gm. Tragac. q. s.

ut f. l. q. Bacilli, Puls. Rad. Glycyrrh. conspergendi, non torrendi. D. S. Lakritzenstängelchen.
 Ähnlich componirt, nur mit *Rad. Irid.* Fl. Unc. ½, sind die (6 Gran schweren) *Trochisci bechici citrini* PH. SLESV. (1 Unze 3 Sht.)

Radix Graminis (albi). Queckenwurzel. Päden. Graswurzel. [Hauptbestandtheile: Zucker (ein eigenthümlicher) und Extractivstoff. — 1 Unze conc. ¾ Sgr.]

Innerl. zu 2–4 Unzen tägl. in Abkochung [die angegebene Quantität mit L. 4 auf L. 2 gekocht, tassenweise. Ry 921 (*Rad. Tarax.*). — Oft will man damit hauptsächlich nur etwas scharfe, unangenehme Arzneien, z. B. Salpeter (Ry 595) einhüllen; dann darf die Quantität geringer seyn.], die Abkochung auch wohl zu Molken [Ry 977]. Man setzt die Wurzel auch wohl zu Decoct-Species als versüssenden u. zugleich adjuvirenden Zusatz [Ry 474 (*Hb. Fumar.*), 637 (*Lign. Guaj.*)]. Von der frischen Wurzel [Spätherbst, Frühjahr] auch der Presssaft [ein Paar Unzen des Morgens].

Ausserl. abgekocht zu Visceralklystieren [Ry 457 (*M. Centaur. min.*)].

+ **Radix Gratiolae.** Gottesgnadenwurzel. Wie *Herba Gratiol.*

Radix Helenii s. Enulae s. Inulae. Alantwurzel.

[Hauptbestandtheile: Alantampher (Helen, Helenia), Alantstärkmehl (Inulin), scharfes Weichharz und Extractivstoff. — 1 Unze conc. $1\frac{1}{2}$, gr. pulv. $1\frac{1}{2}$, subst. pulv. $1\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerl. zu Scr. 1-2 mehrmals tägl. In Pulver u. pulveraufnehmenden Formen [Pillen: Ry 17 (*Acid. benz.*)]; häufiger in Aufguss [am passendsten Digestionsaufguss. — Unc. $\frac{1}{2}$ -1 auf Unc. 6, 2stündl. 1 Essl. — Auch, namentlich bei chronischen Krankheiten, im weinigen Aufguss. — Ry 846, 847] oder Abkochung [wenn es besonders um die harzigen Theile zu thun ist; die Abkochung schmeckt auch schärfer. — Unc. $\frac{1}{2}$ -1 mit Unc. 9 auf Unc. 6, 2stündl. 1 Essl. — Passendes Corrigen: *Glycyrrhiza*.], Decocto-Ebullition [I. S. 162 sub b)].

Ausserl. zu Waschpulvern [nur als Zusatz]; abgekocht zu Waschwässern [vgl. z. B. *Chlorum Calcar.*, *Fitriol. alb.*]; weich gekocht zu Salben [Ry 848].

846.

Ry Rad. Helenii Dr. 2
— Senegae Scr. 2
Aq. comm. ferv. Unc. 6
Digere per $\frac{1}{2}$ hor. In Colat. solve
Ammonii muriatici depur. Dr. 1
et adde
Syr. Capit. Papav. Unc. $\frac{1}{2}$.
M. D. S. 2stündl., 1 Essl. (RICHTER.)

847.

Ry Rad. Helenii Unc. 1
Flaved. Cort. Aurant. Curass. Unc. $\frac{1}{2}$
Vini Gallici albi L. $1\frac{1}{2}$.
Digere per nycthemerum. Colat. D. S.
3mal tägl. 1 Weinglas. (Bei chronischen
Verdauungsbeschwerden, Verschleimungen u. s. w.)

848.

Ry Rad. Helenii pulv. Unc. $1\frac{1}{2}$
coq. c. Aq. comm. Unc. 3 usque ad mol-
litiem, tere per cribrum setaceum, et
massae pulvae adde
Adipis suilli Unc. 1.
M. f. Ungt. D. S. Alantsalbe. (Bei
Krätze 1-2mal tägl. die Ausschlagstel-
len damit einzureiben, u. nach einigen
Stunden wieder mit Seifenwasser abzu-
waschen.) BRÜCKMANN.
Vgl. I. S. 279. — Ganz ähnlich, nur
mit Adipis suilli q. s., ist Ungt. Helenii
PH. P. (von HUFELAND besonders ge-
gen Krätze bei kleinen Kindern empfoh-
len; 1 Unze $2\frac{1}{2}$ Sgr.).

Radix Hellebori albi s. Veratri albi. Weisse Nies-
wurzel. Weisse Germer-Wurzel. [Hauptbestandtheile: Ve-
ratria (s. den Art.) u. Stärkmehl. — Extrahiren mit Essig erhöht, indem es (leicht-
lösliches) essigsaures Veratria bildet, die Wirkung; basische Zusätze sind alsdann
zu vermeiden. — 1 Unze conc. 1, gr. pulv. $1\frac{1}{2}$, subst. pulv. $1\frac{1}{2}$ Sgr.] Cave
besonders salzsaur. Gold; Gerbstoff.

Innerl. (*Pulvis ad Grana decem!*) zu Gr. $\frac{1}{2}$ -1, vorsichtig
steigend bis zu Gr. 6 (bei Geisteskranken stärkere Gaben), ein Paar
Mal tägl. In Pulver, Pillen, Aufguss [namentlich weinigem;
Scr. $\frac{1}{2}$ -1 auf Unc. 4-6, einigemal tägl. 1 Essl.], Abkochung [z. B.

Gr. 15 mit Essig zur Colatur von 5 Unz. gekocht, davon anfangs alle 3-2 St. 1 Essl.: WENDT].

Ausserl. zu Schnupfpulvern [höchst reizend u. deshalb nur etwa bei Asphyctischen pur — zu einem Paar Gran — in die Nase zu blasen, um z. B. das Auswerfen von Massen aus den Lungen zu bewirken. — Vgl. I. S. 221. — Ry 849], Salben [Ry 850; 1090 (*Sulph. dep.*); vgl. † *Ungt. pedicular.*]; infundirt oder abgekocht zu Waschungen [Scr. 1 — Dr. 1 auf Unc. 1].

849.

Ry *Rad. Hellebori albi pulv.* Dr. $\frac{1}{2}$

— *Irid. Flor. pulv.* Gr. 15

† *Oryzae pulv.* Dr. 3

Mixt. oleoso-balsam. Gtt. 5.

M. D. S. Niesepulver.

Puls. sternutator. albus PH. HANN.

(1 Drachme $\frac{1}{2}$ Mgr.)

Vgl. I. S. 221.

850.

Ry *Pulv. Rad. Helleb. albi* Unc. 1

Adip. suill. Unc. 4

Ol. Citri Cortic. Gtt. 10.

M. f. *Ungt.* — (Krätzsalbe.)

Unguentum Veratri PH. LOND.

BIETT nimmt zu seiner Krätzsalbe, die etwa 14 Tage lang anzuwenden, nur halb so viel *Helleb.*; eben so BATEMAN zu seiner Salbe gegen *Pruritus*, aber mit Dr. $\frac{1}{2}$ Cedroöl.

Radix Hellebori nigri s. Melampodii. Schwarze

Nieswurzel, Christwurz. [Hauptbestandtheile: ein eigenthümlicher, scharf-narkotischer, harzähnlicher Stoff. — 1 Unze conc. 1 $\frac{1}{2}$, sub. pulv. 2 Sgr.] Cave Alkalien; Oxalium, Alaun; Metallsalze [besonders salzsaur. Gold, Sublimat, salpeters. Quecksilber u. Silber, Eisen- u. Blei-Salze]; Gerbstoff.

Innerl. (*Pulvis ad Scrupulum unum!*) als Reizmittel zu Gr. 2-8; als Drasticum zu Gr. 15-30 (bei Geisteskranken oft noch mehr), 2-4mal tägl. In Pulver [unangenehm, auch leicht zu heftig wirkend, daher man in den meisten Fällen, wo man nicht drastisch wirken will, die Auszüge vorzieht], Aufguss [wässrigem od. weinigem; Dr. 2 — Unc. $\frac{1}{2}$ auf Unc. 6, gewöhnl. mit 1 Unze *Oxymel*, anfangs 4mal tägl. 1 Essl., allmählig mehr — als Reizmittel] oder, am zweckmässigsten, leichter Abkochung [Ry 851].

Ausserl. zu Salben u. Waschwässern [wie *Rad. Helleb. albi*, doch in 6mal so starken Gaben, — Entbehrlich].

851.

Ry *Rad. Helleb. nigri* Dr. 2 — Unc. $\frac{1}{2}$

coq. c. *Aq. comm. q. s. per $\frac{1}{2}$ hor. ad Colat.* Unc. 8, in qua solve

Kali tartarici Unc. 1

et adda

Mellis aspum. Unc. 2.

M. D. S. Esslöffelweise. (Bei Melancholie.)

REIL.

Radix Jalapae. Jalappen- od. Purgir-Wurzel.

[Hauptbestandtheile: Harz u. Stärkmehl. — 1 Unze sub. pulv. 5 Sgr.]

Innerl. als Reizmittel zu Gr. 3-5, als gelind eröffnendes Mittel

zu Gr. 6-10, einigemal tägl.; als starkes Purgans Dr. $\frac{1}{2}$ - Scr. 2 auf einmal, oder meist besser Gr. 10-12 alle 2-1 St. einigemal hinter einander. — In Pulver [*Elaeosacch. Citri* corrigirt am besten den ekelhaften Geschmack (u. Geruch). — Ry 852; 450. c. (*Gutti*), 962 (*Sem. Cinae*). — *Pulv. Jalap. c. Kali sulphurico* (*Pulv. purgans*) PH. MIL.: Jalappe Dr. $\frac{1}{2}$, Doppelsalz Scr. $\frac{1}{2}$ (dies p. dosi). — *Pulv. purgans* PH. P.: Jalappe, *Tart. dep.*, *Elaeos.*, *Foenic. ana*; 1 Drachme $\frac{2}{3}$ Sgr.], Morsellen [ein Beisp. I. S. 230], Trochischen [Ry 536 (*Hydr. muriat. mite*)], Pillen u. Bissen [Ry 853, 854; 342 (*Extr. Aloës Ac. sulph. corr.*), 450. b. (*Gutti*), 964 (*Sem. Cin.*)], Latwerge [Ry 330 (*Elect. a Senna*), 965 (*Sem. Cin.*), 990 (*Stann. raspat.*)].

852.

Ry *Hydrarg. muriat. mitis* Gr. 12

Rad. Jalapae Dr. $\frac{1}{2}$

Elaeos. Citri Scr. 2.

M. f. *Pulv. Div. in 3 part. aeq. D. S.*
2stündl. 1 Pulver.

Oder dafür:

853.

Ry *Hydrarg. muriat. mitis* Gr. 12

Pulv. Rad. Jalap. Dr. $\frac{1}{2}$

Extr. Tarax. liq. q. s.

ut f. *Boli* nr. 3. *Consp. Pulv. Cass. cin-*
nam. D. S. 2stündl. 1 Stück.

854.

Ry *Rad. Jalapae* Gr. 5

Tartari depur. Scr. 1

Ol. Foeniculi Gtt. 1

Extr. Graminis liq. q. s.

ut f. *Bolus Disp. tal. nr. 6. Consp. Pulv.*
Cass. cinnam. D. S. 3mal tägl. 1 Stück.

Radix Imperatoriae s. Ostruthii. Meister- oder Kaiser-Wurzel. [Hauptbestandtheile: Imperatorin (harzähnlich), äther. Öl u. Stärkmehl. — 1 Unze conc. $1\frac{1}{8}$ Sgr.] Innerl. zu Scr. $\frac{1}{2}$ - Dr. $\frac{1}{2}$, mehrmals tägl., in Pulver oder pulveraufnehmenden Formen [Latwerge: Ry 361 (*Fol. Senn.*)], Aufguss [besonders weinigem Digestionsaufguss. — Unc. $\frac{1}{2}$ auf Unc. 6, alle 2-1 St. 1 Essl.]. — Äusserl. entbehrlich.

Radix Ipecacuanhae (Hypecacuanhae). Brech- wurzel. Ruhrwurzel. [Hauptbestandtheile: Emetin (s. S. 153) und Stärkmehl. — 1 Drachme conc. $1\frac{1}{2}$, *subt. pulv.* $1\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave* [mit sanctionirten Ausnahmen] wie bei *Emetina* und bei Stärkmehl [I. S. 36 *sub* 15].

Innerl. zu Gr. $\frac{1}{4}$ - 1; — um Ekel zu erregen, zu Gr. 1-3, alle 4-2 St.; — als Brechmittel zu Gr. 15-20 auf einmal oder (in der Regel zweckmässiger) zu Dr. $\frac{1}{4}$ - Scr. 2, in 4 Theile getheilt, alle 15-10 Minuten einen.

Die kleineren Dosen in Pulver [Ry 855; 16 (*Acid. benz.*), 163 (*Bismuth. nitr. praec.*), 313 (*Cubeb.*), 736 (*Nuc. Fom.*), 782, 783 (*Opium*; vgl. auch S. 363), 831 (*Rad. Belladonna.*)], Trochischen [offic. *Troch. Ipecac.* — Ry 856-858; s. auch I. S. 237], Pillen u. Bissen [Ry 859, 860; 130 (*Asa foet. dep.*), 346 (*Extr. Aloës Ac. sulph. corr.*), 378 (*Extr. Hyosc.*), 445 (*Galban. dep.*), 450. b. (*Gutti*), 693 (*Morphium acet.*), 905, 906 (*Rad. Scill.*), 994 (*Stip. Dulcam.*). — Scr. 1 mit *Sapon. med.* Scr. 2 (u. Wein-

geist g. s.) zu 80 Pillen, nach dem Mittagessen 1 u. kurz vor Schlafengehn 3-6: JAMES bei Dyspepsie, Stuhlverstopfung, Schüttelmixtur; Aufguss [Scr. $\frac{1}{2}$ - Dr. 1 auf Unc. 3-4, ealöffelweise. — Ry 862; 476 (Hb. Lond. pal.). — Auch in wenigem Aufguss, etwa Dr. 1 mit $1\frac{1}{2}$ Unzen Mallaga 24 St. macerirt, davon (bei empfindlichen Individuen u. Kindern statt des Spiessglanzweins: BUNDELIN) 5-15 Tropfen p. dosi. — *Fin Ipecac.* PH. SLESV.: 1 (pulv.) mit 16 Xereswein 7 Tage macerirt; 1 Unze 6 Shl.] od. Ebullition [Ry 861].

Als Brechmittel häufig in Verbindung mit *Tart. stibiat.* [der in dieser Verbindung nicht, wie er allein so gern thut, bloss durchzuschlagen pflegt, ausser etwa bei sehr geringer Neigung zum Brechen, stärkerer zum Purgiren, wo man ihn dann wohl besser weglässt. — In den meisten Fällen, wo es nicht wegen der Individualität des Kranken oder der dringenden Indication eines sehr starken Brechmittels bedarf, kann man von der vollen Brechdose der Ipecacuanha $\frac{1}{4}$ Scrupel für jeden Gran *Tart. stib.* abziehen], *Rad. Scillae* oder *Oxymel scillit.*, selten mit Zinkoxyd od. *Zinc. sulphur.*; bisweilen, wo man auch zugleich etwas purgiren will, mit *Tart. depur.* od. *Kali tartar.*; bei Leuten, die schwer, nur unter vieler krampfhaften Anstrengung, brechen, setzt man wohl ein Paar Tropfen eines antispasmodischen Mittels [*Äther, Ol. Cajeputi, Ol. Chamomill. citrat.*, oder bei reichen Leuten *Ol. Chamom. simpl.* od. ein Paar Gran *Castoreum*] zu, doch ist dies in der Regel überflüssig, wenn man nur, sobald sich die ersten Vomitoritionen einstellen (nicht früher) das Erbrechen durch ein Paar Tassen lauwarmen Getränks [laues Wasser, lauen einfachen oder Kamillen- oder (am besten) Cardobenedicten-Thee], in Absätzen getrunken, befördert. [Auch ist es rathsam, dass der Kranke sich nicht gleich beim ersten Anfang der Uebelkeit zum Erbrechen zwingt; er unterdrücke lieber die ersten Vomitoritionen, bis sie einen gewissen Grad erreicht haben. — Sonst kann man auch durch Kitzeln des Schlundes mit dem Finger oder einem weichen Federbart, bei Torpor der Magenerven durch warme geistige od. aromatische Bähungen oder einen Sinapismus auf die Magengegend, durch Reiben oder Bürsten des Bauchs, das Erbrechen befördern.] Wo man recht schnell Erbrechen bewirken will, so wie auch bei grosser Unempfindlichkeit des Magens [z. B. bei Verschleimung, manchen Typhusarten, Wahnsinn], reicht man das Brechmittel auf Einmal [etwa Gr. 15-20 Ipecac., etwa noch mit Gr. 1 *Tart. stib.* oder mit einer halben Unze *Oxymel scillit.* od. dgl. (*Pulv. Ipecac. c. Tart. stib.* PH. MIL.: Scr. 1 mit Gr. 1; dies p. dosi.)], und hält höchstens Vorsichts halber noch ein Paar kleinere Dosen in Bereitschaft. Wo man befürchtet, das Brechmittel werde bloss durchschlagen, reicht man es [ohne *Tart. stib.*] ebenfalls auf Einmal, und zwar hier gern eine etwas grössere Dose [Dr. $\frac{1}{4}$ Ipecac.], auch nöthigenfalls noch ein Paar kleine Dosen [zu Gr. 5] von 5 zu 5 Minuten hinterher. [SUTTON empfiehlt einen Zusatz von einem Paar Tropfen Opiumtinctur od. $\frac{1}{4}$ Gran gepulverten Opiums. Andere setzen etwas Gewürzhaftes zu, z. B. *Ol. Macid.* — Man kann auch versuchsweise einen Senfteig auf die Magengegend legen.] In den meisten Fällen

aber ist es am zweckmässigsten, die Brechmittel in getheilten Dosen, etwa alle 15–10 Minuten, zu reichen [in welcher Art sie sicher, nicht zu stürmisch, eine Weile anhaltend, und recht vollständig ausleerend wirken]. — Gegen Hyperemesis dienen vegetabilische Säuren [Citronensaft, Essig], aromatische, ätherische Dinge [ein aromatisches Wasser, ein Ölzucker, etwas Hoffmannstropfen od. dgl.], ein Paar Tropfen Opiumtinctur, ganz besonders aber Brausepulver; äusserl. ein aromatisches Pflaster auf den Magen oder [wenn man es rasch genug haben kann] ein laues Bad. — Nach beendigtem Erbrechen muss man in der Regel so lange, bis alle Übelkeit verschwunden ist, warten, ehe man dem Kranken, selbst wenn er es verlangt, etwas zu geniessen erlaubt; sonst wird Speise oder Getränk leicht wieder ausgebrochen. — Am zweckmässigsten giebt man die Brechmittel in der Regel in Pulver [dessen widriger Geschmack allein Manchem schon Uebelkeit macht. Ry 863–865] oder [was eigentlich dasselbe ist, da das Pulver doch beim Anrühren mit Wasser in eine Art Schüttelmixtur verwandelt wird] in Schüttelmixturen [die man in der Regel etwa auf 4 Esslöffel berechnet, so dass alle 15–10 Minuten 1 Essl. gereicht werden kann, oder für Kinder auf 1–2 Essl., so dass alle 15–10 Minuten 1–2 Theelöffel gereicht werden. — Ry 866–868]; wo es nicht auf eine besonders rasche Wirkung ankommt, und wo man nicht zu befürchten hat, das Brechmittel werde bloss durchschlagen, kann man sich auch der Latwergen- od. Bolus-Form bedienen, doch muss man, namentlich in der letzteren Form, immer die ganze Portion auf Einmal geben, weil sie in dieser Gestalt doch nur allmählig im Magen zur Wirkung kommt [Ry 869, 870]. Unsicherer als in Substanz wirkt die Ipecacuanha im Aufguss [den man also nur, wo schon Neigung zum Erbrechen da ist, oder bei empfindlichen Individuen, anwenden wird. (Doch empfiehlt die PH. HANN. ihr *Infus. Ipecacuanh.*, Ry 872, als sehr sicher wirkend.) — Ry 871, 872; oder von dem S. 398 Z. 4 angegebenen Aufguss mit Mallagawein alle 15–10 Minuten 1–1½ Essl.].

Äusserl. (selten) zu Klystieren [Ein Aufguss von 8scr. ½; bei Cholera empfohlen. — Eine Abkochung von einem Paar Drachmen: CLARI gegen Ruhren, *Hämorrhoides internae* etc.].

855.

Ry *Rad. Ipecacuanh.*
Sulph. stib. aurant. ana Gr. 1
Camphorae trit. Gr. 3
Pulv. gummosi 8scr. 1.
M. f. Pulv. Disp. tales nr. — . D. in charta cerata. S. 2stündl. 1 Pulver.
 (Wenn in der Peripneumonie der Auswurf unter Sinken des Pulses, grosser

Entkräftung, Röcheln, stockt oder ganz aufhört.) MURSIGNA.

856.

Ry *Ambrae gris. pulv. Gr. 3*
Rad. Ipecacuanh. pulv. Dr. 1
Catechu pulv. Dr. 2
Sacch. albi pulv. Unc. 1
Mucil. Gm. Tragac. q. s.

ut f. Trochisci nr. 60, Pulv. Vanill. conspergendi, non torrendi. D. S. Anfangs 1 Stück tägl., allmählig mehr. (Bei Dyspepsie mit Neigung zu Durchfall.) DAUBENTON.

857.

Ry Rad. Ipecacuanh. pulv. Dr. 1
 † Chocoladae c. Sacch. et Vanilla paratae pulv. Unc. 1
 Mucil. Gm. Tragac. q. s.
 ut f. Trochisci nr. 60, Pulv. Vanill. conspergendi, lenissime torrendi. D. S. 2mal tägl. 1 Stück. (Gegen Magenschwäche mit Blähungen.) RICHTER.

858.

Ry Opii pulv. Gr. 1
 Rad. Ipecac. pulv. Gr. 3
 Sacch. albi pulv. Dr. 1½
 Mucil. Gm. Tragac. q. s.
 ut f. Trochisci nr. 8, Pulv. Cass. cinnam. conspergendi, non torrendi. D. S. Morgens u. Abends 2 Stück. (Als Diaphoreticum. — Oder dafür die folgende Formel.)

859.

Ry Opii pulv. Gr. 1
 Rad. Ipecacuanh. pulv. Gr. 2
 Extr. Dulcamar. Scr. 1
 Stipit. Dulcam. pulv. q. s.
 ut f. Boli nr. 4. Consp. Pulv. Cass. cinnam. D. S. Früh u. Abends 1 Stück.

860.

Ry Opii pulv. Gr. 5
 Rad. Ipecac. pulv.
 Hb. Digital. — ana Dr. ¼
 Extr. Helenii q. s.
 ut f. Pilulae 60. Consp. Pulv. Rad. Irid. Flor. D. in vitro. S. 3stündl. 1 Pille. (Bei Husten, bei krampfhaftem Asthma.) (HEIN.)

861.

Ry Rad. Ipecacuanh. Dr. 1
 — Rhei Dr. 3

ebulliant semel c. Aq. comm. feru. q. s.
 In Colat. Unc. 6 solve
 Gm. Mimos. electi Dr. 2
 et adde

Syr. Alth. Dr. 6.
 M. D. S. Stündl. 1 Essl. (Bei Ruhr.) JAHN.

862.

Ry Rad. Ipecacuanh. Gr. 6
 Flav. Cort. Aurant. Dr. ½
 Aq. comm. fervid. q. s.
 repono ad refrigerat.; Colat. Unc. 3 addo
 Syr. Flor. Aurant. Unc. ¼
 M. D. S. ½ St. vor jeder Mahlzeit 1 Essl. (Als reizendes u. magenstärkendes Mittel. — Nach einer franzö. Spitalformel.)

863.

Ry Tartari stibiati Gr. 2
 — depur. Dr. 1
 Rad. Ipecacuanh. Scr. 1.
 M. f. Pulv. Div. in 3 part. aeq. D. S. Viertelstündl. 1 Pulver, bis 3mal Erbrechen erfolgt ist. SCHUBARTH.

864.

Ry Rad. Scillae Gr. 1
 Tart. stibiati Gr. 2
 Rad. Ipecacuanh. Dr. ¼
 Sacch. albi Dr. 1½
 M. f. Pulv. Div. in 6 part. aeq. D. S. Alle 10-5 Minuten 1 Pulver, bis etc. (Für ein Brechmittel pro dosi una ½ dieser Totalquantität.) VOST.
 Sehr stark.

865.

Ry Zinci oxydati v. hum. par. Gr. 12
 Rad. Ipecacuanh. Dr. ½
 Elaeos. Citri Dr. 1.
 M. f. Pulv. Div. in 6 part. aeq. D. in charta cer. S. Alle 10 Minuten 1 Pulver, bis Erbrechen erfolgt. (Bei sensiblen, zu Krämpfen geneigten Individuen.) SUNDLIN.

866.

Ry *Tartari stibiat* Gr. 1

solvo in

Aq. destill. Unc. 1½

adde

Rad. Ipecacuanh. pulv. Scr. 1*Oxymell. scillit.* Unc. ½.

M. D. S. Umgeschüttelt viertelstündl.
1 Essl., bis etc. (Ähnlich u. in gleicher
Dose zu geben ist der *Linctus eme-*
ticus Ph. P.)

867.

Ry *Rad. Ipecacuanh. pulv.* Scr. ½*Aq. comm.* Dr. 6*Oxymell. scillit.* Dr. 2.

M. D. S. Umgeschüttelt alle 10 Minuten
½ Essl., bis 3mal etc. (Für ein 2jähriges
Kind.)

868.

Ry *Pulv. Rad. Ipecac.* Scr. 1-2*Aq. Melissa* Unc. 2*Aether. acetic* Gtt. 8.

M. D. S. Brechmittel, umgeschüttelt alle
10 Minuten 1 Essl., bis etc.

BERENDS.

Für sensible Personen, Damen.

869.

Ry *Tart. stibiat* Gr. 2*Rad. Ipecac. pulv.* Scr. 1*Extr. Cardui bened.* q. s.ut f. *Bolus. Cons.* Sem. *Lycop.* [oder,

wo man den Geruch der *Ipecac.* mehr
verdecken will, *Pulv. Rad. Irid. Flor.*].
D. S. Brechbissen.

870.

Ry *Pulv. Rad. Ipecac.* Dr. ½*Extr. Cardui bened.* Dr. 2*Aq. comm.* q. s.

ut f. *Electuar.* D. S. Brechmittel, zuerst
die Hälfte, nach einer Viertelstunde den
Rest zu nehmen.

871.

Ry *Rad. Ipecacuanh.* Dr. 1-1½*Aq. comm. ferri.* q. s.

digest per ½ hor.; *Colat. fontis* *capr.*
Unc. 1 adde

Vini stibiat Dr. 2*Oxymell. scillit.* Unc. ½.

M. D. S. Brechmittel, alle 15-10 Minu-
ten 1 Essl., bis etc. CASPER.

872.

Ry *Rad. Ipecac. gr. pulv.* Dr. 1½*Flavd. Cort. Aurant.* Dr. 2*Tartari depur.* Dr. ½

infunde cum *Aq. destillat.* Unc. 5 [„li-
ber q. s.“] *ad Colat.* Unc. 4, *admisce*
Oxymell. scillit. Unc. ½.

D. S. Brechmittel, eckelöffelweise in kur-
zen Zwischenräumen, bis etc.

Infus. Ipec. Ph. HANN. (1 Unze 3 Mgr.)

Vgl. S. 399. Doch dürfte eine geringere
Quantität Wasser zweckmäßiger seyn.

Radix Iridis Florentinae. Florentinische Veil-

chen- (Violen-) Wurzel. [Hauptbestandtheil: Stärkmehl, ein
scharfes Harz und (?) äther. Öl. — 1 Unze conc. 1½, *subt. pulv.* 1½ Sgr.]

Innerl. zu Scr. ¼ - Dr. ½, mehrmals tägl.; meist nur als Zusatz
zu andern Arzneien; in Pulver [Ry 663 (*Magnes. carbon.*), 1001
(*Sulphur dep.*)], Trochisken [officinell: *Trochisci bechici.* — Ry 80
(*Ambra gris.*), 109 (*Amylum*); s. auch I. S. 237. — *Bacillen* Ry 845 (*Rad.*
Glycyrrhiz.)], Bissen, Aufguss [offic. *Spec. ad Infus. pector.*]. Zum
Conspargiren: I. S. 185.

Ausserl. in Substanz als Kaumittel [I. S. 189], zur Unterhal-
tung von Fontanellen [vgl. I. S. 238]; gepulvert zu Zahnpulvern
[I. S. 218 *sub a.*]. — Offic.: *Pulv. dentifric.* — Ry 392 (*Extr. Ratanh.*), 679

(Mastiche), 1029 (Tart. dep.)], Zahnlatwergen [Ry 287 (Cort. Chin. fusc.)], Schnupfpulvern [offic.: Pulv. sternutator. — Ry 849 (Rad. Helleb. albi)], Waschpulvern [offic.: Pulv. cosmet. u. Sapo aromat. pro Baln. — Ry 443 (+ Furf. Amygdal.)], Seifenkugeln [offic.: Sapo cosmet.]); als Zusatz zu Räucherpulvern.

* *Radix Lapathi acuti* s. *Rumicis acuti* s. *Oxylapathi*. Grindwurz. [Hauptbestandtheile: eisengründer Gerbstoff, Bitterstoff (Rumicin) und Stärkmehl. — 1 Unze conc. 1 Sgr.] Innerl. der Presssaft der frischen Wurzel [im Frühling u. Frühsommer, zu einigen Unzen tägl., mit Fleischbrühe oder andern Presssäften]; sonst abgekocht in Tisaneform [Unc. 1–2 mit L. 3–4 auf L. 2, tägl. zu verbrauchen. — Ry 637 (Lign. Guaj.)], — Ausserl. eine concentrirtere Abkochung zum Waschen.

Radix Levistici s. *Lignatici*. Liebstöckel- od. Liebstengel-Wurzel. [Hauptbestandtheile: äther. Öl, Harz u. Zucker. — 1 Unze conc. 1½, subst. pulv. 1½ Sgr.] Innerl. selten in Pulver, pulveraufnehmenden Formen, zu Gr. 15–30 mehrmals tägl.; meist in Aufguss [wässerigem, geistigem od. weinigem; namentlich Digestionsaufguss; Unc. ½–1 auf Unc. 6–8, eestöffelweise. — Ry 873. — Oft als Species mit Bacc. Junip., vgl. S. 77], auch wohl in Ebullition [Ry 822 (Rad. Alth.)], Decocto-Ebullition [L. S. 162 sub b)]; nicht zweckmässig in Abkochung.

873.

Ry Rad. Levistici Dr. 1–3.

Aq. comm. feroid. q. s.

digeret per ½ hor.; Colat, refriger. Unc. 6

addo

Spir. muratico-aeth. Scr. 1–Dr. 1

Syr. Flor. Aurant. Unc. ½ [besser

Unc. 1].

M. D. S.: 2stündl. 1 Essl. (Für Kinder.)

WENDT.

Radix Ononidis. Hauhechelwurz. Ochsenbrechwurz. [Hauptbestandtheile: kratzender Extractivstoff (?) und Stärkmehl. — 1 Unze conc. 1, subst. pulv. 1½ Sgr.] Innerl. seltener in Pulver od. pulveraufnehmenden Formen, zu Dr. ½–1, 2–3 mal tägl.; öfter in Abkochung [tägl. Unc. ½–1½ mit Unc. 9–18 auf Unc. 6–12] oder Aufguss.

Radix Paeoniae. Pfingstrosen- od. Gichtrosen-Wurzel. [Hauptbestandtheile: ein eigenthümlicher, scharfer, flüchtiger, leicht zerstörbarer Stoff, Stärkmehl, Zucker, Bitterstoff u. eisenblühender Gerbstoff. — 1 Unze conc. 1½, subst. pulv. 1½ Sgr.] Innerl. zu Scr. 1–Dr. 1 mehrmals tägl., in Pulver [officinell: Pulv. antiepilept.], Aufguss [Unc. ½–1 auf Unc. 6, 2stündl. 1 Essl.] oder [wohl weniger zweckmässig] leicht-

ter Abkochung [etwa in Tisaneform, Unc. $\frac{1}{2}$ auf L. 1 tägl.]; wohl mit Unrecht selten im Prefsaft. [da die frische Wurzel viel kräftiger ist als die getrocknete].

† *Radix Petroselin.* Petersilienwurzel. [Hauptbestandtheile: Zucker, Stärkmehl und äther. Öl, welches einen eigenthümlichen Campher enthält.] Innerl. im Aufguss [etwa wie *Semen Petrosel.*].

Radix Pimpinellae (albae). Pimpinell- od. Bibernell-Wurzel. [Hauptbestandtheile: äther. Öl, scharfes Harz und Stärkmehl. — 1 Unze 1, conc. $1\frac{1}{8}$, subf. pulv. $1\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerl. zu Gr. 5-15 einigemal tägl.; in Pulver; oder des scharfen Geschmacks wegen lieber in Pillen, Bissen, Trochiscen [Ry 874]; besonders aber im Aufguss [namentlich Digestionsaufguss, wässrigem oder besser geistigem; Dr. 2-6 auf Unc. 6, 2stündl. 1 Essl. — Ry 875. — Dr. 3, $\frac{1}{2}$ St. zur Colat. v. Unc. 4 digerirt, mit *Syr. Alh.* Unc. $\frac{1}{2}$, 2stündl. $\frac{1}{2}$ Essl.: RADIUS gegen chronische Heiserkeit u. übermässige Schleimabsonderung in den Lufttracheästen].

Ausserl. in Substanz als Kaumittel [bei Zungenlähmung — noch besser die frische Wurzel]; gepulvert zu Zahn-Pillen u. -Latwergen [besser die Tinctur; vgl. I. §. 156.], Zahnfleischlatwergen; infundirt od. leicht abgekocht zu Mund- u. Gurgelwässern [Dr. 2-4 auf Unc. 6. — Ry 876]; etc.

874.

Ry *Rad. Pimpinell. subtiliss. pulv.*
— Zingiber. — — ana
Dr. 2

Flacos. Caryophyll. Unc. $\frac{1}{2}$

Mucil. Gm. Mimos. q. s.

ut f. Trochisci, Pulv. *Rad. Zingib. conspersigendi, non torrendi, nr. 30. D. S.* Bisweilen ein Stück im Munde zergehn zu lassen und langsam zu verschlucken. (Bei atonischer, paralytischer Bräune.)

VOGT.

875.

Ry *Rad. Pimpinell.* Unc. $\frac{1}{2}$
Aq. comm. bullient.

Vini Gallici albi ana Unc. 3.

Digere per $\frac{1}{4}$ hor.; Colat. refriger. adde Spir. Cochlear. Unc. $\frac{1}{2}$.
M. D. S. 2stündl. 1 Essl.

G. A. RICHTER.

Besser wohl nur mit Wein digerirt, die Colatur mit Wasser verdünnt, umgeschüttelt.

876.

Ry *Rad. Pimpinellae*
Hb. Salviae
Flor. Malv. arbor. ana Unc. 1.
Conc. M. D. S. Den 4ten Theil mit 2 Tassen kochenden Wassers anzubrühen; zum Gurgelwasser.

† *Radix Polygalae amarae.* [1 Unze conc. $1\frac{1}{2}$, pulv. 2 Sgr.] Wie *Herba P. a.*

† *Radix Polypodii (querni).* Engelsüss-, Eichfarn-, Baumfarn- od. Löffelfarn-Wurzel. [Hauptbestandtheile: eigenthümlicher süsser Extractivstoff (Glycyrrhizin?), eisengrün-

der Gerbstoff, fettes Öl und wenig Stärkmehl. — 1 Unze $\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. im Aufguss [Dr. 4-6 auf Unc. 6, esslöffelweise], weniger gern in Abkochung [sehr widerlich].

Radix Pyrethri. Bertram-, Zahn- od. Speichel-Wurzel. [Hauptbestandtheile: Pyrethrin (scharfe harzartige Substanz), scharfes äther. Öl, Bitterstoff und Inulin. — 1 Unze conc. $1\frac{1}{2}$, subst. pulv. $2\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerl. zu Scr. $\frac{1}{2}$ –Dr. $\frac{1}{2}$, einigemal tägl. In Pulver [angere, wenigstens die grösseren Dosen, des scharfen Geschmacks wegen; lieber in] Bissen [z. B. Abends Dr. $\frac{1}{2}$ mit Syr. Cort. Aurant. q. s.: OXLEY bei Lähmungen], Trochisken, Latwerge; in Aufguss [Unc. $\frac{1}{2}$ –1 auf Unc. 6, 2stündl. 1 Essl.; gern mit einem schleimigen Syrup. — Auch, besonders zweckmässig, in wenigem Aufguss] oder leichter Abkochung [Unc. $\frac{1}{2}$ –1 mit Unc. 9 auf Unc. 6, etc.].

Ausserl. in Substanz als Kaumittel; gepulvert zu Zahnpillen u. – Latwergen [nicht eben zweckmässig, vgl. I. §. 156, ausser zum Conspergiren der Pillen. — R_x 788 (*Opium*)], Zahnfleischlatwergen, Niesepulvern [bisweilen par]; infundirt od. abgekocht zu Mund- u. Gurgelwässern [in ähnlicher Concentration wie zum innerl. Gebrauch. — R_x 877].

877.

R_y Sem. Hordei excoct.Rad. Pyrethri ana Unc. $\frac{1}{2}$ coq. c. Aq. comm. q. s. per $\frac{1}{4}$ hor. ad

Colat. Unc. 8, cui refrigeratas adde

Tinct. Pimpinellae Unc. $\frac{1}{2}$

Mellis rosati Unc. 1.

M. D. S. Gurgelwasser, umgeschüttelt.

Radix Ratanhae. Ratanhawurzel. [Hauptbestandtheile: Gerbstoff, Ratanha-Säure (durch ihre grosse Verwandtschaft zum Baryt ausgezeichnet; soll selbst den schwefelsauren Baryt zersetzen; fällt ausser Bleisalzen keine Metallsalze) und Stärkmehl. — 1 Unze conc. $3\frac{1}{2}$, subst. pulv. $4\frac{1}{2}$ Sgr.] Cave s. I. S. 35 sub 6.

Innerl. zu Scr. $\frac{1}{2}$ –Dr. $\frac{1}{2}$ mehrmals tägl.; in Pulver, lieber jedoch in Bissen, Latwerge [R_x 64 (*Alum.*)]; am häufigsten in flüssigem Auszug, und zwar nach SOUBEIRAN besser im Aufguss [wässrigen Digestionsaufguss. Weingeist extrahire zwar den Gerbstoff vollständiger, aber vermengt mit allem in der Wurzel enthaltenen Gerbstoffabsatz (der beim Digeriren mit Wasser zurückbleibe). Kochen verändere den Gerbstoff, u. s. w.] als in Abkochung [bis jetzt am meisten beliebt. — Unc. $\frac{1}{2}$ –1 mit Unc. 12–16 auf Unc. 6–8, alle 2–1 St. 1 Essl. — R_x 878].

Ausserl. zu Zahnpulvern, Zahnfleischlatwergen, plattstillenden Streupulvern; extrahirt zu Mund- u. Gurgelwässern [R_x 879], Klystieren [R_x 880] u. a. Injektionen [R_x 881; 393 (*Ext. Ratanh.*)], selten zu Waschungen [eine saturirte Abkochung diene gegen hartnäckige *Prurigo Scroti*].

878.

Ry *Rad. Ratanh.* Unc. 1
coq. c. Aq. comm. Unc. 16 *ad Colat.*
 Unc. 8, *cui refrigerat. adde*
Mixt. sulph.-acid. Dr. 1
Syr. Cinnam. Unc. 1½.
M. D. S. Alle 2-1 St., umgeschüttelt,
 1 Essl. mit etwas Haferschleim. (Bei
 atonischen Blutflüssen.) SUNDELIN.

879.

Ry *Rad. Ratanh.* Unc. ½
coq. c. Aq. comm. Unc. 12, *sub finem*
coct. addendō
Hb. Salviae Unc. ½
ad Colat. Unc. 6, *cui refrigerat. adde*
Spir. Cochlear.
Mellis rosati ana Unc. 1.
M. D. — Umgeschüttelt zum Ausspülen
 des Mundes. (Bei aufgelockertem Zahn-
 fleisch.) VOGT.

880.

Ry *Rad. Ratanhas conc.*
 — *Tormentillae conc.*
Cort. Quercus gr. pulv. ana Unc. ¼.
M. f. Species. D. S. Morgens u. Abends
 den 6ten Theil mit 2 Weingläsern hei-
 ßen Wassers angebrüht u. gelinde ge-
 kocht, zum Klystier. (Bei Mastdarmvor-
 fall oder Mutterblutfluss aus Atonie,
 u. s. w.) VOGT.

881.

Ry *Rad. Ratanh.* Unc. 1
coq. c. Aq. comm. Unc. 12 *ad Colat.*
 Unc. 6, *cui adde*
Aceti Unc. 2.
M. D. S. Umgeschüttelt zum Einsprit-
 zen. (Bei atonischer Epistaxis, Metror-
 rhagie, Stymatose.)
 SUNDELIN.

Radix Rhei (Chinensis) s. Rhabarbari. Rhabarber-
 wurzel. [Hauptbestandtheile: Rhabarbarin (Rhabarber-Säure, -Stoff, -Bit-
 ter, -Gelb; sehr schwer auflöslich in kaltem Wasser oder Weingeist, etwas wen-
 ger schwer in kochendem Wasser; leicht auflöslich dagegen, mit rothbrauner Farbe,
 in wässrigen Alkali-Lösungen), eisengrünender Gerbstoff, kleeaurer Kalk;
 oft auch Stärkmehl und Zucker. Der Auszug wird durch kaustische u. kohlen-
 saure Alkalien und durch Alkaloide gebräunt. — 1 Drachme *conc.* 1½, *subt. pulv.* 1½
 Sgr.] *Cave* [mit sanctionirten Ausnahmen] starke Säuren, besonders
 Salpetersäure; Salzbilder; viele Salze, besonders Alaun und Metall-
 salze; thier. Leim; Gerbstoff.

Innerl. zu Gr. 3-10, einigemal tägl.; als Abführmittel (unsi-
 cher) Scr. 1-Dr. ½ ein Paar Mal hinter einander oder (noch unsiche-
 rer) Dr. 1 auf den Tag vertheilt. (In den flüssigen Formen, Aufguss,
 Abkochung, nur in der doppelten Menge.) — Den Geschmack corri-
 girt *Ol. Macid.*, nächst dem Zimmt oder Zimmtwasser, noch am er-
 träglichsten. — In Pulver [Zum Abführen namentlich sind diese Form
 und die, welche das Pulver aufnehmen, noch sicherer als die flüssige Form,
 welche letztere als ziemlich entbehrlich in der Armenpraxis überhaupt nicht oft
 vorkommen darf. — Offic.: *Pulv. Magnes. c. Rho.* — 1 mit Doppelsalz 3:
Pulv. Rhei compositus PH. MIL. (etwa zu ½-1 Theelöffel einigemal tägl., als
 Digestivmittel; 1 Drachme ¾ Sgr.). — 1 mit Doppelsalz 2, Salmiak ½: *Pulv.*
digestivus PH. SLESV. (1 Drachme 1½ Shl.). — Mit *Kali tartar.* u. *Flaved.*
Cort. Aurant. ana: *Pulv. digestivus Kleinsti* PH. SLESV., *Pulv. Rhei*
tartarisatus s. lenitivus tartarisatus PH. HANN. (1 Drachme 2 Shl.). — Ry 166
 (Bolus Arm.), 614 (*Kali tartar.*), 736 (*Nuc. Vom.*); vgl. auch *Ferr. pulv.*,

Hb. Belladonn.] oder des abscheulichen Geschmacks wegen lieber in Pillen od. Bissen [z. B. Scr. 1-Dr. $\frac{1}{2}$ mit Honig zum Bissen gemacht, und solche Gabe 1 oder 2mal an einem Morgen gereicht: wohl noch die beste Form, um mit der Rhabarber abzuführen. — Um den üblen Geruch zu decken, lässt man Pillen und Bissen wohl mit Vanille oder mit *Pulv. Rad. Irid. Flor.* bestreuen oder noch besser versilbern. — R. 882; 55 (*Aloë luc.*), 133 (*Asa foet. dep.*), 375 (*Extr. Helleb. nigri*), 403 (*Fol. Tauri insp.*), 409 (*Ferr. oxydul. nigr.*), 450 h. (*Gutt.*), 611 (*Kali sulphuric. dep.*), 615 (*Kali tartar.*), 951 (*Sapo jalapin.*)], schon ungern in Latwerge [R. 434 (*Fol. Senn.*)]; ausserdem in Aufguss [kleine Gabe: Dr. 1-2 auf Unc. 6, 2stündl. 1 Essl. R. 883. — Abführend: Dr. 1 auf einmal oder Dr. 2 auf den Tag. R. 884; 436 (*Fol. Senn.*)]. — Auch wohl in kaltem weinigen Aufguss: R. 885. Oder im Hause des Kranken mit heissem Kaffee infundirt, namentlich zum Abführen. — Oft wird man statt eines magistral zu verschreibenden wässerigen Aufgusses wohlfeiler u. zweckmässiger das officinelle Präparat der Art (mit *Kali carbon.*), die *Tinct. Rhei aquosa*, reichen; so wie überhaupt das Infundiren mit einem Zusatz von *Kali* oder *Natr. carbon.* als die kräftigste Extractionsart anzusehen ist.], Ebullition [R. 428 (*Fol. Nicot.*), 861 (*Rad. Ipecac.*)] oder Abkochung [in ähnlichen Verhältnissen wie im Aufguss. Die abführende Kraft wird durch längeres Kochen vollends geschwächt. Also in der Regel nur leicht abzukochen, auf $\frac{3}{4}$ des Wassers]. Diätetisch verschlucken Manche tägl. ein erbsengrosses Stück in der Mittagssuppe.

Ausserl. als Streupulver [wo doch meist China, Kamillen, Kohle u. dgl. zweckmässiger]; infundirt od. leicht abgekocht zum Klystier [ein Paar Drachmen, meist mit Senna, Salzen, u. dgl. in Verbindung. — R. 440 (*Fol. Senn.*)], zum Verbandwasser [bei atonischen Geschwüren; etwa 1 auf 8; meist aber ebenfalls durch wohlfeilere oder zweckmässigere Mittel — Kamillen, Rindenrinde, China u. s. w. — zu ersetzen].

882.

R. *Rad. Rhei pulv.*

Conch. ppt. ana Dr. 1

Ol. Menth. pip. Gut. 10

Fell. Tauri insp. Dr. 2

Hh. Millefol. pulv. q. s.

ut f. *Pilulae* 120. *Consp. Pulv. Rad.*

Irid. Flor. D. in vitro. S. 3mal tägl. 8.

883.

R. *Rad. Rhei inc. Dr. 2*

Ligni Quass. rasi Unc. $\frac{1}{2}$

Aq. comm. ferv. Unc. 5.

Digere per 12 horas; Colat. refriger. adde

Tinct. aromat. Dr. 1

Syr. Cort. Aurant. Unc. $\frac{1}{2}$

M.D.S. 3stündl., umgeschüttelt, 1 Essl.

SCHWARTZE.

Neben der *Tinct. aromat.* verschwindet das Arom. des Pomeranzenschalensyrups, und der wohlfeilere *Syr. simpl.* würde ziemlich eben so viel thun, oder richtiger eben so wenig, denn neben der Quassia fruchtet keine Süsrigkeit.

884.

R. *Rad. Rhei Dr. 1*

Sem. Foeniculi Scr. 1

Magnes. sulphur. dep. Unc. $\frac{1}{4}$

Mannae elect. Unc. 1

Aq. comm. ferv. Unc. 6.

Repone ad refrigerat. Colat. D. S. Aq. 2mal zu nehmen.

BECKER.

885.

R. *Rad. Rhei gr. pulv.*

Flaved. Cort. Aurant. Carassae. gr. pulv. ana Unc. $\frac{1}{4}$

Vini Gallici albi L. 2.

Macerata, saep. agit., per nyctihemorum; in Colat. solve

Elaeosacch. Macid. Unc. 1

et adde

Spir. sulph. aeth. Dr. 1.

M. D. S. 3mal tägl. $\frac{1}{2}$ Weinglas.

Radix Rubiae. Färberröthe. Krappwurzel. [Hauptbestandtheile: zwei (in Wasser, namentlich Kaltem, sehr schwer, leichter in Alcohol, Äther oder wässerigen Alkalilösungen auflösliche) rothe Farbstoffe und Zucker. — 1 Unze conc. $1\frac{2}{3}$, sub. pulv. $2\frac{1}{8}$ Sgr.] Innerl. zu Scr. 1 — Dr. 1 einige-mal tägl., in Pulver [Ry 886] u. pulveraufnehmenden Formen; in Abkochung [Dr. 6 — Unc. $1\frac{1}{2}$ mit L. 1 auf L. $\frac{1}{2}$, 2stündl. 1 Essl. Für ein 2jähriges Kind etwa Dr. $1\frac{1}{2}$ — 3 mit Unc. 6 auf Unc. 3; 2stündl. 2 Theelöffel. — Ry 887].

886.

Ry Cass. cinnam. Gr. 3

Rad. Rubiae

Sacch. albi ana Scr. 1.

M. f. Pulv. Disp. tales nr. 6. D. S. 3 — 4mal tägl. $\frac{1}{2}$ Pulver. (Für ein 2jähriges rhachitisches Kind.)

coq. c. Ag. comm. Unc. 6, sub finem coct. addendo

Flaved. Cort. Aurant.

Sem. Foeniculi ana Dr. 1

ad Colat. Unc. 3, cui adde

Syr. simpl. Unc. 1.

M. D. S. 2stündl. 2 Theelöffel. (Für ein zweijähriges rhachitisches Kind.)

887.

Ry Rad. Rubiae Dr. 2

Radix Salep. Salepwurzel. [Hauptbestandtheile: Bassorin (oder ein sehr ähnlicher Schleim) und wenig Stärkmehl. — 1 Unze sub. pulv. $4\frac{1}{3}$ Sgr.] Cave: s. I. S. 37.

Innerl. scrupelweise; in Pulver [nicht gern, wenigstens nicht allein, vgl. I. S. 210 sub 2). — Ry 888. Officinell: Pasta Cação c. Lich. Isld.]; als schleimiges Vehikel anderer Arzneien [officinell Mucilago Salep; Dr. 1 auf Unc. 12; doch kann man, wenn man den Schleim im Hause des Kranken bereiten und sogleich noch lauwarm gebrauchen lässt, ihn auch noch stärker machen, etwa 1 Theelöffel Saleppulver mit 1 Esslöffel kalten Wassers zu einem Brei anrühren und diesen unter stetem Umrühren mit 1 Tasse kochenden Wassers, Fleischbrühe od. Milch vermischen]; zum Getränk [ebenfalls erst mit kaltem, dann mit kochendem Wasser behandelt; Dr. 1 — 2 — 3 auf 1 Quart, mit Zucker, Zimmt, etwas Wein u. dgl. — im Hause zu bereiten]; bisweilen als Zusatz zu Mixturen [Ry 829 (Rad. Arnic.), 838 (Rad. Colombo), 1064 (Tinct. Op. croc.)]; in Gallerte [officinell: Gelatina Salep, S. 218. Angenehmer Ry 889. Oder Gelat. Radic. Salep Frit. HANN.: Dr. 1, fein gepulvert, mit 4 Unz. Wasser ebullirt, dazu Syr. Cort. Aurant. Dr. 6; diese Portion etwa in $1\frac{1}{2}$ Tagen zu verbrauchen (1 Unze $1\frac{1}{4}$, 6 Unz. 6 Mgr.). — Ry 634 (Lich. Isld.), 915 (Rad. Seneg.)].

Ausserl. zu Klystieren [Dr. $\frac{1}{2}$ — 1 (höchstens), erst mit etwas kaltem, dann mit kochendem Wasser — zusammen des Heilzwecks halber nicht mehr als 4 — 6 Unzen — angerührt u. lauwarm eingegeben]. — Oder Scr. 1 Salep-

pulver mit 1 Eigelb u. 1 Tasse starker ungesalzener Fleischbrühe: SUNDELIN. — Diese Klystiere sind, wie die Amylumklystiere, unmittelbar vor der Application, also im Halse des Kranken zu bereiten].

888.

Ry *Flaved. Cort. Aurant.*
Rad. Glycyrrh. glabr. anq Dr. 2
Rad. Salep Unc. ½
Sem. Foeniculi Unc. 1.
M. f. Pulv. D. S. Theelöffelweise. (Ammenpulver, bei zu sparsamer Milchabsonderung. — Bei Säure, Durchfall des Säuglings noch etwas *Conchas ppt. dusa.*)
 NEUMANN.

889.

Ry *Pulv. Rad. Salep Dr. 1*
affunde sensim, sub contin. triturat.
Aq. comm. frigid. L. 1.
Tunc coq. sub contin. agit. ad reman.
Unc. 7, quibus adde
Rhacrosacch. Cinnam. (Gtt. 3) Unc. ½.
Repone demum in loco frigido, ut in
Gelat. abeat. D. in pyxide alba. S.
 Ekelöffelweise.

Radix Saponariae. Seifenkrautwurzel. Waschkrautwurzel. [Hauptbestandtheile: ein scharfer Stoff (Saponin, Seifenstoff; chemisch indifferent, in Wasser sehr leicht löslich und damit beim Schütteln stark schäumend; wird durch Gerbstoff und Bleisessig daraus gefällt; auch in Weingeist löslich), eine stärkeartige Substanz und Gummi. — 1 Unze conc. 1 ½ Sgr.] Innerl. in Abkochung [tägl. etwa Unc. 1 mit L. 1 ½–2 auf L. 1. — Ry 474 (*Hb. Fumar.*)]. — Äusserl. ebenfalls abgekocht zu Visceralklystieren [etwa Unc. ½; vgl. *Rad. Valer. min.* — Ry 457 (*Hb. Centaur. min.*), 923 (*Rad. Tarax.*)].

Radix Sarsaparillae s. Sassaparillae. Sarsaparillenwurzel. [Hauptbestandtheile: Schamharz (Parillharz, Periginaensäure, Smilacin), äther. Öl (mit etwas Harz), Chlormetalle und essigsaure Salze; nächst dem Stärkmehl, Gallertsäure etc. Ein Zusatz von Alkalien, Kalkwasser, befördert (durch Verseifung) die Aufnahme der harzigen Theile vom Wasser. Die Ausscheidung des Stärkmehls durch Kalkwasser (oder Weingeist) darf man nicht fürchten, da das Stärkmehl zur Wirksamkeit wohl wenig oder nichts beiträgt. — 1 Unze conc. 4 ½, subit. pulv. 5 ½ Sgr. — Ihrer Theure wegen für Unbemittelte oft durch *Rad. Caricis arenar.*, *Lign. Guaj.*, *Rad. Saponar.*, *Bardan.*, *Lapathi ac.*, *Spec. ad Decoct. Lignor.* od. dgl. zu ersetzen.] **Cave:** Mineralsäuren [Salpetersäure vielleicht ausgenommen], besonders Salzsäure; Salzbilder; Chlorcalcium, chlorichtsäure Salze, Alaun, Metallsalze; Gerbstoff.

Innerl. selten in Pulver od. pulveraufnehmenden Formen, etwa zu Dr. 1–4 auf den Tag [Lat. werge: Ry 434 (*Fol. Senn.*). Ähnlich ist *Elect. mundificans* (*Elect. Sarsapar. comp.*) der PH. BLESV., enthält aber nur ½ so viel Senna (wodurch es gewisse für die meisten Fälle weniger wirksam wird), statt des Sassafras-Holzes die (kräftigere) Rinde, und nur ¾ so viel *Mel despum.* (wodurch es zu steif wird); 1 Unze 4 Sbl.]; in der Regel im flüssigen Auszug, zu Unc. ½–2 auf den Tag, in Tisanenform, und zwar nach neueren Untersuchungen am zweckmässigsten im Aufguss [schon ein kalter wässriger Aufguss soll gut extrahiren; einige neuere englische Ärzte haben besonders einen kalten Aufguss mit Kalkwasser (z. B. Unc. 4 mit Süßholz Unc. ½,

Kalkwasser L. 2, 24 St. macerirt, in 2 Tagen zu verbrauchen: O'BEIRNE, wochenlang fortgesetzt, gegen die üblen Folgen von unzweckmässigem Quecksilbergebrauch, auch als wichtiges Beihülfsmittel bei Nervenkrankheiten, scrofulösen Drüsenanschwellungen, chronischem Katarrh der Harnblase); auch ein geistig-wässeriger (weiniger) Aufguss ist kräftig; am besten extrahirt aber wohl eine etwas lange (12-24 St.) fortgesetzte Digestion, etwa mit 2 verschiedenen Portionen Wasser, oder erst mit Wasser, dann mit schwachem Weingeist (Wein), und die beiden Colaturen vermischt, oder mit einem Alkali (Ry 890)], obwohl man bisher gewöhnlich die Abkochung [sogar meistens stark eingekocht; auch oft Macerations- oder Digestions-Decoct. Ry 891-898. Officinell: Decoct. Zittmanni] angewandt hat.

Ausserl. [selten] zu Gurgelwässern [Ry 504 (†Hydrarg. hydrocyan.)], Kataplasmen [die (sehr entbehrlichen) PRADIERschen s. in G. A. RICHTER *Arzneimittell.* II. S. 82], Dampfbädern [auch wohl sehr entbehrlich].

890.

Ry Rad. Sarsaparill. Unc. 2
Liq. Ammon. caust. Dr. $\frac{1}{2}$ - Scr. 2
Aq. comm. q. s.

digere per 12 horas in vase resina elastica clauso. Colaturam Unc. 9 serva.
Radices residuam infunde

Vini Gallici albi q. s.
et digere per 12 horas. Colaturam Unc. 9 cum priore Colat. misce. D. — Nach Belieben versüsst in 2 Tagen, zu halben Tassen, umgeschüttelt, zu verbrauchen.

891.

Ry Rad. Sarsaparill. Unc. 3
coque c. Aq. comm. L. 6, sub fin. coct. addendo

Ligni Sassafr. Dr. $1\frac{1}{2}$
Rad. Glycyrrh. Dr. 3
ad Colat. L. 2. D. S. 2stündl., umgeschüttelt, 1 Tasse. VOGEL.

892.

Ry Rad. Sarsaparill. Unc. 3
Ichthyocollae Scr. 14
Stibii sulphurati nigri laevigati, in sacculum ligati Unc. 4
coque c. Aq. comm. L. 8 leni igne ad consumptionem dimidiae partis, tum digere per noctem, deinde cola et filtra. D. S. In 2 Tagen, umgeschüttelt, zu verbrauchen. (Tägl. 3 Portionen, früh

nüchtern, Nachmittags u. Abends. Dabei mässige Bewegung, bei gutem Wetter im Freien; mässige Kost u. s. w. So 24-40 Tage. — Gegen Syphilis.)

FELS.

Die Formel wird verschieden angegeben.

893.

Ry Rad. Sarsaparill. Unc. 1
Ligni Guajaci Dr. 6
Cort. Nuc. Jugland. virid. Dr. 2
Stibii sulphurati nigri laevig. Scr. 2
coq. c. Aq. comm. L. 3 ad Colat. L. 2.
Colaturam filtra; adde

Aq. Cinnam. simpl.
Syr. Cort. Aurant. ana Unc. 1.
M. D. S. In einem Tage, umgeschüttelt, zu verbrauchen. (Das POLLINSche Decoct, von RICHTER verbessert.)

894.

Ry Rad. Sarsaparill. Unc. 9

† — Chinac
Ligni Guajaci
— Sassafras ana Unc. 6
Cort. Chinae regii Unc. 3.

Bene concisa macera c. Aq. comm. Unc. 140 [= L. $11\frac{1}{2}$] per 48 horas; tunc c. eadem aqua coque ad remanentiam tertiae partis. Decoctum adhuc fervidum cola c. forti expressione. Species residuas denuo et tertio c. eadem

Aquae quantitate ad eandem Colatur. coque. Colaturia tribus mixtis in lebetes adde

Syr. simpl. L. 2½.

Miscella evaporet ad consist. Syrupi (ad consumptionem tertiae partis), colatur et dehinc paulisper ebulliat; tum fundatur in vas murrhinum, cui jam insunt

† Flor. Borraginis Unc. 1½

Sem. Anisi vulg. Scr. 8

in sacculum ligata. Vas obtectum reponatur, donec miscella omnino frigidata sit. Tum sacculum exprime, liquorem spatula lignea agita et in lagenulis bene impletis et obturatis D. — Roob antisymphilitique von

LAFECTEUR.

Die Vorschrift wird verschiednen angegeben. Die hier mitgetheilte scheint die zuverlässigste. Es gehört dazu folgende Curmethode:

I. Vorbereitungscur (die jedoch nöthigenfalls wegleiben darf). 1ter Tag. Der Kranke trinkt einige Maass Gerstenwasser mit etwa Bitterem, z. B. *Extr. Tarax. liq.* — 2ter Tag. Degleichen. — 3ter Tag. Leichtes Abführmittel (*Calomel* mit *Jalape*; oder Bittersalz). — 4ter Tag. Wieder Gerstenwasser; bei Plethorischen ein Aderlass, bei Gastricismus ein Brechmittel, u. s. w. — Während der ganzen Vorbereitungscur schmale vegetabilische Diät; keine Milchspeisen oder Spirituosa od. Kaffee.

II. Eigentliche Cur. 5ter Tag. Früh um 6 Uhr einem Manne 6, einem Weibe 4-5 Esl. von dem Roob (umgeschüttelt); Patient bleibt im Bett (überhaupt ist Unterstützung der Hautausdünstung während der ganzen Cur besonders wichtig: nur bei warmer, trockener u. in jeder Hinsicht milder Witterung darf Patient am Tage in's Freie gehn.) Um 8 Uhr und dann ferner alle halbe Stunde, von einer sehr schwachen Sarsaparillabkochung (Unc. 2 auf 4 Quart Colatur) 9 Unzen (3 kleine Tassen), bis etwa 7 solche Portionen getrunken. Um 12 Uhr etwas Hamamelcarbonade (oder

gebraten Huhn oder Rindfleisch) mit 5-6 Loth Weissbrod. Während der Mahlzeit darf nichts als die schwache Sarsaparillabkochung getrunken werden. Gegen 4 Uhr wieder 6 Esl. (einem Weibe 4-5) von dem Roob. Von 6 Uhr an bis 8½ Uhr wieder alle halbe Stunde 9 Unzen Sarsaparillabkochung. Um 9 Uhr Mahlzeit wie zu Mittag. — 6ter bis 14ter Tag. Wie am fünften. — 15ter Tag. Bloss strenge Diät; Sarsaparillabkochung. — 16ter Tag. Degleichen. — 17ter Tag. Ein Abführmittel. — 18ter Tag. Wieder Gerstenwasser. — 19ter bis 24ter Tag. Wie am 5ten. — Damit ist meist der Kränke geheilt; doch soll der Gebrauch der schwachen Sarsaparillabkochung noch ein 14 Tage fortgesetzt u. die strenge Diät nur allmählig geändert werden.

Bei zu starken Schweissen während der Cur gebe man weniger Sarsaparillabkochung, bei zu starken Durchfällen etwas weniger Roob (oder breche nöthigenfalls ganz ab); bei Obstruction ½ St. vor dem Abendessen ein Klystier; bei gereiztem, fieberhaftem Zustand statt der Fleischspeisen mehliges (ohne Butter).

Diese Cur ist weniger angreifend als die ZITTMANNsche (s. *Decoct. Zittmanni*), und thut doch auch bei inveterirter, depravirter, hartnäckiger Lustseuche meist recht gute Dienste. Ausser andern deutschen Ärzten wendet auch SCHÖNLEIN sie sehr häufig an.

895.

Ry *Rad. Sarsaparill. Unc. 3*

Ligni Guajaci Dr. 6.

Decoque ter cum Aq. comm. q. s., et in tertia coctione sub finem adde

Fol. Sennae

† Hb. Borraginis

Flor. Rosar. rubrar. ana Dr. 1½.

Colaturas commixtas evapora ad remanent. Unc. 3¾, tum adde

Mellis albi

Sacch. albi ana Unc. $2\frac{1}{4}$.

Inspissa ad consistentiam Roob, ita ut Pondus sit circiter Unc. $6\frac{9}{16}$ (Unc. 6 Dr. $4\frac{1}{2}$). *D. S.* 5mal tägl., umgeschüttelt, 1 Essl.

Rob (Roob) antisymphiliticum (Syrrup. Sarsapar. compositus) Ph. SLESV. (1 Unze 6 Shl.)

Die Hauptbenennung dieser Formel ist nicht gut gewählt, da der Arzt nicht leicht eine solche in das Recept aufnehmen wird.

896.

a.

Ry *Ligni Guajaci* Unc. 1

Rad. Sarsaparill. Unc. 2

infunde Aq. comm. fervidae Unc. $6\frac{1}{4}$; *macera per nycthemer.*; *tunc ex eadem aqua coque leni igne, sub fin. coct. addendo*

Ligni Sassafr. Dr. 2

Rad. Glycyrrhiz. glabr. Dr. 3, *ad Colat.* Unc. 32. *D. S.* In 2 oder 1 Tasse, Morgens u. Abends, umgeschüttelt, zu verbrauchen.

b.

Ry *Residuum Decocti prioris*

coque c. Aq. comm. L. $\frac{1}{4}$ per $\frac{3}{4}$ hor. Co-

lat. D. S. Des Nachmittags, umgeschüttelt, zu verbrauchen. (Gegen sehr eingewurzelte syphilitische Übel, Nasen- und Rachen-Geschwüre, Knochenleiden etc.)

CULLERIER.

897.

Ry *Rad. Sarsaparill.* Unc. 4

coque c. Aq. comm. L. 12, sub fin. coct. addendo

Rad. Glycyrrhiz. glabr. Unc. $\frac{1}{2}$ *ad remanent.* L. 8. *Decoctum refrigeratum cola. D. in lagenulis* 16. — Diese Quantität an jedem Morgen — vierstündl., umgeschüttelt, 1 Glas, lauwarm — nüchtern zu verbrauchen. (Zur Heilung veralteter Syphilis ohne Mercur.) ST. MARIE.

898.

Ry *Cort. Mezerei* Dr. 2

Rad. Sarsaparill. Unc. 3

coque c. Aq. comm. L. 4, sub fin. coct. addendo

Sem. Coriandri

Rad. Glycyrrh. glabr. ana Unc. 1 *ad Colat.* Unc. 32. *D. — 4mal tägl. 4, allmählig bis 8, Unzen.* (Gegen veraltete syphilit. Leiden.) LAGNEAU.

Radix (Bulbus) Scillae s. Squillae. Meerzwiebel.

[Hauptbestandtheile: Scillitin (Brechen u. Purgiren erregender, in Wasser u. Weingeist leichtlöslicher Bitterstoff), Zucker, Schleim und ? scharfes äther. Öl. — 1 Unze conc. $1\frac{2}{3}$; *subl. pulv.* $2\frac{1}{3}$ Sgr.] *Cave* concentr. Säuren, besonders Salpetersäure u. Salzsäure; Salzbilder; Alaun; empfindliche Metallsalze; Gerbstoff.

Innerl. (*Pulvis ad Grana tria!*) zu Gr. 1, allmählig steigend bis zu Gr. 6; 3-6mal tägl. (Gern mit Gewürzen.) In Pulver [Ry 899-901; 864 (*Rad. Ipecac.*)], Pillen [Ry 902-906; 394 (*Extr. Scill.*), 445 (*Galban. dep.*), 449 (*Gutti*), 703 (*Myrrha*), 1012 (*Sulph. stib. aur.*). — Mit \dagger *Milleped.*, *Ammoniac. dep.* ana Dr. $\frac{1}{2}$, *Sapon. medic.* Dr. 1, *Bals. Copaiv. q. s.* (dieses Constituens kann man sich hier zur Noth gefallen lassen, weil es Harz u. Seife genug in der Masse findet, um sich damit zu verbinden, und weil es auch neben der sehr differenten Scilla nicht zu different ist; passender jedoch in beiden Beziehungen wäre Weingeist) zu zweigranigen (besser 90) Pillen: *Pil. scilliticae* Ph. R.; davon 2-4 p. *dosi* (bei asthmatischen, hydropischen, Nieren- u. Blasen-Krankheiten); 1 Drachme 1 Sgr.], Bissen [Ry 907; 82 (*Ammoniac. dep.*)],

Aufguss [heissem wässerigen oder kaltem spirituösen od. weinigen; etwa Dr. $\frac{1}{2}$ auf Unc. 6, esslöffelweise. — Ry 908-910. — *Vinum scilliticum* PH. SLESV. Anbg.: 1 mit 6 weissen Franzweins 10 Tage macerirt; etwa zu 25 (und steigend mehr) Tropfen p. dosi (1 Unze 4 Shl.). — *Elixir pectorale* PH. P., eine Tinctur aus Scilla, Alant- u. Flor. Veilchen-Wurzel, Benzö, Myrrhe, Anis, Süßholzsaft (? löst sich in Weingeist wenig auf), *Ammoniac. dep.* und Safran, ist, weil die Bereitung nicht genügend vorgeschrieben, nicht zu empfehlen.], nicht passend in Abkochung.

Ausserl. als Rubefaciens [frisch zerquetscht, oder gepulvert und mit Essig, oder gepulvert als Zusatz zu Sisapismen] entbehrlich; sonst in Salben [z. B. 1 gepulvert mit *Ungt. Hydrarg. ciner.* 2, zu Einreibungen auf die innere Seite der Schenkel u. den Unterleib bei Wassersucht, wenn der Kranke die Scilla innerl. nicht nehmen kann (italienische Spitalformel). Vgl. Ry 546 (*Hydr. mur. mis.*). — Oder mit *Liq. Kali caust. q. s.* zu einem Schleim gekocht, dieser colirt u. mit Schweineschmalz *q. s.* zur Salbe gemacht: *Ungt. Scillae* PH. P. (1 Unze 3 Sgr.), als zertheilendes Mittel bei Drüsen- und Wassergeschwülsten u. Verhärtungen. Doch dürfte in dieser Salbe das Kali eine grössere Rolle spielen als die Scilla.], Linimenten [z. B. Dr. 1 mit 2 Unzen Kalb-Magensaft — in Ermangelung desselben auch wohl Speichel — zum Liniment gemacht, früh u. Abends in die Nierengegend einzureiben: BRERA bei Wassersucht, wo die zweckmässigen innerlichen Mittel nicht vertragen werden]; endermatisch [zu Gr. 2-4, vorsichtig steigend bis zu Gr. 10 od. 20; bei Empfindlichen in Salbenform].

899.

Ry *Rad. Scillae*

Hb. Digital. ana Gr. 1

Cassiae cinnam. Gr. 2

Rad. Glycyrrhiz. Scr. 1

Ol. Junip. Baccar. Gtt. 2.

M. f. Pulv. Disp. tales nr. — *D. in charta cerata* S. 2-3 mal tägl. 1 Pulver. (Ist die Formel des *Pulv. diureticus* PH. P. mit Hinweglassung des zerfliessenden *Tart. boracat.*)

900.

Ry *Rad. Scillae* Gr. 6

— *Calami mundat.*

Natri carbon. dep. sicci ana Dr. $\frac{1}{2}$

Elaeos. Junip. (Gtt. 9) Dr. 2.

M. f. Pulv. Div. in 6 part. aeq. D. in charta cer. S. 3 mal tägl. 1 Pulver.

Pulv. Scillae c. Natro carb. (*Pulv. diureticus*) PH. MIL.

901.

Ry *Rad. Scillae* Gr. 2

Hb. Digitalis Gr. 1

Tart. depurati Dr. $\frac{1}{2}$.

M. f. Pulv. Disp. tales nr. 6. D. S. 3 mal tägl. 1 Pulver. (Bei Wassersucht.)

OSIANDER.

902.

Ry *Ammoniaci depur.* Scr. 2

Rad. Scillae pulv. Scr. 1

— *Zingib.* —

Sapon. medic. pulv. ana Dr. 1

Mucil. Gm. Mimos. q. s.

ut f. Pilulas Gr. 2 [es werden etwa 120 werden]. *Consp. Sem. Lycop.* D. S. 4 mal tägl. 6 (u. mehr).

Pilulas scilliticas PH. SLESV.; *Messa Pilular. scillit.* PH. HANN. (1 Drachme resp. 3 Shl. u. 1 $\frac{1}{2}$ Mgr.) Besser *Extr. Graminis liq. q. s. ut f. Pilulas* 120.

903.

Ry *Sulph. stib. aurant.*

Rad. Scillae pulv.

Hb. *Digitalis pulv.*Rad. *Pimpinell.* —*Terebinth. loric. ana* Scr. 1Extr. *Pimpinell. q. s.*

ut f. *Pilulae* 60. *Consp. Sem. Lycopod.*
D. in vitro. S. Alle 3 St. 1 Pille. (Bei
 Wassersucht.) (HEIM.)

904.

Ry *Sulph. stib. aurant.*Rad. *Scillae pulv.*Gutti *pulv. ana* Scr. 1Extr. *Pimpin. q. s.*

ut f. *Pilulae* 60. *Consp. Sem. Lycopod.*
D. S. Alle 3 St. 1 Pille. (Bei Wasser-
 sucht mit Hartleibigkeit.) (HEIM.)

Die „*Pilul. hydragogae Heimii*“ der
 PH. F. enthalten noch *Hb. Digital.*, und
 alle 5 Ingredientien *ana* (dies giebt aber
 keine Masse, es ist mehr Extract erforder-
 lich); daraus Zwei-Gran-Pillen.

905.

Ry *Opti pulv.* Gr. 5Rad. *Ipecac. pulv.* Scr. $\frac{1}{2}$ — *Scillae* — Scr. 1— *Pimpinell.* — Dr. $\frac{1}{2}$ Extr. *Pimpinell. q. s.*

ut f. *Pilulae* 60. *Consp. Sem. Lycopod.*
D. S. Alle 3 St. 1 Pille. (Bei Wasser-
 sucht mit Durchfall.) (HEIM.)

906.

Ry *Sagapeni depur.* Dr. 2Rad. *Scillae pulv.*— *Ipecac.* —Hb. *Digital.* — *ana* Scr. $\frac{1}{2}$ Extr. *Gratiol.* Dr. 1Spir. *V. rft. q. s.*

ut f. *Pilulae* 120. *Consp. Pulv. Rad.*
Irid. Flor. D. in vitro. S. 3mal tägl.

4-6. (Bei Brustwassersucht.)

(HEIM.)

907.

Ry *Rad. Scillae pulv.* Gr. 6*Sem. Petrosel.* — Dr. 1Extr. *Levistici q. s.*

ut f. *Boli nr. 6. Consp. Pulv. Cass.*
cinnam. D. S. 3-4mal tägl. 1 Stück.

908.

Ry *Rad. Scillae* Dr. $\frac{1}{2}$ — *Senegae* Dr. 2*Aq. comm. feroid. q. s.**reponere ad refrigerat.; Colat. Unc. 5 adde**Tinct. Colocynth. Scr. 1**Syr. Cort. Aurant. Unc. 1.*

M. D. S. 2stündl. 1 Essl. (Bei torpiden
 Wassersuchten.) SUNDELIN.

909.

Ry *Rad. Scillae grosse pulv.* Scr. 1-2— *Galang.* — — Dr. 5*Strobilor. Lupuli inc.* Dr. 10*Spirit. Frumenti q. s.*

Macera per diem, saepe agit. In Colat.
Unc. 8 solve

Elaeosacch. Junip. Unc. $\frac{1}{2}$ *et adde**Spir. nitrico-aeth. Dr. 3.*

M. D. S. 4mal tägl., umgeschüttelt,
1 Essl. (Bei *Hydrops ex abusu spiritu-*
osorum.) VOGT.

910.

Ry *Rad. Scillae gr. pulv.* Dr. 1*Cass. cinnam.* — — Dr. 2*Kali carbon. e Cin. clav. Dr. $\frac{1}{2}$* *Fini Gallici albi Unc. 8.*

Digere per 12 horas. Colat. D. S.
2stündl. 1 Essl. (Bei Wassersucht.)

G. A. RICHTER.

Radix Senegae s. Polygalae Virginianae. Senega-

WURZEL. [Hauptbestandtheil: ein scharfer Stoff (Senegin; chemisch-indiffer-
 rent; für sich in Wasser unlöslich, aber in Verbindung mit den übrigen extractiven
 Theilen der Wurzel darin löslich; in Weingeist löslich). — 1 Unze conc. 2 $\frac{5}{8}$,
 subst. pulv. 3 $\frac{1}{2}$ Sgr. In der Armenpraxis kann man sie bisweilen, nach HUFFE-

LAND's Vorschlag, durch ein Decoct von *Rad. Arnic.* u. *Saponar.* mit *Oxymel scillit.*, andermal durch *Rad. Helen.*, *Hb. Polygal. amar.* p.p. ersetzen.]

Innerl. zu Scr. $\frac{1}{2}$ -1, einigemal tägl. [Einige ziehen, namentlich für die Darreichung in Pulver u. pulveraufnehmenden Formen, die blosse Rinde als wirksamer vor; doch ist diese selten in den Officinen zu finden, und wenn der Apotheker von seinen trockenen Wurzeln die Rinde mit Mühe abnehmen soll, muss man sich einen höheren Preis gefallen lassen; man erreicht aber auch wohl mit einer etwas grösseren Quantität der Wurzel dasselbe. — Geschmacks corrigentien: *Glycyrrhiza*, *Puls. gummos.*] In Pulver [ungern, des sehr widerlichen Geschmacks wegen, mehr noch aus dem I. S. 210 *sub c.* angegebenen Grunde; doch bisweilen in der Armenpraxis p.p. — Ry 911; 337 (*Extr. Acon.*)], Bissen od. Pillen [Ry 912-914; 1012 (*Sulph. stib. aur.*)], Latwerge [ebenfalls ungern. — Ry 953 (*Sapo med.*)]; Aufguss [Ry 915; 846 (*Rad. Helen.*), 908 (*Rad. Scill.*)]. — Auch wohl (das Senegin besonders gut ausziehend) mit spanischem Wein, Infuso-Decoct od. Decocto-Ebullition [I. S. 162 *sub b*], Abkochung [Dr. 2-6 mit Unc. 9 auf Unc. 6, 2stündl. 1 Essl. — Ry 916, 917].

911.

a.

Ry *Rad. Senegae* Unc. $\frac{1}{4}$

Kali tartarici Dr. 6

Magnes. carbon. Dr. 2.

M. f. Pulv. D. in vitro. S. Früh u. Abends 1 Theelöffel. (Dabei schmale Diät. — Gegen *Pannus oculi.*) SCHMALZ.

Für den Geschmack eine böse Composition; eben so auch mehrere ähnliche Vorschriften von v. AMMON. Ein Zusatz von Zucker (Ölzucker) oder auch *Puls. gummos.* kann, wenn er nicht sehr reichlich ist (wodurch die Einzelgabe sehr voluminös werden würde) wenig helfen; also in der Regel lieber Bissen. — Schon leidlicher, weil das *Kali tartaric.* wegfällt, ist FR. JÄGER's Vorschrift:

b.

Ry *Rad. Senegae* Unc. $\frac{1}{4}$

Tartari depur.

Elaeosacch. Citri ana Dr. 3.

M. f. Pulv. D. in vitro. S. Früh u. Abends 1 Theelöffel. (Gegen Pannus von chronisch-katarrhal. Augenentzündung.)

Ob sie aber auch so wirksam ist? Wir glauben wenigstens mit JÜNGKEN, dass in der SCHMALZischen Formel die beiden Salze mehr wirken als die Senega.

912.

Ry *Kali tartarici* Dr. 2-4

Rad. Seneg. pulv. Unc. $\frac{1}{4}$

Extr. Tarax. liq. q. s.

ut f. Boli nr. 32. Consp. Pulv. Magnes. carbon. D. in vitro bene clauso. S. 3-4mal tägl. 2 Stück.

913.

Ry *Sapon. medic. pulv.* Dr. 1-2

Rad. Seneg. pulv. Unc. $\frac{1}{4}$

Extr. Tarax. liq. q. s.

ut f. Boli nr. 16. Consp. Pulv. Cass. cinnam. D. S. 3-4mal tägl. 1 Stück.

Diese und die vorige Formel können als Ersatz der von v. AMMON gegen verschiedene Augenkrankheiten gerühmten Vorschriften gelten.

914.

Ry *Ammoniaci depur.*

Myrrhae pulv. ana Dr. 1

Rad. Seneg. pulv. Dr. 3

Extr. Glycyrrhiz. q. s.

ut f. Boli nr. 16. Consp. Pulv. Rad. Irid. Flor. D. S. 4mal tägl. 1 Stück.

915.

Ry *Rad. Senegae* Dr. 2

Aq. comm. fervid. q. s.

digere per $\frac{1}{3}$ hor.; Colat. Unc. 3 adhuc fervidae adde

Rad. Salep pulv. Scr. 2, antea c.

Aq. comm. frigid. pauz. contritos.

Ebulliant semel; tum admisce

Syr. Flor. Aurant. Unc. 1.

Repos in loco frigido, ut f. Gelatina.

D. in pyxide alba. S. Theelöffelweise (als Expectorans).

916.

Ry Rad. Senegae Unc. $\frac{1}{4}$

coq. c. Aq. comm. Unc. 9 ad Colat. Unc. 6, quas refrigerata cum

Radix Serpentariae Virginianae. Virginische

Schlangenwurzel. [Hauptbestandtheile: äther. Öl und Bitterstoff. — 1 Unze conc. $3\frac{3}{4}$, *subt. pulv.* $\frac{1}{4}$ Sgr. Surrogate s. I. S. 30.] Innerl. in Pulver od. pulveraufnehmenden Formen [selten, nur etwa in Wechselstößen und chronischen Krankheiten. — Latwerge: Ry 1044 (*Terebinth.*)] zu Scr. $\frac{1}{4}$ –1, alle 3–2 St.; häufiger in Aufguss oder [namentlich, wo keine Zeit zu verlieren ist] in Ebullition, zu Unc. $\frac{1}{4}$ –1 auf Unc. 6, alle 2–1 St. 1 Essl. [Ry 918–920; 802 (*Phosph.*)].

918.

Ry Rad. Serpentar. Virgin. Dr. 6

Aq. comm. fervid. Unc. 8.

Ebulliant paulisper vase clauso. Colat. refriger. adde

Spir. sulph. aether. Dr. 2.

M. D. S. Stündl. 1 starken Essl.

RICHTER.

919.

Ry Rad. Serpent. Virg. gr. pulv. Dr. 6

Vanillae gr. pulv. Dr. 2

Vini Hispan. q. s.

macera, saep. agit.; per $\frac{1}{4}$ horas; Colat. L. 1 adde

Camphorae Dr. $\frac{1}{2}$ in Spir. V. rft. q. s. solutam

Aetheris acetici Dr. 1

Syr. Cinnamomi Unc. $\frac{1}{2}$.

M. D. S. Umgeschüttelt alle $1\frac{1}{2}$ St. 2 Essl. (Ein sehr kräftig belebendes Mittel bei Febr. nervosa stupida alter, an Reizmittel gewöhnter Individuen. Wenn es schneller bereitet werden muss, kann

Camphorae trit. Scr. 1

Gm. Mimos. pulv. Dr. 2

fiat l. a. Emuls., cui adde

Liq. Ammon. succin. Dr. 2.

M. D. S. 2stündl., umgeschüttelt, 1 Essl.

917.

Ry Rad. Senegae Dr. 2

coq. c. Aq. comm. Unc. 9 ad Colat. Unc. 6, in qua solve

Ammon. muriat. depur. Dr. 2

Succi Glycyrrh. dep. Dr. 3.

D. S. 2stündl., umgeschüttelt, 1 Essl.

man digeriren lassen.) VOGT. Ist durch die Vanille und den Wein sehr theuer, die erstere aber wohl durch $\frac{1}{2}$ Dr. Bals. Peruv. zu ersetzen. Der Zimmtsyrup verschwindet neben den übrigen Ingredientien, ist aber auch entbehrlich. Meistens also wohl, da die vom Autor bezeichneten Individuen gerade unter den ärmeren Klassen häufiger vorkommen, zweckmässiger folgende Formel:

Ry Rad. Serpent. Virg. Dr. 6

Spir. Frumenti Unc. 5

Aq. comm. q. s.

digere per $\frac{3}{4}$ hor.; Colat. Unc. 6 fiat c.

Camphorae trit. Dr. $\frac{1}{4}$

Bals. Peruv. Dr. $\frac{1}{2}$ (–1)

Gm. Mimos. pulv. Dr. 2

l. a. Emulsio, cui adde

Aetheris acetici Dr. 1.

M. D. S. Alle $1\frac{1}{2}$ St., umgeschüttelt, 1 Essl.

920.

Ry Cort. Chiniae fusci gr. pulv. Unc. 1

coque c. Aq. comm. L. 2, sub fin. coct. addendo

Rad. Serpent. Virg. Unc. ½
ad Colat, Unc. 9, cui adde

Syr. Cort. Aurant. Unc. 1.
M. D. S. Stündl., umgeschüttelt, 2 Essl.
VOGEL.

† *Radix Symphyti s. Consolidae majoris.* Schwarz-, Wall- od. Beinwell-Wurzel. [Hauptbestandtheile: Schleim, Stärkmehl u. Gerbstoff. — 1 Unze conc. 1 Sgr.] Innerl. in Abkochung [tägl. Unc. ½-1, mit Unc. 8 auf Unc. 6]. — Äusserl. zu Schnupfpulvern; in Abkochung [auf Geschwüre]; der Presssaft [gegen Krätze].

Radix Taraxaci. Löwenzahn-, Butterblumen- od. Pfaffenröhrlein-Wurzel. [Hauptbestandtheile (u. Cave) wie bei *Herba Tarax.* — Im Sommer bitterer u. kräftiger als im Frühjahr u. Herbst. — 1 Unze conc. 1 Sgr.] Innerl. in Abkochung [tägl. Unc. 1-1½, mit L. 1½ oder 2 auf L. 1 od. Unc. 16; tassenweise. — Ry 921, 922; 474 (Hb. Fumar.)], oder der Presssaft [vgl. Hb. Tarax.]. — Äusserl. zu Visceralklystieren [die Abkochung von Unc. 1 oder mehr; vgl. *Rad. Valer. min.* — Ry 923; 457 (Hb. Centaur. min.), 935 (*Rad. Valer. min.*)].

921.

Ry *Rad. Taraxaci Unc. 2*
— *Graminis Unc. 1*
coque c. Aq. comm. L. 3 ad Colat. L. 2,
in qua solve
Kali tartarici
Succi Glycyrrh. dep. ana Unc. ½.
M. D. S. 4mal tägl., umgeschüttelt,
1 Tasse.

De novo cola. D. S. 2stündl., umgeschüttelt, 2 Essl. (Bei von Leberleiden abhängender Wassersucht nach Scharlach. — Zugleich tägl. 2-3 Klystiere von Graswurzel-Abkochung mit etwas Salz oder Honig, später mit Seife; zum Getränk eine Abkochung von Gras- u. Althee-Wurzel.)
(FENG.)

922.

Ry *Rad. Taraxaci Unc. 1*
coq. c. Aq. comm. Unc. 9 ad Colat. Unc. 6,
in qua solve
Kali nitrici dep. Dr. ½
— *tartarici Dr. 1*
Mannas Unc. 1.

923.
Ry *Hb. et Rad. Tarax. Unc. 1½*
Rad. Saponar. Unc. ½
coque c. Aq. comm. L. 1½, sub finem coct. addendo
Rad. Valer. min.
Flor. Chamom. vulg. ana Dr. 6
ad Colat. L. 1. D. S. Zu 2 Klystieren,
umgeschüttelt,
KÄMPF.

Radix Tormentillae. Törmentill-, Ruhr-, Blut-Wurzel. [Hauptbestandtheile: eisengründer Gerbstoff u. Stärkmehl. — 1 Unze conc. 1, sub. pulv. 1½ Sgr.] Innerl. zu Scr. ½-1, mehrmals tägl.; in Pulver u. pulveraufnehmenden Formen, häufiger in Abkochung [Dr. 4-6 (-8) mit Unc. 9 auf Unc. 6, 2stündl. 1 Essl.] oder noch besser [weil sich der Gerbstoff durch das Kochen verändert] Digestionsaufguss. — Äusserl. abgekocht [oft concentrirter als

zum innerlichen Gebrauch; etwa mit Zusatz von geistigen Dingen, Rothwein, Tincturen od. dgl.], zu Mund- u. Gurgelwässern, Klystieren [Ry 880 (*Rad. Ratanh.*)] u. a. Injectionen, Umschlägen u. s. w.

Radix Valerianae minoris s. silvestris. Baldrianwurzel. Katzenwurzel. [Hauptbestandtheile: äther. Öl, eine flüchtige Säure (Baldriansäure, theils an das Öl, theils an Kali gebunden), Bitterstoff (Baldrianstoff) und Weichharz. — 1 Unze conc. $1\frac{1}{2}$, gr. pulv. $1\frac{1}{2}$, subt. pulv. $1\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave* [mit sanction. Ausnahmen] Salzbilder; Basen; kohlen-saure Salze [häufige Ausnahmen], Chlorkalk, salzsaur. Kalk u. Baryt, Alaun, empfindliche Metallsalze.

Innerl. zu Scr. 4-Dr. 1 mehrmals tägl. In Pulver [in dieser Form u. in den sie aufnehmenden namentlich bei Unterleibskrankheiten gern (der Aufguss dagegen wirke mehr auf den Kopf: JÖRG). Gutes Corrigens: *Macis*. — Ry 924-926; 744 (*Ol. Cajep.*), 962 (*Sem. Cinae*), 1097 (*Zinc. oxyd.*); vgl. auch *Lapid. Cancr.*], Trochisken [Ry 1098 (*Zinc. oxyd.*)], Bissen u. Pillen [Ry 131, 134 (*Asa foet. dep.*), 164 (*Bismuth. nitr. praec.*), 446 (*Galban. dep.*), 964 (*Sem. Cin.*)], Latwerge [Ry 277, 278 (*Cort. Chin. fusc.*), 696 (*Mosch.*), 965, 966 (*Sem. Cin.*)], Schütteltrank [besonders grössere Dosen. — Z. B. Dr. 4-6 des Pulvers in ein Glas Wasser geschüttelt, dies gut zugedeckt, alle 3-2 St. umgeschüttelt einen Schluck genommen, so dass die Portion den Tag über verbraucht wird: KREYSIG bei für sich bestehender oder sich zu organischen Herzkrankheiten gesellender Krampfsucht]; im Aufguss [der (von baldriansaurem Kali)süss schmeckt. — So namentlich in acuten Krankheiten. Unc. $\frac{1}{2}$ -1 auf Unc. 6, alle 2-1 St. 1 Essl. — *Inf. Valer. PH. MIL.* wie ihr *Inf. Angelic.*, s. S. 382. — *Inf. Rad. Valer. PH. P.*: Unc. $\frac{1}{2}$, gr. pulv. (was überflüssig), mit siedendem Wasser $\frac{1}{2}$ St. digerirt; Colat. v. 8 Unz. — Ry 927-931; 340 (*Extr. Acon.*), 450 a. (*Fol. Senn.*). — Ebullition: Ry 1091 (*Visc. alb.*). — Auch oft als Species, z. B. mit *Rad. Caryophyllat.*, *Hb. Menth. pip.* u. *Fol. Aurant.* ana: *Spec. nervinae PH. P.* (1 Unze $1\frac{5}{8}$ Sgr.), früh u. Abends $\frac{1}{2}$ -1 Essl. zum Aufguss, kalt getrunken, so monatelang, zur Stärkung u. Regulirung des Nervensystems. Vgl. Ry 421 (*Fol. Aurant.*). — Auch oft in kaltem, wässerigen oder weinigen, Aufguss; z. B. Ry 932; oder 1 Unze auf L. 1 weissen Franzweins, 3-4mal tägl. $\frac{1}{2}$ Weinglas]. — Mit der Chinarinde kann man den Baldrian theils in Substanz, namentlich in Bissen u. Latwergen (Ry 277, 278), theils in (warmem oder kaltem) Aufguss oder Decocto-Infusum (I. S. 164) oder Decocto-Ebullition (Ry 283 u. I. S. 164), mit dem Quassienholz im Aufguss — namentlich gern im kalten — verbinden.

Ausserl. selten als Zusatz zu Niesepulvern; oft, infundirt od. ebullirt, zu Klystieren [Dr. 2-4. — Ry 933; 194 (*Camph.*), 429 (*Fol. Nicot.*). — Zu sogenannten KÄMPF'schen Visceral-klystieren in Verbindung mit verschiedenen bitteren oder bitter-aromatischen, auch schleimigen Vegetabilien, z. B. *Hb. Centaur. min.*, *Card. bened.*, *Tarax.*, *Mar-rub.*, *Millefol.*, *Flor. Chamomill. vulg.*, *Millefol.*, *Verbasci*, *Rad. Alth.*, *Tarax.*, *Sappan.*, auch wohl *Flor. Arnic.*, *Hb. Menth. crisp.* etc. etc.; auch wohl noch mit

Zusatz von etwas Seife, Öl, Salz, Asand, Weizenkleie, Eigelb od. dgl.; statt des Kochsalzes auch wohl andre mehr abführende Salze, z. B. *Tart. natronat.*, *Kali tartar.*, zu Dr. 2-4. Statt componirterer Vorschriften mügen (ausser den Formeln Ry 457, 923) die Beispiele: Ry 934, 935 dienen].

924.

Ry *Rad. Valer. min.* Unc. $\frac{1}{4}$
Magnes. carbon.
Ammon. muriat. depur. ana Gr. 24
Ol. Cajeputi Gtt. 32.

M. f. Pulv. D. in vitro. S. 3mal tägl. 1 Theelöffel. (Nachahmung des RAGOLOSCHEN Geheimmittels gegen Epilepsie, von BUNDELIN.)

925.

Ry *Rad. Valer. min.* Unc. $\frac{1}{4}$
Fol. Aurantii Dr. 1
Ol. Cajeputi Gtt. 24.
M. f. Pulv. Div. in 6 part. aeq. D. in charta cerata. S. 3mal tägl. 1 Pulv. (Desgleichen, von G. A. RICHTER. — Oder noch einfacher: 4mal tägl. Dr. 1 *Rad. Valerian. min.* mit 3 Tropfen *Cajeputöl*: A. G. RICHTER.)

926.

Ry *Ammon. carbon. pyro-oleosi*
Castorei ana Dr. $\frac{1}{4}$
Rad. Valer. min. Unc. $\frac{1}{4}$.
M. f. Pulv. Div. in 15 part. aeq. D. in charta cerata. S. 3mal tägl. 1 Pulver. (Bei allgemein krampfhaft erhöhter Nervenempfindlichkeit.)

RICHTER.

927.

Ry *Rad. Val. min.* Unc. $\frac{1}{4}$
Aq. comm. fervid. q. s.
digere per $\frac{1}{2}$ *hor.*; *Colat.* Unc. 8 *refriger. adde*

Spir. sulphurico-aeth. Scr. 1

Liq. Ammon. acet. Dr. 6

Syr. commun. Unc. $\frac{1}{4}$.

M. D. — Esslöffelweise.

Mixt. excitans mitis PH. P.

928.

Ry *Rad. Valer. min.* Unc. $\frac{1}{4}$

Rad. Angelicas

Flor. Arnicae ana Dr. 2

Aq. comm. fervid. q. s.

digere per $\frac{1}{2}$ *hor.*; *Colat.* Unc. 8 *refriger. adde*

Liq. Ammon. anis.

Spir. sulphurico-aeth. ana Dr. 1

Syr. commun. Unc. $\frac{1}{4}$.

M. D. — Esslöffelweise, umgeschüttelt.

Mixt. excitans fortis PH. P.

929.

Ry *Croci* Dr. $\frac{1}{2}$

Rad. Valer. min. Dr. 3

Aq. comm. fervid. q. s.

repono ad refrigerat.; *Colat.* Unc. 5 *adde*

Aether. acetici Dr. $\frac{1}{2}$

Syr. Florum Aurant. Unc. 1.

M. D. S. Stündl. 1 Essl. (Bei *Febria nervosa versatilis.*)

BUNDELIN.

930.

Ry *Rad. Valer. min.* Dr. 6

Flor. Chamomill. vulg. Dr. 2

Aq. comm. fervid. Unc. 8

repono ad refrigerat.; *Colat. adde*

Tinct. Castorei Dr. 2

Syr. Cinnam. Unc. $\frac{1}{2}$.

M. D. S. Stündl., umgeschüttelt, 1 starken Esslöffel. (Bei Unterleibskrämpfen.)

RICHTER.

931.

Ry *Rad. Valer. min.* Unc. 1

Sem. Cigas Unc. $\frac{1}{4}$

Aq. comm. bullient. q. s.

repono ad refrigerat.; *in Colat.* Unc. 7 *solvo*

Extr. Jugland. Nuc. Dr. 2

et adde

Tinct. Valer. aeth. Dr. 1 $\frac{1}{2}$

Succi Dauci insp. dep. Unc. 1.

M. D. S. Esslöffelweise, umgeschüttelt.

(Gegen Eingeweidewürmer.)

RICHTER.

932.

Ry *Rad. Valer. min. gr. pulv.* Unc. 1
Aq. comm. q. s.
macera, saep. agitando, per nycthem-
rum; Colat. L. 1 adde
Spir. sulph.-aeth. ferrugin. Dr. 1½
Syr. Chamomill. Unc. 1.
M. D. S. 2stündl., umgeschüttelt, 2 Essl.

933.

Ry *Rad. Valer. min.*
Sem. Cinae ana Unc. ½
Aq. comm. fervid. q. s.
repose ad refrigerat.; Colat. Unc. 6 f. c.
Asae foet. depur. Dr. 1
Füello Ovi unius
l. u. Emulsio. D. S. 1mal tägl., um-
geschüttelt, den 3ten Theil, mit ½ Tasse
lauwarmen Wassers, zum Klystier. (Ge-

gen Maden- und Spul-Würmer, für ein Kind von 8 Jahren.)

934.

Ry *Rad. Valer. min. Unc. 2*
Flor. Chamom. vulg.
Hb. Menth. crisp. ana Unc. 1.
Conc. M. f. Species. D. S. 1-2mal tägl.
den 6ten Theil, mit 1½ Tassen Wasser
angebrüht, durchgeseiht und 2 Essl.
Leinöl zugesetzt, zum Klystier.

935.

Ry *Rad. Valer. min. Unc. 1½*
— Taraxaci
Hb. Taraxaci
—, Cardui bened. ana Unc. 1.
Conc. M. f. Species. D. S. 1-2mal tägl.
den 6ten Theil nebst 1 Essl. voll Wai-
zenkleie mit 2½ Tassen Wasser leicht auf-
gewallt und durchgeseiht zum Klystier.

Radix Zedoariae. Zittwerwurzel. [Hauptbestandtheile; äther. Öl, ein aromatisches, scharfes Harz und Stärkmehl. — 1 Unze *conc.* 1½, *subt. pulv.* 2½ Sgr.] Innerl. zu Scr. ¼-1, einigemal tägl.; am besten in Pulver oder pulveraufnehmenden Formen [Latwerge: Ry 228 (*Cass. cinnam.*)]; doch auch im Aufguss [wässerigen od. weinigen; namentlich Digestionsaufguss; etwa Unc. ½ auf Unc. 6, 2stündl. 1 Essl.]; weniger zweckmässig in Abkochung.

Radix Zingiberis (albi) s. Zinziberis. Zingiber album. Ingber; Ingwer. [Hauptbestandtheile: äther. Öl, ein aromatisches Harz und Stärkmehl. — 1 Unze 1½, *conc.* 1½, *subt. pulv.* 2½ Sgr.] Innerl. zu Gr. 10-15, einigemal tägl.; am besten in Pulver [Ry 936] od. pulveraufnehmenden Formen [Trochisken: Ry 80 (*Ambra gris.*), 874 (*Rad. Pimpin.*). Latwerge: Ry 1027 (*Turt. depur.*)]; doch auch in Aufguss [namentlich Digestionsaufguss; wässerigem (auch wohl im Hause des Kranken mit heisser Fleischbrühe zu bereiten), besser noch spirituösem od. geistigem; etwa Unc. ½ auf Unc. 6, 2stündl. 1 Essl. — Ry 828 (*Rad. Armorac.*)], weniger zweckmässig in Abkochung, höchstens, wenn es vorzüglich um den harzigen Bestandtheil zu thun ist, in Ebullition. — Oft als Corrigen. — Diätetisch als *Confectio s. Conditum Zingiberis*, eingemachter Ingwer [vom Conditor oder vom Apotheker zu entnehmen]; bisweilen zu Warmbier, Glühwein u. s. w.

Äusserl. als Kaumittel [bei Zungenlähmung], als Rube-faciens [entweder pur (indem man Ingwerpulver mit Brantwein übergiesst, diesen abbrennen lässt und den zurückbleibenden Brei auf Leinwand gestrichen auflegt) oder mit Senfteig — vgl. *Sem. Sinap.*]; infundirt zu Gurgelwässern, Zahntincturen [Ry 117].

936.

Ry *Rad. Zingiberis* Dr. 2
Blaeosacch. Cinnamomi

Pulv. gummosi ana Usc. $\frac{1}{2}$.
M. f. Pulv. Div. in 12 part. aeq. B. in charta corata. S. 3ständl. 1 Pulver mit Wasser. VOGEL.

RESINAE. Harze. — Dies Wort hier in einem engeren Sinne, in dem gewöhnlichen pharmaceutischen, genommen, wonach es von den in diesem Werke aufgeführten Stoffen folgende umfasst: *Balsamum Tolutanum*, *Benzoë*, *Colophonium*, *Elemi*, *Lacca in granis*, *Mastiche*, \dagger *Pix alba*, *Resina Guajaci nativa* u. *Res. Guajaci Ligni*, *Resina Jalapae*, *Res. Pini Burgundica*, *Resina Pini empyreumatica solida*, *Sandaraca*, *Sanguis Draconis*, *Styrax calamita*, *Tacamahaca*, *Terebinthina cocta*. [Die \dagger *Res. Chinae* ppt. schliessen wir, als noch zu wenig gekannt, von der Übersicht aus.]

Sie sind sämmtlich unauflöslich in Wasser, auflöslich [bis auf zufällige Beimengungen] in Alcohol [*Lacca in gr.*; *Mastix*, *Sandarac*, *Styrax calam.* und *Takamahak* jedoch nur zu ihrem grössten Theil], Äther [*Styrax calam.* nicht vollständig; *Lacca in gr.* nur zum kleinsten Theil; *Jalapenharz* nur in heissem Äther grösstentheils auflöslich] und ätherischen Ölen [*Benzoë* und *Jalapenharz* ausgenommen; auch *Styrax calam.* nur unvollständig], lassen sich auch mit den fetten Ölen und Fetten zusammenschmelzen [*Bals. Tolutan.* und *Styrax calam.* lösen sich jedoch nur unvollständig in fetten Ölen u. Fetten auf; *Benzoë*, *Jalapen-* und *Guajak-Harz* gar nicht]; überhaupt sind sie alle in der Wärme schmelzbar, einige jedoch nur unvollständig [so z. B. *Lacca in gr.*, *Styrax calam.*]. — Die Auflösungen der Harze werden durch Zusatz von Wasser trübe, milchicht, indem sich die Harztheile ausscheiden [doch bleiben diese in der Regel, fein vertheilt, im Wasser suspendirt, so dass man dergl. trübe Mischungen (umgeschüttelt) kann gebrauchen lassen. Bisweilen ist diese Trübung erwünscht, wie z. B. wenn man *Benzoë*tinctur mit wässerigen Flüssigkeiten zu einem Waschwasser verschreibt, wo man oft das milchartige Ansehn gern hat]. — Die Alkalien bilden mit den meisten Harzen in Wasser und Weingeist auflösliche Verbindungen (Harzseifen), z. B. *Sapo guajacinus*; Erden und Metalloxyde bilden in Wasser unauflösliche, die aber meistens in Äther, oft auch in Alcohol, auflöslich sind. — Über zu meidende Verbindungen vgl. noch I. S. 35.

Die Harze werden im Allgemeinen [versteht sich, nicht alle einzelnen] in folgenden Formen angewandt:

1. In Substanz [z. B. Mastix zum Kauen].

2. In Pulver. Sie sind zum Theil nur in der Kälte spröde genug zum Pulvern; und damit das Pulver nicht wieder [durch die Wärme des Zimmers oder des Mundes] zusammenbacke, nicht am Gaumen anlebe, sind Zusätze nöthig [vgl. I. S. 206, d. Tabelle und sub 3.]. Aber auch mit einem Zusatze bleiben manche Harzpulver immer noch zäh, klebrig und deshalb unangenehm einzunehmen (wovon bei den einzelnen). Auch äusserlich [wo in der Regel eben solche Zusätze nöthig] wendet man die Harze in Pulver [Zahnpulver, Streupulver u. s. w.] an.

3. In Zuckerwerkformen; in der Regel nur in Trochischen (die sich dann nicht zum Dörren eignen).

4. In Pillen u. Bissen. Ein wenig Weingeist constituirte sie schon dazu [vgl. I. S. 243 (d. Tab.)]; schön jedoch wird die Masse nur, wenn man noch etwas Seife oder etwas Pulver und Extract zu Hülfe nimmt [vgl. I. S. 245 sub 5.]. In geringer Quantität in eine Pillenmasse aufgenommen darf man sie bei der Constitution ausser Rechnung lassen [I. S. 244 sub 3.].

5. In Latwerge [nicht in zu grosser Quantität].

6. In Pflastern. Die meisten Harze nimmt man gleich in die durch Schmelzen gebildete Pflastergrundlage auf [vgl. I. S. 262 Z. 2. v. u., Quantitätsverhältnisse I. S. 259]; nur die an äther. Öl reicheren [z. B. *Tacamahaca*] lässt man am besten gepulvert der bereits halb erkalteten Mischung zumengen [I. S. 263; Quantitätsverh. S. 260]. In geringem Verhältniss mit anderen Stoffen verbunden, können die Harze, da ihre eigene Consistenz von der eines härteren Pflasters wenig entfernt ist, bei der Constitution des Pflasters ausser Rechnung bleiben.

7. In Salben [nicht gern in Einreibesalben: I. S. 277 sub 3.]. Bisweilen lässt man sie, namentlich die weniger differenten, mit anderen Stoffen zu einer Salbenmasse (Salbengrundlage) zusammenschmelzen [vgl. z. B. I. S. 278 Z. 3]; anderemal nimmt man sie, namentlich die differenteren, gepulvert in eine bereits anderweitig constituirte Salbengrundlage [nicht mehr als $\frac{1}{2}$ auf 1 einer Grundlage von normaler Consistenz] auf.

8. In flüssiger Form. Entweder aufgelöst, namentlich in Weingeist [die Auflösungen müssen immer filtrirt werden], oder mit wässrigen Flüssigkeiten emulgirt [vgl. I. S. 177 (bis)]; innerlich und äusserlich zu verschiedenen Zwecken, z. B. zu Mund- u. Gurgelwässern, Injectionen, Waschungen u. s. w. [nicht zu Linimenten: I. S. 372]. Einige der besser schmeckenden, z. B. Benzoe, Mastix, können emulgirt füglich in Lecksäften gegeben werden.

9. In Räucherungen [I. S. 386 sub 2.], wozu man sie in Species-Form aus der Apotheke kommen lässt.

† *Resina Chinae praeparata*. Präparirtes Chinaharz. [Bitter; von zäher Pillenconsistenz; unauf löslich in Wasser, auflöslich in Alcohol, Äther und verdünnten Säuren.] Innerl. Scr. 1, in *Mixt. sulph. acid.* [ist das schwächere Präparat der PH. BOR. oder das stärkere der PH. HANN. (Schwefelsäure u. Weingeist ana) gemeint?], 20 Tropfen und Wasser 40 Tropfen aufgelöst, auf die Apyrexie vertheilt: PLAGGE; VAN NES.

Resina Guajaci nativa. Guajakharz, natürliches. [Besteht aus 2 verschiedenen Harzen und Guajacin (einem scharfen, sehr kratzenden, chemisch-indifferenten, in kaltem Wasser wenig, leicht in heissem, leichter in Alcohol löslichen Stoff.) — Färbt sich an der Luft grünblau; salpetrische Säure, *Spir. nitrico-aeth.* und viele organischen Substanzen (z. B. *Gm. Mimos.*, viele frischen Pflanzentheile) befördern diese Färbung. — 1 Unze sub. pulv. 4½ Sgr.] Vgl. *Resinae*.

Innerl. zu Gr. 5-15, 2-4mal tägl.; gern mit einem aromatischen Zusatz (einem Ölzucker od. dgl.). In Pulver [Ry 937, 938; 558 (*Hydrarg. stibiato-sulph.*)], Pillen [Ry 939, 940; 185 (*Camp.*), 338 (*Extr. Acon.*), 367 (*Extr. Con. macul.*), 180 (*Calcar. sulphurata*), 560 (*Hydrarg. stibiato-sulph.*), 601 (*Kali sulphurat.*)], Bissen [Ry 941], Latwerge, Emulsion [Die Farbe dieser fällt, auch bei quantitativ und qualitativ gleichen Ingredientien, nicht immer gleich aus, weil die blaue Färbung nicht immer gleich rasch erfolgt. Deshalb könnte der Kranke bei Reiteration des Receptes glauben, der Apotheker habe das eine Mal schlecht gearbeitet. Man setzt deshalb gern etwas *Spir. nitrico-aeth.* zu, der die Bläuung befördert, was zwar auch schon *Gm. Mimos.*, doch weniger kräftig, thut. — Ry 942. — *Emuls. guajacina* PH. SLESV.: Unc. ½, *Gm. Mimos. pulv.* Dr. 2 (besser wäre, schon um den scharfen Geschmack des Guajakharzes zu verbessern, das Doppelte), *Aq. Ment. pip.* Unc. 9, Zucker Unc. 1½ (6 Unz. 9 Sbl.); selten [die officinellen Tincturen ausgenommen] in Auflösungen [vgl. *Liq. Sapon. stib.*].

937.

Ry *Hydrarg. stibiato-sulph.*
Magnes. carbon. ana Scr. ½
Resin. Guaj. nat. Dr. ½.
M. f. Pulv. Disp. tales nr. 6. D. S. 2mal
 tägl. ½ Pulver.

Pulv. purificans PH. P.
 (1 Drachme 1 Sgr.)

938.

Ry *Resin. Guaj. nat.* Dr. 2
Tartari depur. Unc. ½

Sacch. albi Dr. 6.

M. f. Pulv. D. in scatula. S. 3mal tägl.
 1 Theelöffel. (Gegen gichtische Beschwerden mit Unterleibsstockungen.)
 BERENDS.

939.

Ry *Sulph. stibiati aurant.* Gr. 12
Sapon. medic. pulv. Dr. 1½
Resin. Guaj. nat. pulv. Dr. 2½
Spir. V. rft. q. s.
ut f. Pilulae Gr. 2 [besser 120]. *Cons.*

Sem. Lycop. D. S. 2-3mal tägl. 8-12.
Pilulae guajacinae PH. MIL.

940.

Ry *Hydrarg. muriat. mitis*
Sulph. stibiati aurant. ana Scr. $\frac{1}{2}$
Resin. Guaj. nat. Dr. $2\frac{1}{2}$
Extr. Millefol. q. s.
 ut f. *Pilulae* 60. *Consp. Pulv. Cass. cin-*
nam. D. S. 3mal tägl. 4.

941.

Ry *Stibii sulphurati nigri laevig.*

Resina Jalapae. Jalappenharz. [1 Drachme $7\frac{1}{2}$ Sgr.]
 Vgl. *Resinae*. — Innerl. als Reizmittel [häufiger jedoch *Sapo jalapin.*]
 zu Gr. 1-3 einigemal tägl.; als Purgans [häufiger jedoch die Wurzel] Gr.
 5-15 in 2-3 Portionen getheilt, bald hinter einander. — In Pul-
 ver [nicht recht gern; am liebsten noch in Form der *Resina Jalap. praepa-*
rata (s. unten), aber dann in doppelter Dose. Als Geschmacks corrigens *Elaeos.*
Citri], Pillen [Ry 943], Bissen, Emulsion, geistiger Auflö-
 sung [Ry 944].

943.

Ry *Resin. Jalap. pulv.* Scr. 1
Sapon. medicati pulv. Dr. $1\frac{1}{2}$
Ol. Chamom. citrati Gtt. 10
Spir. V. rft. q. s.
 ut f. *Pilulae* 40. *Consp. Sem. Lycop. D.*
in vitro. S. Früh und Abends 2 (-4).
 (Bei habitueller Obstruction.)

Resin. Guaj. nat. pulv. ana Dr. 2
Extr. Dulcam. q. s.

ut f. *Boli* nr. 12. *Consp. Pulv. Cass.*
cinnam. D. S. 3mal tägl. 1 Stück.

942.

Ry *Resin. Guaj. nat.* Dr. 1
Gm. Mimosa pulv. Dr. 2
terendo sensim misce c.
Syr. Violarum Unc. $\frac{1}{2}$
Aq. comm. Unc. 6
 ut f. *Emulsio*, cui adde
Spir. nitrico-aetherei Dr. $\frac{1}{2}$.
M. D. S. 2stündl., umgeschüttelt, 1 Essl.

944.

Ry *Resin. Jalapae* Gr. 5-15
solve in
Spir. V. rftiss. Dr. 1-2
adde
Syr. Chamomill. (od. *Glycyrrhiz.*)
 Dr. 2-4.
M. D. — Umgeschüttelt alle 2 St. die
 Hälfte (bei 15 Gran Harz den 3ten
 Theil), bis zur Wirkung.

★★ **Resina Jalapae praeparata.** [Jalappenharz u. geschälte
 süsse Mandeln ana. — Grübliches Pulver. — 1 Drachme $4\frac{2}{3}$ Sgr.] Vgl. den
 vorigen Artikel.

Resina Ligni Guajaci. Guajakharz vom Apothe-
 ker bereitet. [1 Drachme $2\frac{2}{3}$ Sgr.] Wie *Res. Guaj. nativa*, doch seltner.

Resina Pini Burgundica. *Resina Pini s. abietina.*
Resina alba s. flava [das anfangs weissliche oder schwach gelbliche Harz
 wird mit der Zeit gelb, fast orangefarben] *s. communis. Galipot.* Bur-
 gundisches, Fichten-, Tannen-, weisses, gelbes od.
 gemeines Harz. [Besteht aus 2 Harzen mit wenig Terpenthinöl. — 1 Un-
 ze $\frac{2}{3}$ Sgr.]

Selten innerl. [3mal tägl. 6-8 Pillen, deren jede 3 Gran enthält (der Autor nimmt als Constituenten Gummischleim): ULRICH gegen Flechten (bei sehr reizbaren Personen u. bei Neigung zu activen Blutflüssen zu meiden).]

Äusserl. zu Pflastern [So zum officinellen *Cerat. Resin. Burg.* u. zu andern. — Will man statt des gewöhnlichen Pechpflasters ein weniger übelriechendes u. doch eben so gut klebendes Pflaster haben, so kann man burgundisches Harz schmelzen u. noch etwas *Terebinth. comm.*, $\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{6}$, zusetzen lassen. — Ry 945], Salben [officinell: *Ungt. Res. Pini Burg.*, worin jedoch das Harz nur eine Nebenrolle, das Fett die Hauptrolle spielt], Räucherungen [bei Lungenschwindsucht, namentlich Schleimchwindsucht; man streut von Zeit zu Zeit kleine Portionen Harz auf ein heisses Blech, und füllt so die Luft um den Kranken — vorsichtig — mit Dämpfen. Werden diese vertragen, so kann man nach einiger Zeit hoch Terpenthin, Weihrauch, Myrrhe, Campher od. dgl. dazu nehmen, oder auch zu den kräftigeren Theer-Räucherungen übergehn].

945.

Ry *Resin. Pini Burg.* Unc. $\frac{1}{2}$.

Leni calore liquat. adm.

Camphorae trit. Dr. 1

Opii pulv. Dr. $\frac{1}{2}$

antea cum

Petraei q. s. [Dr. 1] trita,

ut f. *Emplastr.* D. S. Auf Leder gestrichen aufzulegen. (Bei sehr schmerzhaften Rheumatismen.) G. A. RICHTER.

+ *Resina Pini empyreumatica liquida. Pix liquida.* Theer. [Besteht aus Kresot, Picamar, Paraffin, Kupion, Brandharz, Holzessig, u. anderen Producten der trockenen Destillation. — 1 Unze + 1 Sgr.] Vgl. *Balsama naturalia*.

Innerl. zu Gr. 2-4, steigend bis zu Scr. 1 (u. darüber), etwa 3mal tägl.; in Pillen [mit Mehl oder anderen schleimigen Pflanzenpulvern (u. passend einem gewürzhaften Zusatz); ohne Subaction, vgl. 8. 79].

Äusserl. zu Pflastern [Ry 946], Salben [z. B. 1 auf 4 Fett, 1mal tägl. auf die Ausschlagsstellen einzureiben (daneben wohl noch Schwefel- od. Laugen-Bäder): DUCHESNE-DUPARC gegen Krätze. (Soll sehr rasch heilen; ob auch nicht bisweilen zu rasch?) — Oder 1-2 auf 2 Fett (bisweilen Hammeltalg, geschmolzen, oder ranzige, gesalzene Butter), etwa noch mit Zusatz von ein wenig kohlensaurem Kali oder Opiumtinctur: gegen Prurigo. — Mit gleichen Theilen Hammeltalg zusammengeschmolzen: WILLAN bei Lepra. — Ry 947-949], Dämpfen [man setzt in der Nähe des Kranken ein flaches Gefäss mit Theer (wo die Säure des Theers zu sehr reizen könnte, rühre man, damit sie sich nicht mit verflüchtigte, Kreide oder Potasche unter denselben) über eine schwach brennende Spirituslampe; der Theer darf höchstens bis zum schwachen Kochen gebracht werden (nicht aber überwallen, anbrennen p. p.); Intensität u. Dauer der Application sind vorsichtig abzumessen. Ähnlich und meist wohl noch milder, freilich auch weniger sicher, wirkt der Aufenthalt in Schiffstaufabriken].

946.

Ry *Resinae Pini Burgund.* Gr. 15

Cerae flavae Dr. 2

+ *Resin. Pini empyr. liquid.* Unc. $\frac{1}{2}$.

Leni calore liquefacta M. f. Empl. D. —

Emplastr. Picis liquidae

PH. HANN. [1 Unze 2 Mgr.]

947.

Ry *Adip. suilli* Unc. 1

† Resin. Pini empyr. liquid. Dr. 2
Tinct. Opii simpl. Dr. $\frac{1}{4}$.

M. D. S. Einzureiben. (Gegen Prurigo im Hospit. St. Louis zu Paris gebräuchlich.)

948.

Ry Adip. suilli Unc. $\frac{1}{2}$
Sulphur. depur.

† Resin. Pini empyreum. liquid. ana
Dr. 2–4.

M. f. Ungt. D. — (Gegen Lepra vulgaris. Dazu innerl. Theerpillen. Vor dem Gebrauche dieser Mittel ein Purgans, auch Beseitigung eines etwanigen gereizten Zustandes der Haut durch innerlichen Gebrauch von Pulvern aus Sulph. præcip. und Natr. carbon. depur. sicc., so wie durch Bleiumschläge.)

EDW. BECK.

949.

Ry Cretae alb. pulv. Scr. 1
Sulphur. depur.

Adipis suilli

† Resin. Pini empyreum. liquid. ana
Unc. $\frac{1}{2}$

† Liq. Ammon. hydrothionosi Scr. $\frac{1}{2}$.

M. f. Ungt. D. in vitro orificio amplo epistomio clauso. — Abends auf eine 1–2 Handbreit grosse Stelle freigebig einzureiben, am 2ten Tage abzuwaschen; wenn sich eine Stelle gereinigt hat, auf eine andere überzugehen. (Bei chronischen Exanthenen, besonders Psoriasis, Lepra, Prurigo, selbst Tinea capitis und Porrigo. — Zuvor oder zugleich innerliche Behandlung mit Calomel, Plummerschm Pulv., Cantharidentinctur, kohlensaurem Ammon. od. dgl.)

WILKINSON.

Resina Pini empyreumatica solida. Pix navalis. Pix nigra solida. Schiffspech; schwarzes Pech. Pech schlechtweg. [Bestandtheile wie beim vorigen, doch von den flüchtigeren sehr wenig. — 1 Unze $\frac{1}{2}$ Sgr.] Vgl. Resinae.

Selten innerl., zu Gr. 4–20, einigemal tägl., in Pillen [um ihnen den unangenehmen Pechgeruch zu nehmen, kann man sie mit Pulv. Rad, Irid. Flor. bestreuen oder (BATEMAN) einige Zeit nach der Bereitung aufbewahren lassen].

Öfter äusserl. als Pflaster [namentlich — früher häufiger als jetzt — als Pechhaube: man bedeckt bei hartnäckigem Kopfgrind, namentlich dem sogenannten Erbgrind, die grindigen Stellen mit einem Pechpflaster, und reisst dieses nach einigen Stunden mit einiger Gewalt auf einmal ab, wo dann der Grind sowohl als die Haare mit ihren Zwiebeln daran sitzen bleiben. Wenn die Verfahren, das vielleicht in manchen Fällen noch nicht entbehrt werden kann, nicht gar zu schmerzhaft (und dadurch wohl selbst gefährlich) werden soll, wenn man sich nicht lieber entschliessen will, die Haare mit ihren Zwiebeln einzeln mit der Hand oder Pincette auszureissen, — so wende man es wenigstens, zumal bei grossen Grindköpfen, nur allmählig an, indem man nach einander einzelne Streifen Pflaster legt und abreisst. — Pech lässt sich füglichlicher als andre Harze (indem es gewöhnlich etwas weicher ist) pur zum Pflaster schmelzen. Sonst kann man auch recht zweckmässig (namentlich für solche Stellen des Körpers, deren Volumen sehr veränderlich oder auf denen die Haut sehr verschiebbar ist, und wo sich deshalb das Pflaster sehr gut anschmiegen muss, um bei Bewegungen nicht abzugehen — also besonders für den Unterleib) das Pechpflaster bereiten, indem man soviel Spir. Vini alcohol. zusetzt, dass das Pech die Consistenz einer steiferen Salbe annimmt; man schmiert es dann auf Leder und legt es so auf; es verdunstet sehr bald ein Theil des Weingeists und das Pflaster haftet nun sehr fest. Manchem Kranken ist

der Geruch eines Pechpflasters widrig und der eines Pflasters aus *Resina Pini Burgund.* (vgl. den Artikel) erträglicher]; seltener als Zusatz zu Salben.

**Rotulae Menthae piperitae.* Pfefferminzküchlein. [Enthalten Pfefferminzöl u. Essigäther. — 1 Unze 3 Sgr.] *Ad libitum* — in zu grosser Menge freilich erhitzen sie sehr.

**Rotulae Sacchari.* Zuckerzeltchen. Zuckerküchelchen. [Sie sind nicht immer gleich gross; als eine mittlere Grösse kann man annehmen, dass sie 5 Gran schwer sind, also 12 auf 1 Drachme gehn.] Man benutzt sie bisweilen zur Verabreichung von ätherischen Ölen; vgl. I. S. 133.

Saccharum. Zucker. Rohrzucker. — Man unterscheidet [ausser dem meist nur diätetisch angewandten krystallisirten, *Sacch. crystallizatum* s. *Candum* s. *Candi* s. *Canthum*, Candiszucker, Zuckerkand, der nach dem Grade seiner Reinheit fast farblos, gelb oder gelbbraun ist] den reinsten, *Sacch. albissimum* (s. *Canariense*) Raffinade, und den weniger reinen und weniger weissen, *S. album* (s. *Melitense*), Melis. Der letztere setzt aufgelöst gewöhnlich etwas Schleim u. a. Unreinigkeiten ab, deshalb sind dgl. Auflösungen des besseren Ansehens halber zu coliren; noch besser, da der Melis auch — für eine feine Zunge — einen weniger angenehmen Geschmack hat, wählt man für Wohlhabende immer Raffinade, namentlich zu flüssigen Arzneiformen, Gallerten u. dgl. (wie es z. B. die Pharmakopöe bei der Bereitung der meisten Syrupe thut), und zu Pulvern, die recht blendend weiss aussehen sollen. [1 Unze *subt. pulv.* resp. 2 und $1\frac{1}{2}$ Sgr.] *Sol.* $\frac{1}{3}$; auch auflöslich in wässrigem Weingeist. — *Cave:* s. I. S. 36 *sub* 14.

Zucker als Constituens, Vehikel und Corrigen vieler Arzneiformen ist bekannt genug. [Wir haben an verschiedenen Stellen dieses Werks darauf aufmerksam gemacht, wo er in diesen Qualitäten nicht passt. Hier wollen wir nur noch erinnern, dass man ihn nicht mit starkschmeckenden Salzen in Pulvergestalt verordne, weil das einen den meisten Patienten sehr widrigen Geschmack giebt.] Als eigentliches Arzneimittel verordnet man ihn theils innerl. [Zuckerwasser ist bekannt genug und bei Vergiftungen wichtig. — Ein Molkenpulver s. unter *Sacch. Lactis.*], theils äusserl. als Streupulver [bei schwammigen Geschwüren, wildem Fleisch; meist doch mit wirksameren Mitteln in Verbindung. — Bei Schwämmchen der Kinder lässt man wohl die Mundhöhle damit bestreuen oder — gelinde, mittelst eines Pinsels — betupfen], Schnupfpulver, Augenpulver [g. v.; daher meist als Constituens dieser Form. — Selten zu Augewässern: Ry 103 (*Ammon. muriat. dep.*)], zu gelind ausleerenden Klystieren [für sensible Individuen, Kinder. Vgl. *Ol. Lini*].

★★ *Saccharum aluminatum*. Alaunzucker. [Alaun u. *Sacch. albis.* zu gleichen Theilen, gepulvert. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr.] Hauptsächlich zum innerlichen Gebrauch. [Vgl. *Alumen*. — Nach REIL alle 4 St. Ser. 2 trocken langsam zu verschlucken, so dass es eine Weile im Halse hängen bleibt — um Halsentzündungen im Entstehen zu unterdrücken.]

Saccharum Lactis. Milchzucker. [Stüsst wenig; knirscht zwischen den Zähnen. — 1 Unze *subt. pulv.* $2\frac{1}{2}$ Sgr.] *Sol.* 4; in Weingeist kaum löslich. — *Cave:* s. I. S. 36 *sub* 14. — Innerl. zu Unc. $\frac{1}{2}$ –2 tägl.; in Pulver [z. B. 1 mit 2 *Sacch. albis.*, oder 8 mit *Sacch. albis.* 16, *Gm. Mimos.* 1: *Petit-lait en poudre*, Molkenpulver, in Wasser aufgelöst (solche Auflösungen nennt man wohl künstliche Molken, *Serum Lactis artificiale*) als Ersatz der süßen Molken auf Reisen u. s. w. — Oft als Pulverconstituens, vgl. I. S. 207 u. 211 *sub* 1)] oder Auflösung [in Wasser, Thee, Eselmilch u. dgl.]. Gern als Zusatz zu Brustmitteln oder zu kühlenden antiphlogistischen Mitteln u. s. w.

Sagapenum depuratum. Gereinigtes Sagapen. [Pulver. — 1 Unze $4\frac{2}{3}$ Sgr.] Vgl. *Gummiresinae*. — Innerl. zu Gr. 5–20 und mehr, einigemal tägl., wie *Asa foetida depur.* [Pillen: Ry 906 (*Rad. Scill.*)]. — Äusserl. wohl zu Pflastern [wie *Ammoniac. depur.*, doch seltner. Kommt zum officinellen *Empl. sulphurat.*].

Sago. Grana Sago. Sago. [Ist Stärkemehl, zum Theil in Amidin verändert. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. gekocht [durch Kochen theils aufgelöst, theils aufgeschwemmt] zum Getränk [etwa Dr. 2 gepulvert, mit kaltem Wasser angerührt, dann mit L. 2 Wasser oder Fleischbrühe auf L. $1\frac{1}{2}$ gekocht und tassenweise genossen], zu Krankensuppen, als Gallerte, Brei [1 mit 2 Milch u. 1 Wasser zum Brei gekocht, treffliche Nahrung für kleine Kinder: WILDBERG], od. dgl. — Alle diese Formen im Hause zu bereiten.

* *Sal marimum*. Seesalz, Meersalz, Boysalz. [Besteht aus Kochsalz, Glaubersalz, salzsaurem Kalk u. salzsaurer Magnesia. — 1 Unze $\frac{1}{2}$ Sgr.] Zu Bädern [2–4 Pfund (u. mehr)].

* *Sal Thermanum Carolinarum. Sal Carolinense*. Karlsbader Salz. [Besteht hauptsächlich aus schwefelsaurem und kohlensaurem Natron. — 1 Unze $8\frac{1}{4}$, *siccum* 1 Drachme $1\frac{3}{4}$ Sgr.] Sehr leicht auflöslich. — Innerl. seltener pur — zu Ser. $\frac{1}{2}$ -Dr. $\frac{1}{2}$ mehrmals tägl., in Auflösung — oder in Mixturen [Ry 834 (*Rad. Caric. aren.*)]; häufiger bei Brunnencuren als Zusatz [theelöffelweise] zu Mineralwässern [s. 63].

† *Salicina*. Salicin. [Chemisch-indifferent, krystallisirbare,

sehr bittere Substanz.] *Sol.* 16 [bei 15,6° R. $5\frac{1}{2}$]; auch in Alcohol leicht löslich; unlöslich in Äther. — Innerl. etwa zu Gr. 4-8 einigemal tägl., doch nöthigenfalls auch weit mehr, selbst Dr. 1-2 in einer Apyrexie. [Mit Säuren verbunden (z. B. mit Weinstein säure in Pillen, mit Schwefelsäure in Mixtur) will man es wirksamer gefunden haben.] In Pulver, Pillen, Bissen, Auflösung. — Zur endermatischen Methode qualificirt es sich nicht (A. L. RICHTER).

Sandaraca. Sandarach. [Uneigentlich Gummi Juniperi; Wachholderharz. — 1 Unze $2\frac{3}{4}$ Sgr.] Nur selten äusserl., zu Räucherungen [bei chronischen Rheumatismen, Rhachitis u. s. w.].

Sanguis Draconis. Drachenblut. [Gepulvert schön roth. — 1 Drachme sub. pulv. $1\frac{1}{4}$ Sgr.] Nur noch als färbender Zusatz zu Zahnpulvern [vgl. I. S. 219-20], Zahnlatwergen, Schnupfpulvern u. s. w.

SAPONES. Seifen. — Wir nehmen das Wort hier nicht im weitern chemischen Sinne [wo auch *Liniment. ammoniat.*, *Emplastr. Litharg. simpl.* u. m. a. dazu gehören], sondern nur im engern pharmaceutischen, nur die in den Pharmakopöen diesen Namen tragenden Präparate begreifend. — Diese sind sämmtlich in Wasser, Weingeist, auch (unter Erwärmung) in fetten Oelen u. Fetten auflöslich, mehr oder weniger vollständig, d. h. so weit sie nicht ausser der eigentlichen Seife (die immer vollständig auflöslich in jenen Menstruis ist) noch andere Ingredientien (die sich nicht mit auflösen können) eingemengt enthalten [so enthalten *Sapo aromat. pro Baln.* und *Sapo cosmet.* Pflanzenpulver, Balsam, äther. Öle, — *Sapo jalapin.* Jalapenharz (welches nicht bloss, wie alle Harze, in Wasser, sondern auch — als eine Ausnahme, vgl. S. 420 — in fetten Ölen u. Fetten unauflöslich ist), — *Sapo terebinthinat.* äther. Öl und kohlen. Kali]. — Man hat die I. S. 34 sub 5. angegebenen Verbindungen und meistens auch Gerbstoff zu meiden, und zum innerlichen Gebrauch sie immer in *Aq. destill.* aufzulösen. — Sie lassen sich ausgetrocknet pulvern [doch thut man dies nicht bei denen, die ausser der eigentlichen Seife noch wirksamere Stoffe enthalten: *Sapo guajacinus*, *S. jalapinus*, *S. stibiatus*; bei *Sapo terebinthinat.* würde es auch nicht gut angehn. *Sapo aromat. pro Baln.* ist schon Pulver]. — Man wendet sie im Allgemeinen [nicht alle einzelnen] in folgenden Formen an:

1. Innerl. in Pulvern [nicht gern, des unangenehmen Geschmacks wegen; auch nur in beschränkter Quantität (s. I. S. 206, Tab.)], Pillen [in der Regel die beste Form. *Sapo guajacin.*, *jalapin.* und *stibiatus* haben schon Pillenconsistenz; dem (trockenen) *Sapo medicat.* kann man sie leicht durch ein wenig Weingeist oder Wasser oder einen geringen Zusatz eines weichen Extracts (vgl. I. S. 243, Taf.) geben, so dass auch der *Sapo medicat.*, wenn man ihn mit andern

Diagen in Verbindung in Pillen giebt, beim Ansatz der Constituentien kaum mit in Rechnung kommen darf], Latwergen [selten, des schlechten Geschmacks, auch der unsicheren Dose, wegen], Mixturen [meist wässerigen, selten geistigen; man rechne aber nie darauf, dass eine solche Mixtur klar sey oder bleibe, die Seife wird in der Regel darin einen trüben Absatz, bisweilen sogar Flecken bilden; auch ist der Geschmack ekelhaft]; selten bedient man sich der Seifen, namentlich des *Sapo medicat.*, als Emulgentien [sic sind, da ihre Emulsivkraft verhältnissmässig gering ist, meist zu different dazu; allenfalls bedient man sich ihrer wohl in dieser Art bei den als auflösende Mittel zu reichenden Gummiharzen, wo sie die Wirkung unterstützen, freilich auch den Geschmack noch verschlechtern (z. B. R 956), oder auch bei kleinen Quantitäten ätherischer Öle, natürlicher Balsame, besonders wenn dieselben für eine Pillen-Composition zu subigiren sind].

2. Äusserl. in Pulvern [meist nur zu kosmetischen Zwecken], Pflastern [nur etwa *Sapo Hispan. alb.*, den man entweder gleich in der geschmolzenen, noch heissen Pflastergrundlage auflösen (I. S. 262 Z. 2 v. u.) oder auch (in der Regel weniger zweckmässig) als Pulver in die halb erkaltete Pflastermasse einmengen kann. In beiden Fällen beschränke man sich auf die I. S. 260 angegebene Quantität.], Salben [2 Theile einer festen Seife (die schwarze Hausseife hat schon ungefähr Salbenconsistenz) erfordern 1-2 Theile eines fetten Öls oder 3-4 Theile Schweinefett. In der Regel ist es nöthig, die Seife unter Erwärmung in dem Öl aufzulösen und so eine Salbenmasse zu bilden; mit dem Schweinefett aber (das schon eine Salbenmasse ist) kann die Seife auch gepulvert zusammengerieben werden.], und, in geistiger, wässriger oder ölig (oft nur unvollkommener) Auflösung, zu Klystieren [nur etwa *Sapo domest. alb.*], Bädern [bisweilen nur (vgl. I. S. 374) zum Abreiben des Körpers im Bade, wozu besonders von Stückseife wenig, mehr schon von einem Seifenpulver oder von der weichgekochten Seife, wie sie in Badeanstalten dargebracht zu werden pflegt, gehört], Waschungen [auch hierzu bekanntlich oft in Substanz angewandt, so dass die Auflösung erst *ex tempore* geschieht. Die gegen Flechten u. a. Hautkrankheiten mehrfach empfohlene (nicht officinelle) Cocosnusöl-Soda-Seife der Schönninger Fabrik im Herzogthum Braunschweig lasse man doch vorher concentrirt auflösen.], Linimenten [auf 1 Theil Seife meist 3-6 Theile einer geistigen, 3-8 oder mehr Theile einer wässrigen Flüssigkeit (je nach der beabsichtigten Dicke des Liniments u. s. w.); oder auch die Seife mit fettem Öl (auf 1 Theil einer festen Seife wenigstens 1½-2 Theile Öl, weil sonst eine Salbe daraus wird) verbunden (die Seife gepulvert dem erwärmten Öl zugemischt, so dass sie sich mehr oder weniger vollständig darin auflöst)], u. s. w.

★★ *Sapo aromaticus pro Balneis.* [*Sapo Hisp. alb.* 4, *Amyl.* 2, *Rad. Irid. Flor. pulv.* 1, nebst etwas Perubalsam u. einigen äther. Ölen. — Ein Seifenpulver. — 1 Unze 2½ Sgr.] Zum Waschen, zum Abreiben des Körpers im Bade [vgl. *Sapo Hispan. alb.*].

★★ *Sapo cosmeticus.* Schönheitsseife. [*Sapo Hisp.*

alb. pulv. Unc. 3, Rad. Irid. Flor. pulv. Unc. 1, Ol. Lavand. Dr. ½, Ol. Bergamott. Scr. 1, mit der nöthigen Menge Rosenwasser zu einer Seifenkugel geformt. — Es ist zweckmässig, dass die PH. BOR. es nicht verschmäh, eine Vorschrift der Art zu geben, da die Fabrikate der Parfumeurs bisweilen nachtheilige Ingredientien, z. B. Sublimat, enthalten. Nur hätte auch der Preis bestimmt werden sollen.] Zum Waschen. [Man verschreibe (ohne Gewichtsangabe): *Rx Globulum Saponis cosmet. D.*]

Sapo domesticus. Hausseife. [1 Unze *rat.* 1½, *subt. pulv.* 2½ Sgr. — Es ist die weisse Hausseife od. Talgseife, aus Natronlauge und Talg bereitet, gemeint; falls man nicht ausdrücklich die schwarze, grüne od. Schmier-Seife, *Sapo domest. niger s. viridis* verlangt. Diese letztere ist aus Kalilauge und Öl oder Thran bereitet (deshalb auch bisweilen Thranseife genannt); eine sehr dunkle, schwarze od. grüne, Färbung derselben ist in der Regel durch Braunstein, Eisen- od. Kupfer-Vitriol oder Indigo hervor gebracht; 1 Unze ½ Sgr.] *Cave:* s. *Sapones*.

Nur äusserl. [man wird sie selten aus der Apotheke entnehmen], zu Klystieren [Dr. 2-4 — etwa in Verbindung mit Leinöl (vgl. S. 350), Kochsalz, Glaubersalz, Kamillenaufguss u. dgl. — *Rx 479 (Hb. Ment. crisp.)*], Stuhlzäpfchen [pur, seltner in Compositionen (vgl. I. S. 255). *Rx 728 (Natr. sulphur. crud.)*], Kataplasmen [z. B. weisse Seife 1, Gerstenmehl 2, Wasser q. s.: *Catapl. resoloens* des Pariser Kinderspitals. — Häufiger noch die schwarze Seife, s. z. B. KERNDL's Katapl. S. 90. — Ein Zusatz von Seife zu Kataplasmen verhütet (wo er nicht zu reizend ist) zweckmässig das Sauerwerden], Bädern [zu einem allgemeinen 2-3 Pfund; von der schwarzen Seife weniger. Die weisse vorher aufgelöst; einen Theil derselben kann man zum Abreiben des Körpers im Bade mit wenig Wasser weich gekocht reserviren.], Waschungen [ausser dem alltäglichen Gebrauch zur Reinigung auch oft, in schwachem Weingeist (z. B. 12-6 Theilen Kornbranntwein) aufgelöst (als ein wohlfeiler „Seifenspiritus“) bei Quetschungen u. dgl. (wobei freilich sehr oft durch zu frühzeitige Anwendung geschadet wird!)], Linimenten u. Salben [namentlich bei Krätze u. a. chronischen Hautkrankheiten, und zwar zieht man hier in der Regel die kräftigere schwarze Seife vor — *Rx 261 (Chlor. Calcar.)*, 1088, 1090 (*Sulph. dep.*) —, und wählt nur etwa für Wohlhabende (wenn ihnen die schwarze zu unangenehm) oder für Kinder die weisse: *Rx 1008, 1089 (Sulph. dep.)*. Nöthigenfalls kann man die weisse durch einen Zusatz von kohlensaurem Kali oder Natron verstärken. Von den Methoden Neuerer, die Seife als Hauptmittel gegen Krätze anzuwenden, führen wir unten drei (von PFEUFER, SICHERER und HEYFELDER) auf. Es verdienen aber auch EBERMAIER's Bemerkungen (in *Med. Zeitg. d. Vereins f. Heilk. in Preuss.* 1834. Nr. 23.), dass die Seife nicht überall passe und nicht immer günstig wirke, Beachtung. — REISIG empfiehlt (schon als Hausmittel ziemlich bekannt) bei leichteren Verbrennungen (nachdem grosse Blasen vorher durch Einstich entleert), geschabte weisse Seife, mit etwas Wasser zu einem steifen Teige gemacht und messerrückendick auf weiche Leinwand gestrichen, auf die verbrannte Stelle und deren Umgebung zu legen, und den Verband 2-8 Tage lang alle 18-24 St., vorsichtig zu erneuern. — Zu andern Zwecken werden die officinellen Formeln: *Linim. saponato-ammoniat.* u. *Lin. saponato-samphorat.*, wohl immer ausreichen].

PFEUFER's Behandlung der Krätze. Der Krätzigte wird einen Tag lang in Bezug auf seine sonstige Gesundheitsbeschaffenheit beobachtet (fiebrhafte Zufälle, acute Hautausschläge, Abdominal- und Respirations-Katarrhe, Anlage zu Bauch- u. Lungen-Schwindsucht, zur Epilepsie, chronischer Kopfschmerz contraIndiciren), darauf am ganzen Körper, nur Kopf, Gesicht u. Geschlechtstheile ausgenommen, mit schwarzer Seife (diese soll wo möglich gelbbraunlich, von der Consistenz der Manna [„es muss hier eine sehr schlechte, weiche Sorte Manna, die so genannte *pinguis* oder *sordida*, gemeint seyn“], u. vom Geruch eines Fischteichs mit stagnirendem Wasser seyn) bestrichen, und dies an den 6 folgenden Tagen früh und Abends wiederholt, zuletzt jedoch nur an den Stellen, wo noch Ausschlag oder Jucken bemerkt wird (so dass man am ersten Tage, je nach der Grösse des Körpers, 4-6 Unzen, am 2ten bis 4ten je 2-3 Unzen, am 5ten bis 7ten je $\frac{1}{2}$ -1 Unze, verbraucht). Am 8. Tage ein laues Seifenbad, Wechseln der Leib- u. Bett-Wäsche. — Während der ganzen Cur darf der Kranke nur zu den Einreibungen und zur Verrichtung der Nothdurft. das Bett verlassen; Zimmertemperatur von 18-20° R.; des starken Geruchs halber nicht mehr als 10 Kranke in einem geräumigen Saale; zur Kost die volle Portion. — Bei habitueller, inveterirter und lymphatischer Krätze, bei Kranken, die früher scrofulös oder syphilitisch waren, soll am ersten Tage der Cur ein Abführmittel genommen und während der Cur *Spec. ad Dec. Lign. L. 2* verbraucht werden. Um das lästige Brennen, welches die schwarze Seife erregt, zu mindern, kann man ihr die Hälfte Schwefel zusetzen (so dass dann fast das HORNsche Liniment, Ry 1088, daraus wird). — In der Regel ist der Kranke am 8ten Tage geheilt und darf bei trockenem, warmem Wetter am 10ten, bei feuchtem, kalten zwischen dem 12ten u. 14ten Tage die Anstalt verlassen. Nur bei Dyscrasischen muss die Schmiercur bisweilen wiederholt (und der Kranke 2-4 Wochen in der Anstalt gehalten) werden; sehr selten (nur etwa bei syphilitischer Dyskrasie) bleibt sie ganz unwirksam.

SICHERER's Behandlung. Der Kranke wird, nachdem er frisches Weisszeug erhalten hat, zu Bett in ein Zimmer gebracht, dessen Temperatur nie unter 12° R., Morgens und Abends während der Einreibungen aber nicht unter 18-20° seyn darf. Er darf das Bett nur zu den Einreibungen verlassen, bei welchen er sich auf ein Paar alte Bretter stellt, damit der Fussboden nicht beschmutzt werde. Er schmiert sich nun jeden Morgen und Abend, an den ersten 3 Tagen bei sehr ausgebreiteter Krätze jedesmal $2\frac{1}{2}$ -3 Unzen, bei weniger ausgebreiteter 2 Unz., schwarzer Seife (die Seifklumpen zuvor in warmes Wasser getaucht) über den ganzen Körper (nur Gesicht und Geschlechtstheile ausgenommen) ein; an den 3 folgenden Tagen schmiert er nur die Stellen, wo noch Ausschlag zu bemerken, ein, mit 2 Unz. jedesmal ($\frac{1}{4}$ Unz. auf den Tag). Am 7ten Tage Morgens werden noch einmal 2 Unz. eingeschmiert; Mittags ein warmes Bad; dann frische Leib- und Bett-Wäsche.

HEYFELDER's Behandlung, mit weisser Seife (meist 3-4 Wochen dauernd): 2mal tägl. ein starkes Seifenbad (28° R., $\frac{1}{2}$ St. lang; im Bade Abreiben des Körpers mit Seife); mehrmals tägl. die krätzigen Stellen mit einer gesättigten Seifenauflösung waschen. Warmes Zimmer (selbst im Sommer nicht ausgehn); strenge, magere Diät; in Wäsche und Kleidern die grösste Reinlichkeit (Hemden u. Kleider wo möglich nach jedem Bade wechseln, im Anfang auch die Bettwäsche öfters erneuern). Bisweilen, wenn sich die Heilung in die Länge zieht, ein Abführmittel (Glaubersalz); bei torpider, rigider Haut bisweilen statt der Wasserbäder russische Dampfbäder, in denen sich der Kranke ebenfalls mit Seife abreibt: ohne Dampfbäder wirkt bei solchen Individuen die Methode nicht. Rine

Methode für Wohlhabende, für an Wäsche reiche Spitäler und für Kinder; der Autor hat sie auch bei zwei Säuglingen mit weniger starken Seifenbädern und ohne Waschungen versucht.)

**Sapo guajacinus*. Guajakharzseife. [In verdünntem u. erwärmtem *Liq. Kali caust.* so viel als möglich *Res. Guajaci nat.* aufgelöst, colirt u. zur Pillenconsistenz abgedampft. — 1 Drachme 1 Sgr.] *Cave: s. Sapones*. — Innerl. zu Scr. $\frac{1}{2}$ –1, einigemal tägl., pur oder mit andern Mitteln verbunden, in Pillen.

Sapo Hispanicus albus s. Alicantinus s. Venetus. Weisse spanische Seife. [Trocken; leicht zu pulvern. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$, *ras.* $1\frac{3}{4}$, *subt. pulv.* $2\frac{1}{4}$ Sgr.]

Nur äusserl. [u. nur für Wohlhabende; für Unbemittelte ersetzt die weisse Hausseife sie überall], zu Waschpulvern [officinell: *Pulv. cosmet.* u. *Sapo aromat. pro Baln.* — Ry 443 (+ *Furfur Amygd.*)], Seifenkugeln [offic.: *Sapo cosmet.*], Waschungen [offic.: *Spir. saponat.* — Ry 205 (*Camph.*), 608 (*Kali sulphurat.*), 776 (*Ol. Tereb.*)], Linimenten u. Salben [offic.: *Linim. saponato-camphorat.* — Ry 609 (*Kali sulphurat.*)], Pflastern [offic.: *Empl. saponat.*]; wo man verschwenden darf, auch wohl zu Bädern [vgl. *Sapo domest.* — Man kann auch etwa den Kranken im Bade sich mit Unc. 2–3 des *Sapo aromat. pro Balneis* abreiben lassen oder sich des Liniments: Ry 950 bedienen]. (Zu Zahnpulvern entbehrlich: I. S. 218.)

950.

Ry *Saponis Hispan. albi* Unc. 6
solve in

Aq. communis fervid. L. 1.

Solutioni refrigerat. adde

Ol. Lavandul. Dr. 2.

M. D. S. Zu 2 Bädern, umgeschüttelt.
(S. oben.)

Woblfeiler im Hause aus Seidaseife u.
Lavendelöl zu bereiten.

Sapo jalapinus. Jalappenharzseife. [*Res. Jalap.* und *Sapo medicat. ana 2* in *Spir. V. rft.* aufgelöst und zur Pillenconsistenz abgedampft, so dass die Masse $4\frac{1}{2}$ wiegt. (Keine chemische Verbindung, vgl. S. 428.) — Pillenconsistenz. — 1 Drachme $4\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave: s. Sapones* und I. S. 35 sub 8.

Innerl. als Reizmittel zu Gr. 2–6, als Purgans zu Scr. $\frac{1}{2}$ –1, einigemal tägl. In Pillen [officinell: *Pil. Jalapae*. — 3 mit 1 Calomel, daraus eingranige Pillen: *Pilulae purgantes fortes* PH. P., etwa zu 12 Stück einigemal hinter einander; (1 Drachme $4\frac{1}{2}$ Sgr.). Dieselbe Composition, noch nicht zu Pillen geformt, ist *Massa Pilular. e Resina Jalap.* (*Pilul. mercuriales s. purgantes*) PH. HANN. (1 Drachme 7 Mgr.). — Die *Pilulae purgantes c. Hydrarg.* (*Loco Pilular. e Res. Jalap.*) der PH. SLESV. enthalten ebenfalls *Sapo jalapin.* und Calomel; das Verhältniss lässt sich aber einiger sinnenstellenden Druckfehler wegen nicht angeben. — Ry 951, Bissen [Ry 952], bisweilen in

flüssiger Form [vgl. + *Tinct. Jalap. Resid.* mit $1\frac{1}{2}$ Unzen Mandelöl zusammengerieben, etwa 2stündl., umgeschüttelt, 1 Essl.: VOGLER statt des Rinzstills].

951.

Ry *Asae foet. depur.* Dr. 2
Pulv. Rad. Rhei Dr. 1
Ol. Menth. pip. Gtt. 6
Sapon. jalapini Dr. 2
Extr. Millefol. q. s.
 ut f. *Pilulas* 120. *Obduc. Fol. Argent.*
D. in vitro. S. 3mal tägl. 5.

952.

Ry *Extr. Aloë pulv.* Gr. 2
 — *Rhei Scr.* 1
Sapon. jalapini Gr. 15.
M. f. Boli nr. 2. Consp. Sem. Lycop.
D. S. Auf zweimal zu nehmen.

Sapo medicatus s. natronatus s. chemicus. Medicinische Seife. [Trochen; pulverisierbar. — 1 Unze 5, subit. pulv. $6\frac{2}{3}$ Sgr.]
Cave: s. *Sapones.*

Innerl. zu Gr. 5-20 einigemal tägl.; bei Vergiftungen dra-
 ghenweise in kurzen Zwischenräumen [in lauwarmem Wasser aufge-
 löst]. In (Pulver), Pillen [Ry 55 (*Aloë luc.*), 132, 133 (*Asa foet. dep.*),
 358 (*Extr. Chelidon.*), 449 (*Gutti*), 720 (*Natr. carb. dep. sicc.*), 902 (*Rad. Scill.*),
 943 (*Resina Jalap.*); vgl. *Rad. Ipecac.*], Bissen [Ry 913 (*Rad. Seneg.*)],
 Latwergen [Ry 953; 1044 (*Terebinth.*)], Mixturen [ungern; pas-
 send mit einem aromatischen Wasser. Ry 954, 955], auch wohl [als (adju-
 virende) Emulgens selbst, vgl. S. 429] in Emulsionen [Ry 956].

Ausserl. in der Regel durch *Sapo domest.*, bei Wohlhabenden
Sapo Hispan. alb., zu ersetzen, doch nicht bei Einspritzungen in die
 Harnorgane [wie Ry 717].

953.

Ry *Terebinth. latic.* Dr. 1
Sapon. medicati pulv. Dr. $1\frac{1}{2}$
benz. subactis adm.
Rad. Senegae pulv.
 — *Althaeae* — ana Dr. 2
Succi Junip. insp. q. s.
 ut f. *Electuar.* D. S. 4mal tägl., umge-
 ruhrt, 1 kleinen Theelöffel. VOGT.
 Des Geschmacks wegen würde man lie-
 ber Bissen daraus machen: — *Succi*
Junip. insp. q. s. ut f. Boli nr. 24. Consp.
etc. D. S. 4mal tägl. 2 Stück.

954.

Ry *Saponis medicati* Dr. $\frac{1}{2}$
Gm. Mimosae Dr. 1
Sacch. albi Dr. 3
solve in

Aq. Foenic. Unc. 3*adda. terenda**Magnes. carbon.* Dr. $\frac{1}{2}$.

M. D. S. Alle 2-1 St., umgeschüttelt,
 1-2 Theelöffel. (Gegen Magensäure der
 Kinder.)

Compositionen der Art sind bei manchen
 Ärzten beliebt, aber des sehr schlechten
 Geschmacks wegen wohl nicht zu em-
 pfehlen, zumal da *Magn. carbon.* allein
 gewiss dasselbe thut.

955.

Ry *Sapon. medicati pulv.* Dr. 1
Ol. Amygdal. Unc. 1
leni calore mixtis adda
Syr. Althaeae Unc. $1\frac{1}{2}$.
M. D. S. 3mal tägl., umgeschüttelt,
 1-2 Theelöffel. (Für Kinder bei Säure

n. Krämpfen.)

G. A. RICHTER.

et adde

956.

Ry *Ammoniaci depur.*
Galbani depur. ana Dr. 1
Sapon. medicati pulv. Dr. 1½
terendo sensim. misce o.
Syr. Seneg. Dr. 3
Aq. Menth. crisp. Ung. 4
ut f. Emuls., in qua solve
Extr. Fumar. Dr. 2

Spir. sulph. aeth. Dr. 1.

M. D. S. 3ständl., umgeschüttelt, 1 Ecol.
 VOGT.

Schmeckt abscheulich, und wäre für Leute, die Bissen annehmen können, leicht durch Bissen aus Ammoniak, Galbanum u. Seife in den übigen Quantitäten, mit *Extr. Fumar. q. s.* zu 8 Bissen gemacht; tägl. 4mal 1 Stück — u. gleichzeitigen Gebrauch von *Spir. sulph. aeth.* zu ersetzen.

★ *Sapo stibiatus. Sapo antimonialis. Sulphur auratum Antimonii saponatum.* Spießglanzseife. [Pillenconsistenz. — 1 Drachme 2 Sgr.] *Cave* wie bei *Liquor Saponis stib.* — Innerl. zu Gr. 4–10 einigemal tägl.; in Pillen [*D. in vitro bene clauso.* — Ry 957; 185 (*Camph.*)], seltner in wässrigen Auflösungen.

957.

Ry *Ammoniaci depur.* Dr. 1
Extr. Gratiolae Dr. ½
Saponis stibiati Ser. 2.

M. f. l. a. *Pilulae* Gr. 2. [Besser: f. c. *Spir. V. rft. aux. Pilulae* 65, oder lieber 60.] *Consp. Sem. Lycop. D. in vitro bene clauso.* S. 3mal tägl. 5–10.

SUNDELIN.

★★ *Sapo terebinthinatus. Balsamum Vitae externum.* Terpenthinölseife. [*Sapo Hispan. alb., Ol. Tereb.* ana 6, *Kali carbon. e Cin. clav.* 1. (Keine chemische Verbindung, vgl. S. 428.) — Consistenz salbenähnlich. — 1 Unze 2½ Sgr.] Äusserl. zu Einreibungen [Ry 742 (*Ol. anim. aeth.*)]; seltner mit Wasser oder geistigen Flüssigkeiten vermischt [wodurch das Terpenthinöl, zum Theil auch das kohlens. Kali, sich abscheidet] zu Waschungen. (Kann den *Sapo Starkeyanus* äusserlich — innerlich ist er ohnehin entbehrlich — ersetzen.)

★ *Scammonium Halepense. Dacrydium. Diagrydion.* Aleppisches Scammonium. [1 Drachme *subt. pulv.* 4½ Sgr.] Vgl. *Gummiresinae.*

Innerl. (*ad Granum unum!*) als Reizmittel zu Gr. 1–3 einigemal tägl.; als Drasticum zu Gr. 8–16, auf ein Paar Dosen vertheilt, rasch hinter einander. In Pulver [etwa mit *Pulv. gummos.*, oder mit *Tart. depur.* und Zucker], Pillen, Bissen, Latwerge [Ry 990 b. (*Stann. raspat.*)], Emulsion [nach PLANCHER am zweckmässigsten 8 Gras mit 3 Unz. Kuhmilch angerieben (oder auch mit Mandelmilch, oder, für Personen, welche die Kuhmilch unverdünnt nicht gut verdauen, mit 1 Theil Milch und 1–(3) Theilen Wasser), worin es sich lange suspendirt erhält und welcher es einen sü-

sen, nicht unangenehmen Geschmack giebt; man kann noch ein wenig *Aq. Lauro-cer.*, für manche Kranken noch ein Paar Dr. Zucker einsetzen *PLANCHE* empfiehlt noch, doch als unwesentlich, durch thierische Kohle entfärbtes Scammon., welches die Farbe der Milch nicht verändere, anzuwenden.]

† *Sebum bovinum s. bubulum.* Ochsen- od. Rindstalg. [Ceratconsistenz; doch ein wenig minder fest, zugleich meistens etwas minder weiss, als das folgende.] Wie das folgende.

Sebum ovillum s. vervecinum s. hircinum. Hammeltalg. Schöpsentalg. [Ceratconsistenz. — 1 Unze $1\frac{1}{8}$ Sgr.] *Cave:* s. I. S. 35 sub 10. — Pur, auf Leinwand gestrichen, das mildeste und wohlfeilste Digestivmittel bei leichten Excoriationen u. dgl. Auch zu Stuhlzäpfchen pur. Sonst zu Salben, Ceraten u. Pflastern.

* *Secale cornutum. Clavus secalinus.* Mutterkorn. [Hauptbestandtheile: ein fettes Öl, Fungin (die stickstoffhaltige, chemisch-indifferente Substanz der Pilze), Ergotin (stickstofffreie, chemisch-indifferente, in Weingeist leicht, in Wasser (?) und Äther nicht lösliche, giftige, wohl hauptsächlich die Wirkung bedingende, Substanz) und vegetabil. Gamasom. — 1 Unze sub. pulv. 4 Sgr.]

Innerl. in chronischen Krankheiten zu Gr. 3–8, 2–4mal tägl.; — bei Wechselfiebern (*BACKER; MEHLHAUSEN*) Gr. 10, bei schwächlichen Personen Gr. 6–8, in Zwischenräumen von 2 St. 3mal vor dem Eintritt des Paroxysmus; — zur Beförderung der Wehen Gr. 5–10 (–20) [vor grösseren Gaben wird mehrseitig gewarnt] alle $1\frac{1}{4}$ St.; auch wohl noch rascher hinter einander, doch damit nur einigemal; oder auch kleinere Gaben rascher hinter einander; — bei Blutungen Gr. 5–10, in dringenden Fällen alle 10 Minuten (doch nicht zu oft), sonst seltner und bisweilen selbst nur alle 2–3 St. — In Pulver [*D. in charta cerata.* — Z. B. Gr. 6–10, mit $\frac{1}{8}$ – $\frac{1}{3}$ Gran Opium, alle 3–2 St.: *ATLEE* zur Beförderung der Wehen. Als Vehikel etwa Minzwasser oder ein wenig Wein.], Pillen [versteht sich, nur in chronischen Fällen], Schüttelmixtur [z. B. Dr. $\frac{1}{2}$ in *Syr. Cinnaam.* Unc. $\frac{1}{2}$, alle 10 Minuten 1 Theelöffel (3 Dosen): zur Wehenbeförderung], Aufguss [z. B. Dr. 2 auf Unc. 5–6, alle 4–2 St. 1 Essl.: *BUSCH* bei Gebärmutterkrankheiten] oder wohl besser Ebullition od. Abkochung [z. B. Dr. 1 auf Unc. 4, davon alle 15–10 Minuten den 3ten Theil: *PRESCOT* zur Wehenbeförderung. — R. 958].

Ausserl. zum Klystier [Dr. 1, ebullirt: *VILLENEUVE* zur Wehenbeförderung], zu Injectionen in andere Höhlen [bei Blutungen; infundirt oder gekocht; etwa Dr. 2–4 auf Unc. 6–8].

958.

R. *Secalis cornuti* Dr. 1

coq. c. Aq. comm. Unc. 6 ad Colat. Unc. 4,
cui refrigerat. addo

Spir. muriat.-aeth. Dr. $\frac{1}{4}$

Syr. Rubi Id. Unc. $\frac{1}{2}$.
M. D. S. Halbstündl. als Bräutheil hier-

von zu nehmen. (Die Geburt zu beför-
dern.) SCHNEIDER.

Semen Anomii. Piper Jamaicense. Englisches Gewürz; neue Würze; Nelkenpfeffer; Piment; jamaikanischer od. westindischer Pfeffer. [Hauptbestandtheil: äther. Öl. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$, subit. pulv. $2\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. zu Gr. 4–8 mehrmals tägl.; in Pulver, Latwerge; selten im Aufguss [etwa Dr. 1–2 auf Unc. 6, 2stündl. 1 Eoal.]. Diätetisch bisweilen zu Warmbier, Glühwein od. a. Getränken. — Selten äusserl. [Bad: Ry 480 (Hb. Month. pp.).]

* **Semen Anethi.** Dillsamen. [Hauptbestandtheil: äther. Öl. — 1 Unze 1, subit. pulv. $1\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. zu Scr. $\frac{1}{2}$ –Dr. $\frac{1}{2}$, einigemal tägl., in Pulver, Aufguss [Unc. $\frac{1}{2}$ –1 auf Unc. 6, 2stündl. 1 Eoal.; oder als Thee: $\frac{1}{2}$ –1 Loth auf 2–3 Tassen].

Semen (Fructus) Anisi stellati. Sem. Badianae. Sternanis. Badian. [Hauptbestandtheil: äther. Öl. — 1 Unze $2\frac{1}{2}$, subit. pulv. $3\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. zu Scr. $\frac{1}{2}$ –1, einigemal tägl., in Pulver oder pulveraufnehmenden Formen [Bissen: Ry 102 (Ammon. muriat. dep.)], Aufguss [Unc. $\frac{1}{2}$ auf Unc. 6. — Officinell: Species ad Infus. pector.].

Semen Anisi vulgaris. Anis. [Hauptbestandth.: äther. Öl. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$, subit. pulv. 2 Sgr.] Innerl. zu Scr. $\frac{1}{2}$ –1, mehrmals tägl., in Pulver, Latwerge [Ry 667 (Magnes. carb.)], Aufguss [Unc. $\frac{1}{2}$ –1 auf Unc. 6, 2stündl. 1 Eoal.; oder als Thee zu Dr. $\frac{1}{2}$ –1 mit einem Paar Tassen Wasser auf einmal]. Häufig als Zusatz zu Brustmitteln, auch wohl — doch seltner als der Fenchel — zu Abfuhrmitteln. Bisweilen als Geschmacks corrigens (vgl. jedoch I. 3. 44). — Als Conspergens. — Äusserl. als Streupulver [I. 8. 223 sub b)].

Semen Avenae excorticatum. Avena decorticata. Grutum Avenae. Geschälter Hafer. Hafergrütze. [Hauptbestandtheile: Stärkmehl, Zucker und ein kleberartiger Stoff. — 1 Unze $\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. abgekocht als schleimiges Vehikel andrer Arzneien [Dr. 2–4 auf Unc. 6 Colatur ist schon sehr stark schleimig], zum Getränk [„Hafergrütz- od. Hafer-Schleim“] und zu Krankensuppen [mit Zucker, kleinen Rosinen u. dgl. — bleibe der Köchin überlassen]. — Äusserl. abgekocht als Menstruum von Mund- u. Gurgelwässern [Dr. 1–4 auf Unc. 6]; zu erweichenden Cataplasmen [mit Wasser oder Milch weich gekocht. — Es ist der wohlfeilste Stoff dazu].

Semina Cacao. Kakaobohnen. [Hauptbestandtheile: fettes Öl (8. 342) und wenig Arom.]

Innerl. in Pulvern, Pasten, Morsellen [Schocoladen. Officinell: *Pasta Cacao c. Lich. Isld.* — Ry 218 (*Carbo ppt.*), 284 (*Cort. Chin. fusc.*). — Auch die fertige Schokolade benutzt man wohl zu Trochischen u. dgl.: Ry 219 (*Carbo ppt.*), 672 (*Magn. usta*), 857 (*Rad. Ipecac.*), 963 (*Sem. Cinna*). Wo in diesem Buche Schokolade als Ingrediens einer Formel aufgeführt ist, ist in der Regel die sogenannte Gesundheitsschokolade (die aber, für sich angewandt, diesen Namen weniger als die Gewürzschocoladen verdient, weil sie schwerer zu verdauen ist) od. *Cacaomasse*, Schokolademasse, darunter zu verstehn, die von den Fabrikanten oder auch wohl von Apothekern entweder bloss aus gerösteten Cacaobohnen oder aus Cacao und Zucker zu gleichen Theilen bereitet wird. Sonst wird auch die Gerstenschokolade, aus (meist gleichen Theilen) Cacao und präparirtem Gerstenmehl, und die verschiedenen Gewürzschocoladen, mit Zusatz von Vanille (oder häufiger statt derselben mit dem wohlfeileren peruvianischen Balsam — vgl. den Artikel), Zimmt, Gewürznelken u. s. w. bereitet, zu diätetischem Gebrauch ärztlich verordnet. Man läßt von diesen verschiedenen Präparaten in der Regel 2 Loth (von der Gesundheitsschokolade ohne Zusatz nur 1 Loth), zerhackt, mit einer reichlichen Tasse oder 2 kleinen Tassen Wasser oder Milch leicht aufgekocht, auch wohl noch mit 1 Eidotter, auf einmal nehmen. — Eine gar nicht erhaltende Schokolade, die freilich ganz anders und weniger angenehm schmeckt, kann man aus ungerösteten Cacaobohnen mit Zucker bereiten lassen. — Einiger andern, mehr medicinischen Schocoladen haben wir unter verschiedenen Artikeln gedacht und erwähnen nur, noch gelegentlich der hie und da käuflichen Kream-Schokolade (Schocol. mit Fleischextract). — Des Kakao schalen-Kaffees, aus den gerösteten Schalen der Kakao-Bohnen bereitet, haben wir schon unter † *Cort. Cacao tostus* gedacht].

Semen Cannabis. Hanfsamen. [Hauptbestandth. : fettes

Öl. — Man verordnet ihn immer zerquetscht, *contusum*. — 1 Unze $\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. in Emulsion [Unc. 1 auf Unc. 12-16, zu halben Tassen. Ry 959, 960]; in Aufguss oder Ebullition [in Tisaneform; Unc. 1-2 auf 1 Quart, tassenweise. — Ry 961]. — Äusserl. zu Breiumschlägen [lieber Leinsamenmehl].

959.

Ry *Sem. Cannab. contusi* Unc. 1
terendo sensim misce c.

Aq. comm. Unc. 16
ut f. Emuls. in Colat. solve

Gm. Mimosae Dr. 2

Sacch. alb. Dr. 6.

Densa cola. D. S. 2stündl., umgeschüttelt, $\frac{1}{2}$ Tasse. BRÜCKNER.

960.

Ry *Sem. Cannab. contusi*

Amygdal. dulc. excocti. et contus. ana Unc. 1

terendo sensim misce c.

Aq. comm. L. 2

ut f. Emuls. in Colat. solve

Pastae gummosae Unc. $\frac{1}{2}$.

D. S. Stündl., umgeschüttelt, $\frac{1}{2}$ Tasse. (RICHTER.

961.

Ry *Rad. Althaeae*

Sem. Cannabis ana Unc. 2

— *Foeniculi*

Rad. Glycyrrh. ana Unc. $\frac{1}{2}$.

C. C. M. f. *Species.* D. S. Zum Thee. (Etwa 2 gehäufte Essl. mit 4 Tassen Wassers zu bulliren. — Bei entzündlichem Trippern.) HUFELAND.

Semen Carvi. Kümmelsamen. Karbe. [Hauptbestandth. äther. Öl. — 1 Unze 1, *subl. pulv.* $1\frac{2}{3}$ Sgr.] Innerl. zu Scr. $\frac{1}{2}$ - Dr. $\frac{1}{4}$ einigemal tägl., in Pulver [Ry 663 (*Magnes. carbon.*)], Aufguss [Unc. $\frac{1}{4}$ auf Unc. 6, eislöffelweise. Häufiger als Thee: $\frac{1}{2}$ - 1 Loth auf 2-3 Tassen]. Als Corrigenes [vgl. r. s. 44, 195]. — Äusserl. zu Klystieren [selten; etwa Unc. $\frac{1}{2}$ mit Unc. 6 infundirt].

Semen Cinae s. Santonici. Zittwersamen. Wurmsamen. [Hauptbestandtheile: äther. Öl und Santonin (Wurmsamenbitter — ein chemisch-indifferent Stoff oder (nach LIEBIG) eine fettsäure). — 1 Unze $2\frac{1}{3}$, *subl. pulv.* $3\frac{1}{2}$ Sgr. — Surrogat für Arme + Sem. Tanacetii.]

Innerl. zu Dr. $\frac{1}{2}$ - 1, mehrmals tägl. In Pulver [Manche Ärzte ziehen es grüßlich gepulvert vor. — Man kann es Kindern etwa mit warmer Milch oder warmem Kaffee einrühren, was den Geschmack noch am ersten erträglich machen wird. — Ry 962; 450 c. (*Gutti*)], Zuckerwerkformen [namentlich, der schon voluminösen Gaben wegen, am bequemsten in Morsellen (Beispi. I. s. 230). — Ry 963; 413 (*Ferr. sulphur. cryst.*)], Bissen [Ry 964], Latwerge [zwar giebt man sonst sehr übel-schmeckende Dinge nicht gern in dieser Form, indess Kinder lassen sich leicht durch den Vorgesmack des süßen Saftes betrügen; nimmt man freilich *Oxymel scillit.* zum Constituens der Latwerge, so ist der Vorgesmack so schlecht wie der Nachgeschmack. — Ry 965, 966; 990 a. (*Stann. raspat.*)], Schüttelmixturen; im Aufguss [für ein 4-8jähriges Kind Unc. $\frac{1}{2}$ - 1 auf Unc. 4, 3stündl. 1 Essl., etwa in Kaffee oder mit Möhrensaft od. dgl. gereicht. — Ry 931 (*Rad. Valer. min.*)]. Diätetisch als *Confectio Sem. Cin.*, überzogener, überzuckerter Wurmsamen [PH. SLESV.: 1 Unze 4 Sht.; auch bei manchen Conditoren zu finden]; als Zittwer-Schokolade [wie u. d. käuflich].

Äusserl. zu Klystieren [für ein 8jähriges Kind etwa Unc. $\frac{1}{2}$, infundirt. — Ry 514 (*Hydrarg. muriat. corros.*)], 983 (*Rad. Valer. min.*)].

962.

Ry *Ferri sulph. cryst.* Gr. 1-2

Rad. Jalapae Gr. 4

— *Valerian. min.*

Suli sulphurici depur. ana Scr. $\frac{1}{2}$

Sem. Cinae Scr. 1.

M. f. *Pulv. Disp. tales* nr. 12. D. S.

5-6mal tägl. $\frac{1}{2}$ Pulver.

G. A. RICHTER.

Etwa für ein Kind von 6-8 Jahren; mit Syrup od. dgl. anzurühren.

963.

Ry *Sem. Cinae pulv.*

+ *Chocولاتا pulv. ana* Unc. 4

Sacch. albi pulv. Unc. 2

Mucil. Gm. Tragac. q. s.

ut f. l. a. *Trochisci, Pulv. Cass. cinnam. conspergendi, non torrendi*, nr. 120. D. S. 3stündl. 4-6. (Etwa für Kinder von 4-6 Jahren.)

964.

Ry *Rad. Jalap. pulv.* Dr. $\frac{1}{2}$

— *Valer. min. pulv.* Dr. $1\frac{1}{2}$

Sem. Cinae pulv. Unc. $\frac{1}{2}$

Extr. Tarax. liq. q. s.

ut f. *Boli* nr. 24: *Consp. Pulv. Macidis*. D. S. 4mal tägl. 2 Stück. (Für ein Kind von 8 Jahren.)

965.

Ry *Rad. Jalap. pulv.* Dr. $\frac{1}{2}$ - Scr. 2
 — *Valer. min. pulv.* Dr. 2
Sem. Cinae (vel Tanacet.) gr. pulv.
 Unc. $\frac{1}{2}$
Kali sulphuric. dep. pulv. Dr. $1\frac{1}{2}$ - 2
Oxymell. scillit. q. s.

ut f. *Electuar.* D. S. 2-3 mal tägl., umgerührt, 1 Theelöffel. BREMSER.
 Diese Vorschrift [deren Totalquantität nur sehr gross ist, so dass man sie passend halbir] kann als Ersatz des STÖRCKschen Wurmlatwerge [welche, unzweckmässig, die 4 ersten Ingredientien ana ansetzt], des *Elect. anthelminth. s. Sem. Cinae comp.* PH. SLESV. (1 Unze 4 Sbl.) und des mit Unrecht so genannten *Elect. anthelminth. Störckii* PH. HANN. (1 Unze 3 Mgr.) [welche weniger Baldrian, etwas mehr Jalappe p. p. enthalten], und des *Elect. anthelminth.* PH. F. [welches etwas weniger Baldrian, etwas mehr Jalappe, statt des *Kali sulphur.* unpassend *Kali tartar.*, das in *Tart. dep.* verwandelt wird, statt des reinen *Oxym. scillit.*

aber nicht unpassend *Oxym. scillit.* Dr. 6, *Syr. comm. q. s.*, wodurch die Latwerge weniger ekelregend werden muss, — enthält; 1 Unze $2\frac{5}{8}$ Sgr.] dienen. Vor allen diesen Vorschriften verdient aber gewiss die folgende, als weniger ekelhaft zu nehmen, den Vorzug.

966.

Ry *Rad. Valer. min. pulv.*
 — *Filicis excoctic. pulv.*
Pulv. Sem. Cinae ana Dr. 3
Mellis commun. q. s.

ut f. *Electuar.* D. S. 3stündl., umgerührt, (nach dem Alter des Kindes) 1-2 Theelöffel (bis die ganze Portion 2mal verbraucht ist; zugleich in den ersten 4 Tagen gegen Abend 1 Gran Calomel mit Zucker; nach Beendigung der Latwerge aber ein starkes Purgans aus *Rad. Jalap.* — Die Latwerge schmeckt weniger ekelhaft als die vorige).

PH. HANN.

Es ist schade, dass keine besondere Benennung u. kein Preis dazu angegeben.

+ *Semen Coffeae. Fabae Coffeae.* Kaffeebohnen.

[Hauptbestandtheile: Coffein (chemisch-indifferent, nächst dem Harnstoff die stickstoffreichste organische Substanz — deshalb auch schon gegen Diabetes versucht —, löslich in 50 Wasser, in kochendem viel leichter, auch leicht in schwachem Weingeist), äther. Öl und eisengrünender Gerbstoff. Durch das bekannte Rösten („Brennen“) wird empyreumat. Öl und Bitterstoff aus dem äther. Öl und Coffein gebildet.] Ein Aufguss des rohen Kaffees ist als Arzneimittel versucht worden, aber ziemlich in Vergessenheit gerathen; uns ist deshalb nur der Gebrauch des gebrannten Kaffees wichtig, von dem wir im Folgenden allein handeln.

Innerl. passt für diätetische und arzneiliche Benutzung am besten (nicht die Abkochung, sondern) der Aufguss, den man der Gewöhnung wegen meist sehr stark [1-2 Loth auf 1 grosse Tasse] machen lassen muss. [Hier gehörige Verordnungen: Gegen Wechselieber 1 Tasse sehr starken schwarzen Kaffees mit halb so viel oder eben so viel Citronensaft, warm, früh nüchtern im Bett am fieberfreien Tage zu trinken (etwa einige Stunden darauf Fleischbrühe, u. den ganzen Tag im Bett bleiben). Oder auch beim Eintreten der ersten Empfindungen des Paroxysmus ein Aufguss von 2 Tassen heiss getrunken. — Bei Cholera der Kinder, besonders sehr junger, viertelstündl. 1 Theel. sehr starken Kaffees ohne Zucker u. Milch: DEWEES.]

Ausserl. zu Zahnpulvern [pur oder in Verbindungen], zum Rauchen bei schmerzenden hohlen Zähnen [grüblich zerstoßen]; zu Klystieren [influidirt; — selten, doch bei narkotischen Vergiftungen bis-

weilen neben der innerlichen Anwendung brauchbar]; zur Luftverbesserung [um vegetabilische und besonders thierische Gerüche zu zerstören. Man kann dazu den Dunst von frisch gebranntem Kaffee benutzen, den man in der offenen Kaffeetrommel umschüttelt; zweckmäßiger noch ist es, das Pulver des scharf getrockneten und dann gestossenen rohen Kaffees auf einem durch eine Lampe erhitzten Eisenblech bis zur braunen Färbung zu rösten; man kann auf diese Weise mit 1 Loth Kaffee in einem ziemlich grossen Zimmer den Kaffeedunst mehrere Tage lang ununterbrochen unterhalten, indem man von Zeit zu Zeit so viel von dem Pulver, als man zwischen 2 Finger fassen kann, aufsteht: WEISS].

* *Semen Colchici.* Zeitlosensamen. [Hauptbestandtheile: Colchicin (s. S. 390) u. fettes Öl. — 1 Unze $1\frac{1}{3}$ Sgr.] Cave wie bei *Hb. Belladonn.* — Innerl. wie *Rad. Colch.*, oder in wenig geringerer Dose; meistens jedoch die Tinctur oder das † *Vinum Colch. e Sem.*

Semen Coriandri. Koriandersamen. Schwindelkörner. [Hauptbestandth.: äther. Öl. — 1 Unze $\frac{2}{3}$, *subt. pulv.* $1\frac{1}{3}$ Sgr.] Innerl. [selten] zu Scr. I — Dr. $\frac{1}{4}$ einigemal tägl., in Pulver, Aufguss [wässrigem oder wenigem; Unc. $\frac{1}{2}$ auf Unc. 6, *qs. löffelweise*]. (In geringeren Dosen als Zusatz zu übel-schmeckenden, leicht Leibkneifen erregenden, auf die Verdauung nachtheilig wirkenden Mitteln, z. B. *Senna, Jalape, Scilla.*)

Semen Cumini s. Cymini s. Carvi Romani. Römischer, Mutter-, Kron-, Kreuz-, Hafer-, Pfaffenod. Pfeffer-Kümmel. [Hauptbestandth.: äther. Öl. — 1 Unze 1, *subt. pulv.* $1\frac{2}{3}$ Sgr.] Wie *Sem. Carvi*; doch nicht als Corrigenens. [Pflaster: R. 755 (*Ol. Cumini*).]

Semen Cydoniorum. Quitten-Samen (-Kerne, -Körner). [Hauptbestandtheile: Schleim u. fettes Öl. — 1 Unze $5\frac{1}{3}$ Sgr.] Nur zur Bereitung des Quittenachleims [s. I. S. 321 u. besonders *Mucil. Cydon.*].

Semen Erucae s. Sinapis albae s. citrinae. Weiss- od. gelber Senf. [Hauptbestandtheile: ? wie bei *Sem. Sinapis*. — 1 Unze $\frac{1}{2}$, *subt. pulv.* 1 Sgr.] Wie *Sem. Sinapis*, doch, da er etwas weniger scharf ist, hauptsächlich nur zum innerlichen, namentlich zum mehr diätetischen Gebrauch. [In neuerer Zeit als Hausmittel zur Mode gewordene sehr grosse Gaben — zu halben u. ganzen Unzen — sind nicht zu empfehlen.]

Semen Foeniculi. Fenchelsamen. [Hauptbestandth. äther. Öl. — 1 Unze 1, *subt. pulv.* $1\frac{2}{3}$ Sgr.] Innerl. zu Scr. $\frac{1}{2}$ — Dr. $\frac{1}{2}$, ei-

nigermal tägl., in Pulver [Ry 662 (*Magn. carb.*), 888 (*Rad. Salep*), u. v. a.], pulveraufnehmenden Formen; Aufguss [Unc. $\frac{1}{2}$ - 1 auf Unc. 6, 2stündl. 1 Essl. Häufiger als Thee: $\frac{1}{2}$ - 1 Loth auf 2-3 Tassen. — Fenchelthee mit Kuhmilch vermischt bei Ammen, deren Milch abnimmt (ROSENSTEIN), bei zu entwöhnenden Kindern, bisweilen auch bei künstlich zu ernährenden Säuglingen p.p.]; häufig als Zusatz zu Infusions-Species [z. B. Ry 478 (*Hb. Meliss.*), 491 (*Hb. Trifol. fibr.*)], zu Brüst- u. Abführ-Mitteln u. s. w.; als Geschmackscorrigens [vgl. jedoch I. S. 44]; als Conspergens.

Semen Foeni Graeci. Bockshornsamen. Griechisch-Heu-Samen. Siebenzeit. [Hauptbestandtheile: äther. (?) und fettes Öl, Schleim u. Bitterstoff. — 1 Unze *gr. pulv.* $\frac{2}{3}$ Sgr.] Innerl. selten, höchstens etwa als schleimiger Thee [Unc. $\frac{1}{2}$ (nicht zerstoßen) mit 3 Tassen heissen Wassers infundirt]. — Äusserl. zu Klystieren [ebenfalls etwa Unc. $\frac{1}{2}$ mit einigen Unzen Wasser infundirt], Bähungen, Breiumschlägen [gepulvert u. gekocht; doch lieber dafür Leinsamelmehl].

Semen Hordei excorticatum. *Hordeum perlatum s. mundatum.* Gersten- od. Perl-Graupen. Geschälte od. gerollte Gerste. [Hauptbestandtheile: Stärkmehl, Zucker, Gummi und ein kleberartiger Stoff. — 1 Unze $\frac{2}{3}$ Sgr.] Innerl. abgekocht als schleimiges Vehikel andrer Arzneien [Unc. $\frac{1}{2}$ - 1 $\frac{1}{2}$ auf 1 Quart, mit Zucker, auch wohl noch mit Citronensaft, Himbeerssig, bei Armen Kespig, u. dgl. — im Hause zu bereiten]. — Äusserl. abgekocht als Menstruum von Mund- u. Gurgelwässern [Dr. 1-4 auf Unc. 6. — Vgl. *Caricac*], Klystieren [Ry 675 (*Malth. Hordei*)].

* **Semen Hyoscyami.** Bilsensamen. [Hauptbestandtheile: Hyoscyamin (vgl. S. 203) und fettes Öl. — 1 Unze $1\frac{1}{8}$, *subt. pulv.* $1\frac{3}{4}$ Sgr.] **Cave:** vgl. *Fol. Hyosc.* und I. S. 35 sub 10. — Innerl. zu einigen Gran mehrmals tägl. in Emulsion [als unsicher abzuempfehlen, obwohl noch beliebt. Etwa Scr. 1 - Dr. 1 auf Unc. 6, alle 2-1 St. 1 Essl.; z. B. Ry 967]. — Äusserl. zu Räucherungen [bei Zahnweh; man setzt einen Trichter über die Kohlen, worauf man den Samen geworfen hat, und leitet so den Dampf an und in den Zahn. (Die Samenkörner platzen dabei; die dann blossliegenden weissen Keime hat man wohl für aus den Zähnen gefallene Würmer gehalten.)]. Ein Mundwasser: Ry 464 (*Hb. Conii mac.*).

967.

Ry *Sem. Hyoscyami* Dr. 1
Amygdal. dulcium excort. Unc. $\frac{1}{2}$
 \dagger *Aq. Amygdal. amar. dilut.* * Unc. 8
f. l. a. Emulsio; *Colat. admisce*
Sacch. albis. Dr. 6

Magnes. ustae Dr. 1.

D. S. Umgeschüttelt alle 2-1 St. 1 Essl.
 (Bei Cardialgie u. Vomiturition von zu grosser Reizbarkeit des Magens u. Sphäre; vielfach erprobt.)

Emuls. Amygdalar. composita PH.

HANN., SLESV. (8 Unz. resp.
12 Mgr. u. 12 Shl.)

*) Durch *Aq. Cerasor.* zu ersetzen.

Werden die kleinen Bilsensamen mit den Mandeln zugleich angestossen, so entgegen sie leicht grossentheils dem Pistill; zweckmässiger also ist es, sie zuerst a-

part zerstoßen, dann die Mandeln zusetzen zu lassen (also zwischen der 1sten u. 2ten Zeile des Receipts ein „*bene contusis adde*“ einzuschreiben). — Dass sich ein wenig bläusaur Magnesia bildet, kann nichts ausmachen.

Semen Lini. Leinsamen. [Hauptbestandtheile: Schleim u. fettes Öl. — 1 Unze $\frac{1}{2}$, gr. pulv. $\frac{5}{8}$ Sgr.]

Innerl. in Tisanenform [Soll er hier als ein kräftiges Demulcens wirken, so lässt man ihn am besten kochen, u. zwar ziemlich stark, wo er dann freilich schlecht schmeckt. Etwa Unc. 2 (nicht zerstoßen; für den Apotheker, dem man zwar selten die Bereitung dieser Tisanen auftragen wird, kann man zur Beseitigung jedes Zweifels *Semen L. integrum* schreiben; eben so auch zum Klystier) mit $1\frac{1}{2}$ Quart Wasser od. Milch auf 1 Quart, tassenweise; zur Versüssung Zucker od. Süssholzsaft; auch kann man gegen Ende des Kochens etwas Fenchel zusetzen].

Aüsserl. zu Gurgelwässern [selten u. durch angenehmere Schleime entbehrlich], Klystieren [eine Abkochung von etwa Unc. $\frac{1}{2}$ mit einigen Unzen Wasser. — Officinell: *Spec. ad Enema*. — Die beliebte Verbindung mit Oelen, z. B. Leinöl, scheint, wenigstens in den meisten Fällen, nicht allzu zweckmässig zu seyn, denn der Schleim hält an, das Öl führt ab. Will man freilich nur ein reizmilderndes Klystier, ohne Rücksicht auf die Stuhlausleerungen zu nehmen, so mag sie gelten; eben so auch die Verbindung des Leinsamenschleims mit stärkeren Abführmitteln: hier kann der Schleim dazu dienen, die Einwirkung dieser Mittel allmählicher und gerade dadurch, indem die zu rasche Ausleerung des Klysters verhindert wird, ergiebiger zu machen — wie man ähnliche Wirkungen von indifferenten Zusätzen zu Brechmitteln beobachtet.], Cataplasmen [hier grüßlich gepulvert: Leinsamenmehl, *Farina Seminis Lini*. Bei Armen nimmt man wohl, als noch wohlfeiler, grüßlich gepulverten Leinkuchen, *Placenta Sem. Lini* (den Rückstand, welcher bei der Leinölbereitung in der Presse bleibt). — Das eine oder andere kocht man — im Hause des Kranken — mit Wasser oder Milch weich, oder wenn man den Umschlag rascher haben will, rührt man es nur mit kochendem Wasser zu einem Brei an; auf die letztere Weise braucht man aber weit mehr, weil das Leinsamenmehl dabei weniger anschwillt als beim Kochen; auch erkalten — aus einem bekannten physikalischen Grunde — die auf die letztere Weise bereiteten Cataplasmen rascher. Zu einem mässig dicken Cataplasma von der Grösse eines Viertelbogens braucht man, wenn es gekocht wird, etwa Unc. $1\frac{1}{2}$. — Es empfiehlt sich das Leinsamenmehl zu Cataplasmen besonders durch seine Leichtigkeit und seine gelind demulcirende Eigenschaft; auch hält es gekocht die Wärme recht gut zusammen (was freilich die wohlfeilere Hafergrütze auch thut), besser als Kräuter. So macht es denn eine Menge anderer zu Cataplasmen empfohlenen erweichenden Mittel entbehrlich; doch beliebt man auch oft Verbindungen mit erweichenden oder narkotischen Kräutern u. s. w., so z. B. die officinellen *Spec. ad Catapl.* oder Ry 422 (*Fol. Hyosc.*)].

Semen Lycopodii. Pollen Lycop. *Lycopodium. Sulphur vegetabile.* Bärlappsamen; Hexenmehl; Streu-, Klopff-, Blitz- od. Moos-Pulver. Erdschwefel. [Haupt-

bestandtheile: Pollenin (chemisch-indifferente, stickstoffhaltige, in Wasser, Wein-geist, Säuren u. wässerigen Alkalilösungen unlösliche Substanz), fettes Öl, Zucker u. s. w. — 1 Unze $1\frac{3}{4}$ Sgr.]

Innerl. zu Scr. 1-Dr. 1 einigemal tägl. in Latwerge [z. B. $\frac{1}{2}$ Unze mit 3 Unz. *Pulpa Prunor. depur.*, 2stündl. 1 Essl.: HUFELAND für Erwachsene. Oder mit *Gm. Mimos. ana*, u. *Syr. Amygdal. q. s.*, theelöffelweise (angenehm schmeckend): HENSEHEL für Kinder]. Schüttelmixturen oder besser [vgl. I. S. 313] Emulsionen [höchstens Dr. 1 auf jede Unze Wasser, weil es sonst zu dick wird, bisweilen kaum noch aus der Flasche geht. — Ry 968]. Als Conspergens [I. §. 90].

Ausserl. zu Streupulvern [pur (vgl. I. §. 124.) oder mit China-, Kamillen-Pulver, Zinkkalk u. dgl. — Ry 1101 (*Zinc. oxyd.*)], Salben [pur oder in ähnlichen Verbindungen. — Ry 1103 (*Zinc. oxyd.*)].

968.

Ry *Sem. Lycopodii* Dr. 2*terendo sensim misce o.**Syr. Althaeae* Unc. $1\frac{1}{2}$ *Aq. Foenic. (oder Aq. comm.)* Unc. 2.D. S. Umgeschüttelt theelöffelweise.
(Bei Strangurien kleiner Kinder.)

HUFELAND.

+ *Semen Melonum*. Melonen-Samen od. - Kerne. [Nur noch in der PH. AUSTR.; sonst obsolet. — Hauptbestandth.: fettes Öl.] In (echter) Emulsion [zum Getränk, etwa tägl. Unc. 1-2 auf 3-8 Tassen].

+ *Semen Paeoniae*. Pfingstrosen- od. Gichtrosen-Samen. [Hauptbestandth.: fettes Öl. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr.] In Pulver u. flüssigen Auszügen wie *Radix Paeon.* (Obsolet.)

Semina Papaveris (albi s. sativi s. hortensis). Mohnsamen. Weisses Magsamen. Weisses Mohn. [Hauptbestandtheile: fettes Öl, sehr wenig Morphin p. p. — 1 Unze $\frac{1}{4}$ Sgr.]

Innerl. in Emulsion [Zum Getränk — was jedoch weit weniger angenehm als Mandelmilch — Unc. $\frac{1}{4}$ auf L. 1; sonst aber Unc. 1- $1\frac{1}{2}$ auf Unc. 8 Colatur (so *Emuls. ex Seminib. Papav. albi* PH. SLESV.: 1 mit 8 Wasser emulgirt, zur Colat. $\frac{1}{2}$ Zucker). — Die Ärzte schreiben bisweilen zur Bereitung der Emulsion, um mehr Narkotisches in dieselbe zu bringen, „*Sem. Papav. cum Capitibus*“ vor; dies ist aber unschicklich, hindert die gehörige Bereitung der Emulsion, und man weiss am Ende gar nicht, wie viel schleimige u. ölige Theile, wie viel narkotische man dem Kranken darreicht. Will man also die Wirkung der Mohnküpfe dabei haben, so lasse man eine schwache Abkochung derselben mit den Samen zur Emulsion machen oder setze (was noch wohlfeiler, doch freilich auch weniger kräftig ist) *Syrup. Capit. Papav.* zu der fertigen Emulsion. — Ry 65 (*Alum.*)].

Selten äusserl. [Ein Mundwasser: Ry 464 (*Hb. Conii mac.*). — Ry 969.]

969.

Ry *Sem. Papaveris* Dr. 2*Aq. comm.* Unc. 3.

F. l. o. Emulsio; Colat. adde

Aq. Laurocer. Dr. $\frac{1}{2}$.
M. D. S. Einigermal tägl., umgeschüt-
 telt und (etwa durch die Spritze) er-

wärmt einzuspritzen. (Als schmerzstil-
 lend bei heftiger Gonorrhöe.)

SCHLEGEL.

+ *Semen Peponum s. Cucurbitae.* Kürbis-Samen
 od. - Kerne. Ganz wie *Sem. Melonum*.

Semen Petroselin. Petersilien- od. Peterlefn-
 Samen. [Hauptbestandth.: äther. Öl. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. zu
 Scr. $\frac{1}{2}$ - Dr. $\frac{1}{2}$, einigemal tägl., in Pulver, pulveraufnehmenden
 Formen [Bissen: Ry 907 (*Rad. Scill.*)], Aufguss [wässrigem, geistigem
 oder weinigem; Unc. $\frac{1}{2}$ - 1 auf Vac. 6, 2stündl. 1 Essl. — Ry 138 (*Bacc. Junip.*),
 1077 (*Turion. Pini*). Oder als Thee: $\frac{1}{2}$ - 1 Loth auf 2 bis 3 Tassen]. — Äus-
 serl. als Streupulver [I. S. 223 sub b)] oder mit ungesalzener
 Butter zur Salbe gemacht [gegen Kopfungeschiefer; wo indess das äther.
 Öl noch wirksamer].

Semen Phellandrii s. Foeniculi aquatici. Wasser-
 od. Ross-Fenchelsamen. [Hauptbestandtheile: äther. Öl und ein ei-
 gentümlicher Extractivstoff. — 1 Unze $\frac{3}{4}$, sub. pulv. $1\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. an-
 fangs zu Gr. 15-20, allmählig steigend zu Dr. $\frac{1}{2}$ - 1, einigemal tägl.,
 in Pulver [z. B. 3stündl. 1 Scrupel mit eben so viel *Sacch. Lactis*: HUF-
 LAND. — 4mal tägl. Scr. $\frac{1}{2}$ mit *Extr. Hyosc.* Gr. $\frac{1}{2}$, Myrrhe Gr. 2: BIRD bei
 Lungenschwindsucht], Bissen, Latwerge, Aufguss [Unc. $\frac{1}{2}$ - 1
 auf Unc. 6, 2stündl. 1, später auch 2 Essl. — Ry 381 (*Extr. Myrrh.*), 469 (*Hb.*
Digital.), 631 (*Lich. Ield.*), I. S. 288 (*Rad. Salep*)].

Semina Psyllii s. Pulicariae. Flöhsamen. [Hauptbe-
 standtheil: Schleim (der schon durch blosses Schütteln — vgl. I. S. 321 — daraus
 gewonnen werden kann, in der Regel jedoch durch ordentliches, d. h. länger fort-
 gesetztes, Infundiren in grösserer Menge ausgezogen wird. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr.)
 1 Drachme giebt mit 5-6 Unzen kaltem oder 16 Unzen kochenden Wassers infun-
 dirt u. colirt einen geruch- u. geschmacklosen, grünlichen Schleim, der äus-
 serl. wie Quittenschleim benutzt werden kann. Ist jedoch ziemlich obsolet.

Semen Sabadillae (†). Sabadill- od. Capuciner-
 Samen. Mexikanischer Läusesamen. [Hauptbestandtheil: Ve-
 ratrin (s. den Art.). — 1 Unze $1\frac{1}{2}$, sub. pulv. $2\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerl. (†) ist dies sehr heftig wirkende Mittel wohl zu ent-
 behren, auch schon ziemlich obsolet; wenigstens gebe man es nicht,
 wie empfohlen, in brechenenerregenden Gaben scrupelweise, sondern
 höchstens zu Gr. 2-6 ein Paar Mal tägl., in Pulver, Pillen, Bis-
 sen, Aufguss [mit Wasser oder Milch, etwa Dr. 1 auf Unc. 6, in 2 Tagen
 zu verbrauchen]; nicht füglich in Latwerge [der Unbestimmtheit der
 Dose wegen].

Äusserl. zu. Klystieren [Dr. 1 (für Kinder verhältnissmässig wenige) mit Wasser od. Milch infundirt oder leicht abgekocht], Streupulvern u. Salben [vgl. I. S. 223 sub b)]. Gegen Kleiderläuse in das Futter eingenäht; zur Vertreibung der Wanzen in die Ritzen gestreut oder Bettstellen u. dgl. mit einem Aufguss oder einer Abkochung von 1 Unze mit 1 Pfund Essig gereinigt.

Semen Sinapis (*s. Sinapeos*, *S. nigrae*). Schwarzer (rother, grüner) Senfsamen. Senf vorzugsweise. [Hauptbestandtheile: äther. Öl (S. 357; es bildet sich zwar erst beim Zusammentreten eines in der Substanz vorhandenen Radicals mit Wasser) und fettes Öl. — 1 Unze $\frac{5}{8}$, gr. pulv. $1\frac{1}{8}$, subf. pulv. $1\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave* starke Säuren; Salzbilder; Alkalien.

Innerl. zu Dr. $\frac{1}{2}$ –1 (1–2 Theelöffel), 2–3mal tägl.; in Substanz oder noch wirksamer [aber bei Empfindlichen dann vorsichtig, anfangs kleinere Gaben; bisweilen ganz zu meiden, vgl. I. S. 210 sub c.] in Pulver; ferner in Aufguss [warm (etwa + 40° R. oder etwas darüber; nicht aber siedend heiss, weil dies die Bildung des äther. Öls beeinträchtigt) oder kalt aufgegossen, mit Wasser, Wein, Bier; etwa Unc. 1 auf Unc. 6, einige Essl. tägl. (Essig, den man auch oft zum Extrahiren angewandt hat, beeinträchtigt die Bildung des äther. Öls; er ist gerade dadurch bei der diätetischen Anwendung — im Mostrich — passend, aber wohl nicht bei der arzneilichen.) — Ry 459 (Iib. Cochlear.), 825 (Rad. Armorac.)], zu Molken [*s. Serum Lactis acidum*]. (Diätetisch als Mostrich.)

Äusserl. infundirt [über Menstrua u. Temperatur gilt dasselbe wie beim innerlichen Gebrauch] zu Mund- u. Gurgelwässern [etwa Dr. 1–2 auf Unc. 6. — Ry 970], Waschungen [z. B. bei chronischen Hautausschlägen od. bei Lähmungen Dr. 2–4 auf Unc. 6, bei torpiden Frostbeulen Unc. $\frac{1}{2}$ auf Unc. 3–2], Umschlägen [als gelindes Rubefaciens Unc. $\frac{1}{2}$ – $1\frac{1}{2}$ auf Unc. 6], Bädern [Unc. 4–8, gestossen, in einen leinenen Beutel gebunden u. mit warmem Wasser angebrüht, dann Brühe und Beutel ins Bad gethan. (Man schütze die Augen: I. S. 365.) — Zu Fuss- oder Arm-Bädern auf ähnliche Weise vorbereitet, Unc. 2–4. Wenn der Kranke nicht aus dem Bette steigen kann, kann man diese localen Bäder dadurch ersetzen, dass man Unc. 2–4 gestossenen Senfs in einen Beutel gebunden mit $\frac{1}{2}$ Quart warmen Wassers übergiesst, in dieses, sobald es $\frac{1}{2}$ St. oder länger gezogen und man den Beutel noch ausgedrückt hat, Tücher taucht, und diese, etwas ausgedrückt, um Füsse u. Unterschenkel oder um die Arme schlägt. — Unc. 2 mit *Natr. carbon. crud.* Unc. $1\frac{1}{2}$ zu einem Fussbade: SUNDELIN]. Gepulvert zu Pflastern [Ry 971] und besonders zu Teigen [oder „Latwergen“, „Salben“ (vgl. I. §. 197). — Mit seltenen Ausnahmen, z. B. Ry 972, benutzt man die Senfteige, Sinapismen nur als Rubefacientia. Zu diesem Zweck nimmt man den Senf gröblich gepulvert (Senfmehl, *Farina Sem. Sinap.*) und rührt ihn mit Wasser (mit warmem Wasser wirkt er etwas schneller, doch beträgt dieser Unterschied höchstens einige Minuten) zu einem weichen Brei, einer weichen Latwerge an. (Einige empfehlen, ausgepresstes, seines fetten Öls beraubtes, Senfpulver zu nehmen, welches rascher wirken soll. Es gehört dahin das, bei den Specereibändlern zu findende,

sogenannte englische Senfmehl; dieses ist jedoch bisweilen verfälscht, enthält z. B. Pulver von spanischem Pfeffer, in welchem Fall es durch Essig — vgl. unten — nicht so wie das Senfpulver geschwächt wird, bisweilen aber auch andere Stoffe, die es weniger wirksam machen; auch hat es oft durch lange Aufbewahrung gelitten; am sichersten entnimmt man also das Senfpulver immer aus der Apotheke.) Früher rührte man die Senfteige gewöhnlich mit Essig an, schwächte aber dadurch ihre Wirksamkeit. (Man kann zwar äusserst rasch die Haut röthen, wenn man Senfpulver auf ihr ausbreitet und dies mit *Acid. acetic.* betrüpfelt; aber es wirkt hierbei hauptsächlich nur die Essigsäure, und wenn man eine intensivere Wirkung beabsichtigt, muss man Senf mit Wasser anwenden.) — Will man die Wirkung des Senfteigs mildern (z. B. bei zarterer Haut, oder um ihn langsam einwirken zu lassen, um ihn mehrere Stunden liegen lassen zu dürfen), so kann man auf 1 Senf noch $\frac{1}{2}$ (od. mehr) Roggenmehl dazu nehmen (wodurch der Teig zugleich mehr gebunden, zusammenhaltend, wird), ihn mit Essig bereiten (vgl. den Artikel *Sinapism.*), auch wohl ihn über Flor auflegen. Will man (z. B. bei Scheintod, Lähmungen, Schlagfluss, p. p.) den Senfteig noch verstärken, so werden zu dem Ende Zusätze von Pfeffer, spanischem Pfeffer, Ingwer, Kochsalz, *Liq. Ammon. caust.* (vgl. das *Cave!*) p. p. empfohlen; aber diese Empfehlungen schreiben sich noch aus der Zeit her, wo man die Senfteige mit Essig zu bereiten pflegte, ohne zu vermuthen, dass man sie dadurch schwächte, und man wird bei gutem Senfpulver und bei der Bereitung mit Wasser ihrer wohl selten bedürfen; (auch fände man eine bessere Verstärkung im \dagger *Ol. Sinap. æther.*, vgl. den Art.). Man empfiehlt auch noch zu demselben Zweck Zusätze von geschabtem Meerrettig, aber dieser wirkt, obgleich rascher, doch minder intensiv, — von rohen oder gebratenen, geschabten oder zerquetschten, Zwiebeln oder Knoblauch, aber diese wirken überhaupt minder stark, — von Cantharidenpulver, aber dies wirkt beträchtlich langsamer, und es tritt überhaupt bei ihm die hautröthende und schmerzmachende Wirkung weit minder hervor als die blasenziehende, was beim Senf umgekehrt ist, — von Sauerteig (*Fermentum Panis*), aber dieser ist überhaupt ein viel schwächeres Rubefaciens als der Senf, kann eher zur Schwächung des Senfteigs dienen (man gebraucht ihn bisweilen bei zarten Kindern pur als sehr gelindes Rubefaciens). — Wir führen unten (Ry 973, 974) noch ein Paar zusammengesetzte Beispiele von angeblich verstärkten Senfteigen, der Autorität ihrer Urheber wegen, auf, halten sie jedoch nicht für zweckmässig. — Man legt die Senfteige, dick auf Leinwand (von der Grösse eines Kartenblatts bis zu der eines Octavblatts) gestrichen, auf eine oder beide Waden (weniger passend auf die Fusssohlen, weil hier die Haut zu dick), auf die Deltamuskeln, in den Nacken; auf den Bauch, bei Croup wohl um den Hals, u. s. w., und lässt sie so lange liegen, bis sie eine Weile lebhaften Schmerz erragt und die Haut stark geröthet haben, wozu bei Erwachsenen in der Regel $\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{2}$ St., bei Kindern eine kürzere Zeit, erforderlich ist. Selbst bei höchst unempfindlicher Haut, und wenn der Kranke nicht über Schmerz klagt, darf man einen kräftigen Senfteig nicht über 1 St. liegen lassen, weil sonst wohl sehr heftige Reaction, selbst Brand, darauf erfolgt. — Nach dem Abnehmen wäscht man, damit nicht etwas liegen bleibe und nachwirke, die Stelle mit warmem Wasser oder Milch ab. — Gegen einen zu heftigen oder zu lange anhaltenden Schmerz nach der Application, Nervenaufrregung p. p. nützt das Auflegen einer narkotischen Salbe (z. B. aus \dagger *Ungt. popal.* *Usc.* $\frac{1}{2}$, *Extr. Bellad.*, *Stramon.*, *Hyosc.* ana Gr. 6 — „die Extracte durch Anstossen mit etwas Wasser erweicht“ —: TROUSSEAU; BLANC), eines narkot. Kataplasma, auch (wo sie nicht contraindicirt ist) die Anwendung von Kälte auf

die Stelle (etwa durch ab und zu wiederholtes Auftröpfeln von Äther.), Kataplasmen [KERNDL's *Catapl. acre* s. S. 90].

970.

Ry *Sem. Sinap. cont. Unc. 1*
Vini Gallici albi L. 1
digere leni calore per nycthemeron;
Colat. adde
Spir. Angelic. comp. Unc. 2.
M. D. S. Mundwasser, umgeschüttelt;
auch tägl. 3-4mal 1 Eael. innerl. (Bei
Zungenlähmung.) (THILENIUS.

971.

Ry *Resin. Pini Burgund. Unc. ½*
Euphorbii Dr. 1
leni cal. liquatis et fere refrigeratis ad-
miisce
Sem. Sinapis subit. pulv. Dr. ½
Ol. Terebinth. Dr. ¼.
F. Emplast. D. — (Als gelind ableit-
tendes Mittel.)

D'ALQUEN.

Auf Leder zu streichen.

972.

Ry *Sem. Sinap. subtiliss. pulv. Unc. 1*
Ol. Amygdal. Scr. 4
Succi Citri q. s.

† *Semen Staphidis agriæ*. [Hauptbestandtheil: Delphinin (scharfes Alkaloid). — 1 Unze pulv. $3\frac{1}{2}$ Mgr.] Hauptsächlich nur noch äusserl., als Streupulver [vgl. I. S. 223 sub b)] od. in Salben [vgl. † *Ungt. pedicular.*].

Semen Stramonii. Stechapfelsamen. [Hauptbestandtheile: Daturin (s. S. 245) u. fettes Öl. — 1 Unze $1\frac{1}{4}$, subit. pulv. 2 Sgr.] *Cave*: vgl. *Hb. Stramon.* und I. S. 35 sub 10. — Innerl. [selten; in der Regel die Tinctur] (*Pulvis ad Grana quatuor!*) zu Gr. $\frac{1}{2}$ - 2 u. vorsichtig steigend mehr, einigemal tägl., in Pulver, Pillen [Ry 975]. (Emulsion wegen Unsicherheit der Wirkung nicht beliebt.) — Äusserl. [selten] zu Räucherungen [wie *Sem. Hyosc.*].

975.

Ry *Hydrarg. muriat. mitis Gr. 5*
Fruct. Capsici ann. ppt. Dr. ½
Sem. Stramon. pulv. Dr. 1

ut f. *Ungt. D.* — (Gegen Sommersprossen, Leberflecke.) P. FRANK.

973.

Ry *Sem. Sinapis gr. pulv. Dr. 2*
Piperis nigri — — Dr. ½
Rad. Armorac. rasae
† Fermenti Panis ana Unc. ½
Aceti concentr. q. s.
ut f. Cataplasma mollius. D. in pyxide
vesica tecta. S. Senfteig.
Sinapismus fortior PH. HANN.
(1 Unze $2\frac{1}{4}$ Mgr., 4 Unz. 7 Mgr.)
Vgl. S. 446 Z. 18 v. u. — Ebenso, nur mit
spanischem Pfeffer, Sinapismus. for-
tior PH. SLESV. (1 Unze $\frac{1}{4}$ Shl., 3 Unz.
9 Shl.)

974.

Ry *Sem. Sinap. gr. pulv. Unc. 1½*
Farinae Secalis Unc. ½
Liq. Ammon. caust. q. s.
ut f. Cataplasma mollius. D. in pyxide
vesica tecta. S. Senfteig.
 SUNDELIN.
Vgl. S. 446 Z. 18 v. u.

Extr. Glycyrrh. q. s.

ut f. *Pilulae* 60. *Consp. Sem. Lycop. D.*
S. Alle 4 St. 2 Stück. (Gegen Gesichtss-
chmerz; — während der Paroxysmen
etwas Opium.) PRACOCK.

† *Semen Tanacet.* Rainfarn- od. Wurfarn-Samen. [Hauptbestandtheile wie bei *Flor. Tanac.*, doch weniger äther. Öl, mehr bitterer Extractivstoff. Dennoch halten manche Praktiker den Samen für stärker. — 1 Unze 1, gr. pulv. $1\frac{1}{3}$ Sgr.] Innerl. wie *Flores Tanac.* — Äusserl. zu Klystieren [wie *Sem. Cinæ*].

SERA LACTIS. Molken-Arten. [vgl. I. §. 205.] Die PH. BOR. hat Vorschriften zu 5 Molkenarten aufgenommen [vgl. die folgenden Artikel], so dass diese fünf von Preussischen Ärzten kurz mit den officinellen Benennungen, oder doch ohne ausführliche Bereitungsangabe, verschrieben werden können, z. B.: *Ry Serum Lact. acidum e Lactis vaccini L. 1-2-3 paratum. D. S.* In einem Tage zu verbrauchen. Oder: *Ry Lactis vaccini L. 1-3; f. l. a. Serum Lact. acidum. D. S. u. s. w.* Soll beim *Serum Lact. acidum* die Quantität des *Tart. depur.*, beim *S. L. aluminatum* die des Alauns, beim *S. L. tamarindinatum* die des Tamarindenmusses, um des Heilzwecks willen, vermehrt werden: *Ry Serum Lact. acidum (aluminat., tamarindinat.) e Lactis vaccini L. 1-2 cum duplici (triplici) Tartari depur. (Aluminis, Pulpae Tamarind.) quantitate paratum. D. S. u. s. w.* Oder: *Ry Lactis vaccini L. 1-2; f. c. duplici Tartari dep. (Alum., Pulp. Tamar.) quantit. l. a. Serum Lact. acidum.* Soll statt der hier genannten sauren Körper ein anderer von den I. S. 317 aufgeführten Körpern zur Scheidung der Milch angewandt werden: *Ry Serum Lact. acidum e Lactis vacc. L. 1-2, (loco Tartari depur.) cum Aceti Dr. 4 (Acidi sulph. diluti Scr. 1, Vini Rhenani Una. 4, p.p.) paratum. D. S. u. s. w.*

Man lässt von den Molken zum innerlichen Gebrauch täglich die aus L. 1-3 (bei einiger Gewöhnung auch wohl noch mehr) bereitete Quantität, — wenn man differentere Zusätze [z. B. von Alaun, Weinstensäure u. s. w.] gemacht hat, die aus L. 1-2 bereitete Quantität verbrauchen. Sehr oft giebt man die Molken längere Zeit hindurch: **Molken curen** [im Frühjahr oder Sommer, bei mässiger Bewegung in freier Luft, namentlich auf Gebirgen (zu Reiners, an vielen Gebirgsorten der Schweiz, aber auch an vielen Badeorten im flachen Lande u. s. w., sind eigne Anstalten dazu), Morgens nüchtern anfangs kleinere Mengen, allmählig grössere, kalt oder häufiger lauwarm, zu verzehren, etwa noch in Verbindung mit einem Mineralwasser. Dabei Diät wie bei den Milkcuren, s. S. 288. Entstehen Verdauungsbeschwerden, leichte Palliative dagegen, oder man wählt Pomeranzenmolken, Ry 976]. Ein Surrogat der süssen Molken s. S. 427.

Über den äusserlichen Gebrauch vgl. einige der folgenden Artikel.

Componirtere Formeln: Ry 976-978; 460 (*Hb. Cochlear.*), 600 (*Kali nitr. dep.*).

976.

Ry *Flaved. Cort. Aurant.* Dr. 4-6
ebulliant c.

Sero Lactis dulcificato e Lactis
L. 2-3 parato.

Colat. D. S. In einem Tage zu verbrauchen.

977.

Ry *Rad. Graminis conc.*

Malthi Hordei contusi ana Unc. $\frac{1}{2}$
coque leni igne per $\frac{1}{2}$ horam c.

Sero Lactis dulcificato e Lactis
L. 3 parato.

+ *Serum Lactis cum Aceto Vini* PH. HANN. Essigmolken. [Mit Essig q. s. bereitet. — 1 L. 4 Mgr.] Innerl. u. äusserl. wie die folgenden.

★ ★ *Serum Lactis acidum s. tartarisatum.* Saure Molken. Weinsteinmolken. [Eigentlich nur Eine Art der sauren Molken, *Ser. Lact. acid.* (vgl. I. S. 316), weshalb die Benennungen *S. L. tartarisat.*, Weinstein., bezeichnender sind (zumal da das weinsteinsäure Salz wohl meistens wesentlich mitwirkt); doch hat die Preuss. Pharmak. einmal jene ersteren Benennungen gestempelt. — Bereitet wie *Serum Lactis dulcificatum* — s. unten —, nur dass ohne Hinzufügung der *Conchae ppt.* filtrirt wird. — 1 L. 8 Sgr.] Vgl. *Sera Lactis.*

Innerl. täglich die aus L. 1-2-3 Milch bereitete Quantität, etwa mit Zucker (*Elaeos. Citri*) versüsst. [Man kann, wenn es der Heilzweck erfordert, die Quantität des *Tart. depur.* bis auf das Dreifache (Dr. 1 auf L. 1) vermehren, ohne befürchten zu müssen, dass ein Theil desselben unaufgelöst bleibe: es wird nämlich ein Theil desselben, der seine Säure an das Coagulum abgibt, in *Kali tartar.* verwandelt. Lässt man die Molken heiss coliren und noch warm trinken, so kann man selbst die 6fache Quantität *Tart. depur.* (Dr. 2 auf L. 1) anwenden.]

Äusserl. bisweilen zu Klystieren [Ry 600 (*Kali sür. dep.*)].

★ ★ *Serum Lactis aluminatum s. aluminosum.* Alaumolken. [Wie *Ser. Lact. dulcificatum* — s. unten — bereitet, nur dass statt des *Tartar. depur.* eben so viel *Alumen* angewandt und ohne Hinzufügung der *Conch. ppt.* filtrirt wird. — 1 L. 8 Sgr.] Vgl. *Sera Lactis.* — Innerl. täglich die aus L. 1-2 Milch bereitete Quantität; mit Zucker (bisweilen *Elaeos. Cinnam.*) versüsst. [Man kann, wenn es der Heilzweck erfordert, die Quantität des Alauns bis auf das Doppelte (Scr. 2) oder Dreifache (Dr. 1 auf L. 1 Milch) vermehren.]

★ *Serum Lactis dulce.* Süsse Molken. [1 Kälber-

Colat. D. S. In einem Tage zu verbrauchen.

978.

Ry *Serum Lactis dulce e Lact. vacc.*
L. 2 paratum

Succi rec. expr. et colati Hb. Chelidon. maj. Dr. 2

Aq. Cinnam. simpl. Unc. 1.

M. D. S. Früh u. Nachmittags, umgeschüttelt, die Hälfte. (Meistens jedoch, wie schon I. S. 318-319 u. 340 bemerkt, wird es dem Kranken lieber seyn, wenn man ihm erlaubt, die Molken allein, nach dem Presssaft, einzunehmen.)

laab mit 12 *Aq. comm.* 10–12 St. macerirt; von dieser Flüssigkeit Ser. 8 auf L. 3 Milch, die Milch digerirt, nach beendigter Coagulation decantirt und colirt. — 1 L. 5½ Sgr.] Vgl. *Seru Lactis*. — Innerl. täglich die aus L. 1–3 Milch bereitete Quantität. [Ry 460 (*Hb. Cochlear.*), 978.] — Äusserl. [selten] zum Gurgeln, zu Klystieren, zu localen und [sehr theuer!] allgemeinen Bädern.

★ ★ *Serum Lactis dulcificatum*. Versüsste Molken. [L. 3 Milch gekocht, dazu *Tartar. depur.* Dr. 1; die Calatur durch Eiweiss geklärt; nach dem 2ten Coliren *Conchae ppt.* bis zur Neutralisation zugesetzt, dann filtrirt. — 1 L. 8 Sgr.] Vgl. *Sera Lactis*. — Innerl. täglich die aus L. 1–3 Milch bereitete Quantität. [Ry 976, 977.]

★ ★ *Serum Lactis tamarindatum*. Tamarindenmolken. [Wie *Ser. Lact. dulcificatum* bereitet, nur dass statt des Weinsteinrahms *Pulpa Tamarind.*, Unc. 1 auf L. 3 Milch, angewandt und ohne Hinzufügung der *Conchae ppt.* filtrirt wird. — 1 L. 8 Sgr.] Vgl. *Sera Lactis*.

Innerl. täglich die aus L. 1–2–3 Milch bereitete Quantität. [Bisweilen vermehrt man um des Heilzwecks willen die Quantität der *Pulpa Tamar.* bis auf das Doppelte oder Dreifache.] — Äusserl. bisweilen zu Klystieren [vgl. *Kali nitr. dep.*].

† *Serum Lactis vinosum* PH. SLESV. Weinmolken. [Mit 8 Unzen Rheinwein auf L. 3 Milch bereitet. — 1 L. 12, 1 Unze 1½ Sbl.] Innerl. wie die vorigen.

Siliqua dulcis. Johannisbrod. [Hauptbestandtheile: Zucker u. Schleim. — 1 Unze conc. $\frac{5}{8}$ Sgr.] Bisweilen als versüssender Zusatz zu Brustspecies [vgl. I. 8. 46 u. 195; man verordnet zweckmässig: *Siliqua dulcis fissa et a seminibus liberata*].

★ ★ *Sinapismus*. Senfteig. [Gepulverter Senf 1, Roggenmehl $\frac{1}{2}$, mit Essig zu einem Teige gemacht. — 1 Unze 1 Sgr. Sehr leicht auch im Hause des Kranken zu bereiten, falls man einen so schwachen Senfteig haben will; vgl. *Sem. Sinap.*]

★ ★ *Solutio arsenicalis*. *Solutio Fowleri*. *Liquor arsenicalis s. Arsenici kalinus*, *Guttae febrifugae s. Tinctura mineralis Fowleri*. Arsenikauflösung. [*Arsen. album* u. *Kali carbon.* e *Tart.* zu gleichen Theilen durch Kochen in Wasser aufgelöst (u. zu arsenichtsaurem Kali verbunden), mit etwas *Spir. Angel. comp.* — 1½ Drachmen, also etwa 90 Tropfen, enthalten 1 Gran Arsenik. — 1 Drachme $\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave* wie bei *Arsen. album*. Man giebt zwar das Mittel in der Regel nur (mehr oder weniger) pur, doch hat man wenigstens das Zusammenreffen desselben mit den dort angegebenen Nahrungsstoffen zu ver-

meiden; man gebe es also nie gleich nach dem Essen, doch auch nie bei nüchternem Magen. Will man etwas Schleimiges nachtrinken lassen, so sey es *Mucil. Gm. Mimos.* Man lasse auch während des Arsenikgebrauchs alle erhitzenen Nahrungsmittel vermeiden, beseitige eine etwa vorhandene Magensäure, Sorge für Leibesöffnung u.s.w. Innerl. (*ad Guttas decem!*) zu 5-7 Tröpfen ($\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{12}$ Gran Ars.), steigend bis zu 11 oder 12 Tropfen ($\frac{1}{4}$ Gran), 2-4mal tägl.; namentlich bei längerem Gebrauch nur die kleineren Gaben; bei Wechselfiebern (wo man es nur zur Beseitigung der Anfälle auf kurze Zeit giebt) steigt man wohl kurz vor dem Anfall rasch zu den etwas grösseren Gaben. — Gern mit Opiumtinctur [z. B. Dr. $1\frac{1}{2}$ mit *Tinct. Opii simpl.* Dr. $\frac{1}{2}$, davon 4 Gaben — zuerst 8 Tropfen und gestiegen bis zu 12 — binnen 8-6 St. vor dem Fieberanfall].

Äusserl. selten, als Verbandwasser [beim Karbunkel einen tiefen Kreuzschnitt gemacht und darin Leinwand gelegt, die mit der durch gleiche Theile destillirten Wassers verdünnten Fowlerschen Solution befeuchtet: SWALLOW. (Wohl kaum empfehlungswerth.)].

Species aromaticae. Loco Specierum pro Cucuphis. [*Hb. Majoran., Rosmar., Serpylli, Thymi, Flor. Lavand. ana 2, Caryophylli 1.* — 1 Unze $1\frac{5}{8}$ Sgr. — Die der PH. P. sind theurer und minder kräftig u. angenehm.] Selten innerl., im Aufguss [etwa in typhösen Fiebern, Dr. 4-6 auf Unc. 4-6; alle 2-1 St. 1 Essl.]. — Häufiger äusserl., zu trockenen Umschlägen [vgl. I. S. 199], infundirt mit Wasser, Weingeist od. Wein] zu Umschlägen, Bädern [L. 1]. — Innerl. u. besonders äusserl. verbindet man diese Species oft mit Campher, z. B. äusserl. den geistigen Aufguss mit *Spir. camphorat.*

Species ad Cataplasma. [*Fol. Malv., Hb. Alth., Hb. c. Flor. Meliloti citr., Sem. Lini ana.* — Grübliches Pulver. — 1 Unze $1\frac{5}{8}$ Sgr. — Einfacher und für die meisten Fälle passender sind die *Spec. ad Catapl.* PH. MIL.: Weizenkleie u. Leinsamen ana; 1 Unze $\frac{2}{3}$ Sgr.] Mit Wasser oder Milch zum Breiumschlag zu kochen.

Species ad Decoctum Lignorum. Holzthee. [*Lign. Guaj. 4, Rad. Bardan., Saponar. ana 2, Rad. Glycyrrh. echin., Lign. Sassafr. ana 1.* — 1 Unze 1 Sgr.]

Innerl. zu 1-2 Unzen tägl. in Abkochung [in Tisänenform. Guajakholz eignet sich zu einer sehr starken, die beiden folgenden Ingredientien zu einer mässig starken Abkochung, die beiden letzten nur zu einer Ebullition. Die Composition ist also nicht ganz zweckmässig, und wenn man die Abkochung in der Apotheke bereiten lässt, so verschreibe man lieber die einzelnen Ingredientien und lasse die beiden letzteren erst *sub finem coctionis* zusetzen. Will man die Abkochung im Hause des Kranken machen lassen, so lasse man nur mässig einkochen, etwa jede Unze mit L. 1 - $1\frac{1}{2}$ auf die Hälfte, oder (wohl das zweckmässigste) gebe ein Digestionsdecoct an, so dass die Species erst einige Stunden mit heissem

Wasser digerirt u. dann auf $\frac{2}{3}$ oder die Hälfte eingekocht werden. (Der Kranke mag 2 Unzen mit 1 Quart (12 Tassen) kochenden Wassers einige St. an einer warmen Stelle, unter öfterm Umschütteln, ziehen lassen, dann bis auf 6 oder 8 Tassen einkochen.)].

Die *Spec. ad Dec. Lign. PH. MIL.* (Gusjakholz, Graswurzel ana 4, Süßholz 1; 1 Unze $\frac{5}{8}$ Sgr. — Dazu gehört *Decoct. Lignor.*: 2 Unz. mit L. 6 auf L. 3), so wie die *Spec. Lignor. PH. P.* (*Rad. Bardap., Caric. aren., Lapathi ac., Saponar., Glycyrrh., Lign. Guaj., Sassafr., Stip. Dulcam., Sem. Foenic.* ana; 1 Unze 1 Sgr.) leiden an demselben Übelstande wie die der *PH. BOX.*

**** Species ad Enema s. pro Clysmate.** Species zum Klystier. [*Hb. Alth.* 4, *Flor. Chamom. vulg.* 2, *Sem. Lini* 1. — 1 Unze 1 Sgr.] Zu Einem Klystier Unc. $\frac{1}{2}$ - 2 [je nachdem man den Auszug dieser Species bloss als Vehikel andrer Mittel oder als Hauptmittel anwenden will], mit 2 - 4 Tassen Wasser aufgewallt.

Species ad Fomentum. [*Strobili Lupuli* 4, *Flor. Chamom. vulg., Lavand., Hb. Rorismar., Serpylli* ana 1. — 1 Unze 2 Sgr.] Hauptsächlich zu feuchten Bähungen [mit Wasser, Weingeist oder Wein infundirt], doch auch wohl zu Bädern [L. $\frac{1}{3}$ - 1 (theuer!)], u. s. w.

Species ad Gargarisma. [*Hb. Alth., Flor. Malv. vulg., Sambuci* ana. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr.] Infundirt oder — zu besserer Ausziehung der schleimigen Theile — ebullirt zu Gurgelwässern od. andern Zwecken. [Bestimmter spricht sich die Beziehung zum Gargelwasser in den differenteren *Spec. ad Gargar.* von *PH. BLESV. Anhg.* (*Hb. Alth., Salv.* ana 2, *Flor. Samb., Rad. Pimpinell.* ana 1; — 1 Unze 2 Sbl.) aus; auch noch in denen der *PH. HANN.* (*Hb. Alth., Salv., Flor. Samb.* ana; — 1 Unze $1\frac{1}{2}$, 6 Unz. $7\frac{1}{2}$ Mgr.)].

Species ad Infusum pectorale. Brustthee. [*Rad. Alth.* 4, *Rad. Glycyrrh.* $1\frac{1}{2}$, *Rad. Irid. Flor.* $\frac{1}{2}$, *Fol. Farfar.* 2, *Flor. Rhüados, Verbasci, Sem. Anisi stell.* ana 1. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr. — *Spec. pectorales PH. P.* (weniger angenehm): *Flor. Verbasci, Sambuci, Fol. Farfar., Rad. Glycyrrh., Alth.* ana 4, *Rad. Irid. Flor., Sem. Foenic.* ana 3; 1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr. — *Spec. ad Inf. pect. PH. MIL.*: *Rad. Alth., Fol. Farfar.* ana 4, *Rad. Glycyrrh.* 2, *Sem. Anisi vulg.* 1; 1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr. — *Spec. pro Infuso pector. cum Fructibus PH. SAXON.*: Feigen 11, kleine Rosinen 4, Perlgrauen 3, Süßholz, Eibischwurzel, *Fol. Farfar.* ana 2, *Hb. Hyssopi*, † *Hb. Capilli Vener.* ana $\frac{1}{2}$.]

Zu infundiren [namentlich Digestionsaufguss] oder auch — zu besserer Ausziehung der schleimigen u. süßen Theile — zu ebulliren; Dr. 2-3 auf 2 Tassen; mit Zucker, Candiszucker, Honig od. dgl. [vgl. *Stip. Dulcam.*]

Species resolventes. Zertheilende Species. [*Hb. Meliss., Orig. vulg.* ana 3, *Flor. Chamom. vulg., Lavand., Sambuci* ana 1. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr. — *Spec. resolv. PH. MIL.* (noch kräftiger, obwohl weniger ange-

nehm riechend): *Hb. Absinth.*, *Menth. cr.* ana 1, *Flor. Chamom. vulg.*, *Samb.* ana $\frac{1}{2}$; 1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr. — *Spec. resolutives externae* PH. SLESV.: *Hb. Absinth.*, *Meliss.*, *Menth. pip.*, *Orig. vulg.* ana 4, *Flor. Chamom. vulg.*, *Samb.* ana 3, Lorbeeren 2; 1 Unze 2 Sht. — (Die zum innerlichen Gebrauch bestimmten *Spec. resolv.* PH. P. s. Ry 474.)] Zu trockenen, besser noch zu feuchten Umschlägen [mit Wasser, Weingeist od. Wein infundirt, oft mit Zusatz von *Spir. camphorat.* od. dgl.], Bädern [L. 2 (sehr theuer!)], u. s. W.

Species ad suffiendum s. pro Fumo. Räucher-species. [Weibrauch, Benzoë, Bernstein u. Lavendelblumen. — 1 Unze 4 Sgr. — PH. MIL.: bloss Weibrauch u. Bernstein; 1 Unze $2\frac{1}{2}$ Sgr.] Auf Kohlen zu streuen. — Ry 979.

979.

Ry *Camphorae rasae* Dr. 1
Spec. ad suffiend. Unc. 1.

M. f. Pulv. gross. D. S. Eine Prise auf Kohlen zu streuen, den Dampf in Baumwollwatten aufzufangen und diese warm auf die rheumatische Stelle zu legen.

SPIRITUS. Geister. [Die *Spiritus aetherei* (von denen unten besonders), und *Spir. Mindereri* u. *Nüri fumans* (die nur dem Namen nach hieher gehören) hier ausgeschlossen.] Rücksichtlich der Aufnahme in einzelne Arzneiformen zum innerlichen oder äusserlichen Gebrauch gilt im Allgemeinen von ihnen dasselbe, was von den Tincturen [vgl. unten den Artikel]. Die an ätherischem Öl reichen (und das sind die meisten) werden bei der Vermischung mit Wasser trübe, opalisirend; man hat bei diesen auch im Allgemeinen [Ausnahmen bei einzelnen] die I. S. 35 sub 9. angegebenen Verbindungen zu meiden. — Wo, wie so häufig, von einem Vegetabil kein Spiritus, wohl aber das äther. Öl officinell ist, kann man jenen durch eine magistrale Auflösung des Öls in *Spir. V. rft.*, einige Tropfen auf die Unze, ersetzen.

Spiritus acético-aethereus. *Liquor anodynus vegetabilis Westendorffii.* Essigäthergeist; versüssster Essiggeist; versüsste Essigsäure. [*Aether acet.* 1, Spirit oder in Ermangelung dessen *Spir. V. rftiss.* 3. — Spec. Gewicht = 0,885-0,895. — 1 Drachme 18gr.] Cave: s. *Aether acet.* — Innerl. zu 10-40 Tropfen öfters tägl. [Auf Dr. 1 gehn ungefähr 100 Tropfen.] Darreichungsweisen wie bei *Spir. sulphur.-aeth.*

SPIRITUS AETHEREI. Verdünnte Naphthen [die Praktiker unterscheiden auch hier nicht zwischen Ätherarten und Naphthen; vgl. S. 31]; nach einer älteren Ansicht: versüsste Säuren. — Sie lassen sich mit geistigen und wässerigen Flüssigkeiten, auch mit äthe-

rischen Ölen verbinden; sie lösen — namentlich der *Spir. sulphuric-aethereus* — viele Harze, natürliche Balsame, äther. Öle, Campher, Amber [fast vollständig], Bernsteinsäure, etc. auf. — Über zu meidende Verbindungen vgl. I. S. 37 sub 18. 19. [Genaueres bei den einzelnen.] — Rücksichtlich der Darreichungsformen und der häufig zu wiederholenden Gaben gilt hier im Allgemeinen dasselbe, was bei den (unverdünnten) Naphthen, s. S. 32.

Spiritus Angelicae compositus. Loco Spiritus theriacalis. [Wässrig-geistiges Destillat von Angelika, *Hb. Scord.*, Baldrian u. Wachholderbeeren] zusammen 20 auf 60, u. darin $1\frac{1}{2}$ Campher auflöst. Man darf ihn, wie den Camphergeist, nicht mit wässrigen Flüssigkeiten zusammenbringen, wenn sich der Campher nicht ausscheiden soll; wenigstens muss man dann umschütteln lassen; es wäre denn, dass (wie z. B. in der *Solutio arsenical.*) so viel Wasser dazu käme, dass der Campher sich wieder im Wasser vollständig auflösen kann. — 1 Unze 2 Sgr. — Der *Spir. aromaticus camphoratus* PH. P. (1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr.) unterscheidet sich hauptsächlich nur durch einen Zusatz von *Hb. Menth. pip.* — Dem Präparate der PH. BOR. entspricht genau der *Spir. Angel. comp. camphoratus* der PH. HANN. (1 Unze $3\frac{1}{2}$ Mgr.), während der *Spir. Angel. comp.* (schlechtweg) derselben Pharmak. (1 Unze 3 Mgr.) keinen Campher enthält u. deshalb in etwas größeren Dosen gegeben werden kann.]

Innerl. [selten] zu 1–2 Theelöffeln (Scr. 2–Dr. $1\frac{1}{2}$) mehrmals tägl.

Äusserl. zu Mundwässern [selten. R. 979 (*Sem. Sinap.*)], Waschungen [pur oder mit andern reizenden Mitteln; vgl. *Liq. Ammoniacos.*], Badespiritus [R. 767 (*Ol. Orig. cret.*)], u. s. w.

† *Spiritus Anisi* PH. AUSTR. Anisgeist. [Wässrig-geistiges Destillat, 10 auf 60.] Innerl. etwa zu 1–2 Theelöffeln mehrmals tägl., oder zu 1 Essl. 1–2mal tägl.; pur oder in Mixturen. [Wo er nicht officinell ist, ersetzt ihn der unter dem Namen *Anisette* bekannte Liqueur oder eine magistrale Auflösung des Anisöls in Weingeist.]

★★ *Spiritus camphorato-crocatus.* [*Spir. camphorat.* 12, *Tinct. Croci* 1. — 1 Unze $2\frac{1}{3}$ Sgr.] Äusserl. wie *Spir. camphoratus*.

Spiritus camphoratus. Camphergeist. [*Camph.* 1 in *Spir. Vini* est. 12. — Man darf ihn nicht mit wässrigen Flüssigkeiten zusammenbringen, sonst scheidet sich der Campher in Flocken aus; wenigstens muss man dann umschütteln lassen. — 1 Unze $1\frac{2}{3}$ Sgr.]

Innerl. (selten; doch namentlich für Arme statt theurerer Auflösungen u. bei Nervenfiebern oft passend) zu 18–90 Tropfen (Gr. 1–5 Campher).

Äusserl. zu Mund- u. Gurgelwässern [Ry 304 (Cort. Querc.)], Injectionen [Ry 5 (Acet. plumb.). — Bei verschiedenen Gehörkrankheiten auf Baumwolle ins Ohr gebracht, etwa mit Tinct. Castor. od. ögl.; häufiger jedoch hier Campher in Substanz.]; zu Waschungen, Bähungen u. Einreibungen [q. v., z. B. oft pur bei Frostheulen, aufgesprungener Haut, Quetschungen, bei Decubitus; desgl. bei von leichter Erfrierung rothgebliebenen Nasen, oder bei rothen Nasen der Trinker, bei „Blutwurstarmen“ der Frauenzimmer: NEUMANN; bei rothen Nasen der Damen: ASHERSON; — bei Blattern, um das Gesicht möglichst vor denselben zu schützen, schwaches Benetzen desselben mit in Camphergeist getauchten Tüchern: HILDEBRAND. — Mit Spir. Junip. ana 1, Acet. scillit. $\frac{1}{2}$, lauwarm mit Lappchen aufzulegen: BECKER gegen Kopfgeschwulst Neugeborener. — Ry 10 (Acet. plumb.), 653 (Liq. Ammon. caust.), 779 (Ol. Tereb.), 981 (Spir. Formic.). — Zu Augen-Waschungen u. Bähungen meist nur Dr. 1–2 auf Unc. 4, doch auch mehr, ja wohl selbst pur: BEER; um Campherdunst an's Auge gehn zu lassen, benutzt man meist häufiger den Campher in Substanz.], u. s. w.

Spiritus Cochleariae. Löffelkrautgeist. [Geistig-wässriges Destillat; über 2 Pf. 1 Pf. abgezogen. — 1 Unze 2 $\frac{1}{2}$ Sgr.] Selten innerl. [weil man die *Cochlearia* in dieser Form nur in sehr geringer Dose anwenden kann], zu Dr. $\frac{1}{2}$ –1, einigemal tägl., in Mixturen [Ry 875 (Rad. Pimpinell.)]. — Häufiger äusserl., in Zahnfleischincturen [Ry 980], als Zusatz zu Mund- u. Gurgelwässern [Ry 285 (Cort. Chin. fusc.), 390 (Extr. Ratanh.), 879 (Rad. Ratanh.), 1059 (Tinct. Catechu), 1062 (Tinct. Lavcae)].

980.

Ry Balsami Peruviani
Tinct. Catechu ana Dr. 1
— Myrrhae Dr. 2

Spir. Cochleariae Unc. 1.

M. D. — Zahnfleischinctur, umgeschüttelt, mit einer Schwammbürste zu appliciren.

+ *Spiritus Cochleariae compositus* (Spir. anti-scorbuticus) PH. SLESV. [Spir. Cochlear. 12, Liq. pyro-tart. 8, dazu rohe Schwefelsäure 1 getropfelt; überdestillirt. — 1 Unze 4 Sbl.] Cave wie bei *Mixt. pyro-tartur.* — Innerl. etwa zu 20–40 Tropfen mehrmals tägl., verdünnt [in Zuckerwasser, einem aromatischen Wasser, oder anderen Mixturen].

+ *Spiritus coeruleus* PH. HANN. [Hb. Absinth., Scord., Sabin., Fl. Lavand. ana 2 $\frac{1}{2}$, Spir. Frumenti 96; davon 54 abdestillirt; dazu Grüsepap. $\frac{3}{4}$, Liq. Ammon. caust. 9. — 1 Unze 2 Mgr., 6 Unz. 9 Mgr.] Zu Umschlägen.

Spiritus Formicarum. Ameisenspiritus. [Wässrig-geistiges Destillat, über 1 Pf. 2 Pf. abgezogen. — Enthält das äther. Öl und die Ameisensäure. — 1 Unze 2 $\frac{1}{2}$ Sgr.] Cave wie bei *Formicae.* —

Innerl. (selten) zu 20–60 Tropfen einigemal tägl. — Äusserl. zu Waschungen u. Einreibungen [R_y 981. — Ums Auge, z. B. bei Augenliederlähmung, verdünnt oder pur].

981.

R_y Tinct. Cantharidum Dr. 2
Spir. Formicarum

Spir. camphorati ana Unc. 3.
M. D. S. 2mal tägl. etwas erwärmt einzureiben. (Bei atonischen Rheumatismen, Lähmungen u. dgl.) VOGT.

Spiritus Frumenti s. s. 460.

Spiritus Juniperi (Baccarum). Wachholdergeist. [Wässrig-geistiges Destillat; 15 auf 60. — 1 Unze 1 $\frac{3}{4}$ Sgr.] Innerl. zu Scr. 1–Dr. 1 einigemal tägl., seltner pur als in Mixturen [R_y 982. — Kali acet. Dr. 2 in Spir. Junip. Unc. $\frac{1}{2}$ gelöst, 4mal tägl. 20–80 Tropfen: SUNDELIN]. — Äusserl. zu Umschlägen, Waschungen u. Einreibungen [R_y 747 (Ol. Caryophyll.), 776 (Ol. Tereb.), 793 (Petrol.); vgl. auch Spir. camphorat.].

982.

R_y Spir. nitrico-aetherei Dr. 1
— Juniperi Unc. $\frac{1}{2}$

Succi Juniperi inspiss. Unc. 1
Aq. Petroselinii Unc. 6.
M. D. S. 3stündl., umgeschüttelt, 2 Essl.
(VAN SWIETEN.)

Spiritus Lavandulae. Lavendelgeist. Eau de Lavande. [1 Unze 1 $\frac{1}{2}$ Sgr.] Äusserl. als Riechmittel [auch zum Sprengen in Krankenzimmern: I. §. 245.]; zu Waschungen u. Einreibungen [R_y 794 (Petrol.); vgl. auch Liq. Ammon. anis.].

† **Spiritus Lavandulae compositus** PH. HANN. [Zimmt u. Muskatnuss ana $\frac{1}{2}$, † Sandelholz $\frac{1}{2}$, mit Spir. Lavand. 45, Spir. Rosmar. 15 digerirt. — 1 Unze 4 Mgr.] Innerl. etwa zu 1 Theelöffel einigemal tägl. — Äusserl. als Riechmittel u. zu Waschungen. [Das gleichnamige Präparat der PH. SLESV. (1 Unze 6 Shl.) ist viel stärker und nur zum äusserl. Gebrauch geeignet.]

Spiritus Mastiches compositus. Spir. matricalis. Zusammengesetzter Mastixgeist. [Über Mastix, Myrrhe, Weihrauch ana 3 $\frac{1}{2}$ (zusammen also 10) Weingeist 60 abdestillirt. — 1 Unze 2 $\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. (selten) zu Scr. 1–2, einigemal tägl. — Äusserl. als Zusatz zu Zahnfleischincturen; zu Waschungen; zum Eintropfeln in unreine Geschwüre; u. s. w. Badespiritus: R_y 767 (Ol. Orig. cret.).

† **Spiritus Melissa compositus** PH. SLESV. Aqua Carmelitana. Zusammenges. Melissengeist. Carmeliterwasser. [Geistig-wässriges, doch weit mehr wässriges, Destillat von

frischem Melissenkraut, frischen Citronenschalen, Muskatnuss, *Rad. Angel.*, Wurzeln u. Zimmtcassie. — 1 Unze 3 Sbl.] Innerl. zu 1 Theelöffel, u. diese Gabe nöthigenfalls ein Paar Mal wiederholt [bei hysterischen Zufällen].

† *Spiritus Menthae piperitae* Ph. P. [Bereitungsangabe fehlt! — 1 Unze 2 Sgr.]

★★ *Spiritus Mindereri.* [Liq. Ammon. acet. u. Aq. destill. ana. — 1 Unze 2½ Sgr.] Wie *Liq. Ammon. acet.*, nur in doppelt so grosser Gabe. [Ry 85 (*Ammoniac. depur.*.)]

Spiritus muriatico-äthereus. Spir. Salis dulcis. Aether muriaticus alcoholisatus. Salzäthergeist; versüsseter Salzgeist; Salzölgeist; ätherischer Salzölweingeist. [Spec. Gewicht = 0,835–0,845. — 1 Drachme ⅔ Sgr.] *Cave:* vgl. *Spirr. aetherei*; besonders aber Schwefelsäure, Alkalien.

Innerl. zu 10–30 Tropfen öfters tägl. [Auf Dr. 1 gehn ungefähr 90 Tropfen.] Darreichungsweisen wie bei *Spir. sulphur. - aeth.*; oft bloss mit einem Syrup [etwa Dr. 1 auf Unc. 1, theelöffelweise]. Ry 293 (*Cort. Chin. reg.*), 459 (*Hb. Cochlear.*), 873 (*Rad. Levist.*), 958 (*Secale cornut.*).

Äusserl. als Pinselsaft [Dr. 1–2 auf *Mell. rosati* Unc. 1. — Ry 983; 382 (*Extr. Myrrh.*)], als Zusatz zu Gurgelwässern [Dr. 1–2 auf Unc. 6]; zu Einreibungen [z. B. Ry 1073 (*Tinct. Opü simpl.*)], u. s. w.

983.

Ry *Spir. muriatico-ätherei*
Extr. Chinae fuscae frig. par. ana
Dr. 1
Aq. Rutae Unc. 1

Mell. rosati Unc. ⅓.
M. D. S. Pinselsaft; umgeschüttelt.
(Gegen brandige Bräune bei Kindern.)
WENDT.
Zweckmässiger wohl etwas weniger
Wasser, damit der Saft dicker werde.

Spiritus Nitri fumans. Acidum nitroso-nitricum. Rauchender Salpetergeist; rauchendes Scheidewasser; salpetrige Salpetersäure. [Ein Gemisch von Salpeter- und salpetriger Säure. Specif. Gewicht = 1,50–1,55. — 1 Unze 3½ Sgr.] *Cave* wie bei *Acid. nitric.* [Säction. Ausnahme: Ry 770.]

Selten innerlich (≠), zu wenigen Tropfen mehrmals tägl.; gegen oriental. Cholera in stärkeren Gaben empfohlen [Ry 984–986].

Meist nur äusserl.; als Ätzmittel [wie *Acid. nitric.*; wirkt noch kräftiger]; oder verdünnt zu Injectionen [Scr. 1–Dr. ⅓ auf Wasser L. 1: FRICKE im späteren Verlaufe der Gebärmutter-Blehnorrhöe mit weissem, dünnem, wässerigem Secret], Linimenten [Scr. ⅓ auf Unc. 6:

FRICKE zum Betupfen syphilitischer Flecke im Gesicht], Bädern [Unc. 1-2: FRICKE bei syphilitischen Ausschlägen].

984.

Ry *Spir. Nitri fumantis* Dr. $\frac{1}{2}$
Decocti Sem. Avenae excort. L. 1
Syr. simpl. Unc. 1.
M. D. S. Alle 2-1 St. 1 Essl. (Bei secundärer Syphilis. — Daneben Holztränke, schmale Diät u. s. w.)

FRICKE.

985.

Ry *Spir. Nitri fumantis* Dr. $\frac{1}{2}$ -1
Decoct. Rad. Colombo (e Dr. 2-4 parat.) Unc. 4.
M. D. S. Stündl. 1 Essl., in veräusertem Haferischleim. (Gegen oriental. Cholera.)

BOWES.

986.

Ry *Spir. Nitri fumantis* Dr. 1
Aq. Menth. pip. Unc. 1
Tinct. Opii simpl. Gtt. 40.
M. D. S. Alle 3-4 St. den 4ten Theil dieser Mixtur in einer Tasse veräusert Hafererschleims. (Statt der *Aq. Menth. pip.* nimmt der Autor auch bisweilen eben so viel *Mixt. camphorata* PH. LOND. [die mit nur ungefähr $\frac{1}{2}$ so viel Campher bereitet ist, aber dennoch wohl eben so viel enthalten mag, als die der PH. BOR.]. Dabei schleimiges Getränk [immer nur in kleinen Portionen], trockene heisse Tücher auf den Unterleib, Wärmflaschen an die Füße. — Gegen oriental. Cholera.)

HOPE.

Spiritus nitrico-aethereus. Spir. Nitri dulcis. Aether nitricus alcoholicusatus. Salpeteräthergeist; veräusert Salpetergeist. [Spec. Gewicht = 0,840-0,850. — Reagirt gewöhnlich etwas sauer. Verändert die Farbe verschiedener organischen Stoffe, namentlich Pflanzen-Auszüge. — 1 Drachme 1 Sgr.] *Cave:* vgl. *Spiritus aetherei*; besonders aber Alkalien; Luft. Man hüte sich auch, ihn, namentlich in grösseren Mixturen, Elixiren, auf längere Zeit zu verordnen [er soll sich hier leicht zersetzen und salpetrige Dämpfe entwickeln].

Innerl. zu 10-25 Tropfen öfters tägl. [Auf Dr. 1 gehn ungefähr 100 Tropfen.] Darreichungsweisen wie bei *Spir. sulphur.-aether.* [Ry 987; 14 (*Acet. scillit.*), 138 (*Bacc. Junip.*), 469 (*Hb. Digital.*), 758 (*Ol. Junip.*), 909 (*Rad. Scill.*), 982 (*Spir. Junip.*), 1025 (*Tart. boracat.*); vgl. *Bals. Copaiv.*]

987.

Ry *Spir. nitrico-aetherei* Scr. 2
Aq. Rosarum Unc. 6

Syr. Rhoeados Dr. 6.
M. D. S. Stündl. 2 Essl.

VOGEL.

Spiritus Rosmarini s. Anthos. Rosmaringeist. [1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr. — Zu gleichen Zwecken dienend, noch kräftiger und angenehmer ist die, aus Rosmarin u. Lavendel mit Franzbranntwein bereite, *Aqua Hungarica* (s. *Anthos composita*, Ungarisches Wasser) der PH. SLESV. (1 Unze 4 Sbl.); eben so die aus Rosmarin, Salbei u. Ingwer bereite *Aq. Reginae Hungariae* PH. HANN. (1 Unze $2\frac{1}{2}$ Mgr., 6 Unz. 12 Mgr.)] Äusserl. als Riechmittel, zu Waschungen [z. B. zu Augenwaschungen etwa Unc. $\frac{1}{2}$ auf Unc. 4] u. dgl. — Unc. 1 mit 6 Tropf. Anisöl, auf Löschpapier getropft auf die Magengegend zu legen: VOGEL gegen das Erbrechen durch Fahren p. p.

* *Spiritus Rosarum.* Rosenspirit. [*Ol. Rosar.* Scr. 1 auf 6 Unzen Sprit; filtrirt. — 1 Unze 4½ Sgr.] Statt weniger theurer Spiritus als Riechmittel, oder — drachmen- od. selbst unzenweise — zu Waschwässern u. a. kosmetischen Mitteln.

Spiritus saponatus. Seifenspirit. [*Sapo Hispan.* alb. 1 auf *Spir.* *V.* rst. 3, Rosenwasser 1. — 1 Unze 1½ Sgr. Oft durch häusliche Bereitung ersetzt, s. *Sapo domest.*] Nur äusserl., zu Einreibungen, Waschungen [R_x 988], p. p. Badespirit: R_x 767 (*Ol. Orig. cret.*).

988.

R_x *Tinct. Benzoës* Dr. 2
Spir. saponati Unc. 1

Aq. Florum Aurantii— *Rosarum* ana Unc. 4.

M. D. S. Zum Waschen, umgeschüttelt.

Spiritus Serpylli. Quendelgeist. [1 Unze 1½ Sgr.] Zu Einreibungen, Waschungen, Linimenten [R_x 155 (*Bals. Peruv.*). Badespirit: R_x 767 (*Ol. Orig. cret.*)], als Zusatz zu Mund- u. Gurgelwässern, u. s. w.

Spiritus sulphurico-äthereus. Spir. Vitrioli dulcis. Aether sulphuricus alcoholicisatus. Liquor anodynus mineralis Hoffmanni. Schwefeläthergeist; versüßte Schwefelsäure; Hoffmannstropfen. Liquor (*κατ' ἔξοχον*). [*Aether sulphur.* 1, Sprit od. in Ermangelung dessen *Spir. Vini* rstiss. 3. — Spec. Gewicht = 0,855–0,865. — 1 Unze 4 Sgr.] *Cave* wie bei *Aether sulph.* — Vgl. *Spiritus ætheri*.

Innerl. zu 10–30 Tropfen öfterstägl.; in dringenderen Fällen [z. B. Ohnmachten, Krämpfen] zu 20–60 Tropfen einmal od. einigemal bald hinter einander. [Auf Dr. 1 gehn ungefähr 120 Tropfen.] Pur [auf Zucker oder — namentlich die grösseren Gaben — mit Zuckerwasser, Thee, Wein od. dgl. verdünnt] oder in Tropfenmixturen, Linctus [vgl. *Aetheres*, S. 32], Juleps u. s. w. [Dr. ½–1½ auf den Tag]; als Zusatz zu Aufgüssen, Abkochungen, Elixiren u. s. w. [R_x 149 (*Bals. Copaiv.*), 656 (*Liq. Ammon. succin.*), 761 (*Ol. Ment. pip.*), 1070 (*Tinct. Opii simpl.*); vgl. auch *Camph.*, *Ol. anim. æther.* u. *foetid.*, *Ol. Macid.*, u. v. a. Beispiele.]

Äusserl. wie *Aether sulphur.* [vgl. den Artikel], wo eine weniger kräftige Einwirkung erfordert wird; so als Riechmittel, zu Injectionen [Ohrtropfen: R_x 35 (*Acid. pyro-lign. crud.*). Zahntropfen: R_x 1067 (*Tinct. Opii croc.*)], Einreibungen, als Augentmittel, u. s. w. — ITARD's „Fumigation“ als Palliativ bei nervöser Otalgie: Dr. 3 (doch ist das Präparat der PH. GALL. stärker als das der PH. BOR., also von dem letzteren verhältnissmässig mehr) mit Wasser Unc. ½ in ein Fläsch-

chen gethan, und dies, während man die Öffnung gegen den Gehörgang richtet, in ein mit warmem Wasser gefülltes Gefäss getaucht.

Spiritus sulphurico-äthereus ferruginosus s. martiatus. Liqueur anodynus martialis. Tinctura tonico-nervina Bestucheffii s. aurea nervino-tonica Lamottii. Eisenhaltiger Liqueur; schmerzstillender Eisenliqueur; Bestucheffsche Nerventinctur; Lamottesche Goldtropfen. Ätherische Tinctur von salzsaurem Eisenoxyd. [Besteht aus Eisenchlorür, Schwefeläther, Chlornaphtha (wenig) und Weingeist. Spec. Gewicht = 0,830 - 0,840. — Ziemlich farblos, wird aber im Finstern nach einiger Zeit goldgelb; der Kranke bewahre sie im Hellen auf. — 1 Drachme $1\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave* wie bei *Ferrum muriat. oxydulat.*, ausserdem die Substanzen, welche mit Chlor eine unauflösliche Verbindung bilden.

Innerl. zu 10-30 Tropfen einigemal tägl., auf Zucker oder in einem aromatischen Wasser, in Wein, Mixturen [R_y 932 (*Rad. Valer. min.*)].

Spiritus Vini. Weingeist. [Der (in der ärztlichen Praxis nicht vorkommende) absolute Alcohol lässt sich bekanntlich mit Wasser in allen Verhältnissen mischen und stellt so die verschiedenen Abstufungen des wässrigen Weingeists, welche ärztlich, diätetisch u. s. w. angewandt werden, dar. Weingeist (doch nicht immer in allen seinen Verdünnungstufen) löst ohne Zersetzung (wenigstens ohne bald erfolgende; zuweilen erfolgt später Zersetzung) auf: die meisten organischen Säuren; ätzendes Ammonium, alle Alkaloïde; viele Salze (besonders alle zerfliesslichen Salze anorganischer Säuren, *Kali carbon.* ausgenommen); Seifen; Schwefellebern; Gerbstoff; Harze (nicht immer vollständig); ätherische (auch brenzlich-ätherische) Öle, Campher; natürliche Balsame (nicht immer vollständig); fette Öle und Fette (meist nur die stärkeren Weingeiststufen); die (verdünnten u. unverdünnten) Ätherarten; Zucker; die meisten Extractivstoffe; mehrere indifferenten stickstoffhaltigen Substanzen (z. B. Coffein, Piperin); u. s. w.; — von Salzen, Gerbstoff, Zucker, Extractivstoffen u. a. um so mehr, von Harzen, äther. Ölen, Campher, Balsamen, Ätherarten, um so weniger, je wässriger er ist.] *Cave*: s. I. S. 37 sub 18. [bei manchen Weingeistarten könnte auch das (ätherische) Fuselöl, beim Franzbranntwein u. Sprit bisweilen eine geringe Beimischung von Gerbstoff, auf leicht zersetzliche Substanzen, z. B. Sublimat, Salzbilder, Blausäure, zersetzend einwirken, und es sind alsdann jene Weingeistarten zu meiden].

— Die Ph. Bor. führt folgende Weingeistarten auf:

1. **Spiritus Frumenti.** (*Spir. ardens. Vinum adustum. Aqua Vitae.*) Kornbranntwein. [Schmeckt und riecht stark nach Fuselöl. — Spec. Gewicht = 0,940 - 0,950; folglich Procente reinen Alcohol nach Lowitz: $34\frac{1}{2}$ - $39\frac{1}{2}$. — 1 Unze $\frac{1}{3}$ Sgr.]

2. **Spiritus Vini rectificatus.** Rectificirter Weingeist. [Spec. Gewicht = 0,895 - 0,905; Procente reinen Alcohol: $55\frac{1}{2}$ - $60\frac{1}{2}$. — 1 Unze 1 Sgr.]

3. Spiritus Vini rectificatissimus. Höchst rectificirter Weingeist. [Oft *Alcohol Vini*, Alcohol schlechtweg genannt, obwohl diese Benennung besser auf die folgende wasserfreierte Stufe passt. — Spec. Gewicht = 0,835–0,845; Procente reinen Alcohols: 81–85. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr.]

4. Spiritus Vini alcoholisatus. Alkoholisirter Weingeist. [Spec. Gewicht = 0,810–0,820; Procente reinen Alcohols: 91–95. — 1 Unze $3\frac{1}{2}$ Sgr.]

5. Spiritus Vini Gallici. Franzbranntwein. [Gelblich. Enthält weit weniger Fuselöl, und dasselbe von weniger unangenehmem Geschmack, als der *Spir. Frumenti*. — Spec. Gewicht = 0,940–0,950; Procente reinen Alcohols: $34\frac{1}{2}$ – $39\frac{1}{2}$. Er entspricht also in der Stärke dem *Spir. Frumenti*. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr.]

6. Spiritus Vini Gallici fortior. Sprit. [Farblos; ziemlich frei von Fuselöl. — Spec. Gewicht = 0,875–0,885; Procente reinen Alcohols: $64\frac{1}{2}$ – $68\frac{1}{2}$. Er steht also in der Stärke zwischen *Spir. V. rectificatus* u. *Spir. V. rectificatissimus*, dem ersteren näher. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerl. wendet man, wenn man den Weingeist als Arznei selbst, nicht bloss als Menstruum andrer Arzneistoffe benutzen will, nur den *Spir. Vini rectificatus* [theelöffelweise (doch in der Regel nicht pur, sondern mit etwas Wasser) öfters tägl., oder eine grössere Dose kurz vor der Mahlzeit; bei Gewöhnung an geistige Getränke grössere Gaben. — *Potus spirituosus* PH. P., aus *Spir. V.* rst. Unc. 1, *Aq. comm.* L. 2, *Syr. commun.* Unc. 1, ist wohl sehr entbehrlich, und, da er doch nur für sehr Arme bestimmt ist, durch Kornbranntwein mit Wasser zu ersetzen.] und den *Spir. Vini Gallici* [in etwas grösserer Gabe] an; höchstens bei Armen statt des letzteren den stark fuselnden [u. deshalb bei Wohlhabenden kaum äusserlich anzuwendenden] Kornbranntwein [versteht sich, nicht aus der Apotheke entnommen]. — Das Publicum benutzt diätetisch (!?) ausser dem Kornbranntwein und dem Franzbranntwein [namentlich dem Cognac, einer geschätzteren Sorte des Franzbranntweins] auch noch den Rum, *Spiritus Sacchari* [Dieser ist in der Stärke sehr verschieden: der, den man gewöhnlich trinkt, hat nur 40–45 Procent Alcohol; guter Jamaica-Rum aber hat oft bis zu 65 Procent, ist dann nicht mehr unvermischt zu trinken, sondern nur noch zu Punsch od. dgl. zu gebrauchen. — Taffia, Rataffia, ist eine schwache Sorte des Zuckerbranntweins.], den Arrak, Rak, *Spir. Oryzae* [der in der Regel nur einige vierzig Procent hat. — Man kann gewöhnlichem Branntwein, indem man Reis in ihm maceriren lässt, den Geschmack und Geruch des Arraks geben.], den Kirschegeist [„Baseler Kirschwasser“, in vielen Gegenden den [sehr stark fuselnden, deshalb in der Regel nur von Armen getrunkenen, wegen seiner nachtheiligen, namentlich leichtsäuerferwahnung erzeugenden, Wirkung sehr verrufenen] Kartoffelbranntwein, u. a. [so wie auch bekanntlich Weingeist (namentlich oft Koss- od. Franz- Branntwein), welcher durch nochmalige Destillation über ätherisch-ölige Pflanzenstoffe, oder durch directes Auflösen von äther. Ölen in ihm, einen angenehmeren Geschmack u. Geruch erhal-

ten hat, — die verschiedenen sogenannten *Liqueurs*]. — Verschiedene gebräuchliche componirte Getränke s. im Anhang.

Auch äusserl. bedient man sich in der Regel nur der unter „Innerl.“ aufgeführten Weingeistarten [verdünnt oder nicht; über den Grad der Verdünnung lässt sich wenig Allgemeines sagen] zu Mund- u. Gurgelwässern, Zahntincturen, Einspritzungen [z. B. des *Spir. V. rst.* mit 1–3 Theilen Wasser verdünnt, oder im Nothfall des *Spir. Frumenti* mit 1–2 Theilen Wasser verdünnt, zu Injectionen in die Genitalien bei Metrorrhagien mit dem Charakter der Paralyse; oder des *Spir. V. rst.* mit 6–8 Theilen Wasser verdünnt, bei torpidem Nachtripper], Augewässern [zu Augen-Waschungen u. Bähungen *Spir. V. rst.* Dr. 2–Unc. 1 auf Unc. 4, oder häufiger *Spir. V. Gallici* Unc. $\frac{1}{2}$ – $1\frac{1}{2}$ auf Unc. 4], Waschungen, Einreibungen, Umschlägen, Bädern [zu einem allgemeinen Bade 3–8 Quart Kornbranntwein, bei sehr Reichen Franzbranntwein. — Bei ganz Armen schlagen Einige vor, 2–6 Eimer Branntweinspüllicht zu nehmen, aber dieses variirt sehr und ist meistens sehr unkräftig, sehr arm an Alkohol, während es durch Gehalt an Essigsäure p. p. Nebenwirkungen erhält.], auch Dampfbädern [zu den (namentlich gegen oriental. Cholera empfohlenen) Dampfbädern, welche durch Verbrennen des Weingeists unter dem Sitze oder Lager des (umhüllten) Kranken instituiert werden (I. S. 387), kann man $\frac{1}{8}$ – $\frac{1}{6}$ Quart gewöhnlichen Brennspiritus in ein oben ganz offenes blechernes Gefäss (von etwa 4–5 Zoll im Querdurchmesser) thun; doch braucht nicht gerade diese ganze Portion zu verbrennen, sondern man hört auf, sobald die erwünschte Wirkung erreicht ist], u. s. w.

Spongiae ceratae. Wachsschwamm. [Dünne Badeschwämme in Wachs getränkt und stark gepresst. — 1 Drachme $1\frac{1}{2}$ Sgr.] Und

Spongiae compressae. Pressschwamm (mit welchem Namen jedoch auch wohl die vorigen bezeichnet werden). [Badeschwämme von feinerer Textur, in längliche Stücke geschnitten, mit heissem Wasser befeuchtet und mit Bindfaden — der erst beim Gebrauch abgenommen wird — dicht u. stark zusammengesehnürt, zu fingersdicken Cylindern. — 1 Drachme $3\frac{1}{2}$ Sgr.] Zu chirurgischen Zwecken.

Spongia marina. Meer-, Bade-, Wasch- od. Apotheker-Schwamm. [Sehr grosse: 1 Unze $13\frac{2}{3}$ Sgr.; mittelgrosse: $8\frac{1}{2}$ Sgr.]

Stannum raspatum s. limatum. Rasura s. Limatura Stanni. Geraspелtes Zinn. Zinnfeile. [1 Unze $2\frac{1}{2}$ Sgr. — Die PH. AUSTR. hat ausser dem *Stann. limat.* auch noch das gröbere & *granulatum*, s. S. 2, Note.]

Innerl. zu Scr. 1–Dr. 2 ein Paar Mal tägl. Weniger gern in Pulver [wozu es erst noch gesiebt (so dass die gröberen Partikeln im Siebe zurückbleiben) werden muss, dadurch aber an Wirksamkeit verlieren möchte] als

in Latwerge [die steif zu halten. — Ry 989, 990] oder Bissen. Nach einigen Dosen ein Abführmittel.

Äusserl. zu Augenpulvern [ebenfalls das Feinste abgeseibt und nicht unvermischt; doch ist es wohl überhaupt zu diesem Behuf nicht zu empfehlen, denn ein recht feines Pulver erhält man nie, und das grobe dürfte sehr reizen. — Ry 991, 992].

989.

Ry *Stanni raspati* Unc. 1
Extr. Gentianae Dr. 2
Mellis communis q. s.
 ut f. *Electuar. spiss. D. S.* Alle 3 St.,
 umgerührt, 2 Essl. P. FRANK.

990.

MATTHIEU'S Methode
 gegen den Bandwurm.

Ry *Tart. natronati pulv.*
Rad. Jalapae pulv. ana Dr. 1
Sem. Cinae pulv. Unc. $\frac{1}{2}$
Rad. Filicis pulv. Dr. 6
Stannl raspati Unc. 1
Mell. commun. q. s.
 ut f. *Electuar. spiss. D. S.* Alle 2 St.,
 umgerührt, 1 Theelöffel.

Ry *Gutti pulv.* Scr. $\frac{1}{2}$
Scammonii Halepens. pulv. Scr. 1
Tart. natronati pulv.
Rad. Jalapae pulv. ana Scr. 2
Mellis commun. q. s.
 ut f. *Electuar. spiss. D. S.* Alle 2 St.,
 umgerührt, 1 Theelöffel.

(Nachdem der Kranke mehrere
 Tage eine sparsame Diät geführt —

dünne Brodsuppen, leichte Gemüse, be-
 sonders salzige Speisen, als Häring u.
 dgl. —, giebt man die Latwerge a. 2-3
 Tage lang, bis er Empfindungen von dem
 Wurm in den Gedärmen bekommt; dann
 die Latwerge b., bis der Wurm abgeht;
 sollte dies Abgehen nicht erfolgen, so
 giebt man einige Essl. Ricinus-Öl nach,
 oder ein Klystier von diesem Öl. —
 Es ist erlaubt, die Dosen dieser Mittel
 nach der Individualität des Kranken zu
 modificiren.)

991.

Ry *Stanni subtiliter pulverati* Scr. $\frac{1}{2}$
Boracis Dr. 1
Sacch. albi Dr. 2.
M. f. Pulv. D. S. 2mal tägl. mit einem
 trocknen Pinsel aufzutupfen. (Bei ady-
 namischen Hornhauttrübungen.)
 JÜNGKEN.

992.

Ry *Ferri sulphur. cryst.* Gr. 4
Stanni subtiliter pulv. Dr. 1
Sacch. albi Dr. 2.
M. f. Pulv. D. S. Wie das vorige. (Bei
 hartnäckigen Verdunkelungen der Horn-
 haut.)
 BORRHAUVE.

*Stibium oxydatum album. Antimonium diapho-
 reticum ablutum. Acidum stibiosum et stibicum.*
 Weisses Spiessglanzoxyd. (Verbindung von antimoniger
 u. Antimon-Säure.) [Pulver. — 1 Drachme $1\frac{2}{3}$ Sgr.] Sonst wohl zu
 Scr. $\frac{1}{2}$ - Dr. $\frac{1}{2}$, 2-3mal tägl., in Pulver [vgl. *Kali sulphuric. dep.*],
 Pillen, Latwerge, Schüttelmixtur u. s. w.; jetzt ziem-
 lich obsolet [obwohl aus Frankreich kürzlich wieder empfohlen].

*Stibium sulphuratum nigrum (Sulphuretum Sti-
 bii nigrum) laevigatum. Antimonium crudum praepara-
 tum s. alcoholisatum.* Fein gepulvertes schwarzes

Schwefelspiessglanz. [1 Unze $4\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave* starke Säuren [besonders Salpetersäure, Salzsäure].

Innerl. zu Gr. 5–20, 2–4mal tägl., in Pulver [Ry 993; 549 (*Hydrarg. oxyd. rubr. ppt.*)], Morsellen [offic. *Mors. antimoniales Kunkeli*], Pillen [Ry 338 (*Extr. Acon.*)], oder grössere Gaben in Bissen [Ry 369 (*Extr. Dulcam.*)], 941 (*Resin. Guaj. nat.*)]; nicht recht passend in Latwergen [seiner Schwere wegen; wenigstens müssen die Latwergen sehr steif seyn. — Ry 448 (*Graphit.*)]. — Abkochungen (bei längerem Kochen wird es zerlegt, Schwefelwasserstoffgas entwickelt und Antimonoxyd ausgeschieden) sind als unzweckmässig ausser Gebrauch gekommen, ausser etwa noch in einigen alten Compositionen, z. B. in den Decocten von FELL u. POLLIN, Ry 892, 893.

993.

Ry *Stibii sulphurati nigri laevig.* Dr. $\frac{1}{2}$
Magnes. carbon. Gr. 5
Cassiae cinnamom. Gr. 4

Sacch. albi Dr. $\frac{1}{2}$.
M. f. Pulv. Disp. tales nr. —. *D. S.*
 Früh u. Abends ein halbes Pulver.
Pulv. antimonalis PH. P. (1 Drachme $\frac{2}{3}$ Sgr.)

Stipites (Caules) Dulcamarae. Bittersüßstengel. Alp- od. Alf-Ranken. [Hauptbestandtheil: Solanin (Alkaloid, in Wasser sehr wenig, leichter in Weingeist löslich). — 1 Unze conc. $\frac{5}{8}$, sub. pulv. $1\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave:* s. I. S. 33 *sub b.* [mit sanction. Ausnahmen, z. B. Ry 524]; besonders aber Gerbstoff.

Innerl. zu Scr. $\frac{1}{2}$ –Dr. $\frac{1}{2}$ einigemal tägl., in Pulver, Bissen [Ry 994; 181 (*Calcar. sulphurata*), 369 (*Extr. Dulcamar.*)], Latwerge, Aufguss [z. B. mit 2–3 Theilen *Spec. ad Infus. pect.*, ein gewöhnlicher Thee gegen Husten], Ebullition oder leichter Abkochung [tägl. Dr. 2–4–6, mit Unc. 8 oder 16 auf Unc. 6 oder 12 gekocht; auch wohl mit Milch abgekocht; etwa mit einem kleinen aromatischen Zusatz (einer Tinctur od. dgl.). — Ry 298 (*Cort. Mez.*)]. — *Decoct. Dulcam.* PH. MIL.: Unc. 1 mit L. 2 auf Unc. 16].

Ausserl. in concentrirter Abkochung [Unc. $\frac{1}{2}$ –1 mit Unc. 8 auf Unc. 6] zu Waschungen, Umschlägen.

994.

Ry *Sulph. stibiati rubei*
Rad. Ipecacuanh. pulv. ana Gr. $\frac{1}{2}$
Stipit. Dulcam. pulv. Scr. 1

Extr. Glycyrrhizae q. s.
ut f. Bolus. Disp. tal. nr. 12. Cons.
Pulv. Rad. Glycyrrh. *D. S.* 3–4mal
 tägl. 1 Stück.

* **Stomachus vitulinus exsiccatus.** *Ventriculus v. s.* Kälberlaab. [1 Drachme $1\frac{1}{2}$ Sgr.] Zur Bereitung der süssen Moken, s. I. S. 316.

Strobili Lupuli. *Coni s. Flores s. Turiones Lupuli s. Humuli.* Hopfen. [Hauptbestandtheile: äther. Öl, Harz und Hopfenbitter

(Lupulit, in Wasser schwer, in Alcohol leicht löslich; nicht zu verwechseln mit Lupulin, dem gelben Staube des Hopfens, der auch — vgl. MAGENDIE *Forsch. z. Bereitg. u. Anw. einiger neuen Arzneimitt.* etc. 6te Aufl, Lpz. 1831 — als Arzneimittel angewandt worden). — 1 Unze conc. 2 $\frac{2}{3}$ Sgr.] *Cave* Salzbilder; viele Metallsalze, namentlich Eisensalze.

Innerl. selten in Pulver, etwa zu Gr. 5–15 einigemal tägl. [Gr. 3 — eine, wie es scheint, doch gar zu kleine Dose — vor Schlafengehn statt des Opium als Schlafpulver: NIEMANN]; meist in Aufguss [namentlich Digestionsaufguss; mit Wasser, Wein oder Weingeist; Dr. 6–8 auf Unc. 6, esslöffelweise. — Ry 909 (*Rad. Scill.*)], weniger zweckmässig in Abkochung. — (Hopfenbier.)

Ausserl. in Substanz zu Kräuterbetten [theils für rhachitische Kinder: hier doch nicht unvermischt, des betäubenden Geruchs wegen; theils — als Kopfkissen — bei Schlaflosigkeit: auch hier vorsichtig]; selten zu Kataplasmen [etwa gröblich gepulvert in den aus Hafergrütze, Leinsamen od. dgl. und Wasser gekochten Brei eingerührt]; extrahirt zu Bädungen [offic. *Spec. ad Foment.*], Bädern [Unc. 4–8].

† *Strychninum*. Strychnin. Brechnuss-Alkaloid. [Pulver, sehr bitter schmeckend, mit fast metallischem Nachgeschmack. In Wasser bei mittlerer Temperatur fast unauflöslich (*Sol.* 7000). — Ist das giftigste Alkaloid. Bildet mit Säuren (namentlich auch durch Zersetzung der meisten Metallsalze) die Strychninsalze, welche meist leicht löslich sind, unerträglich bitter schmecken und fast noch giftiger wirken als das reine Strychnin. — 1 Gran 4 Mgr.] *Sol. Spir. V. rftiss.* 20. — *Cave*: besonders Säuren [magnetral Salze zu bilden (vgl. oben) ist nicht rathsam, weil man die Quantität des sich bildenden Salzes nicht genau kennt und bei neuen, noch nicht versuchten Salzen überdies nicht weiss, wie heftig sie wirken]; Salzbilder; Iodkalium; Metallsalze [namentlich Silber-, Quecksilber-, Gold-Salze]; Gerbstoff.

Innerl. zu Gr. $\frac{1}{18}$ oder $\frac{1}{12}$, steigend bis zu Gr. $\frac{1}{4}$; 2mal tägl. In Pillen [vorher in *Spir. V. rftiss.* aufgelöst, dann *Pulv. Rad. Glycyrrh.* und *Extr. Glycyrrh. q. s.* zugesetzt, so dass Gr. 1 etwa auf 32 Pillen vertheilt wird].

Endermatisch [anfange etwa zu Gr. $\frac{1}{8}$ – $\frac{1}{6}$ (1–2mal tägl.), sehr vorsichtig steigend bis zu Gr. 2 (od. mehr); bei Empfindlichen in Salbenform. (Man darf und muss bisweilen so weit steigen, bis leichte Zuckungen eintreten; dann aber ist es auch Zeit, ein Paar Tage auszusetzen und die Nachwirkung abzuwarten; für den Fall des Eintretens lebensgefährlicher Symptome halte man *Morphium acet.* zur endermat. Anwendung bereit; aus der Kinderpraxis bleibe das Mittel gänzlich ausgeschlossen: A. L. RICHTER.)].

† *Strychninum aceticum*. *Acetas strychnicus*. Essigsäures Strychnin. [In Wasser leicht löslich. — 1 Gran 3 Mgr.] *Cave*: wie bei *Strychnin. nitric.*; ausserdem starke Säuren.

Innerl. in gleichen Gaben wie † *Strychninum*; in Auflö-

sung [des Geschmacks wegen nicht zu empfehlen. — Gr. $1\frac{1}{2}$ in *Spir. F. rftiss.* Unc. $\frac{1}{2}$, davon vor Schlafengehn 3–4 (allmählig bis 20 od. 30) Tropfen: FRICKE gegen heftige *dolores osteocopi*. — Gr. $1\frac{1}{2}$ in *Spir. F. rftiss.* Dr. $\frac{1}{2}$, *Aq. Cinnam. vinos.* Dr. $3\frac{1}{2}$, 2mal tägl. 10 (u. allmählig mehr) Tropfen: LÜDERS bei Paraplegien], am besten in Pillen [aber hierzu in destill. Wasser aufgelöst, dann *Succ. Glycyrrh. dep.* und *Pulv. Rad. Glycyrrh.* dazu, so dass Gr. 1 etwa auf 32 Pillen vertheilt wird].

Endermatisch [wie † *Strychninum*].

+ *Strychninum muriaticum. Hydrochloras strychnicus.* Salzsaures Strychnin. [In Wasser leicht löslich. — 1 Gran 3 Mgr.] *Cave* wie beim folgenden; ausserdem Sublimat, salpetersaur. Quecksilberoxyd. — Innerl. [in Pillen] wie das vorige. — Endermatisch [wie † *Strychninum*].

* *Strychninum nitricum. Nitrus strychnicus.* Salpetersaures Strychnin. [Wenig auflöslich in Weingeist, leicht in heissem Wasser. — 1 Gran $2\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave* besonders Salzbilder; Alkalien, Bittererde; Iodkalium, *Kali oxymuriat.*, Oxalium, salzsaur. Gold; Gerbstoff. — Innerl. (*ad Grani quadrantem!*) wie † *Strychninum acetic.* [doch zu den Pillen in heissem destill. Wasser aufzulösen]. — Äusserl. endermatisch [wie † *Strychninum*], zur Infusion in die Venen? [Gr. $\frac{1}{8}$ – $\frac{1}{4}$ in 2–3 Unzen Wasser, von DIEFFENBACH und IDELER bei Epileptischen versucht, wirkte sehr heftig und doch nicht günstig].

* *Styrax calamita. Storax. Storax.* [Enthält äther. Öl und Benzoesäure. — 1 Unze 2, *subt. pulv.* 3 Sgr.] Vgl. *Resinae*. — Gegenwärtig, ausser in der *Massa Pilul. e Cynoglosso*, nur noch äusserl.; zu Zahntincturen [selten. — Ry 117]; als Zusatz zu Salben; hauptsächlich aber zu Räucher-Species u. -Pulvern [I. S. 197].

Styrax liquidus. Ambra liquida. Liquidambar. Balsamum Storacis. Flüssiger Storax. Storaxbalsam. [Consistenz salbenähnlich. — 1 Unze $1\frac{5}{8}$ Sgr.] Vgl. *Balsama naturalia*. — Innerl. kürzlich von L'HÉRITIER in 2 unpassenden Formeln empfohlen. Will man ihn [statt des, durch das Aufstossen Manchem sehr unangenehmen, *Copaivabalsams*] versuchen, so gebe man ihn etwa zu Scr. $\frac{1}{2}$ –1 (u. mehr), einigemal tägl.; in Bissen [etwa mit *Pulv. Rad. Ath. q. s.*] oder Emulsion. — Sonst nur noch zur Bereitung des *Ungt. de Styrace* [Ry 995].

995.

Ry *Colophonii* Gr. 16

Elomi

Cerae flavae ana Dr. 1

*liquatis admisce**Styracis liquidi* Dr. 1*Ol. Olivar.* Unc. $\frac{1}{2}$.*Styrace soluto Ungt. cola; refrigeratum**D. S. Storaxsalbe.*PH. HANN., HASS. (1 Unze $3\frac{1}{2}$,

4 Unz. 12 Mgr.)

Succinum. Electrum. Ambra flava. Carabe. Bernstein. Agtstein. [1 Unze *resp.* $1\frac{1}{3}$ Sgr.] Innerl. obsolet. — Nur noch zu Räucher-Species u. -Pulvern [theils bloss wohlt riechenden: offic. Spec. ad suffiend.; theils gegen chronische Rheumatismen, Wassersuchten, u. s. w., mit Bacc. Junip., Tacamahaca u. dgl. m.].

Succus Citri. Citronensaft. [Hauptbestandtheil: Citronensäure. — Der käufliche, italienische, *S. C. Italicus*, ist wohlfeiler (1 Unze $1\frac{1}{8}$ Sgr.), aber weniger angenehm als der frisch ausgepresste (1 Unze 4 Sht.); daher man ihn seltner, bei Wohlhabenden nie, sondern hier immer den *S. C. recen- ter expressus et colatus*, vorschreibt] (Schreibt man *Succ. Citri* ohne Zusatz, so nimmt der Apotheker in der Regel den käuflichen.) — Saturationsfähigkeit s. I. S. 138 Note a.)] *Cave:* wie bei den Essigen [s. 12].

Innerl. theelöffel- oder esslöffelweise; theils pur, theils in Saturationen u. Brausemischungen [vgl. d. Register], auch anderen Mixturen [Ry 996; 723 (*Natr. muriat.*)]; oft als diätetisches und Haus-Mittel [Gegen Scorbut mit Rheinwein u. Zucker ana in beträchtlicher Quantität. — Vgl. † *Flor. Samb.*, † *Sem. Coffeae*]. — Nicht passend in Zuckerwerkformen [I. S. 232, 233]. — Zu Molken [s. I. S. 317]. — Verschiedene Getränke s. im Anhang.

Äusserl. zu Mundwässern [mit Zucker ana Unc. 1, Rothwein L. 1; italienische Spitalformel bei Scorbut], zu Waschungen, Einreibungen [gegen Leberflecke, Sommerflecke u. s. w. Eine Salbe zu diesem Behuf: Ry 972 (*Sem. Sinap.*). — Ry 1055 (*Tinct. Canthar.*)], Umschlägen [so gegen Decubitus; bisweilen hierzu mit Fett q. s. als Salbe].

996.

Ry *Succi Citri rec. expr. et colati* Unc. 1*Ol. Amygdal.* Unc. $1\frac{1}{2}$ *Syr. Althaeae* Dr. $\frac{1}{2}$.*M.D.S.* 3stündl., umgeschüttelt, 1 Essl.

(Gegen hartnäckige chronische Durchfälle, *Fluxus coeliacus* p.p. — ursprünglich Hausmittel.) STEINHEIM.
Die Quantität des Syrups ist sehr gering.

Succus Dauci inspissatus depuratus. Roob Dauci depuratum. Gereinigter Mohrrüben- od. Möhren-Saft. Möhrenmufs. [Consistenz eines dickeren Syrups. — 1 Unze 1 Sgr.] Innerl. pur als Hausmittel *ad libitum*, als Zusatz zu Mixturen unzenweise [nicht Jedem angenehm]; als Constituens von (Pillen, Bissen,) Latwergen, Lecksäften. (Gern als Zusatz zu Brust- u. Wurm-Mitteln.) — Äusserl. als Zusatz zu Mund- u. Gurgelwässern unzenweise, als Constituens von Pinselsäften

[namentlich gegen Aphthen], Cataplasmen [hierzu ist auch der rohe Möhrensaft, *S. D. i. crudus* (1 Unze $\frac{2}{3}$ Sgr.) rein genag. — R_x 463 (*Hb. Conil mac.*)].

+ *Succus Ebuli inspissatus* (*Roob Ebuli*) PH. AUSTR. Attigmußs. [Aus dem Saft der Attigbeeren, *Baccæ Ebuli* (Hauptbestandtheile: Schleimzucker, rother Extractivstoff und wenig äther. Öl) mit etwas Zucker bereitet.] Wie *Succ. Sambuci inspiss. dep.*

Succus Glycyrrhizæ (Liquiritiæ) depuratus.

[Bisweilen *Extr. Liquir.*, welche Benennung jedoch zweckmässiger für das S. 179 aufgeführte Präparat reservirt wird.] Gereinigter Liquiritien-, Lakritzen- od. Süßholz-Saft. [Aus dem käuflichen rohen, *S. G. crudus*, durch Auflösen, Coliren und Wiedereindicken gereinigt, getrocknet u. gepulvert. — 1 Unze $3\frac{5}{8}$, *subt. pulv.* $5\frac{1}{8}$ Sgr. — Zu flüssigen Arzneien ist es dem Apotheker oft bequemer, eine schon fertige Auflösung des Safts anzuwenden; eine solche wird — unter der Benennung *Solutio Liquiritiæ* — in vielen Apotheken vorrätzig gehalten; kennt der Arzt die Concentration derselben, so kann er sie gleich statt des *Succ. Glycyrrh. dep.* verordnen. Die PH. MIL. läßt gleich direct aus dem rohen Süßholzsaft durch blosses Coliren (ohne zuvoriges Wiederaustrocknen u. Pulvern) eine *Solut. Succ. Liquir. concentrata*, die ungefähr $\frac{1}{3}$ ihres Gewichts an Süßholzsaft (nebst $\frac{1}{8}$ *Spir. V. rft.*, der Haltbarkeit wegen) enthält, bereiten (1 Unze 1 Sgr.).] Cave: vgl. *Extract. Glycyrrhiz.*

Innerl. scrupelweise öfters tägl.; in Pulver [nicht gern pur (oder als alleiniges Constituens), weil er Feuchtigkeit anzieht, zusammenbackt, auch am Gaumen klebt], Morsellen [damit er, wenn man ihn in die heisse Zuckermasse bringt, nicht klümpere, mit unauflöslichen Pulvern gemengt. — R_x 1014 (*Sulph. tib. rub.*)], Trochisken [*offic. Troch. bechici.* — R_x 1003 (*Sulph. dep.*)], Bacillen [R_x 997. — Auch pur zu saubren Stangen geformt findet man ihn in den Apotheken], Pillen u. Bissen [bisweilen als Constituens; doch zieht er gern Feuchtigkeit an, so dass die Pillen etwas schmierig werden; auch bindet er, wie andere trockne Extracte (und wie alle in Wasser auflösliche Pulver) wenig Flüssigkeit, passt also nicht, wo viel Flüssigkeit zu binden ist und man die Masse zu voluminös zu machen fürchtet; es kommt indess, wenn man nur wenige Gaben verordnet, die erste von jenen nachtheiligen Eigenschaften, und wenn man ihn nur als Mit-Constituens, in untergeordneter Quantität (um der Masse Zähigkeit zu geben), aufnimmt, beide nicht in Betracht], Latwergen; in Auflösungen, Mixturen [oft ist ihm hier das wirksamere und elegantere *Extr. Glycyrrh.* vorzuziehen, wo man nicht dessen stärker zersetzende Kraft fürchtet (vgl. S. 179). — Nicht leicht als Emulgens (wozu er zu schwach), doch bisweilen als Zusatz zu andern Emulgentien, um dadurch eine Emulsion haltbarer zu machen, auch wohl nebenbei zugleich den Geschmack (z. B. des Camphers — R_x 190) zu corrigiren]. Oft als Geschmacks corrigens [vgl. jedoch I. S. 46] u. als einhüllender Zusatz [namentlich für viele scharfe Arzneien, z. B. Salmiak, salzsauren Kalk, *Rad. Calami, Helen.*, *Seneg.*, auch Ammoniakgummi, u. s. w. — Es ist aber wohl nicht richtig, ihn — mit vielen Ärzten — als ein Surrogat des Zuckers in der Armenpraxis zu betrachten; wohlfeiler als mit theu-

ren Syrupen kommt man freilich mit ihm weg, aber wohl nicht wohlfeiler als mit dem Zucker selbst oder mit *Syrup. simpl.* oder gar *Syr. commun.*; denn wenn er auch stärker versüßt als Zucker, so ist er doch auch merklich theurer. Und nebenbei hat man von seiner unnöthig häufigen Anwendung noch den Nachtheil, dass man Zunge u. Stuhlgänge färbt u. diagnostisch unbrauchbar macht].

Aüsserl. bisweilen als Stuhlzäpfchen [etwa mit *Mucil. Gm. Mimos.* geformt; — um Hämorrhoidarien das Brennen beim Stuhlgang zu mindern].

997.

R_y *Rad. Glycyrrh. pulv.* Unc. 1
Succi Glycyrrhizae depur. Unc. 2

Sacch. albi pulv. Unc. 3
Mucil. Gm. Tragacanth. q. s.
 ut f. l. a. Bacilli. D. S. Lakritzenstängelchen.

Succus Juniperi inspissatus. Roob Juniperi.

Wachholderbeer-Saft od. - Mufs. [Consistenz eines dickeren Syrup. — 1 Unze 1½ Sgr. — Da er nur in grösseren Quantitäten recht wirksam ist, und Mixturen einen schlechten Geschmack und schlechte Farbe giebt, so wendet man wohl meist passender ein *Elaeosacch. Junip. Baccar. an.*] Innerl. drachmenweise, seltener jedoch pur [mehrmals tägl. ein Paar Theelöffel] als in Mixturen [R_y 1019 (*Syr. Spin. cerv.*). Meist aber nur als Zusatz, Unc. ½ - 2 auf Unc. 6. R_y 982 (*Spirit. Junip.*). — Selten zum Getränk [Unc. ¼ - 1½ auf den Tag, in Wasser oder Wasser mit Rheinwein] oder als Constituens von Latwergen [R_y 292 (*Cort. Chin. reg.*), 296 (*Cort. Hippocast.*), 953 (*Sapo medic.*)].

† *Succus Nucum inspissatus (Roob Nucum) PH.*

SLESV. Wallnussmufs. [Aus mit etwas Wasser zerstoßenen unreifen Nüssen der Saft ausgepresst, mit dem gleichen Gewicht abgeschäumten Honigs zur Honigconsistenz eingedickt, mit Zusatz von etwas Zimmt. — 1 Unze 4 Shl.] Innerl. theelöffelweise mehrmals tägl., pur od. in Mixturen.

Succus Sambuci inspissatus depuratus. Roob

Sambuci depuratum. Gereinigtes Fliedermufs. [Consistenz wie beim vorigen. Auflösung klar, schwärzlich-braun. — 1 Unze 1½ Sgr.] Selten pur, zu Dr. 2-6 öfters tägl.; meist nur als Zusatz zu Mixturen [vgl. *Flor. Samb.* — In R_y 1019 (*Syr. Spin. cerv.*) soll er doch mehr als blosser Zusatz seyn.], oder als mitwirkendes Constituens von Latwergen.

Sulphur citrinum s. in baculis. Gelber od. Stangen-

Schwefel. [1 Unze gr. pulv. ⅝ Sgr.] Nur zu den Schwefel-Räucherungen [grüßlich gepulvert; in eigenen Apparaten. Die Litteratur derselben s. bei G. A. RICHTER, *Arzneimittell.* III, S. 439 ff. Wollte man Dämpfe von (unverändertem) Schwefel haben, so hätte man den Schwefel einer Temperatur von nur 88° R. oder etwas darüber (wobei er schmilzt) auszusetzen. Gewöhnlich aber will man schwefligsaure Dämpfe anwenden; dann muss

man den Schwefel, in kleinen Portionen, auf glühende Kohlen oder (besser) ein rothglühendes Eisenblech werfen. — Im Münchener Krankenhause werden gegen die Krätze schwefelsaure Dämpfe angewandt, indem ein gröbliches Pulver aus 3 Schwefel u. 1 Salpeter in kleinen Portionen auf eine glühende eiserne Platte gebracht u. die Dämpfe, zugleich mit den Dämpfen von kochendem Wasser, in ein Badezimmer geleitet werden, dessen Temperatur auf 26–30° R. unterhalten wird und in welchem die Kranken ganz entkleidet (auch den Kopf den Dämpfen ausgesetzt) sitzen. — Dauer aller solchen Applicationen $\frac{1}{8}$ – $\frac{1}{2}$ (–1) St., je nach Wirkung u. Gewöhnung].

Sulphur depuratum. Flores Sulphuris loti. Ge-
reinigter Schwefel. Schwefelblumen, ausgewaschen.
[Sehr feines Pulver. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr.] **Cave:** Latwergen und Schüttelmixturen dürfen nicht lange aufbewahrt werden, weil sich sonst wohl Schwefelwasserstoffgas entwickelt; noch rascher geschieht dies, wenn etwa *Ferrum pulverat.* und saure Salze (z. B. *Tartar. depur.*) dabei sind. — Bei Personen, die an Säure leiden, entwickeln sich wohl während des Schwefelgebrauchs Blähungen (nach oben u. unten), die nach Schwefelwasserstoffgas riechen; man setze also hier ein Absorbens [etwas *Magn. carb.* od. dgl.] zu.

Innerl. zu Gr. 5–10; — um mehr auf den Darmcanal zu wirken, zu Scr. $\frac{1}{2}$ –Dr. $\frac{1}{2}$; 2–4mal tägl. In Pulvern [Bei Brustaffectionen gern mit *Elaeosacch. Foenic.* od. *Anist.*, sonst mit irgend einem andern Ölzucker. — Ry 998–1001; 831 (*Rad. Bellad.*), 1011 (*Sulph. stib. aurant.*). *Offic. Pulv. Glycyrrh. comp.* — 2stündl. Gr. 5 mit Campher Gr. 1 u. Zucker: v. HILDBRAND gegen Mercurialkachexie. — Bei gewöhnlicher katarrhalischen Heiserkeit giebt HENLY den Schwefel in einem etwas voluminösen, trocken zu verschluckenden Pulver, etwa wie Ry 1002, so dass der Kranke recht lange daran zu schlucken hat; bei einer sehr leichten Heiserkeit soll manchmal schon Eine solche Gabe, bei bedeutenderer einige, bei chronischer viele Gaben helfen.], Trochisken [namentlich bei Brustaffectionen. Ry 1003], Bissen [so namentlich, wenn man ihn mit übel-schmeckenden Dingen, wie z. B. *Salmiak*, *Kali tartar.*, verbinden will. — Ry 1004; 101 (*Ammon. muriat. dep.*)], Pillen [selten, und meist nicht in voller Gabe, sondern nur als Zusatz zu anderen Mitteln. — Ry 310 (*Croc.*)], Latwerge [Ry 1005; 448 (*Graphit.*)], Schüttelmixtur [Ry 1006].

Ausserl. in Salben [gewöhnlich (falls nicht noch andere Hauptbestandtheile in die Salbe aufgenommen werden) Dr. 2–4 auf 1 Unze Fett. Vgl. *Ungt. sulphurat. simpl. u. comp.* (wo wir auch noch andre Krätzsalben mit Schwefel angeführt haben); ferner *Cinnabaris*; Ry 1007, 1008; 544 (*Hydr. mur. mite*), 948, 949 († *Resina Pini empyreum. liq.*)], Linimenten [selten; vgl. I. S. 372], Waschwässern [vgl. I. S. 371]. — Schwefel-Räucherungen s. unter *Sulph. citrin.*

998.

Ry *Sulphuris depurati* Dr. 1Sem. *Foeniculi* Dr. 2Rad. *Glycyrrhizae* Unc. $\frac{1}{2}$.

M. f. Pulv. D. S. Theelöffelweise.

G. A. RICHTER.

999.

Ry *Sulphur. depur. Unc. ½*

Tartari depur. Unc. 1

Elaeosacch. Cūri Dr. 6.

M. f. Pulv. D. in vitro. S. 2-3mal tägl.
1 Theelöffel. (Für Hämorrhoidarii äusserst beliebt.)

1000.

Ry *Camphorae tritae Gr. 16*

Sulphur. depur. Unc. ½

Elaeosacch. Anisi Dr. 2.

M. f. Pulv. Div. in 8 part. aeq. D. in charta cerata. S. 3mal tägl. 1 Pulver.
VOGEL.

1001.

Ry *Acidi benzoici Scr. 1*

Sulphur. depur. Unc. ½

Rad. Glycyrrhizae

— *Iridis Flor. ana Dr. 2*

Sacch. albi Unc. 2

Ol. Anisi

— *Foeniculi ana Gtt. 10.*

M. f. Pulv. D. in vitro. S. 2-4mal tägl.
1 Theelöffel. (*Pulvis pectoralis*)
WEDELÜ.)

1002.

Ry *Sulphuris depur.*

Gm. Mimosae

Elaeosacch. Foeniculi ana Scr. ½.

M. f. Pulv. Disp. tal. dos. nr. —. (S. das oben Gesagte.) (HIMLY.)

1003.

Ry *Sulphuris depur.*

Succi Glycyrrh. depur. ana Dr. 2

Sacch. albi pulv. Unc. 1

Mucil. Gm. Tragacanth. q. s.

ut f. Trochisci nr. 10, Pulv. Rad. Glycyrrh. echin. conspergendi, leniter torrendi. D. S. 4mal tägl. 2 Stück.

1004.

Ry *Sulphuris depur.*

Ammon-muriat. dep. pulv. ana Scr. ½

Extr. Glycyrrhizae q. s.

ut f. Bolus. Consp. Pulv. Sem. Foenic. Disp. tales nr. 8. D. S. 4mal tägl. 1 Stück.

1005.

Ry *Sulphuris depur.*

Carbonis Spongiae ana Dr. 2

Concharum ppt. Dr. 1

Conserv. Rosarum Unc. 2½.

M. f. c. Aq. Rosar. pauxillo Electuar. D. S. 3-4mal tägl., umgerührt, einen starken Theelöffel voll. VOGT.

1006.

Ry *Sacch. albissimi Unc. ½*

solve in

Mucil. Gm. Mimos. Dr. 7

Aq. Rosarum Dr. 1

adde

Sulphuris depur. Gr. 9-Scr. 1.

M. D. S. Umgeschüttelt stündl. 1 Theelöffel. (Bei katarrhalischen oder schon durch Egel, Salmiak, Calomel gemilderten entzündlichen Brustzufällen von Säuglingen.) KOPF.

1007.

Ry *Camphorae c. pauxillo Ol. Olivar. trit. Scr. ¼*

Sulphuris depur. Gr. 15

Ungt. rosati Unc. ½

Olei Rosarum Gtt. 1-2.

M. exactiss. f. Ungt. D. in pyxide alba. S. Augensalbe. (Gegen Psorophthalmie, Augenliederflechten, Augenliederkupfer.) ALLEN.

Neben dem Rosenöl verschwindet das Arom der Rosensalbe, also lieber Ungt. simpl.

1008.

Ry *Sulphuris depur.*

Sapon. domest. albi pulv. ana Dr. 2

Adipis suilli Unc. 1.

M. f. Ungt. D. — (Gegen Tinea.)

BIETT.

Sulphur præcipitatum. *Lac Sulphuris. Magisterium Sulphuris.* Gefällter Schwefel. Schwefelmilch. [Sehr feines Pulver. — 1 Drachme $1\frac{1}{2}$ Sgr. Bei Armen oft durch *Sulph. depur.* zu ersetzen.] *Cave* wie bei *Sulphur depur.* — Innerl. zu Gr. 4-8; — um mehr abführend zu wirken, zu Scr. $\frac{1}{2}$ -1; einigemal tägl. In Pulver [gern mit einem Ölzucker, etwa *Elaeos. Foenic. od. Citri.* — Ry 1009, 1010; 493 (*Hb. Fiol. tricol.*), 614 (*Kali tartar.*)], Pillen u. Bissen [vgl. *Sulph. depur.* — Ry 615 (*Kali tartar.*)], Latwerge, Schüttelmixtur. — Selten äusserl. zu Waschpulvern [vgl. I. S. 226], Waschwässern [Ry 809 (*Plumb. acet. erud.*)] p. p.

1009.

Ry *Sulphuris præcipitati* Dr. 3
Tartari depurati Dr. 6
Elaeosacch. Citri Unc. $\frac{1}{2}$.
M. f. Pulv. D. in vitro. S. 2-3mal tägl.
 1 Theelöffel. (Für Hämorrhoidarii.)

1010.

Ry *Sulphuris præcipit.* Dr. $\frac{1}{2}$
Magnes. carbon. Scr. 1
Sam. Foeniculi Scr. $\frac{1}{2}$
Sacch. Lactis Dr. $1\frac{1}{2}$.
M. f. Pulv. D. S. 4mal tägl. eine Messerspitze. (Bei *Crusta lactea.*)

HAASE.

Sulphur stibiatum aurantiacum. *Sulphur Antimonii auratum.* *Sulphuretum Antimonii* (*Antimonium hydrosulphuratum*) *luteum.* *Subbisulphuretum Stibii.* Goldschwefel. Pomeranzenfarbenes Schwefelspiessglanz. [Feines Pulver. — 1 Drachme $4\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave* Salzbilder; Säuren [besonders Salzsäure, Salpetersäure], saure Säfte [auch süsse Säfte, die leicht gähren, z. B. schleimige u. a. Syrupe, Honigsäfte — wenigstens verordne man mit solchen nicht auf längere Zeit, in der heissen Jahreszeit nur auf Einen Tag; in der kälteren lasse man die Arznei kühl aufbewahren], saure Salze; metallische Salze [doch ist die Verbindung mit Calomel sanctionirt, vgl. S. 260], Eisenpräparate [namentlich metallisches Eisen], reine u. kohlen saure Alkalien u. Erden [doch sind die Verbindungen mit *Magnes. carbon.* u. *Conch. ppt.*, *Lapid. Cancr.* sanctionirt], *Kali tartar.*; Seifen [ebenfalls mit Ausnahmen]; Gerbestoff [doch waren Verbindungen mit China u. dgl. früher beliebt]; Hütze.

Innerl. zu Gr. $\frac{1}{2}$ -2, 2-3mal tägl., in acuteren Krankheiten alle 4-2 St. (Als Brechmittel ist er ziemlich obsolet, wegen unsicherer u. angreifender Wirkung.) In Pulver [Ry 1011; 15, 16 (*Acid. benz.*), 183 (*Camph.*), 337 (*Extr. Acon.*), 532, 534 (*Hydr. muriat. mit.*), 855 (*Rad. Ipecac.*)], Morsellen [nicht recht passend, weil die Einzeldose nicht genau zu bestimmen; doch macht man bei kleinen Gaben wohl Ausnahmen (so wie in Ry 1014 mit dem Mineralkermes)], Trochisken [nicht zu dörren], Pillen [Ry 1012; 352 (*Extr. Calendul.*), 396 (*Extr. Seneg.*), 445

(*Galban. dep.*), 450. b. (*Gutti*), 903; 904 (*Rad. Scill.*), 940 (*Resina Guef. nat.*)], Bissen [R₁ 538 (*Hydrarg. muriat. mit.*), 692 (*Morphium acet.*)]; auch in Schüttelmixturen, namentlich Lecksäften [für voluminösere, mehr dünnflüssige Mixturen lassen Manche den Goldschwefel vorher mit Traganth — auf 1 Theil Goldschwefel etwa 1-1½ Theile *Gm. Tragac.* — anreiben, damit er während des Abgiessens der Partialgabe sicherer suspendirt bleibe; besser enthält man sich dieser Darreichungsart ganz; in zähere Lecksäfte dagegen kann man den Goldschwefel unbedenklich aufnehmen. So giebt man ihn oft bloss mit einem Syrup, z. B. Gr. 3-6 mit *Syr. Ipecac.*, *Seneg.*, † *Ammoniaci*, *Croci*, *Capit. Papav.*, *Glycyrrh.* (od. einem andern) *Unc. 1*, umgeschüttelt theelöffelweise. R₁ 1013].

Endermatisch [Gr. 1-2, etwa in Salbenform].

1011.

R₁ *Sulph. stibiat aurantiaci*
Camphorae tritae ana Gr. 3
Sulphuris depurati
Sacch. albi ana Dr. 2.

M. f. Pulv. Div. in 4 part. aeq. D. in charta cerata. S. 2-4mal tägl. ein halbes Pulver mit Fliederthee.

Pulv. diaphoreticus Ph. P.
(1 Drachme ½ Sgr.)

1012.

R₁ *Ammoniaci depur.* Dr. 1½
Rad. Scillae pulv. Gr. 15

Sulphur. stibiat aurant. Dr. ½

Rad. Senegae pulv. Dr. 2

Extr. Taraxaci liq. q. s.

ut f. Pilulas 150. Consop. Pulv. Rad. Irid. Flor. D. S. 3mal tägl. 5-6. (Kräftig auflösend u. expectorirend.)

BEREND.

1013.

R₁ *Sulphur. stibiat aurant. Gr. 6*

Extr. Lactucae viros. Scr. 1

Syr. Senegae Unc. 2.

M. D. S. Umgeschüttelt 2stündl. 1 Theelöffel.

Sulphur stibiatum rubrum. Kermes mineral.
Sulphuretum Stibii (Antimonium hydrosulphuratum) rubrum. Mineralkermes. Braunrothes Schwefelspiessglanz. [Feines Pulver. — 1 Drachme 6 Sgr.] *Cave* wie beim vorigen. [Säuren, auch Magensäure, sollen die brechenenerregende Kraft steigern.] Innerl. — zu Gr. ¼-1 (u. mehr), einigemal tägl. — und äusserl. ganz wie das vorige Präparat. [R₁ 1014-1016; Trochischen: I. S. 237; Bissen: R₁ 994 (*Stipit. Dulcam.*)].

1014.

R₁ *Sacch. albi Unc. 6*
coque c. Aq. comm. q. s. ad consist. tabulandi, admisce

Sulphuris stibiat rubei Gr. 15

Croci pulv. Dr. 1

Gm. Mimosae pulv.

Succi Glycyrrhiz. dep. ana Dr. 2

Flor. Rhosad conc. Dr. 1.

F. Morsuli nr. 30. D. S. 3mal tägl. 1 Stück.

Vgl. S. 472, Z. 4-2 v. u.

1015.

R₁ *Sulphuris stibiat rubei Scr. ½*

Kali sulphurati Scr. 1

tere cum

Syr. Senegae Unc. 2

adde

Liq. Ammon. anisati Scr. 1.

M. D. S. 2stündl., umgeschüttelt, 1 Theelöffel. (Gegen Croup, wenn Schwefelle-

ber überhaupt angezeigt ist.)

V. HAGEN.

Die Formel ist mehrfach unchemisch; deshalb, so wie wegen der oft urgirenden Beschaffenheit der Krankheit, gegen welche sie bestimmt ist, darf man den gewöhnlichen Dosen-Maßstab hier nicht anlegen.

1016.

Ry *Sulphuris stibiatum rubei* Gr. 3

Camphoras tritae Gr. 4

Mucil. Gm. Mimos. Unc. $\frac{1}{2}$

Syr. Althaeae Unc. 1.

Terendo M. D. S. Umgeschüttelt alle 2 St. 2 Theelöffel. (Bei Croup, wenn sich Gerassel in der Luftröhre einstellt. Bei stärkeren Graden des Übels die — „für Kinder schon starke“ — Gabe des Kermes noch verdoppelt.)

ALBERS. SACHSE.

SYRUPI. Zuckersäfte. Bisweilen Säfte schlechtweg (gewöhnlich aber denkt man bei diesem Ausdruck auch an Honige, Roobs u. dgl.). [Die meisten sind so componirt, dass sich der Zucker zur Flüssigkeit ungefähr wie 9:5 (nach der PH. HANN. wie 8 bis 9:5; nach der PH. AUSTR. wie 2:1) verhält.]

Man hat [ausser den für die vegetabilischen Substanzen geltenden *Cave's*] die I. S. 36 unter Zucker angegebenen Verbindungen zu meiden, ausserdem bei den säuerlichen [*Syr. + Aceti, Berberid., Cerasor., Moror., Ribium, Rubi frutic., Rubi Id., + Sambuci, + Scill. (s. den Art.), Succu Ciri*] die Verbindungen mit allen den Stoffen, bei denen wir: „*Cave saure Säfte*“ bemerkt haben; bei den meisten übrigen ist auch zu beachten, dass sie mit *Aq. communis* bereitet werden [nur *Syr. Cinnam. u. Flor. Aurant.* bloss mit destillirten Wässern, *Syr. Cort. Aurant. u. Croci* bloss mit Franzwein (der zwar in einigen Fällen eben so oder noch mehr zersetzend einwirken würde als *Aq. comm.*). — Die PH. HANN. lässt zweckmässig ihre Syrupe mit *Aq. destill.* (oder destillirten Pflanzenwässern) bereiten, nur die mit Wein berücktet (*+ Syr. de Ammoniaco u. Aurant. Cort.*), die aus Fruchtsäften und den *+ Syr. Scill. angenommenen*.]; bei den meisten, namentlich aber bei den vorzugweise schleimigen [*Syr. Alth., Amygdal., + Lich. Irid.*], dass sie durch Wärme leicht sich selbst und die Arzneien, mit welchen sie verbunden sind, zersetzen (I. S. 43). Beim *Syr. Rhei* ist noch des *Kali carbon.* wegen zu caviren.

Man reicht die Syrupe [ausser zum Getränk] seltner pur [am meisten eignen sich noch hierzu, als different genug: *Syr. Alth.* und *Glycerhiz.* als Demulcentien, *Syr. Ipocac.*, *+ Ammoniaco* als Expectorantien, *Syr. Capit. Papav., Croci* als Sedativa für kleine Kinder, *Syr. Rhei, Senn., Spin. cervin., + Mannae* PH. SLESV., HANN. als Abführmittel für Kinder, *+ Syr. Chinæ* PH. SLESV. (freilich ein unzuverlässiges Präparat) und *+ Lich. Irid.* PH. HANN. in der Kinderpraxis; — vgl. die Artikel] als in Verbindungen. Für feste Formen eignen sie sich nicht. Unter den weichen werden sie bei Latwergen, bisweilen auch [doch meistens minder passend; vgl. I. S. 241] bei Pillenmassen, als Constituentien angewandt. Am häufigsten setzt man sie jedoch zu innerlich angewandten flüssigen Arzneiformen — Aufgüssen, Abkochungen, Auflösungen, Mixturen, Emulsionen [selten als Emulgentien;

vgl. I. S. 178–179], und besonders zu Juleps u. Lecksäften; von den letzteren bilden sie häufig die Grundlage. Sie zu Elixiren, Kraftbrühen, Preßsäften, Molken, künstlichen Mineralwässern, zu setzen, vermeidet man — mit seltenen Ausnahmen. Die wohlschmeckenden reicht man oft mit Wasser verdünnt zum Getränk [das Mischungsverhältnisse überlässt man gewöhnlich dem Geschmack des Kranken; doch wird Unc. 4 auf 1 Quart in der Regel ein passendes seyn].

Die Syrupe sind meistens ungefähr so schwer, dass 1 Unze 6 Theelöffel füllt. — Die der Ph. Bor. sind alle klar, nur der *Syr. Amygdal.* trübe. — Die Mehrzahl der Syrupe hat keine schöne Farbe, und in verhältnissmässig grosser Menge angewandt können sie einer sonst farblosen Mixtur sogar eine schlechte Farbe mittheilen. Schöne Farben geben [vgl. übrigens I. S. 37–39]: 1. Weiss: *Syr. Amygdal.* 2. Roth: *Syr. Cerasor.*, *Moror.*, *Rubi frutic.*, *Rhoeados* [nur diese 4 sind intensiv roth; von den übrigen rothen Syrupen wird die Farbe in einer Mixtur zu sehr verdünnt], (*Violar.* mit Säuren). 3. Blau: *Syr. Violar.*, der aber durch Säuren schön roth, durch Alkalien, auch durch essigsaures Kali u. Natron, grün gefärbt wird. — Angenehm riechen: *Syr. Flor. Aurant.*, *Amygdal.*, † *Capill. Vener.*, *Bals. Peruv.*, *Violar.*, *Cinnam.* — Angenehm schmecken: die meisten säuerlichen (*Syr. Cerasor.*, *Ribium*, *Rubi Id.*, *Rubi frutic.*, *Moror.*, *Succi Citri*, *Berberid.*); ausserdem *Syr. Flor. Aurant.*, *Amygdal.*, *Cinnam.*, *Zingib.*, † *Menth. pip.*, *Bals. Peruv.*, *Violar.*, † *Rosar.* Auch *Syr. Cortic. Aurant.*, in welchem der Franzwein stark vorschmeckt, ist vielen Kranken angenehm. — Allen 3 Indicationen — der Farbe, des Geruchs u. des Geschmacks — zugleich entsprechen besonders: *Syr. Amygdal.*, *Violar.*, nächst dem *Syr. Cerasor.* — Besonders schlecht schmecken: *Syr. Ipecacuanh.*, *Rhei*, *Sennae*, † *Mannae* Ph. SLESV., HANN., *Senegae*, *Croci*, † *Ammoniaci* [doch pflegen kleine Kinder sich durch den süssen Vorschmack dieser Säfte zum Einnehmen bewegen zu lassen, so dass man sie ihnen eher geben kann als verwöhnten Erwachsenen]. — Bei bittern Mitteln sehe man sich wohl vor, wenn man ihren Geschmack durch Syrupe verbessern will [vgl. I. S. 45]; wenigstens wähle man nur aromatische Syrupe — *Syr. Cinnam.*, *Cort. Aurant.*, *Zingib.*, † *Menth. pip.* — und setze sie in reichlicher Menge an. Zu fade, vapid, ekelhaft schmeckenden Arzneien wähle man dieselben Syrupe oder, meist noch besser, *Syr. Flor. Aurant.*, *Bals. Peruv.*, säuerliche Syrupe, namentlich *Syr. Succi Citri*. Überhaupt aber vergesse man nicht, dass die Syrupe nicht dem Geschmacke jedes Erwachsenen zusagen.

Ausserdem möge für die Auswahl der einzelnen Syrupe noch folgende Übersicht dienen:

Zu antiphlogistischen Mischungen wählt man gern säuerliche Syrupe — oder *Syr. Alth.*, *Amygdal.*; — auch wohl *Syr. Capit. Papav.*, *Chamomill.*

Zu sedativen: *Syr. † opiat.*, *Capit. Papav.*, *Croci* (diesen besonders für kleine Kinder statt des *† Syr. opiat.*), *Cerasor.*, *Rhocados* — *Syr. Chamomill.*, *Ipecac.*, *Violar.* — *Syr. Alth.*, *Amygdal.*

Zu roborirenden: *Syr. Cortic. Aurant.*, *† Chinae*, *Cinnam.*, *Zingib.*

Zu excitirenden: *Syr. Flor. Aurant.*, *Cinnam.*, *Menth.*, *† Menth. pip.*, *Zingib.*, *Chamomill.*, *Bals. Peruv.*, *† Ammoniaci.*

Zu alterirenden: *Syr. Chamomill.*, *Ipecac.*, *Rhei.*

Zu purgirenden: *Syr. Mannae*, *Rhei*, *Spinæ cervinæ*, *Sennae*, — oder säuerliche Syrupe (od. Honig).

Zu diaphoretischen: *Syr. Ipecac.*, *† Sambuci*, allenfalls auch *Syr. Bals. Peruv.*, *Menth.*, *† Menth. pip.*, *Chamom.* (Sonst *Succus Sambuci inspiss. dep.*)

Zu diuretischen: *Syr. † Scill.*, *Bals. Peruv.* (*Succ. Junip. insp.*, *Oxymel scillit.*, *Colchici.*)

Zu expectorirenden, zu Husten-, überhaupt Brust-Mitteln: *Syr. Alth.*, *Amygdal.*, *Glycyrrhiz.*, *† Foenic.*, *† Lich. Isld.* — *Syr. Ipecac.*, *Seneg.*, *Bals. Peruv.*, *† Ammoniaci*, *† Capill. Vener.* — *Syr. Capit. Papav.*, *Croci*, *Rhocados*, *Violar.* (Sonst auch Honig, *Succ. Dauci insp. dep.*, *Oxymel scillit.*)

Zu stomachischen: *Syr. Cortic. Aurant.*, *Cinnam.*, *Zingib.*, *Menth.*, *† Menth. pip.*, *† Foenic.*, *Rhei.*

Zu säuretilgenden: *Syr. Rhei.*

Zu carminativen: *Syr. † Foenic.*, *Menth.*, *† Menth. pip.*, *Zingib.*, *Rhei.*

Zu analeptischen: *Syr. Flor. Aurant.*, *Menth.*, *† Menth. pip.*, *Cinnam.*, *Bals. Peruv.*, *Chamom.*

Zu anthelminthischen: *Syr. Rhei.* (Sonst auch) *Succ. Dauci insp. dep.*, *† Succ. Nucum insp.*, *Oxymel scillit.*)

Zu kühlenden, durstlöschenden: *Syr. Succ. Citri*, *† Aceti*, *Berberid.*, *Ribium*, *Rubi Id.*, od. andere säuerliche.

Zu Emmenagogis: *Syr. Croci*, *Chamom.*, *† Ammoniaci*, *Capit. Papav.*, *Cinnam.*

Zu Emulsionen wählt man am liebsten, um das Ansehen nicht zu verderben, nur: *Syr. simplex*, *Alth.*, *Amygdal.*, *Flor. Aurant.*; doch auch aus therapeutischen Gründen noch bisweilen: *Syr. Mannae*, *Bals. Peruv.*, *Seneg.*, *Chamom.*, *† opiat.*, *Cap. Papav.*, *Croci*, *Glycyrrh.*, *† Capill. Vener.*, *† Foenic.*, *† Lich. Isld.*

Zu Gallerten aromatische Syrupe (I. S. 289).

Zu Linctus am häufigsten *Syr. Alth.*, doch auch viele andre. (Sonst *Oxymel simpl.* od. *scillit.*, *Mel despumat.* od. *rosat.*)

Zu Pinselsäften, Mund- u. Gurgel-Wässern: besonders oft *Syr. Moror.*; doch auch andere. (Sonst *Mel rosat.* od. *despumat.*, *Oxymel simpl.*, *Succ. Dauci insp. dep.*)

Zur Verdünnung von Säuren gern die rothen Frucht-Syrupe.

Um andere scharfe Sachen einzuhüllen: *Syr. Alth.*, *Amygdal.*

In der Armenpraxis schränke man sich möglichst auf *Syr. communis* u. *simplex* ein; nur bei kleinern Kindern dürfte

Syr. Rhei oder *S. Sennae* († *Syr. Mannae* PH. SLESV., HANN.) bisweilen unentbehrlich seyn.

† *Syrupus Aceti* PH. AUST. *Oxysaccharum*. [Eisig 1 mit Zucker 2 ebullirt.]

Syrupus Althaeae. Eibischsyrop. [Aus einem Aufguss der Wurzel. — Gelblich. — 1 Unze $1\frac{1}{8}$ Sgr.] Im Sommer geht er leicht in saure Gährung über, deshalb vermeide man, ihn auf längere Zeit zu verordnen, namentlich mit Stoffen, die durch einen sauren Saft zersetzt werden würden [vgl. z. B. *Sulph. stibiat. aurant.*]. — Ry 1017.

1017.

Ry *Sem. Foeniculi pulv.*— *Anisi pulv.**Succi Glycyrrh. depur. ana Dr. 1**Syr. Alth. Unc. $1\frac{1}{2}$.*

M. f. Electuar. D. S. 2stündl., umgerührt, 1 Theelöffel. (Bei katarrhalischem Husten.)

Looch pulmonale PH. HANN.
(1 Unze 3 Mgr.)

† *Syrupus Ammoniaci* (*s. de Ammon.*) PH. SLESV., HANN. [*Ammoniac. depur.* 1 in weiss. Franzwein 5 gelöst, mit fast 8 Zucker. — 1 Unze resp. 4 Shl. und 3 Mgr., 4 Unz. 10 Mgr.] Theelöffelweise [jeder Theelöffel enthält 5–6 Gran Ammoniakgummi] pur oder als Zusatz zu Mixturen.

Syrupus Amygdalarum s. emulsivus. Mandelsyrup. [Eine höchst concentrirte Emulsion von süssen Mandeln mit Zusatz von $\frac{1}{4}$ bittern, mit etwas *Aq. Flor. Aurant.* ($\frac{1}{8}$ des Wassers) u. vielem Zucker. (Doch ist es nicht recht passend, ihn verdünnt statt der gewöhnlichen Mandelemulsionen anzuwenden; vgl. S. 47.) Man hat deshalb, besonders wenn man ihn voluminöseren Mixturen zusetzt, umzuschütteln. — Weiss; trübe. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr.]

Ry 1018.

1018.

Ry *Rad. Glycyrrhiz. glabr. pulv.*— *Iridis Flor. pulv.*— *Althaeae pulv. ana Gr. 16**Gm. Mimos. pulv. Gr. 32**Syr. Amygdalar. Unc. 2.*

M. D. S. 2stündl., umgeschüttelt, 1 Theelöffel. (Bei heftigem katarrhal. Husten.)

Linctus leniens PH. HANN.
(1 Unze 4 Mgr.)

Im Sommer verschreibe man nur eine halb so grosse Quantität, weil die Masse leicht in Gährung geht.

Syrupus Balsami Peruviani s. Indici nigri. *Syr. balsamicus*. Perubalsamsyrup. [Perubalsam mit heissem Wasser digerirt, etc. — Gelblich. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr.]

Syrupus Berberidum. Berberizensyrup. [Roth. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr.]

† *Syrupus Capillorum Veneris* PH. HANN. Frauensyrup. Capillarsyrup. [Aus einem Aufguss; mit etwas *Aq. Flor. Aurant.* — 1 Unze $1\frac{1}{2}$, 4 Unz. 6 Mgr.]

* *Syrupus Capiti Papaveris s. Diacodion s. Papaveris albi.* Mohnkopfsyrup. Diacodiensyrup. [Mohnköpfe u. Johannisbrod ana 3, Süßholzwurzel 2, mit 120 auf 30 gekocht, dazu Raffinade 24. — Dünner als andre Syrupe. Gelblich-braun. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr.] Kleineren Kindern wohl theelöffelweise, pur oder in Mixturen. Sonst wie andre Syrupe.

Syrupus Cerasorum. Kirschsyrup. [Aus dem Saft der mit den Kernen zerstoßenen sauren Kirschen. — Dicker als andre Syrupe. Intensiv roth. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr.]

Syrupus Chamomillae. Kamillensyrup. [Aus einem Aufguss der Flor. Chamom. vulg. — Braungelb. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr.]

† *Syrupus Chinae* PH. SLESV. [Braune China 4, Zimmtcasie 1, mit Rothwein (vgl. S. 129 Z. 5, 6) 30 macerirt, zur Colatur Zucker 32. — Rothbraun. — 1 Unze 4 Sbl.] Kindern bisweilen pur, theelöffelweise; sonst als Zusatz zu Mixturen.

Syrupus Cinnamomi. Zimmtsyrup. [Cassia cinnam. mit Aq. Cinnam. vinosa u. etwas Rosenwasser infundirt etc. — Röthlich-braun. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr.]

Syrupus communis. Gemeiner Syrup. [Man hüte sich, ihn der Ähnlichkeit der Benennung wegen mit dem *Syr. domesticus* (Spina. corv.) zu verwechseln. — Käufl. Schwarzbraun; trübe. Reagirt in der Regel sauer oder wird doch sehr leicht (durch Schlimmgehalt) sauer! — 1 Unze $\frac{1}{2}$ Sgr.] Nur für die Armenpraxis.

Syrupus Corticum Aurantiorum. Pomeranzenschalensyrup. [Aus einem Aufguss der Flavedo Cort. Aurant, mit weissem Franzwein. — Gelblich-braun. — 1 Unze $2\frac{1}{2}$ Sgr.]

Syrupus Croci. Safransyrup. [Aus einem Digestionsaufguss mit weissem Franzwein. — Braungelb. — 1 Unze $2\frac{1}{2}$ Sgr.] Kindern bisweilen pur, theelöffelweise. Sonst wie andre Syrupe.

Syrupus Florum Aurantii s. Naphae. Pomeranzenblüthsyrup. [Aq. Flor. Aurant. 5, Raffinade 9. — Gelblich. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr.]

† *Syrupus Foeniculi* PH. SLESV., AUSTR. [Aus einem Aufguss. — Hellbraun. — 1 Unze 3 Sbl.]

Syrupus Glycyrrhizae s. Liquiritiae. Süßholzsyrup. [Süßholzwurzel leicht abgekocht, die Colatur eingedickt, dazu Raffinade u. Mel. despum. — Gelbbraun. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr.]

* *Syrupus Ipecacuanhae*. Brechwurzelsyrup. [1 zur Colatur von 27 infundirt, dazu Raffinade 48. — Bräunlich. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr.] Als Expectorans zu Dr. $\frac{1}{4}$ - Unc. $\frac{1}{4}$ ($\frac{1}{4}$ - 3 Theelöffel); um Ekel zu erregen, Unc. $\frac{1}{4}$ - $1\frac{1}{2}$ (1 - 2 Essl.); öfters tägl.; pur od. als Zusatz zu Mixturen, etc.

† *Syrupus Lichenis Islandici* PH. HANN. [*Lich. Isl.* 1 mit destill. Wasser 12 zur Colat. von 8 gekocht, diese mit Zucker 10 ebullirt. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$, 4 Unz. 6 Mgr.] Kindern bisweilen pur, theelöffelweise. Sonst als Zusatz zu Mixturen.

Syrupus Mannae. Mannasyrup. [*Manna electa* 1, Wasser 3, Raffinade 4. — Bräunlichgelb. — 1 Unze 2 Sgr.] Nur noch als Zusatz zu Purgirmitteln. [Kräftiger ist der † *Syr. Mann.* PH. SLESV., *Syr. Mann. laxativus* PH. HANN. (1 Unze resp. 3 Shl. und 3 Mgr.), eine Verbindung der wirksamen Bestandtheile des *Syr. Mann.* und *Syr. Sennae* PH. BOR. (dem *Syr. Mann.* der älteren PH. BOR. entsprechend), indem er statt des Wassers in der obigen Composition eben so viel eines starken, mit etwas Fenchel bereiteten Senna-Aufgusses enthält. Man kann ihn Neugeborenen u. Säuglingen als Abführmittel pur, theelöffelweise, geben, wozu der *Syr. Mann.* PH. BOR. (ausser in grösseren Gaben, wo er aber durch Bildung von Magensäure unangenehm werden könnte) zu schwach ist.]

Syrupus Menthae (crispae). Minzsyrap. [Aus einem Aufguss der Krauseminze. — Braungelb. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr.]

† *Syrupus Menthae piperitae* PH. SLESV. Anhg. [Aus einem Aufguss. — 1 Unze 3 Shl.]

Syrupus Mororum. Maulbeersyrup. [Dicker als andre Syrupe; dadurch eignet er sich besonders gut zu Pinselsäften. — Intensiv roth. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr.]

† *Syrupus opiatius* PH. SLESV. [*Extr. Opii* Gr. 25 in Malla-gewein Unc. 1, Süßholzsyrup Unc. 24. — 1 Unze 4 Shl.]

Syrupus Rhei. Rhabarbersyrup. (Statt des *Syr. Cichorei cum Rheo*, der noch in der PH. AUSTR.) [Mit etwas Zimmtcassie u. *Kalk carb.* bereitet; braut deshalb mit Säuren ant. — Braunroth. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr.] Fast nur als Abführmittel für kleine Kinder, den jüngsten theelöffelweise, etwas älteren zu 2 Theelöffeln, nach Bedürfniss wiederholt. Auch wohl bisweilen als Constituens von Pillen, Latwergen u. s. w. [z. B. R 667 (*Magnes. carbon.*). — Mixtur: R 618 (*Kali tartar.*).]

Syrupus Rhoeados s. Papaveris rubri. Klatschrosensyrup. [Aus einem Aufguss. — Intensiv roth. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr.]

Syrupus Ribium. Johannisbeersyrup. [Roth. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr.]

† **Syrupus Rosarum** PH. SLESV. Anhg. [Aus einem Aufguss der Centifolienrosen. — 1 Unze 3 Shl. — Durch Syr. simpl. mit Rosenöl, 1 Tropfen auf 2–3 Unzen, zu ersetzen.]

Syrupus Rubi fruticosi. Brombeersyrup. [Intensiv roth. — Soll in Gegenden, wo die Maulbeeren nicht reifen, dem Maulbeersyrup substituirt werden. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr.]

Syrupus Rubi Idaei. Himbeersyrup. [Roth. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr.] Ausser der Anwendung zur Verdünnung von Säuren, zum Getränk u. s. w. auch besonders als Geschmackscorrigens zu manchen Salzmixturen [soweit diese dadurch nicht zersetzt werden; z. B. zu Salpeter-Auflösungen], zu Schleimen p.p. beliebt.

† **Syrupus Sambuci** PH. AUSTR. [Aus dem Saft der Beeren.]

† **Syrupus Scillae** PH. HANN., SLESV. *Oxysaccharum scilliticum*. [Zimmtcassie u. Ingwer aus 1 mit Meerzwiebelessig 18 digerirt, die Colatur mit Zucker 30 ebullirt. — 1 Unze resp. 3 Shl. und $2\frac{1}{2}$ Mgr., 4 Unz., 7 Mgr.]

Syrupus Senegae. [Aus einer Abkochung, 1 mit 18 auf 10, dazu Zucker 18. — Gelblich. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr.] Seltner pur, theelöffelweise [sehr schwache Gabe] denn als Zusatz zu Mixturen.

Syrupus Sennae. Sennessyrup. [Aus einem Aufguss von Senneblättern mit etwas Anis. — Braun. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr.] Neugeborenen u. Säuglingen theelöffelweise als Abführmittel [statt des Syr. Mannae der ältern PH. BOR. (vgl. S. 479), der doch noch etwas stärker war]; sonst wie andere Syrupe.

Syrupus simplex. Syr. Sacchari. *Saccharum clarificatum*. [Gelb. — 1 Unze 1 Sgr.]

* **Syrupus Spinae cervinae s. Rhamni catharticae.** *Syr. domesticus.* Kreuzdornbeersyrup. Hauslyrup. [Aus dem frisch ausgepressten Saft der *Baccae Spin. cerv. s. Rhamni cath.*, Kreuzdorn-, Kreuz- od. Wegdorn-Beeren (deren anderweitige Anwendung obsolet) bereitet. — Grünbräunlich. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr. — Das Präparat der PH. HANN. (1 Unze $2\frac{1}{2}$, 4 Unz. 7 Mgr.) enthält noch, zweckmässig, einen Auszug von Gewürzen.] Für Erwachsene als Zusatz zu abführenden Mixturen, seltner als Hauptmittel [R. 1019; auch wohl pur, zu

einigen Theelöffeln]; Kindern, als Abführmittel pur, theelöffelweise; für Neugeborene wirkt er jedoch zu stark. — Bisweilen als Constituens von Laxirpillen.

1019.

Ry *Syr. Spinæ cervinæ*
Succi Juniperi inspiss.

Succi Samb. insp. depur. ana Unc. 2.
M. D. S. Alle 3-2 St. $\frac{1}{2}$ Essl. (Bei
acuten Wassersuchten.) RUST.

Syrupus Succi (Acetositis) Citri. Citronensyrup. [Aus dem frisch ausgepressten Saft. — Gelblich. — 1 Unze $3\frac{1}{2}$ Sgr.] Zu ähnlichen Zwecken wie *Syr. Rubi Id.*, so wie auch als Geschmackscorrigens für fette Öle, natürl. Balsame, Campher u. a. m., beliebt; vgl. auch Limonade im Anhang: Getränke.

Syrupus Violarum. Veilchensyrup. [Aus einem Aufguss. — Veilchenblau; Farbenänderung s. S. 475. — 1 Unze 3 Sgr.]

Syrupus Zingiberis. Ingwersyrup. [Aus einem Aufguss. — Bräunlich. — 1 Unze $1\frac{1}{8}$ Sgr.]

Tacamahaca. Takamahak. [1 Unze $3\frac{1}{2}$ Sgr.] Vgl. *Resinate*. — Nurnoch zu Räucherungen [in Species oder Pulvern; hauptsächlich bei allerlei kalten Geschwülsten; vgl. *Baccae Junip.*], u. bisweilen als Zusatz zu Pflastern.

Tamarindi s. Fructus Tamarindorum. Tamarinden. [Hauptbestandtheile: Weinstein, Weinsteinäure, Citronensäure und Zucker. — 1 Unze 1 Sgr.] Innerl. in Abkochung [als kühlendes u. gelind eröffnendes Getränk Unc. 1-2 mit L. 1 auf L. 3 gekocht, mit einem Paar Unzen *Syr. simpl.*, auch wohl ein wenig *Eleosacch. Citri*. Als adjuvirendes Vehikel andrer Arzneien, z. B. Salze, Unc. 1-2 mit Unc. 10-12 auf Unc. 6-8 gekocht, Stündl. 1 Essl. Als Abführmittel Unc. 2 mit Unc. 12 auf Unc. 8, mit Zusatz von Salzen (weil es ohne diese doch ein höchst unsicheres Abführmittel ist; theils gelinder abführenden: *Natr. phosphor.*, *Tart. boracat.*, theils stärkeren: Glaubersod. Bitter-Salz), alle 1- $\frac{1}{2}$ St. $\frac{1}{2}$ -1 Tasse. — Ry 1020, 1021].

1020.

Ry *Tamarindorum* Unc. 2
coque c. Aq. contm. Ute. 12 ad Colat.
Unc. 8, in qua solve

Tart. boracat Unc. 1

Eleos. Citri (Gtt. 8) Unc. $\frac{1}{2}$.

D. S. 2stündl., umgeschüttelt, 1 Essl.

[Die hier erfolgende Zersetzung ist beträchtlich, vgl. *Tart. borax.*]

1021.

Ry *Tamarindorum* Unc. 2
coque c. Aq. comm. Unc. 12 ad Colat.
Unc. 8, in qua solve

Natri sulph. dep. cryst. Unc. $\frac{1}{2}$

Mannæ electæ Unc. 1.

Denuo cola. D. S. Stündl. oder halbstündl. $\frac{1}{2}$ Tasse.

Tartarus ammoniatus. Tartarus solubilis ammoniacalis. Cremor Tartari volatilis. Kali ammoniato-tar-

taricum. Tartras kalico-ammoniacus. Ammonium-
 weinstein; Weinsteinsalmiak; auflöslicher ammo-
 niakalischer Weinstein. Weinsteinsaures Ammo-
 niak-Kali. [Verwittert; löst dabei Ammoniak fahren. — 1 Drachme 1 Sgr.]
Sol. 2. — Cave Säuren; saure Säfte u. saure Salze; reine u. koh-
 lensaure Alkalien u. Erden; salzsauren Kalk u. Baryt, schwefelsaure
 Magnesia; Metallsalze.

Innerl. zu Dr. $\frac{1}{4}$ - 1, mehrmals tägl., in Pulvern [in einem Glase oder (wenn dispensirt) in Wachsapier zu verabreichen], lieber noch in Auflösungen [Ry 1022].

1022.

Ry *Tartari ammoniaci* Unc. $\frac{1}{4}$ - 1

solvo in

Aq. Foeniculi Unc. 6

addo

Extr. Taraxaci liquid

Mellis despumati ana Unc. 1.

M. D. S. 2stündl. 1 Essl.

Tartarus boraxatus. Cremor Tartari solubilis s. boraxatus s. Borace solubilis. Boraxweinstein; auflöslicher Weinsteinrahm. [Pulver, zerfließt an der Luft. — 1 Un-
 z 5 Sgr.] *Sol. 1. — Cave* Weinstein-, Schwefel-, Salz-, Salpe-
 ter-Säure; Alkalien, Erden; salzsauren Kalk, Baryt, Kali, Na-
 tren; schwefelsaures, salpeters., weinsteins., essigs. Kali; Metall-
 salze; Seiten; Schwefellebern; längere Aufbewahrung (die Lösung
 schimmelt leicht). [Die Praktiker wollen oft ein gelind eröfnendes Salz in flüssi-
 ger Form — wo es also leicht auflöslich seyn muss — mit sauren Säften verbind-
 en; dazu eignet sich besonders dieses Salz, das nicht (wie Kali tartar., Tart.
ammoniac. u. *natronat.*) durch die meisten vegetabilischen Säuren zersetzt wird; nur
 die Weinsteinsäure selbst zersetzt den Boraxweinstein und sondert etwas *Tartar.*
depurat. daraus ab (bei der Verbindung mit Tamarinden, die zwar freie Wein-
 steinsäure enthalten, ist die Zersetzung für die Praxis schon sehr unbedeutend).
 — Sonst eignet sich zu dem angegebenen Behuf auch das (etwas theurere, aber
 auch angenehmere) *Natrum phosphor.*]

Innerl. zu Scr. $\frac{1}{2}$ - 2 alle 2 St.; um abzuführen, Unc. 1 - 1 $\frac{1}{2}$, in
 einige Portionen vertheilt. In Auflösungen, Mixturen
 [Ry 1023 - 1025; 437 (*Fol. Senn.*), 820 (*Pulpa Tamar.*), 1020 (*Tamarind*),
 1052 (*Tinct. Canthar.*)].

Ausserl. zu Verbandwässern [Dr. 2 auf Unc. 6: nach RUST
 oft ein gutes Palliativ beim Krebsgeschwür].

1023.

Ry *Extr. Chelidonii* Dr. 1

— *Taraxaci liquid* Unc. $\frac{1}{4}$

Tartari boraxati Dr. 6

solvo in

Aq. Melissae Unc. 6.

D. S. 2stündl., umgeschüttelt, 1 Essl.

G. A. RICHTER.

1024.

Ry *Tartari boraxati* Unc. 1 - 1 $\frac{1}{2}$

solvo in

Aq. Foeniculi Unc. 4

addo

Oxymellis simpl. Unc. 1.

M. D. S. 2stündl. $\frac{1}{2}$ Tasse, bis Bitter-

chende Öffnung erfolgt.

G. A. RICHTER.

1025.

Ry *Tartari boraxati* Unc. 1
solve in

Aq. Menthae crispae Unc. 8

adde

Spir. nitrico-aether. Dr. 2

Oxy mell. scillit. Unc. 1.

M. D. S. Alle 2 St. 2 Essl. (Bei Wasserversucht.)

SELIG.

Tartarus depuratus. Cremor Tartari. Crystalli Tartari. Kali tartaricum acidulum. Bitartras kalicus cum Aqua depuratus. Gereinigter Weinstein; Weinstein-Rahm od. - Krystalle; Weinsalz; saures weinsteinsaures Kali. [Sehr feines Pulver. — 1 Unze $2\frac{1}{2}$ Sgr.] *Sol.* 200–250; Wasser von $+15^{\circ}$ R. 180–200, von $+40^{\circ}$ R. 40. — *Cave* reine u. kohlen saure Alcalien u. Erden [wenn man nicht etwa, wie in den Brausepulvern, Kohlensäure entbinden will]; Borax; Seifen; Schwefellebern.

Innerl. zu Scr. $\frac{1}{2}$ –1 als Digestivmittel, Diureticum; zu Dr. $\frac{1}{4}$ –2 als (gelindes) Abführmittel; öfters tägl. In Pulvern [bisweilen pur, messerspitzen- od. theelöffelweise. Verbindungen: Ry 591, 592 (*Kali nitr. dep.*), 610 (*Kali sulphuric. dep.*), 863 (*Rad. Ipecac.*), 901 (*Rad. Scill.*), 938 (*Rosina Guaj. nat.*), 999 (*Sulph. depur.*), 1009 (*Sulph. praecip.*)], namentlich auch Brausepulvern [besonders wenn man mit diesen zugleich abführend wirken will. — Saturationsfähigkeit s. I. S. 138. — Die mit *Tart. dep.* bereiteten Brausepulver brausen aber nicht so rasch u. stark auf als die mit *Acid. tartar.* bereiteten, worauf man, wenn der Kranke ein Brausepulver verlangt, zu achten und allenfalls noch einen kleinen Zusatz von *Acid. tart.* zu machen hat. — Ry 665 (*Magnes. carb.*), 719 (*Natr. carbon. depur. sicc.*); vgl. auch *Lapid. Cancr.*], Bissen [so namentlich mit übel-schmeckenden Dingen. — Ry 854 (*Rad. Jalap.*)], Latwergen [z. B. 1 mit *Pulpa Prunor. dep.* 4; Ersatz der *Pulpa Tamarind.* nach HUFELAND. — Ry 1026, 1027; 433 (*Fol. Senn.*)], Auflösungen oder häufiger Schüttelmixturen [Ry 1028; 293 (*Cort. Chin. rag.*)]. — Man hielt früher den *Tart. depur.* für leichter auflöslich im kaltem Wasser, als er es ist, und verordnete deshalb häufig „Auflösungen“, dieses nur zum Theil, anderentheils aber Schüttelmixturen, waren. Ihn durch warmes oder gar siedendes Wasser in grösserer Quantität aufzulösen, ist, da er sich beim Erkalten doch wieder ausscheidet, unnütz, falls man nicht die Auflösung warm gebrauchen lassen will, was unangenehm ist. Dagegen giebt man ihn bisweilen in warmer Milch, warmen Molken (vgl. *Ser. Lact. acid.*) aufgelöst. — Bisweilen auch in Schüttelmixtur zum Getränk: Dr. 3 auf 1 Quart Wasser, mit einem Paar Unzen Citronen-, Kirsch- od. Himbeer-Syrup. So z. B. die „*Solutio*“ *Tartari dep.* (mit der unpassenden synonymen Benennung *Decoct. Crystallorum Tartari*) der PH. HANN.: Dr. 3 in 32 Unz. siedenden destillirten Wassers aufgelöst, mit 2 Unz. Himbeersyrup (1 L. $\frac{1}{2}$ Mgr.); diese Mischung ist nur bei der Bereitung eine vollkommene Auflösung, kommt aber im Hause des Kranken, erkaltet, als Schüttelmixtur an; überdies ist sie in der Regel der Theure wegen, lieber im Hause, mit gewöhnlichem Wasser, zu bereiten].

Äusserl. zu Zahnpulvern [wohl nur selten thatsam, vgl. I. S. 218, — Ry 1029. — Zu Zahnlatwergen ist er gar nicht zu empfehlen, weil er oft das süsse Constituens der Latwerge bald in saure Gährung setzen und die Latwerge sehr unangenehm machen würde], Augenpulvern [Ry 165 (*Bol. alba*)].

1026.

Ry *Tartari depur.* Unc. 1
Sem. Foenic. pulv. Dr. 2
Pulpae Tamarind. Unc. 2
Syr. Rubi Id. q. s.
 ut f. *Electuar.* D. S. Stündl. umgerührt, 2 Theelöffel. (Schmeckt recht angenehm.)

1027.

Ry *Tartari depur.* Unc. 1
Rad. Zingib. pulv.
Conserv. Rosar. ana Dr. 1
Syr. Cort. Aurant. q. s.
 ut f. *Electuar.* D. S. Theelöffelweise, umgerührt. (Bei Wassersucht.)

Manno.

1028.

Ry *Tartari depur.* Unc. $\frac{1}{2}$

* *Tartarus ferruginosus s. martiatus s. chalybeatus.* *Kali tartaricum ferratum.* *Ferrum tartarizatum.* *Ferrum potabile Willisii.* *Mars solubilis.* *Tartras kalico-ferricus.* Eisen Weinstein; auflösliches Eisen. Weinstein-saures Eisenoxyd-Kali. [Wird an der Luft etwas feucht. — 1 Drachme 2 $\frac{1}{2}$ Sgr.] *Sol.* 4. — *Cave* Säuren, saure Salze u. Säfte; reine, kohlen., blaus., bernsteins. Alkalien; schwefelsaure, phosphors., salpeters., salzs. Salze; Borax; Metallsalze; Seifen; Schwefellebern; Kalkwasser; Gerbstoff.

Innaerl. zu Gr. 5-10 einigemal tägl., in Auflösungen; nicht gern in Pulver oder Pillen [des Feuchtwerdens wegen; wenigstens mit ähnlichen Cautelen deshalb, wie beim *Ammon. muriat. martiat.*].

Tartarus natronatus. *Sal Seignette.* *Sal polychrestum de Seignette* [nicht mit *Sal polychr. Glaseri* zu verwechseln]. *Sal Rochellense s. Rupellense.* *Kali tartaricum natronatum.* *Kali natronato-tartaricum.* *Tartras kalico-natricus cum Aqua.* Natron Weinstein. Seignettesalz; Rochellersalz; Polychrestsalz etc. [Verwittert schwach. —

Sacch. albissimi Unc. 2

Aq. destill. (oder *commun.*) L. 2.

M. D. — Umgeschüttelt mehrmals tägl. zu halben Tassen (als Digestivmittel) oder zu 2 Tassen (als gelindes Abführmittel). (Mischungen der Art werden wohl „*Aqua crystallina*“ genannt.)

1029.

Ry *Tartari depur.* Unc. $\frac{1}{2}$
Rad. Iridis Flor. Dr. 2
Myrrhae
Sanguin. Dracon. ana Dr. 1
Ol. Caryophyll. Gtt. 5.
M. f. Pulv. D. in vitro albo. S. Zahnpulver.
Pulv. dentifricius ruber PH. HANN.
 (1 Unze 6 Mgr.)
 Das gleichnamige Pulver der PH. BLESV. (1 Unze 6 Sht.) enthält kaum 2 Tropfen Öl (wenig).

1 Unze 3, *subt. pulv.* $4\frac{1}{2}$ Sgr.] *Sol.* $1\frac{1}{2}$. — *Cave* Säuren; saure Salze u. Säfte; schwefelsaure, phosphors., salpeters., salzs. Salze [Natronsalze ausgenommen], *Tart. dep.*; Metallsalze; Kalkwasser.

Innerl. zu Scr. $\frac{1}{2}$ — Dr. $\frac{1}{2}$ alle 2 St.; als Abführmittel Unc. $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ [etwa in Fleischbrühe (BERENDS)], auf mehrere Portionen vertheilt. In Pulver, Latwerge [R₂ 990. a. b.], Auflösung [R₂ 1030, 1031].

Ausserl. bisweilen zu Visceralklystieren [vgl. *Rad. Valer. min.*].

1030.

R₂ *Tartari natronati* Unc. 1

Mannae electae Unc. 2

solve in

Aq. communis Unc. 8.

Cola. D. S. Stündl. 2 Essl. MARCUS.

1031.

R₂ *Extr. Hyoscyami* Gr. 6

Tartari natronati Unc. 1

solve in

Aq. communis Unc. 6

adde

Syr. Chamomillae Unc. 1.

M. D. S. Stündl., umgeschüttelt, 1 Essl.

Tartarus stibiatus. *Tartarus emeticus s. Antimonii.* *Antimonium tartarizatum.* *Tartras kalico-stibicus.* Spiessglanzweinstein. Brechweinstein. Weinsteinsaures Spiessglanzoxyd-Kali. [Ist ein basisches Doppelsalz. — Sehr feines Pulver. — 1 Drachme $3\frac{1}{2}$ Sgr.] *Sol.* 13–15; siedend 2; auch auflöslich in wässrigem Weingeist. — *Cave* Schwefel-, Salpeter-, Salz-, Weinstein-Säure [also nicht *Fin. stibiat.* mit Fruchtsyrupen, wie so oft geschieht!]; Salzbilder; kaust. Alkalien u. alkal. Erden [Kalkwasser]; viele Salze, z. B. Kalisalze, kohlen-saures Natron, schwefelsaure und salzsaure Salze [doch ist die Verbindung mit Balmiak beliebt, und die Verbindung mit Glaubersalz empfiehlt (als Brech-Abführmittel bei manchen Vergiftungsfällen) ORFILA; es soll aber die brechen-erregende Kraft des *Tart. stib.* durch die Verbindung mit Glaubersalz verstärkt werden]; Seifen; Schwefellebern; Gerbstoff [doch rühmen Manche die Verbindung mit China, worin der Brechweinstein zersetzt, niedergeschlagen u. seine brechen-erregende Kraft sehr vermindert wird]; *Aq. comm.*

Innerl. (*ad Grana sex!*) zu Gr. $\frac{1}{12}$ — $\frac{1}{4}$ alle 3–2 St.; — zu Ekelcuren Gr. $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$, steigend [bis zur gehörigen Wirkung, dann mit der Dose lavirend; bei Wahnsinnigen gleich anfangs stärker u. meist pur, in destill. Wasser oder als Getränk mit Zucker; sonst wohl mit *Extr. Fumar.*, *Cardui bened.*, od. *Acetum scillit.*]; — als Brechmittel zu Gr. 3–4 binnen $\frac{1}{2}$ St. (höchstens $\frac{3}{4}$ St.) in getheilten Dosen [Darreichungsweisen s. unten]. — Bei Brustentzündungen nach Neueren zu Gr. $\frac{1}{2}$ –1 (u. mehr) alle 3–2 St.; — beim *Delirium tremens* nach Neueren etwa zu Gr. $\frac{1}{2}$ stündl. [in Auflösung; — so lange, bis Erbrechen und einige Ruhe oder der Schlaf erfolgt; — A. L. RICHTER wendet noch vorher kalte Begiessungen im lauen Unterbade an]; — bei traumatischen Verletzungen nach [FRANK in Montpellier. u. 4.] fran-

zö. Ärzten in noch höheren, doch meist seltner wiederholten, Gaben [meistens 4mal tägl. 2 oder selbst 3-4 Gran; nachdem gewöhnlich 1 od. mehrere Bluteentziehungen vorangeschickt]; — bei Tetanus, Manie, Gehirnerschütterung bisweilen in noch weit stärkerer Gabe [als Brechmittel hier wohl sogar bis zu Dr. $\frac{1}{2}$ binnen einigen Stunden. — Bei Tetanus nach mehreren italien. Ärzten zu Gr. 12-24 in 24 St. — Diese ungewöhnlich grossen Dosen gebe man immer in Auflösung, mit nicht zu wenig Wasser, um eine zu starke örtliche Wirkung möglichst zu verhüten].

Die nicht zum Brechen bestimmten Gaben [die freilich sehr oft, wo man es nicht erwartet u. wünscht, Erbrechen, oder Erbrechen und Laxiren bewirken] in Pulver [R 1032, 1033; 291 (*Cort. Chin. reg.*)], Pillen u. Bissen [vorher in destill. Wasser aufgelöst; etwa in heissem, wenn kaltes die Masse zu voluminöse machen würde], Auflösungen u. Mixturen [officiell *Finum stibiat.*, Gr. 2 auf Unc. 1. — R 1034-1037; 99 (*Ammon. muriat. dep.*)].

Als Brechmittel [Einige allgemeine Bemerkungen über die Darreichung der Brechmittel s. unt. *Rad. Ipecac.* — Wenn man ihn mit der *Ipecacuanha* verbindet, so zieht man wohl für jeden halben Scrupel derselben einen Gran von der vollen Dose des Brechweinsteins ab. — Um zu verhüten, dass er bloss durchschlage, dient (freilich nicht sicher) die Verbindung mit *Ipecac.* (Pulver oder Aufguss); nach Einigen soll er in Pulver nicht so leicht als in Auflösung, besonders einer schwächeren, durchschlagen. — Gegen Hyperemesis die S. 399 angegebenen Mittel, gegen Hyperkatharsis ausserdem etwa noch Milchklystiere. BERTHOLD empfiehlt bei zu heftiger oder perverser (nicht Erbrechen, aber z. B. Schmerzen im Leibe, in den Waden erregender) Wirkung schwarzen Kaffee innerl. und in Klystieren. Seltner wird es (wenigstens nach mässigen Gaben des Brechweinsteins) nöthig (und noch an der Zeit, noch nicht zu spät) seyn, wie bei einer förmlichen Vergiftung (s. den Anhang) zu verfahren.] in Pulver [mit Zucker oder mit *Ipecac.* (R 863, 864) p.p. — Gr. 3 mit *Tart. depur.* Gr. 17: *Pulv. e Tart. stib. (Pulv. emeticus)* PH. MIL., etwa auf 3 Einzelgaben zu vertheilen. — Bisweilen mit Stärkmehl, wodurch die brechenerregende Kraft so bedeutend erhöht wird, dass man nur halb so viel *Tart. stib.* zu geben braucht; doch wird das Brechen auch dadurch angreifender, beschwerlicher; es paest also das Zusetzen von *Amylum* (ohne Verminderung der Gabe des *Tart. stib.*) wohl nur bei grosser Unempfindlichkeit des Magens, bei Geisteskranken, überhaupt in Fällen, wo gewöhnliche Brechmittel im Stiche lassen.], Bissen [selten; nur etwa um der Verbindung mit *Ipecacuanha* willen; so in R 869; ein Auflösen des Brechweinsteins (s. oben) ist, da hier die ganze Dose auf einmal gegeben wird, nicht nöthig], am häufigsten in Auflösung [in Wasser od. Wein (vgl. *Fin. stibiat.*); oft mit *Ipecac.* als Schüttelmixtur (so R 866), oder mit *Oxymel scillit.* (R 866, 1038). — *Liquor Tart. stib. (Aqua emetica)* PH. MIL.: Gr. 3 in *Aq. comm.* (besser *destill.*) Unc. 2; esslöffelweise].

Ausserl. zu Klystieren [Gr. 3-6. — RADIUS bei Schlagflüssen u. komatösen Zuständen: Gr. 3-8 in 12 Unz. Wohlverleibblumen-Aufguss. (Aber 12 Unz. Wasser sind für ein Klystier, das doch nicht bloss ausleeren soll, zu viel, und die Bereitung eines Aufgusses dauert zu lange; lieber eine Abulition.)], Injectionen [Gr. 1 auf Unc. 1: in die Harnröhre (welche man dabei in der

Mitte des Gliedes comprimirt) einzuspritzen: JÜNGKEN zur Wiederherstellung des Trippers bei gonorrhöischer Ophthalmie. — Gr. 6-8 auf Unc. 1: KÖHLER (in Elbling) zur Hervorrufung einer adhärenten Entzündung oder gutartigen Eiterung in Lymph- oder Balg-Geschwülsten, kalten Abscessen, Fistelgeschwüren], Augentropfwässern [Gr. $\frac{1}{4}$ -1 (u. mehr) auf Unc. $\frac{1}{2}$], Augensalben [Gr. 2-5 (u. mehr), mit etwas destill. Wasser (od. einer andern Flüssigkeit) zu einem zarten Brei angerieben, auf Dr. 2. — Ry 1039] u. andern Salben [Um bloß gelind zu reizen, 1 auf 20-10 Fett; Ry 1040. — Um Pocken zu bilden, 1 auf (8-) 4-2 Fett; z. B. nach AUTENRIETH 1 auf (etwas mehr als) 3, einer Haselnuss gross 3mal tägl. in die Herzgrube einzureiben, bei Keuchhusten (bei jüngeren Kindern oder feiner Haut nach JÖRG ein schwächeres Verhältnis, auch wohl nur 1-2mal tägl. einzureiben); officinell: *Ungt. Tartari stib.*, 1 auf 4; *Ungt. Stibii* PH. P.: 1 auf 8 (1 Drachme $5\frac{3}{4}$ Sgr.). Ry 1041. — Um die Schmerzen zu mindern, bisweilen mit einem Zusatze von Opium (Pulver od. Tinct.). — Man bedeckt bis zum Erscheinen der Pusteln die Stelle mit Wolle, und reibt, wenn sie erscheinen, nur noch zwischen, nicht auf ihnen ein], Pflastern [um Pocken zu bilden, Scr. 2-Dr. 2 mit *Cerat. Resin. Burgund.* Unc. $\frac{1}{2}$, auf Leder gestrichen aufgelegt; sonst, um nur gelind zu reizen, schwächer; Ry 1042], opisthastischen Einreibungen [in concentrirter Auflösung. — Bei *Nævus vascularis* („den wir, mit HEUSINGER u. A., nicht so zu reizen wagen würden“) empfiehlt HICKMAN, mit einer Mischung von 1 *Tart. stib.* und 8 Baumöl tägl. einzureiben, bis Pusteln entstehen, dann aber Breiumschläge bis zur Heilung anzuwenden.], Waschwässern [Gr. 3-15 auf Unc. 1]; endermatisch [? — die bisherigen Versuche laden nicht zur Nachahmung ein]; zur Venen-Infusion [etwa Gr. 2 — doch auch wohl bis Gr. 4 od. 6 (diese grösseren Dosen aber doch wohl passend in Zwischenräumen) — in $\frac{1}{2}$ -2 Unzen lauen destill. Wassers gelöst]; zu Umschlägen u. Verbandwässern [Gr. $\frac{1}{2}$ -6 auf Unc. 1. — BEAUCHAMP bei *Porrigio decalvans*, um die Haare wieder wachsen zu machen: Gr. 5 (od. weniger) auf 1 Unze, 3mal tägl. applicirt.], Streupulvern [selten; heftig reizend; etwa bei fungösen Geschwüren], Ätzipasten [mit Wasser zu einem dünnen Teige gemacht, aufzupinseln, um den Callus bei Geschwüren zu beseitigen: RUST].

1032.

Ry *Tartari stibiat* Gr. 3
Chinii sulphur. Gr. 10
Sem. Foenic. Dr. 1 $\frac{1}{2}$
Ol. Chamom. citr. Gtt. 6.
M. f. Pulv. Div. in 6 part. aeq. D. in charta cer. S. In der fieberfreien Zeit 2stündl. 1 Pulv. (Die erste Gabe bringe bald Erbrechen, bald Stuhlgang zu Wege, bisweilen auch beides nicht, aber das Fieber verschwindet immer gleich sicher.) (GOLA.

1033.

Ry *Tartari stibiat* Gr. 15-Scr. 1
Natri carbon. depur. sicci Scr. 1
Ammon. muriat. depur. Dr. 1
Cort. Chin. fusci Unc. 1.
M. f. Pulv. Div. in 10 part. aeq. D. S.
 Tägl. 3-4 Stück. (Gegen Wochenfieber.) (SCHWARTZE.
 Mehrfach unchemisch, vgl. S. 485.

1034.

Ry *Tart. stibiat* Gr. 3
Kali nitrici dep. Dr. 2

solve in

Infuso Flor. Samb. Unc. 9

adde

Mellis despum. Unc. 3.

M. D. S. Stündl. — wenn Erbrechen erfolgt, 2stündl. — 2 Essl. (Bei Pneumonie.)

RICHTER.

1035.

Ry *Tart. stibiati Gr. 6-12*

solve in

Infuso Flor. Samb. (od. Chamom. vulg.) Unc. 6-4

adde

Syr. Alth. (od. Cap. Papav.) Unc. 1.

M. D. S. 2stündl. — wenn Erbrechen erfolgt, 3stündl. — 1 Essl. (Bei Brustentzündungen.)

(TEALLIER.

1036.

Ry *Tart. stibiati Gr. 15-Scr. 1**Natri carbon. depur.**Ammon. muriat. — ana Dr. 1*

solve in

Decocti Cort. Chin. fusci (Unc. 1)
Unc. 10.

M. D. S. Alle 2-1 St., umgeschüttelt, 1 Essl. (Wie Ry 1033.)

SCHWARTZE.

Mehrfach unchemisch, vgl. S. 485.

1037.

Ry *Tart. stibiati Gr. 1**Gm. Mimos. electi Unc. ½*

solve in

Aq. destill. Unc. 8

adde

*Aq. Flor. Auranti Unc. ½**Syr. Capit. Papav. Unc. 1.*

M. D. — Zwischen den Anfällen des Wechselfiebers (leichter Quotidian- u. Tertian-Fieber) in der ersten St. 1 Essl., in der 2ten 2, in der 3ten 3 Essl., u. s. f. bis zum Essen; 2 St. nach dem Essen wieder mit 1 Essl. anzufangen u. s. w. (Oder man giebt auch, statt die Gabe zu vermehren, sie nur öfter, zuletzt viertelstündl. 1 Essl.) — Man kann sich auch daneben der Salbe: Ry 1040 bedienen.

FRYSSON.

1038.

Ry *Tart. stibiati Gr. 3-4*

solve in

Aq. destill. Unc. 1½

adde

Oxymell. scillit. Unc. ½.

M. D. S. Alle 15-10 Minuten 1 Essl., bis etwa 3mal Erbrechen erfolgt ist.

1039.

Ry *Tart. stibiati Gr. 4*

tere cum

Ol. Ricini Dr. 1

dein adde

Butyri rec. insulsi Dr. 1.

M. exactiss. D. in olla alba. — Früh u. Abends einer Linse gross ins Auge zu bringen, durch sanftes Reiben des oberen Lides zu verbreiten; nachher 1 St. od. länger ein erwärmtes Tuch umzubinden. (Gegen Verdunkelung der Hornhaut nach Augenentzündungen. — Bei grosser Empfindlichkeit des Auges einige Tropfen Opiumtinctur zuzusetzen. — Die Quantität des *Tart. stib.* wird allmählig bis auf Scr. 1 (!) vermehrt. — Nur in den ersten Tagen erfolge entzündliche Reizung der Augenhäute, aber nach 1-3 Monaten Heilung.)

WITZMANN.

1040.

Ry *Tart. stibiati Gr. 12*solve in *Aq. destill. ferv. q. s., adde**Adip. suilli Unc. ½.*

M. f. Ungt. Div. in 12 part. aeq. D. in charta cerata. S. In der Apyrexie 4-5mal tägl. eine Portion einzureiben (auf Bauch, Rücken, Schenkel od. Arme; man muss die Stellen oft wechseln, um Ausschlag zu vermeiden). — Vgl. Ry 1037.

FRYSSON.

1041.

Ry *Hydrarg. muriat. mercur. pulv. Gr. 1½**Tart. stibiati Dr. ½**Adipis suilli Dr. 3.*

M. D. S. Mit erwärmtem Flanell bis zur Röthung der Haut einzureiben. (Soll

schneller wirken als die gewöhnliche Brechweinsteinsalbe.) HANAY.

Fest der ganze Sublimat wird in Calomel verwandelt. — Zweckmässig lässt man die beiden Salze zuerst mit etwas *Aq. destill.* zu einem zarten Brei reiben, dann erst das Fett dazu reiben. — Der Autor giebt noch an, dass für manche Fälle auch schon ein Waschwasser aus den angegebenen Quantitäten der beiden Salze und *Aq. destill.* Dr. 3 ausreiche; man solle die Haut mit erwärmtem Flanell und dann mit dem („umgeschüttelten“) Wasser, welches möglichst warm seyn müsse („weil es sonst nicht so viel Brechweinstein aufgelöst hält“), einreiben; zweckmässiger verschriebe man

wohl von diesem Wasser die doppelte Totalquantität.

1042.

Ry *Resin. Pini Burgund.* Unc. $1\frac{1}{2}$
Euphorbii Dr. $\frac{1}{2}$.

Leni ignis liquatis adm.

Tart. stibiati

Opii pulv. ana Scr. 1, *antea c. pauz.*

Aq. destill. in pulvem trita, et

Terebinth. laric. Dr. 1.

F. Emplastr. D. S. Auf Leder über den Unterleib zu legen. (Bei Durchfällen von unterdrückter Hautthätigkeit od. dgl., — doch ist das Pflaster für eine zarte, reizbare Haut viel zu stark.)

Terebinthina. Terpenthin. — Zum innerlichen Gebrauch, zu Zahnfleischlatwergen und zu Klystieren wählt man immer den reineren, (weniger dickflüssigen) venedischen Terpenthin, *Tereb. laricina s. Veneta*; sonst ist zum äusserlichen Gebrauch meistens, für Arme immer, der gemeine Terp., *Tereb. communis*, rein genug. [Beide Terpenthinarten sind zu dickflüssig und zu zäh, als dass sie sich tröpfeln liessen. Man giebt also auch kleine Quantitäten immer nach dem Gewicht an. — 1 Unze resp. $1\frac{1}{3}$ und $\frac{5}{8}$ Gr.] Vgl. *Balsama naturalia*.

Innerl. zu Gr. 5-20, einigemal tägl. In Pillen u. Bissen [vgl. 8.79. — Ry 1043; 415 (*Farr. sulph. cryst.*), 903 (*Rad Scill.*). — Man hat hier, wie beim Copaivabalsam, vorgeschlagen, durch Zusatz von *Magnes. usta* (etwa $\frac{1}{16}$ - $\frac{1}{8}$) dem Balsam Pillenconsistenz zu geben, aber dies ist wohl auch hier entbehrlich: die Verbindung muss mindestens $\frac{1}{2}$ Tag, bisweilen einige Tage stehen, ehe sie jene Consistenz annimmt, wird nachher leicht hart, und wirkt vielleicht anders. BUCHNER empfiehlt (nach FAURÉ), Terpenth. Dr. 6, Terpenthinöl Dr. 2 u. *Magnes. ust.* Gr. 36 zusammen zu kneten, und diese Composition, welche nach 7-8 Tagen Pillenconsistenz annimmt, statt des Copaivabalsams anzuwenden.], Latverge [z. B. Dr. 1 auf 1 Unze *Mel album* (nicht *despumatum*, das zu dünn ist, um in dieser Verbindung Latwergenconsistenz zu geben), theelöffelweise. — Ry 1044; 953 (*Sapo medic.*)], Emulsion [besonders grössere Gaben werden in dieser Form am besten vertragen. — Ry 1045].

Äusserl. zu Zahnfleischlatwergen, Klystieren [Dr. 1-2, durch Eigelb emulgirt] u. a. Injectionen [z. B. für die Harnröhre bei alten torpiden Nachtrippern Dr. $\frac{1}{2}$ - 1-2 auf Unc. 6, durch Gummi emulgirt], Linimenten [z. B. mit Eigelb *ana*, einigemal tägl. mit Leinwand aufzulegen: PITSCHAFT bei Zellgewebsverhärtung, Drüsengeschwülsten, Pädarthrocace, Winddorn], Salben [vgl. 8.79-80, auch I. 8.278 Z. 2, 3. — Ausser einigen Salben der PH. BOR., in die der Terpenthin mehr od. weniger als

Hauptbestandtheil eingeht — *Ungt. Terebinth., basilic., Elemi* — führen wir noch auf: Ry 1046-1048], Pflastern [vgl. I. S. 259, 260, auch §. 162. — *Tereb. comm.* geht, als Haupt- oder Neben- Bestandtheil in viele officinelle Pflaster ein, ist auch z. B. Hauptbestandtheil des *Empl. diaphoreticum Mynsichti* PH. SLESV. Anhang, welches ausserdem noch einige Harze, Gummiharze, Bernstein p. p. enthält (1 Unze 6 Shl.). — *Empl. febrifugum* von GARDES: † Strassburger Terpenh. (durch *Tereb. lario.* zu ersetzen) Dr. 10 mit den Pulvern von Weihrauch, Myrrhe u. Aloë ana Dr. 2 zusammengeschmolzen (besser: „in einem erwärmten Mörser gemischt“); die Masse auf 2 Stücke weissen Leders von der Form und Grösse, dass man den ganzen Vorderarm damit bedecken kann, gestrichen (auf jedes Unc. 1), und diese beiden Pflaster (nöthigenfalls noch durch Binden befestigt) 15-20 Tage auf den Vorderarmen des Kranken liegen gelassen; soll alle Wechselstieber sicher heilen! — Als zu mancherlei chirurgischen u. a. Zwecken brauchbar nehmen wir Ry 1049 auf.], Räucherungen [unter einem langen Mantel oder der ausgespannten Bettdecke wirft man einen aus Terpenthin mit irgend einem Pulver, etwa *Pulv. Rad. Irid. Flor.*, geformten Bolus auf glühende Kohlen: STOLL u. A. bei Durchfällen, namentlich von unterdrückter Harnabsonderung].

1043.

Ry *Extr. Levist.* [oder *Aurant. Cort.*]
Dr. 1

Terebinth. lario. Dr. 2
Baccar. Junip. pulv. q. s.
ut f. *Boli* nr. 12 [oder *Pilulas* 120].
Consp. Pulv. Cass. cinnam. D. — 3-4mal
tägl. 1 Bissen [oder 10 Pillen].

1044.

Ry *Terebinth. lario.* Dr. 1
Saponis medicati pulv. Scr. 4
terendo bene mixtis adde
Cort. Chin. reg. pulv.
Rad. Serpentar. — ana Dr. 2
Syr. simpl. q. s.
ut f. *Electuar. D. S.* 3mal tägl., umgerührt, 1 Theelöffel. (Bei atonischen Wassersuchten.) BERENDS.

1045.

Ry *Terebinth. lario.*
Gm. Mimos. pulv. ana Dr. 1
terendo sensim misce q.
Syr. Bals. Peruv. Unc. 1
Vini Gallici albi Unc. 2.
D. S. 3mal tägl., umgeschüttelt, 1 Essl.

1046.

Ry *Cerae flavae* Dr. 2

Terebinth. lario. Unc. $\frac{1}{2}$

leni calore liquatis admisce
Ol. Terebinthinae Dr. 2.

D. S. Verbandsalbe.

Ungt. Tereb. (Bals. terebinthinat. Frahmii) PH. SLESV. (1 Unze 3 Shl.)

1047.

Ry *Terebinth. lario.* Dr. 6
Vitellum Ovi dimidium
exacte contritis admisce

Ol. Hyperici cocti Dr. $1\frac{1}{2}$

Olibani pulv.

Myrrhae pulv. ana Gr. 22 $\frac{1}{2}$.

Lenissimo igne diffletur aquosum. D. S. Verbandsalbe.

Ungt. digestivum (s. Terebinthinae compositum) PH. SLESV. (1 Unze 3 Shl.)

1048.

Ry *Cerae flav.* Dr. 2
liquefiant leni cal. in

Ol. Olivar. Dr. 3

Tereb. lario. Dr. 2.

Post refrigerat. adde

Bals. Peruv. Scr. 1

† *Ligni Santali rubri pulv. Scr. $\frac{1}{2}$.*

M. D. S. Verbandsalbe.

Bals. Locatelli nach der Angabe der
PH. SLESV., od. auch *Bals. Itali-*
cum. (1 Unze 4 Sbl.)

Ceras flavae
Resinae Pini Burgund.
Colophonii ana Dr. 2
Terebinth. latic. Unc. $\frac{1}{2}$.
Leni igne liquata M.; refriger. D. S.
Modellirwachs.

1049.

R_y Empl. Litharg. simpl.

Terebinthina cocta. Gekochter Terpenthin. [1 Un-
ze 1 Sgr.] Vgl. *Resinae*. — Innerl. (selten) zu Scr. $\frac{1}{2}$ — Dr. $\frac{1}{2}$,
mehrmals tägl. in Pillen [R_y 414 (*Ferr. sulph. cryst.*)], Bissen.
— Äusserl. bisweilen als Constituens von Pflastern [doch zieht
man meist *Resina Pini Burg.* vor].

TINCTURAE. Essentiae. [Vgl. I. S. 25, 26.] Ausserden
Präparaten, die diesen Namen führen, sind auch noch *Elixir ad lon-*
gam Vitam, † *Elix. aperitivum Clauderi* u. die *Elixiria Proprie-*
tatis wahre Tincturen, und zwar *Tincturae compositae*; auch
Elixir Aurantior. comp. ist zum Theil als Tinctur [und nur zum Theil
als Elixir] zu betrachten. Dagegen führen nur uneigentlich den Namen Tin-
ctur: *Tinct. Laccae* (eine wässrige Abkochung), *Rhei aquosa* und *Rosar. acidula*
(wässrige Aufgüsse), † *Opii nigra* PH. SLESV. (vgl. I. S. 26), *Ferri pomati* und
† *Ferri cydoniat* PH. SLESV. (wässrige Auflösungen), u. a. schon I. S. 24, 25
erwähnte.

Über zu meidende Verbindungen vgl. Weingeist
(I. S. 37) und die Substanzen, aus denen die einzelnen Tincturen be-
reitet werden.

Man berechnet die quantitative Wirksamkeit der Tincturen
wohl so, dass man annimmt, sie haben nur $\frac{1}{4}$ der Wirkung von der
zu ihrer Bereitung angewandten Substanz; die Arzneimittel müssen
also in Tincturform in $\frac{4}{3} = 1\frac{1}{3}$ mal so grosser Gabe gegeben werden
als in Substanz. Es leuchtet aber ein, dass dies Verhältniss sehr va-
riiren müsse nach der Auflöslichkeit der verschiedenen Bestandthei-
le des Arzneimittels in Weingeist, so dass z. B. von Mitteln, deren
Wirksamkeit hauptsächlich in harzigen u. ätherisch-öligen Theilen
liegt, die Tincturen relativ wirksamer seyn müssen — solcher Mittel
zu geschweigen, welche sich, wie z. B. reine Harze, Iod, ganz auflö-
sen. Wir haben deshalb auch die Dosenbestimmungen für die ein-
zelnen seltener nach dieser Berechnung als nach den aposteriorischen
Angaben bewährter Praktiker angesetzt, ausserdem jedoch, damit
der Leser selbst [namentlich der ausländische], wo es ihn interessirt, die-
se Berechnung anstellen könne, bei den einzelnen das quantitative
Verhältniss der Substanzen zur extrahirenden Flüssigkeit angegeben
[wo bei diesen Angaben nicht ausdrücklich die Weingeistsorte bemerkt ist, ist im-

mer *Spir. V. rectificatus* gemeint], u. zwar meist auf 60 Gewichtstheile dieser Flüssigkeit, so dass der Leser in der Zahl, welche die relative Menge der Substanz angiebt, auch zugleich die Zahl der Grane von dieser Substanz hat, deren Lösliches in einer Drachme der Tinctur enthalten ist. [Diese letztere Annahme ist zwar nicht streng richtig, denn wenn z. B. eine Drachme Weingeist noch das Lösliche von Gr. 10 irgend einer Substanz aufnimmt, so wiegt die Flüssigkeit nun mehr als Dr. 1, wiegt vielleicht Dr. 1 u. Gr. 5, es enthält folglich Dr. 1 der Tinctur das Lösliche von etwas weniger als Gr. 10; auch das Auspressen u. Filtriren bringt einige Fehler in diese Annahme; indessen alle diese Fehler zusammen sind so unerheblich, dass wir für die Praxis davon abstrahiren können, wie es denn auch z. B. die PH. BOR. selbst bei der Angabe des Inhalts der Canthariden- u. Opium-Tincturen thut. — Sehr lobenswerth bestimmt die PH. SLESV. bei den meisten, die PH. AUSTR. bei fast allen ihren Tincturen das Gewicht der filtrirten Flüssigkeit; wir haben jedoch auch bei diesen Tincturen der Gleichförmigkeit halber den Gehalt nach der aufgegossenen Flüssigkeit angegeben.] Viele Arzneimittel, deren wirksame Bestandtheile zu viel Weingeist zur Auflösung erfordern, kann man deshalb in der Tincturform nicht füglich in voller Dose reichen, weil man zu viel Weingeist mitgeben müsste; so z. B. die China, Valeriana u. v. a.

Man giebt die Tincturen theils in Tropfenform, pur [wenn man die mit den höheren Weingeiststufen bereiteten Tincturen in grösseren Dosen giebt, z. B. von einer mit *Spir. V. alcohol.* bereiteten 50–60, von einer mit *Spir. V. rftiss.* od. *Spir. F. Gall. fort.* bereiteten 60–80 Tropfen, so lasse man für nicht sehr an Spirituosa Gewöhnte die Einzelgaben, doch mit etwas Syrup oder Schleim nehmen, um den sehr scharfen Geschmack zu mildern], oder mit einander oder mit andern wenig voluminösen, flüssigen oder auch wohl erst in der Tinctur aufzulösenden Mitteln [Naphthen, ätherischen Ölen, Salzen, u. s. w.] in Verbindung; oder man setzt sie voluminösern wässerigen Arzneiformen verschiedener Art [Aufgüssen u. Abkochungen, versteht sich, erst nach dem Erkalten der Colatur] zu. [Man berechnet in Mixturen die Drachme von den meisten zu 85–90, von den mit Maltagawein bereiteten zu 70–75, von den wässerigen (uneigentlichen Tincturen) zu 55–60, von den mit *Spir. V. alcohol.* bereiteten zu 95–100, von den mit *Spir. sulph. aeth.* bereiteten zu 110–120 Tropfen.] Zwar scheiden sich bei der Verbindung mit Wasser gern, namentlich aus den harzigen Tincturen, aufgelöste Theile aus ihrer Auflösung im Weingeist aus; doch hat dies selten mehr zur Folge als eine Trübung der Mischung, indem die aus dem Weingeist ausgeschiedenen Theile ihrer Leichtigkeit und feinen Vertheilung wegen im Wasser suspendirt bleiben oder doch leicht durch Umschütteln wieder suspendirt werden; nur bei Augenwässern kann es bedenklich werden, kann das Mittel zu reizend machen [vgl. *Tinct. Opii simpl.*], und bei der innerlichen Anwendung hat man nur etwa bei schon in sehr geringer Quantität wirksamen Mitteln, z. B. Canthariden, Iod, darauf Rücksicht zu nehmen und eine

ungleiche Wirkung der Partialgaben zu befürchten; man setzt deshalb zu den Tincturen von solchen Mitteln, wenn sie mit Wasser verdünnt werden sollen, gern eine ansehnliche Quantität von *Syr. Amygdalar.* oder *Alth.*, oder giebt sie in einer Emulsion oder auch bloss mit einem jener beiden Syrupe, damit, wenn sich jene Bestandtheile aus ihrer Verbindung mit dem Weingeist ausscheiden, sie in der dicklichen Flüssigkeit vollkommener u. sicherer suspendirt bleiben. [Über extemporane Verdünnung von Harztincturen mit Wasser vgl. I. S. 393. sub 4). Über Tincturen als Ersatz von zu emulgirenden Harzen u. Schleimharzen I. S. 177-178. Dass es (wider die Angaben der Schriftsteller) erlaubt sey, Tincturen zu Emulsionen zusetzen: I. S. 182.] — In weiche Arzneiformen nimmt man die Tincturen selten auf [bieweilen in Latwergen als Geschmacks-Corrigentia]; noch seltner und nur in den allergeringsten Quantitäten in feste. Für Pillen- u. Bissen-Massen sind sie nur selten als Constitutionen-brauchbar, wenn nämlich durch Weingeist zu erweichende und dann zähe Stoffe (Harze, Gummiharze, Seifen) in ansehnlicher Quantität in der Mischung sind [vgl. I. S. 241]. —

Hier noch eine kleine praktische Übersicht:

Narkotisch: die Opium-Tincturen, *Tinct. Croci*, † *Nuc. Vom.*, † *Bellad.*, *Stramon. Sem.*, *Hyosc.*, † *Hyosc. Sem.*

Flüchtig reizend: *Tinct. Moschi*, *Ambrac. aeth.*, die Silbergeil-Tincturen, *T. Valer. aeth. und ammon.*, † *Kanill.*

Excitirend: *Tinct. Arnicae*, die Baldrian-Tincturen, *Tinct.* † *Angel.*, *Calami*, † *Asae foet. ammon.*, † *Bals. Peruv.*, † *Chamom.*, † *Chenop. ambros.*, † *Helen.*, † *Lupuli Strobil.*, † *Sabin.*

Gewürzhaft: *Tinct. aroquat.*, (*aromata. aetida*), *Capsici ann.*, † *Galang.*, † *Cardam.*, *Caryophyllor.*, *Cinnam.* (*aus Cuss. cinnam.*), † *Cinnam. acuti.*, † *Vanill.*, † *Macid.*, † *Zingib.*

Tonisch: *Tinct. Chinac comp. und simpl.*, † *Chinioldinii* (S. 114), *Cascarill.*, † *Lupuli Strob.*, *Cortic. Aurant.*, *Aurantii Pomor. immat.*, † *Quass.*, † *Colombo*, die Rhabarber-Tincturen; — die Eisen-Tincturen.

Bitter: *Tinct.* † *Quass.*, *Gentian.*, † *Trifol.*, † *Colombo*, *Absinth.*, † *Lupuli Strobil.*

Auflösend bitter: die Rhabarber-Tincturen, u. a.

Erregend-auflösend: *Tinct. Asae foetid.*, *Asae foet. ammon.*, *Galbani*, *Iodi*, † *Bellad.*, † *Helen.*, † *Helleb. nigri.*

Adstringirend: *Tinct. Catechu*, † *Kino*, *Laccaes.*, *Batoni.*, *acchar.* (Eisen-Tincturen).

Balsamisch: *Tinct.* † *Bals. Peruv.*, *Benzoes.*, *Bauzoes comp.*, † *Myrrh.*, die *Elizir Proprietatis*, † *Eliz. aperit. Clauderi*, *Tinct. Succini*, *Pini comp.*, † *Fulgini.*, (*Asae foet.*, *Galbani*).

Scharf: *Tinct.* † *Helleb. nigri*, † *Helleb. albi*, *Guaj. Rosin.*, *Guaj. ammon.*, *Guaj. Lign.*, *Euphorbia*, *Cantharid.*, † *Canthar. concentr.*, † *Formicar.*, † *Scill.*, *Scill. kalina*, *Colchici (Sem.)*, † *Colch. Rad.*, † *Toxicodendri.*

Narkotisch-scharf: *Tinct. Aconiti*, *Acon. aether.*, *Digital. aether. und simpl.*, † *Nicotin.*

Gewürzhaft-scharf: *Tinct. Pimpinell.*, † *Helen.*, † *Capsici ann.*

Kalisch: *Tinct. kalina*, (*Scillas kalina*).

Durch Schwefelsäure wirksam: *Tinct. Rosar. acidula*; weniger *Tinct. aromat. acida*; noch weniger *Elix. Propriet. Paracelsi*.

Componirte stärkende und excitirende Mittel: und zwar 1) die tonisch-stärkende Eigenschaft vorwaltend: *Tinct. Chinae comp.*, *Elixir Aurantior. comp.*, *Tinct. amara*, † *Absinth. comp.*, † *Absinth. alkalina*, *Rhei vinosa*, † *Rhei amara*, † *Rhei comp.*, *Elix. amarum*; 2) die gewürzhafte, flüchtig reizende Eigenschaft vorwaltend: *Tinct. aromat.*, *carminativa*, *Calami comp.*, † *stomach. Lentini*.

Stomachisch u. carminativ: die vorigen, die gewürzhaften, tonischen.

Alterirend: *Tinct. Iodi*, *Asae foet.*, † *Bellad.*, mehrere excitirende, flüchtig reizende u. s. w.

Antispasmodisch: *Tinct. Asae foet.*, *Galbani*; — *Tinct. Valer.*, *Valer. aether.*, † *Chamom.*; — die Bibergeil-Tincturen, *Tinct. Moschi*, *Ambrac*; — die narkotischen.

Expectorirend: *Tinct. Opii benzoica* u. a. narkotische, unter Umstän- den balsamische, scharfe, † *Tinct. Helen.*, † *Scill.*, u. s. w.

Diaphoretisch: *Tinct. Guajaci ammon.*, *Guaj. Resin.*, *Guaj. Ligni*, *Valer. ammon.*, (*Pini comp.*), die Aconit-Tincturen.

Diuretisch: *Tinct. Cantharid.*, † *Scill.*, *Scill. kalina*, *Colechici (Sem.)*, † *Colch. Rad.*, *Digit. aether. und simpl.*, † *Sabin.*, † *Bals. Peruv.*, die Guajak-Tincturen, *Tinct. Pini comp.*, *kalina*.

Drastisch: *Tinct. Aloës*, die *Elixiria Proprietatis*, † *Elix. aperit. Clauderi*, *Elix. ad long. Fil.*, *Tinct. Colocynth.*, *Sennae*, † *Helleb. nigri*, † *Jalap. Radic.*, † *Jalap. Resin.*

Emmenagog: *Tinct. † Sabin.*, *Galbani*, † *Asae foet. ammon.*, *Iodi*; — die *Elixiria Propriet.*, † *Elix. aperit. Claud.*; — *Tinct. Croci*, *Stramon. Sem.*; u. a.

Zu Mund- u. Zahn-Mitteln am häufigsten: *Tinct. Myrrh.*, † *Bals. Peruv.*, † *Fanll.*, die Zimmt-Tincturen, *Tinct. † Galang.*, *Caryophyllor.*, *Pimpinell.*, *Catechu*, *Laccac.*, *Ratanh. sacchar.*, *Opii crocata*, *Opii simpl.*, auch wohl *Tinct. Canthar.* — Für sich † *Tinct. gingival. balsam.*

Zu Augenmitteln vorzüglich *Tinct. Opii vinosa*, *crocata* u. *simpl.*

Zu Verbandwässern: *Tinct. Myrrh.*, *Aloës*, *Opii simpl.*, † *Chamo- mill.*, u. a.

Zu reizenden Einreibungen u. Linimenten: *Tinct. Canthar.*, † *Canthar. concentr.*, † *Formicar.*, *Euphorb.*, † *Scill.*, *Digit. aether. oder simpl.*, *Colocynth.*, *Capsici ann.*, *Iodi*.

Zu reizenden Injectionen: *Tinct. Myrrh.*, *Opii simpl.*, *Capsici ann.*, *Euphorb.*, *Canthar.*

Als Geschmacks- und [minder kräftige] Geruchs-Corrigentien [vgl. I. S. 45, 47] benutzt man besonders die gewürzhaften, so wie der schön rothen Farbe wegen wohl die — übrigens nichts weniger als indifferenten — *Tinct. Laccac* und *T. Rosarum acidula*.

Tinctura Absinthii. Wermuthtinctur. [10 auf 60. — 4 Unze 3½ Sgr.] Innerl. zu Dr. ½–1 einigemal tägl.

† **Tinctura Absinthii composita** PH. HANN. [Wer-

meth, Zittwer- u. Nelken-Wurzel, *Hb. Card. bened.*, *Centaur. min.*, Pomeranzen- u. Citronen-Schale, Würznelken, zusammen $16\frac{2}{3}$, auf 60. — 1 Unze 4 Mgr.] Innerl. zu 30-60 Tropfen, einigemal tägl.

† *Tinctura Absinthii alkalina* PH. SLESV. Anhg.

BIESTER's Magentropfen. [*Hb. Absinth.*, *Card. bened.*, *Centaur. min.*, *Cort. Aurant.*, *Lign. Guaj.*, *Sassafr.*, *Cort. Chin. fusc.*, *Rad. Angel.*, *Valer. min.*, zusammen etwa 11, *Kali carbon.* $3\frac{1}{3}$, auf 60. — 1 Unze 8 Sbl.] Innerl. in gleichen oder etwas grösseren Gaben wie die vorige.

Tinctura Aconiti. Eisenhütleintinctur. [5 auf 60. — 1 Unze $3\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. zu 25-50 (u. mehr) Tropfen einigemal tägl.

* *Tinctura Aconiti aetherea.* Ätherische Eisenhütleintinctur. [$7\frac{1}{2}$ auf *Spir. sulph. - aeth.* 60. — 1 Drachme $\frac{5}{8}$ Sgr.] Innerl. zu 15-30 Tropfen öfters tägl.

Tinctura Aloës. [10 auf *Spir. V. rftiss.* 60. — 1 Unze $3\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. (nur als Reizmittel) zu 8-20 Tropfen einigemal tägl. [R_y 1050.] — Äusserl. zu Klystieren [um stark abzuführen, Dr. $\frac{1}{2}$ -1], Augenpinselwässern [Ser. $\frac{1}{2}$ -1 auf Dr. 2]; selten als Zusatz zu Verbandwässern [drachmenweise].

1050.

R_y *Tinct. Aloës*

— *Castorei ana* Dr. 1

— *Cortic. Aurant.* Dr. 2.

M. D. S. 3mal tägl. 15 Tropfen. (Bei chronischem Erbrechen.)

HUFELAND.

Tinctura amara. [*Hb. Centaur. min.*, unreife Pomeranzen, *Rad. Gent.* u. *Zedoar.*, zusammen $11\frac{2}{3}$, auf 60. — 1 Unze $3\frac{2}{3}$ Sgr.] Innerl. zu Dr. $\frac{1}{2}$ -1 ein Paar Mal tägl.

* *Tinctura Ambrae (aetherea).* Ambertinctur. [$1\frac{1}{2}$ auf *Spir. sulph. - aeth.* 60. — 1 Drachme $2\frac{2}{3}$ Sgr.]

Innerl. zu 15-30 Tropfen mehrmals tägl.; seltner pur als in Mixturen. [Die Wirkung des *Spir. sulph. - aeth.* bleibt wohl immer die vorherrschende; man kann den Amber darin nicht in genügenden Dosen geben; daher meistens nur als Zusatz zu andern Mitteln. — Mit *Tinct. Moschi ana*, viertelstündl., umgeschüttelt, 20-40 Tropf.: DYSEN bei oriental. Cholera. — 1 mit 2 *Tinct. aromat. acids*, 3-4mal tägl., besonders Morgens, 20-30 Tropfen (in Haferschleim): WAIZ gegen hartnäckigen *Vomitus gravidarum*, dem nichts Entzündliches und keine Plethora zum Grunde liegt; — dazu etwa noch ein Magenpflaster: HELLER.]

Auch wohl, drachmenweise, als Zusatz zu Mundwässern od. Zahntincturen [bei üblem Mundgeruch].

+ *Tinctura Angelicae* PH. SLESV., HANN., AUSTR. [10-12½ auf 60. — 1 Unze resp. 6 Sbl. und 3 Mgr.] Innerl. zu Dr. ½-1 mehrmals tägl.

Tinctura Arnicae. Wohlverleihblumentinctur. [Flor. Arnic. 7½ auf 60. — 1 Unze 3½ Sgr.] Innerl. zu Dr. ¼-1 mehrmals tägl. [Ry 769 (Ol. Sabin.)]. — Selten äusserl. zu Umschlägen, Einreibungen od. dgl.

Tinctura aromatica. Gewürztinctur. [Zimmtcasie, Cardamom, Würznelken, Galgant u. Ingwer, zusammen 10, auf Spirit 60. — 1 Unze 4½ Sgr.] Innerl. zu 20-60 Tropfen 2-3mal tägl. [Ry 309 (Cort. Sinarub.), 883 (Rad. Rhei), 1065 (Tinct. Opii croc.). Bisweilen mit heissem Zuckerwein als Glühwein (s. den Anhang: Getränke).] Oft als Corrigenens. — Äusserl. entbehrlich. — (Eine wohl noch kräftigere, doch minder angenehme, Composition ist *Tinct. aromatica* PH. P.: Ingwer, Kalmus, Angelica, Alant, Pfefferminze, Anis ana 2½, Würznelken u. Zimmtcasie ana 1½, schwarzer Pfeffer ½, auf 60 Spir. V. rft.; zur filtrirten Tinctur ½ Anisöl; — 1 Unze 4 Sgr.)

** *Tinctura aromatica acida.* Loco Elixiris Viatrioli Mynsichti s. anglicani. Saure Gewürztinctur. MYNSICHT's Elixir. [1 concentr. Schwefelsäure auf Tinct. aromat. 2¼. — 1 Unze 4½ Sgr. — Tinct. aromat. acida PH. P. (1 Unze 4 Sgr.) ist etwas schwächer: 1 conc. Schwefelsäure auf 30 Tinct. arom. PH. P.] Cave wie bei Acid. sulph. dilut. — Innerl. zu 20-50 Tropfen mehrmals tägl. (etwa Dr. 1-2 tägl. zu verbrauchen); in Tropfen [passend in einem schleimigen Vehikel, etwa versüßtem Haferschleim, zu nehmen. — Verbiödg. mit Tinct. Ambræ s. dort.] od. grösseren Mixturen; zum Getränk [Dr. 1-2 auf ½ Quart, mit Zucker q. l.].

Tinctura Asae foetidae. Asandtinctur. [10 auf Spir. V. rftiss. 60. — 1 Unze 3½ Sgr.] Innerl. zu 30-70 Tropfen einigemal tägl., pur oder in Mixturen [Ry 781 (Ol. Faler.), 1057 (Tinct. Castor.); vgl. auch Petrol. und Tinct. Colocynth.]. — Äusserl. bisweilen als Riechmittel [bei Hysterischen]; als Zusatz zu Klystieren [einige Drachmen. — Ry 1051], Verbandwässern [z. B. bei Caries q. v.]. Endermatisch [zu 10-30 Tropfen, unverdünnt].

1051.

Ry Magnes. sulphur. crud. Unc. ½

Mannae Unc. 1

solvs in

Inf. Flor. Chamom. vulg. Unc. 10
cola; adde*Tinct. Asae foet. Dr. 2**Ol. Lini* Unc. 1.

M. D. S. Etwas erwärmt und umgeschüttelt zum Klystier. (Schon sehr stark ausleerend.)

Caena foetidum (PH. EDINB.)

+ *Tinctura Asae foetidae ammoniata s. volatilis*

PH. HANN. [15 auf *Liq. Ammon. vinos.* 60. — 1 Drachme 1, 1 Unze 6 Mgr.] Innerl. zu 15-30 Tropfen mehrmals tägl. — Als Riechmittel.

* *Tinctura Aurantii Pomorum immaturorum.*

Tinctur von unreifen Pomeranzen. [12½ auf 60. — 1 Unze 3½ Sgr.] Innerl. zu Dr. ¼-1, einigemal tägl.

+ *Tinctura Balsami Peruviani* PH. HANN., SLESV.

[Resp. 7½ und 10 auf *Spir. F. rftiss.* 60. — Resp. 1 Drachme ¾, 1 Unze 4½ Mgr. und 1 Unze 8 Shl.] Nur äusserl. [vgl. *Bals. Peruv.*].

+ *Tinctura Belladonnae (Herbae)* PH. SLESV. [5 auf

60. — 1 Unze 6 Shl.] Innerl. etwa zu 20-40 Tropfen einigemal tägl. — Äusserl. etwa zu Klystieren [Dr. 3-4] u. a. Einspritzungen, Augenwässern [Zu Tropfwässern zu den bei *Hb. Bellad.* angegebenen Zwecken mit 3-½ Theilen Wasser verdünnt], Umschlägen [verdünnt od. pur].

Tinctura Benzoës. Benzoëtinctor. [10 auf *Spir. F.*

rftiss. 60. — 1 Unze 4½ Sgr.] Nur äusserl., zu Waschwässern [die beim Zutritt von Wasser entstehende milchigte Trübung hat man gern, u. nennt solche Waschwässer wohl Jungfernmilch. Sie geben einen schönen Teint, dienen auch selbst, zumal mit ein wenig Sublimat, der freilich zersetzt wird, gegen leichte Hauteruptionen. — Man kann 1 auf 8-32 Wasser (Rosen-, Orangenblüth-, Kirsch- u. Mandel-Wasser, Bitter-Mandel-Emulsion, p.p) nehmen. — Ry 105 (*Ammon. muriat. dep.*), 988 (*Spir. saponat.*)], als Zusatz zu Linimenten, Räucherspiritus u. dgl.

Tinctura Benzoës composita. Balsamum Com-

mendatoris s. traumaticum. Commandeur- od. Wund-Balsam. [*Benz.* 7½, *Aloë* ½, *Bals. Peruv.* 1½, auf *Spir. F. rftiss.* 60. — 1 Unze 4½ Sgr.] Innerl. (selten) zu 15-20 Tropfen mehrmals tägl. — Äusserl. wie *Tinct. Myrrhae*, doch seltner.

Tinctura Calami. Kalmustinctur. [10 auf 60. —

1 Unze 3½ Sgr.] Innerl. zu Dr. ¼-1; 2-3mal tägl. (Man kann in dieser Form den Kalmus nicht füglich in voller Gabe geben.) [Ry 271 (*Cort. Angustur.*), 823 (*Rad. Angelic.*).] — Äusserl. zu Zahntincturen, als Zusatz zu Mund- u. Gurgelwässern.

Tinctura Calami composita. [Kalmus, Zedoaria, Ingwer,

unreife Pomeranzen, zusammen gegen 12 auf 60. — 1 Unze 3½ Sgr.] Innerl. zu Dr. ¼-1; 2-3mal tägl.

Tinctura Cantharidum. Spanischfliegentinctur.

[5 auf *Spir. V. rhus.* 60. — 18–20 Tropfen enthalten ungefähr das Lößliche von 1 Gran. — 1 Unze $3\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerl. (*ad Guttas quindecim!*) zu 5–10, vorsichtig steigend bis zu 20 (u. mehr) Tropfen, einigemal tägl. [Da man gegen Wasserscheu häufiger die Canthariden selbst anwendet, so steigt man mit der Tinctur selten bis zu den angegebenen höheren Gaben.] Verdünnt u. eingehüllt [etwa in einer Emulsion, einem Salepdecoct, oder doch die einzelnen Gaben in schleimigem Vehikel oder in Fleischbrühe, p.p.]; pur oder in Mixturen [z.B. Dr. $\frac{1}{2}$ mit *Syr. Alth.* od. *Amygd.* Unc. $1\frac{1}{2}$, 3stündl. 1–2 Theelöffel. — Dr. $\frac{1}{2}$ mit *Vini stibiaci* Dr. 2, 4mal tägl. 15–20 Tropfen: BUCHOLZ bei fieberlosem Anasarka nach Scharlach. — Mit *Bals. Peruv.* ana, 4mal tägl. (umgeschüttelt) 24 Tropf. mit Wein: KOPF bei paralytischer Rauresis. — Ry 1052, 1053].

Ausserl. zu Zahnpulvern [vgl. I. §. 218 sub 4)], Zahnpillen [vgl. I. §. 156.], Zahnlatwergen [Ry 789 (*Opium*)], Zahntropfen [vgl. I. §. 349], Einspritzungen [z.B. Dr. 2 od. mehr auf 6 Unz. Wasser: VOGT, um die Wandungen von Fisteln zu entzünden. — Bisweilen wird man kaum mit der unverdünnten Tinctur diesen Zweck genügend erreichen.], Augewässern [Zu Augen-Wassungen u. Bähungen (bei asthenischen Krankheiten) Dr. 2–4 (u. mehr?) auf Unc. 4. — Zu Einreibungen auf beschränkte Stellen der Augenlider (z.B. auf Chalazion) 1 mit 4–1 eines aromatischen Spiritus oder Campherspiritus]; zu Waschungen, Einreibungen, Linimenten [mehr od. weniger verdünnt, wenn sie nicht (wenigstens bei zarter Haut) als Rubefaciens wirken soll. — Bei ausgebrochener Wasserscheu nach LALUETTE auf einzelne Theile oder selbst über den ganzen Körper einzureiben, dann aber diesen zum Theil oder auch ganz (!) mit einem camphorirten Cantharidenpflaster zu belegen. — Oft in Verbindung mit *Liniment. ammoniat.*, *Liniment. ammoniato-camphorat.* u. ähnlichen, etwa Dr. 1 auf 1 Unze dieser Linimente. — Ry 1054–1056; 653 (*Liq. Ammon. caust.*), 981 (*Spir. Formic*)].

1052.

Ry *Tartari boracati* Unc. 1
solus in

Aq. Petroselin. Unc. 3
adde

Tinct. Cantharidum Dr. 1

Syr. Althaeae Unc. 2.

M. D. S. Stündl. 1 Essl. (Bei Torpor der Nieren.) KÖNIG.

1053.

Ry *Aetheris sulphurici* Dr. $\frac{1}{2}$

Tinct. Opii simpl. Dr. 1

— *Cantharidum* Dr. 2.

M. D. S. 2mal tägl., umgeschüttelt,
10 Tropfen in einer Tasse Milch (u. so

lange gestiegen, bis leichtes Brennen beim Uriniren entsteht). HECKER.

1054.

Ry *Tinct. Cantharid.*

Spir. Borismar. ana Dr. 1

Liq. Kali carbon. Dr. $1\frac{1}{2}$

Aq. comm. Unc. 4.

M. D. S. Waschwasser, 2mal täglich anzuwenden. (Wenn auf behaarten Theilen durch syphilit. Hautausschläge die Haare ausgefallen sind und nicht wieder wachsen wollen.) (SACHS.

1055.

Ry *Tinct. Cantharid.* Dr. 1

Subel Citri rec. expr. et colati Unc. $\frac{1}{2}$

Inf. Ab. Rorismar. Unc. 4.

M. D. S. Öfters damit zu waschen: (Zu demselben Zweck wie das vorige.)

MEISSNER.

1056.

Ry *Ol. Terobinth. rft.*

Ol. camphorati ana Unc. $\frac{1}{2}$

Tinct. Cantharidum Unc. 1.

M. D. S. Ungeschüttelt 2-3 mal tägl. einzureiben. (Bei veralteten Rheumatismen, Lähmungen u. dgl.)

Lindmentum excitans. SMITH.

† *Tinctura Cantharidum concentrata* PH. SLESV.

[15 auf *Spir. V. rftiss.* 60. — 1 Unze 12 Shl.] Nur äusserl. zu besonders stark reizenden Einspritzungen, als Rubefaciens [eingerieben oder aufgelegt] und als Vesicans.

Tinctura Capsici annui. Spanisch-Pfeffer-Tinctur. [10 auf *Spir. V. rftiss.* 60. — 1 Unze 4 Sgr.] Innerl. zu 15-50 Tropfen, ein Paar Mal tägl., in schleimigem Vehikel, in Mixturen [Ry 91 (*Ammon. carb. dep.*), 769 (*Ol. Sabim.*)]. — Äusserl. zu Gurgelwässern [Dr. 1-4 auf Unc. 6, bei brandiger Bräune noch stärker], Zahnpillen [vgl. I. §. 156.], Zahn- u. Zahnfleischlatwergen; auch wohl zu Einreibungen [z. B. mit anderen reizenden Flüssigkeiten, zu Frictionen bei oriental. Cholera].

† *Tinctura Cardamomi* PH. SLESV., HANN. [12 auf (*Spir. V. rftiss.* : PH. SLESV.) 60. — 1 Unze resp. 8 Shl. und 7 Mgr.] Innerl. zu 20-40 Tropfen mehrmals tägl.

* *Tinctura carminativa* (Wedelii). Blähungtreibende Tinctur. [Zittwerwurzel, Kalmus, Galgant, römische Kamillen, Anis, Kümmel, Würznelken, Lorbeeren, Macis u. Pomeranzenschalen, zusammen 16 $\frac{9}{16}$ auf *Spir. V. rftiss.*, *Aq. Ment. pip.* ana 30; beim Dispensiren noch zu 7 Theilen 1 Theil *Spir. aitr. aether.* gesetzt. — 1 Unze 4 $\frac{5}{8}$ Sgr.] Innerl. theelöffelweise mehrmals tägl.

Tinctura Caryophyllorum. Würznelkentinctur. [12 auf *Spir. V. rftiss.* 60. — 1 Unze 4 $\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. zu 20-40 Tropfen einigemal tägl. — Als Zusatz zu Zahnfleischlatwergen.

Tinctura Cascarillae. Cascarilltinctur. [12 auf *Spir. V. rftiss.* 60. — 1 Unze 3 $\frac{5}{8}$ Sgr.] Innerl. zu Dr. $\frac{1}{4}$ -1 einigemal tägl.

Tinctura Castorei. Bibergeiltinctur. [10 auf *Spir. V. rftiss.* 60. — 1 Drachme 16 Sgr.]

Innerl. zu 20-60 Tropfen einigemal tägl.; häufiger jedoch (namentlich bei hysterischen Krampzufällen) in verhältnissmässig

kleineren Gaben alle 1- $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{4}$ St., so oft als nöthig wiederholt; pur oder häufiger in Mixturen. [Bei krampfhaften, überhaupt nervösen Zufällen, sumal wo man rasch einwirken will, oft in — sehr mannigfaltigen — Verbindungen mit Baldrian-, Asand- od. Opium-Tincturen, *Liq. Ammon. succin.*, *Liq. Ammon. carb. pyro-oleost.*, Aether, äther. Ölen u. dgl., und etwa in Kamillen- od. Melissen-Thee gereicht; z. B. (statt vieler) Ry 1057, 1058; 49 (*Aeth. acet.*). Dergleichen Verbindungen sind nicht nur ökonomisch vorthailhaft, weil man dadurch die Gabe der theuren Castoreumtinctur verringern kann, sondern auch therapeutisch nützig, weil in den Fällen, wo man sie verschreibt, selten Zeit dazu ist, sich auf die Wirkung eines Mittels zu verlassen. — Man verordne bei so rasch vorübergehenden Zuständen nur geringe Totalquantitäten. — Andre Mixturen: Ry 930 (*Rad. Valer. min.*), 1050 (*Tinct. Aloë*).]

Äusserl. (selten) als Riechmittel [besser die folgende], zu Augenwässern [z. B. mit *Tinct. Opii simpl. ana Scr. 1*, *Aq. Chamomill. Uns. 4*, zu lauen Bähungen bei mit Schwäche verbundenem Augenliederkrampf: ROSAS (hier wohl oft durch wohlfeilere Mittel zu ersetzen). — Vgl. *Liq. Ammon. caust.*].

1057.

Ry *Tinct. Castorei*— *Asae foet. ana Dr. $\frac{1}{2}$* *Liq. Ammon. carb. pyro-ol. Scr. 1.**M. D. S.* Alle 1- $\frac{1}{4}$ St., umgeschüttelt, zu 15-25 Tropfen, mit Kamillenthee.

1058.

Ry *Tinct. Opii crocatas Scr. $\frac{1}{2}$* — *Valerian. aether. Scr. 2*— *Castorei Dr. 1.**M. D. S.* Wie das vorige.

Tinctura Castorei ätherea. Ätherische Bibergeiltinctur. [10 auf *Spir. sulph. aeth.* 60. — 1 Drachme 16 $\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. zu 10-30 Tropfen, nach Bedürfniss wiederholt [man giebt sie in der Regel nur in den bei der vorigen erwähnten dringenderen Fällen; also meist in rasch auf einander folgenden Gaben]; pur oder in Verbindungen [wie bei der vorigen. — Z. B. Dr. $\frac{1}{2}$ mit *Ol. Chamom. citrat. Scr. $\frac{1}{2}$* , zu 15 Tropfen. — Ry 657 (*Liq. Ammon. succin.*)]. — Äusserl. als Riechmittel, zu Einreibungen ums Auge [vgl. z. B. S. 299 & 2 v. u.].

Tinctura Castorei Canadensis. Englisch-Bibergeil-Tinctur, [10 auf *Spir. F. rffiss.* 60. — 1 Drachme 2 Sgr.] In etwas grössern Gaben als *Tinct. Castorei* [so weit dies der Weingeist erlaubt; doch wird man, wenn man auch 1 $\frac{1}{2}$ mal so viel giebt, immer weit weniger mit ihr ausrichten].

Tinctura Castorei Canadensis ätherea. Ätherische Englisch-Bibergeil-Tinctur. [10 auf *Spir. sulph. aeth.* 60. — 1 Drachme 2 $\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. u. äusserl. wie *Tinct. Castorei äther.* [Da hier der *Spir. sulph. - aeth.* mitwirkt, ja vielleicht das Wirksamste ist, so wird es selten zweckmässig seyn, die Gabe höher zu greifen als bei der entsprechenden Russisch-Bibergeil-Tinctur.]

Tinctura Catechu. [12½ auf Spir. V. rftles. 60. — 1 Unze 4½ Sgr.] Innerl. zu 40–70 Tropfen (in dringenden Fällen auch wohl Dr. 1, verdünnt), mehrmals tägl. [Ry 442 (*Fol. Uv. Ursi*).] — Äusserl. zu Mund- u. Gurgelwässern [Unc. ½–1 auf Unc. 6. Ry 1059; 325 (*Opur. sulph.*)], Pinselsäften [Dr. 2–4 auf 1 Unze Saft. — Ry 1060], Zahnfleischlatwergen [nur als Zusatz], Zahntincturen [Ry 980 (*Spir. Cochlear.*)], Injectionen [Ry 393 (*Extr. Ratanh.*)], Verbandwässern [Ry 264 (*† Calor. Natri*)], u. s. w.

1059.

Ry *Tinct. Catechu*
Spir. Cochleariae ana Unc. ½
Aq. Salviae Unc. 6.
M. D. S. Mundwasser, umgeschüttelt.

1060,

Ry *Tinct. Catechu* Dr. 2
— *Myrrhae* Dr. 1
Syr. Mororum Unc. 1.
M. D. S. Umgeschüttelt zum Bepinseln
des Zahnfleisches.

+ ***Tinctura Chamomillae vulgaris Florum*** PH. AUSTR. [10 auf 60.] Innerl. theelöffelweise mehrmals tägl. [man kann in der Tinctur die Kamillen nicht füglich in voller Dose geben; also wohl in der Regel nur als Zusatz zu Mixturen]. — Äusserl. zu Verbandwässern [verdünnt].

+ ***Tinctura Chenopodii ambrosiaci s. Botryos Mexicanae*** PH. SLESV. [10 auf 60. — 1 Unze 6 Sbl.] Innerl. wie die vorige.

Tinctura Chinae composita. Elixir s. Tinctura roborans Whyttii. Whyttsches Magenelixir. [Cort. Chin. fusc. 7½, Rad. Gentian., Cort. Aurant. Pom. ana 2½, zusammen also 12½, auf Spirit 45, Aq. Cinnam. simpl. 15, zusammen 60. — 1 Unze 5½ Sgr.] Innerl. zu Dr. ½–1 mehrmals tägl., pur oder in Mixturen.

Tinctura Chinae simplex. [Cort. Chin. fusc. 12½ auf Spirit 60. — 1 Unze 5½ Sgr. — Man kann begreiflich weder in dieser Tinctur noch in der vorigen die China in voller Gabe geben.] Innerl. zu 40–80 Tropfen, einigemal tägl., in Mixturen.

Tinctura Cinnamomi. Zimmttinctur. [Cass. cinnam. 12½ auf Spirit 60. — 1 Unze 4½ Sgr.] Innerl. zu 20–60 Tropfen einigemal tägl., bei Metrorrhagien zu 30–40 Tropfen alle 1–¼ St., mit Wasser od. Wein. [Bei gleichzeitigen Krampfszufällen, oder wenn sie allein Erbrechen machen sollte, mit Opium- od. Castoreum-Tinctur; bei reiner Atomie mit Mineralsäuren (umgeschüttelt), Alaun. — Ry 66 (*Alum.*), 683 (*Mixt. sulph. - ac.*), 1063 (*Tinct. Opii croc.*); vgl. auch *Acid. phosphor.*] — Äus-

serl. zu Mundwässern [Ry 1062 (Tinct. Lacc.)], Zahnfleischlatwergen [nur als Zusatz], p. p.

+ *Tinctura Cinnamomi acuti* PH. SLESV. [$12\frac{1}{2}$ auf Spir. V. rftiss. 60. — 1 Unze 12 Sbl.] In etwas geringeren Gaben als die vorige.

+ *Tinctura Colchici e Radice* PH. SLESV. Zeitlosenwurzel-tinctur. [40 der frischen Wurzel auf 60. — 1 Unze 6 Sbl.] Innerl. zu 10–25 Tropfen (u. mehr) einigemal tägl.

* *Tinctura Colchici (e Semine)*. Zeitlosensamen-tinctur. [$12\frac{1}{2}$ auf 60. — 1 Unze $3\frac{3}{4}$ Sgr.]. Innerl. zu 15–60 Tropfen (u. mehr) einigemal tägl.

Tinctura Cotocynthidis. Koloquintentinctur. [Pulpa Coloc. 5, Stepania $\frac{1}{2}$, auf Spir. V. rftiss. 60. — 1 Unze 5 Sgr.]

Innerl. (ad Guttas viginti!) nicht in eigentlich purgirender Gabe, sondern nur als Reizmittel, zu 5–10–20 Tropfen einigemal tägl.; gern in schleimigem Vehikel oder doch verdünnt, z. B. mit Wein; pur od. in Mixturen [z. B. 1 mit 2 Tinct. Asae foet., früh u. Abends 30 Tropfen: HEIM gegen chronische Unterleibsverstopfungen. — Ry 343 (Extr. Aloës Ac. sulph. corr.), 385 (Extr. Nuc. Vom. spirit.), 769 (Ol. Sabin.), 908 (Rad. Scill.), 1076 (Tinct. Rhei vin.). Vgl. auch Liq. Saponis stibiat].

Äusserl. zu Einreibungen [z. B. zu 60 Tropfen, mit Schweine-schmalz, in den Unterleib bei Wahnsinnigen: CRESTIEN. — Oder Unc. $\frac{1}{2}$ mit Ol. Ricin. Unc. $\frac{1}{2}$, Morgens u. Abends in den Unterleib (1 Theelöffelchen) zur Erregung des Stuhlgangs; oder in geschwollene Drüsen zur Zerkleinerung derselben, einzureiben: HEIM].

+ *Tinctura Colombo* PH. SLESV. [$12\frac{1}{2}$ auf Spir. V. rftiss. 60. — 1 Unze 8 Sbl.] Innerl. zu Dr. $\frac{1}{2}$ –1 einigemal tägl.

Tinctura Corticum Aurantiorum. Pomeranzenschalentinctur. [Flavedo Cort. Aurant. $12\frac{1}{2}$ auf Spirit 60. — 1 Unze $4\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. zu 40–60 Tropfen einigemal tägl. [Ry 371 (Extr. Gentian.), 638 (Lign. Quass.), 843 (Rad. Gentian. rubr.), 1050 (Tinct. Aloës), u. a. m.]

Tinctura Croci. Safrantinctur. [$7\frac{1}{2}$ auf 60. — Über Farbenänderung vgl. Crocus. — 1 Drachme $1\frac{1}{2}$ Sgr.]. Innerl. zu 20–60 Tropfen mehrmals tägl. — Selten äusserl.

Tinctura Digitalis aetherea. Aetherische Fingerhut-tinctur. [$7\frac{1}{2}$ auf Spir. sulph. aeth. 60. — 1 Drachme $\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. (ad Guttas viginti!) zu 10–20–30 Tropfen einigemal tägl. [Ry 758 (Ol. Junip.).]

Tinctura Digitalis simplex. Einfache Fingertinctur. [10 auf *Spir. V. rftiss.* 40, Wasser 20. — 1 Unze 3½ Sgr.]

Innerl. [samentlich oft bei Lungensucht, auch bei Wassersuchten] (*ad Guttas triginta!*) zu 10–30 Tropfen einigemal tägl.; pur, od. in Mixturen [z.B. Dr. 3 mit *Tinct. Scill. kalin.* Dr. 1, 2stündl. 30 Tropfen, u. dabei 3mal tägl. 1 Gran Calomel: HORN in einem Falle von weit vorgeschrittener Wassersucht. — Mit *Tinct. Colehici* (e Sem.) ana Dr. 2, *Spir. nitro-aeth.* Scr. 1, früh u. Abends 20 Tropf. auf Zucker; v. HILDENBRAND bei Brustwassersucht („häufigere u. grössere Dosen würden wohl nicht schaden“). — Vgl. *Oxymel scillit.*].

Ausserl. zu Einreibungen [theelöffel- od. esslöffelweise; z.B. 2–3mal tägl. Unc. ½ auf Unterleib u. Schenkel: CHERSTIEN bei Wassersucht].

Tinctura Euphorbii. Euphorbiumtinctur. [5 auf *Spir. V. rftiss.* 60. — 1 Unze 2½ Sgr.] Nur äusserl., eingetröpfelt od. mit Charpie aufgelegt [bei carissen u.s. atonischen Geschwüren], oder eingerieben [gegen Warzen, oder — vorsichtig, bis sich die Haut geliebt entzündet — bei Lähmungen].

Tinctura Ferri acetici aetherea. *Spiritus acetico-aethereus martiatus.* *Naphtha Aceti martiata.* *Liquor anodynus martialis Klaprothi.* KLAPROTH's ätherische essigsaurer Eisentinctur. [9 einer gesättigten Auflösung von essigsaurem Eisenoxyd mit vorwaltender Essigsäure, 1 Essigäther, 2 *Spir. V. rftiss.* — Spec. Gewicht = 1,020–1,030. — Dunkelrothbraun. — 1 Drachme 1½ Sgr.] *Cave* wie bei *Extr. Ferri pomat.* — Innerl. zu 20–60 Tropfen einigemal tägl. [Ry 145 (*Bals. Copaiv.*).]

+ ***Tinctura Ferri ammoniata s. aperitiva*** PH. SLESV. [Eisensalmiak 15 auf *Spir. V. rftiss.* 60. — Goldgelb. — 1 Drachme 1 Shl.] Innerl. zu 20–60 Tropfen einigemal tägl.

+ ***Tinctura Ferri cydoniata*** PH. SLESV. [+ *Extr. Ferri cydon.* 1 auf *Aq. Cinnam. vin.* 6. — Schwarz. — 1 Unze 10 Shl.] Wie *Tinct. Ferri pomati.*

+ ***Tinctura Ferri muriatici (oxydati)*** PH. HANN. [*Ferr. mur. oxydat.* 1 auf *Spir. V. rft.* 7. — Rothbraun. — 1 Unze 3 Mgr.] Innerl. wie die folgende.

★ ***Tinctura Ferri muriatici oxydulati.*** Tinctur von salzsaurem Eisenoxydul. [*Ferr. mur. oxydulat.* 1 auf *Spir. V. rft.* 7. — Grünlichgelb. — 1 Unze 3 Sgr.] Innerl. zu 15–40 Tropfen einigemal tägl., etwa mit einem aromatischen Wasser verdünnt.

Tinctura Ferri pomati. *Tinct. Martis pomata. Tinct. Malatis Ferri.* Aepfelsaure Eisentinctur. [Extr. F. p. 1 auf Aq. Cinnam. sin. 6. — Schwarz. — 1 Unze 2½ Sgr.] Innerl. zu 30–60 Tropfen einigemal tägl.

* **Tinctura Ferri tartarici.** *Tinctura Martis tartarizata Ludovici s. Martis aperitiva Glauberi.* Weinsteinsaure od. LUDWIG'S Eisentinctur. [Mit Franzbranntwein. — Braungelb. — 1 Unze 2½ Sgr.] *Cave* wie bei *Tartar. ferruginos.* — Wie die yorige. [Verbindung mit Extr. *Helleb. nigri* s. S. 180.]

† **Tinctura Formicarum** PH. SLESV. [20 auf 60. — 1 Unze 4 Sbl.] Wie *Spirit. Formicar.*

† **Tinctura Fuliginis** PH. P. *Tinctura Claudi.* Ruß-tinctur. [7½ auf *Spir. F. rftiss.* 60. — 1 Unze 3½ Sgr.] Innerl. zu Dr. ¼–1, einigemal tägl.

† **Tinctura Galangae** PH. SLESV., HANN. [12½ auf (*Spir. F. rftiss.*: PH. SLESV.) 60. — 1 Unze 8 Sbl.] Innerl. zu 20–60 Tropfen einigemal tägl.

Tinctura Galbani. Mutterharztinctur. [10 auf *Spir. F. rftiss.* 60. — 1 Unze 4 Sgr.] Innerl. zu 30–70 Tropfen einigemal tägl. — Äusserl. zu Injectionen [Ohrtropfen: Ry 519 (*Hydrarg. mercuri. corr.*)], als Augenwasser [einzutropfen oder zu Augenhäuben; — z. B. auf die letztere Weise, pur, doch nicht ununterbrochen, anzuwenden: KOPF gegen serofulöse Ophthalmien, geschwächtes Sehvermögen nach Anstrengungen u. s. w.; FISCHER gegen chronischen Angealiederkrampf], zu Einreibungen [q. v.].

Tinctura Gentianae. Enziantinctur. [10 auf 60. — 1 Unze 3½ Sgr.] Innerl. zu Dr. ¼–1 einigemal tägl.

† **Tinctura gingivalis balsumica s. Myrrhae composita** PH. SLESV. [Catechu, Myrrhe ana 7½, Bals. Peruv. 1½ auf *Spir. F. rft.*, *Spir. Cochlear.* ana 30. — 1 Unze 8 Sbl.] Meist pur zu verordnen und vom Kranken *ex tempore* nach Bedürfniss zu verdünnen.

Tinctura Guajaci ammoniata s. volatilis. Flüchtige Guajakharztinctur. [*Res. Guaj. nat.* 10 auf *Liq. Ammon. vinos.* 60. — 1 Unze 4½ Sgr.] *Cave* Säuren, Alkalien [Ausnahme: Ry 1061], Salze. — Innerl. zu 15–30 (u. mehr) Tropfen mehrmals tägl., in schleimigem Vehikel, also z. B. mit Althäensyrup [etwa Unc. ¼ auf Unc. 2 Syrup, 3–5mal tägl. 1 Theelöffel] oder jede Einzel-

gabe in Haferschleim. [Mit *Liq. Ammon. succin.* ana 1, *Tinct. Opü simpl.* $\frac{1}{2}$; 3mal tägl. 15-20 Tropfen: KRÜKENBERG gegen rheumat. Zahnschmerz, Ry 339 (*Extr. Acon.*), 1061 (*Tinct. kalina*); vgl. auch *Liq. Sapon. stib.*]

Tinctura Guajaci Ligni. Guajakholzinctur.

[12 $\frac{1}{2}$ auf *Spir. V. rftiss.* 60. — Braun. Farbenänderung ähnlich wie bei der folgenden. — 1 Unze 3 $\frac{3}{4}$ Sgr.] Innerl. zu 30-70 Tropfen einigemal tägl. — Selten äusserl. [Mundwasser: Ry 1062 (*Tinct. Laccas*).]

Tinctura Guajaci Resinae. Guajakharzinctur.

[*Res. Guaj. nat.* 10 auf *Spir. V. rftiss.* 60. — Grünbraun; wird durch Schwefelsäure blassgrün, durch salpetrige Säure grün (bei Zutritt von Wasser blau), durch Chlor, *Spir. nitrico-aeth.*, salzsaur. Eisen u. Ammonium, schwefelsaur. Kali u. Magnesia, kohlen. Kalk blau, durch Alkalien braun; giebt mit *Spir. saponat.* ein gelbes Gemisch, aus welchem Wasser nicht, wie sonst, das Harz niederschlägt. — 1 Unze 4 Sgr.] Innerl. zu 30-70 Tropfen, 3mal tägl.

† ***Tinctura Hetenii s. Radicis Enulae*** PH. AUSTR. [10 auf 60.] Innerl. zu Dr. $\frac{1}{2}$ - 1 einigemal tägl.

† ***Tinctura Hellebri albi*** PH. HANN. [12 $\frac{1}{2}$ auf 60. — 1 Unze 3 Mgr.] Innerl. zu 4-8 (u. vorsichtig steigend mehr) Tropfen, 3-4mal tägl.

† ***Tinctura Hellebri nigri s. Melampodii*** PH. P., HANN., AUSTR. [10 (in PH. HANN. mit *Coccionell.* $\frac{5}{12}$) auf 60. — 1 Unze 3 $\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. zu 20-60 Tropfen einigemal tägl.

Tinctura Hyoscyami. Bilsenkrauttinctur. [10 auf *Spir. V. rftiss.* 40, Wasser 20. — 1 Unze 3 $\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. zu 10-20 (u. allmählig mehr) Tropfen einigemal tägl. — Zu Augentropfwässern [mit 2- $\frac{1}{2}$ Theilen Wasser verdünnt oder selbst pur].

† ***Tinctura Hyoscyami (Seminis)*** PH. SLESV. Bilsensamentinctur. [5 auf 60. — 1 Unze 6 Sbl.] Innerl. zu 20-40 (u. allmählig mehr) Tropfen einigemal tägl.

† ***Tinctura Jalapae Radicis*** PH. SLESV. Anhg. [15 auf 60. — 1 Drachme 1 Sbl.] Innerl. nur etwa als Reizmittel, zu 40-60 Tropfen einigemal tägl.; oder als Zusatz zu abführenden Mixturen [Dr. $\frac{1}{2}$ - 2 auf den Tag].

† ***Tinctura Jalapae Resinae*** PH. SLESV. Anhg. [Mit *Sapo med.* ana 5 auf *Spir. V. rftiss.* 60. — 1 Drachme 2 Sbl.] Innerl. nur etwa als Reizmittel, zu 15-40 Tropfen einigemal tägl.

Tinctura Iodi. Iodtinctur. [6 auf *Spir. V. alcohol.* 60.

Verwandelt sich mit der Zeit in Iodnaphtha. — 1 Drachme $1\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave* wie bei *Iodum*; auch längere Aufbewahrung. Beim Hinzutreten von (vielm) Wasser scheidet sich Iod aus, so dass, wenn man bei unzuverlässigen Kranken die Tinctur nicht tropfenweise zu verordnen wagt, es rathsamer ist, sie durch Weingeist oder auch [doch dann nur auf Einen Tag] durch [Gummi- oder Leinsamen-] Schleim oder *Syr. simpl.* zu verdünnen, als durch blosses Wasser.

Innerl. (*ad Grana* — „soll wohl heissen: *Guttas*“* — *decem*!) zu (2-) 4–16 Tropfen, 2–3mal tägl.; am besten pur [etwa in einer der oben angegebenen Verdünnungen]; doch auch bisweilen, aber meist minder rathsam, in Verbindungen [z. B. *Extr. Bellad. Scr.* $\frac{1}{2}$ in Dr. 2, einigemal tägl. 10 Tropf. (u. allmählig mehr): MICHELSON gegen chronische Ruthenkrümmung nach Tripper (daneben ein Aufguss von *Dulcam.* u. *Senega*)]. Jede Einzelgabe in einhüllendem Vehikel [einem der oben angegebenen Schleime, oder Zuckerwasser].

Ausserl. zu Augenwässern [noch wenig angewandt; zu Augenbähungen etwa *Scr.* $\frac{1}{2}$ – Dr. $\frac{1}{2}$ auf *Unc.* 4]; zum Aufpinseln [nach BUCHANAN bei Anschwellungen, Steifigkeit, Contraction der Gelenke — besonders nach Verwundungen —, bei Geschwüren u. Fistelgängen in der Nähe derselben, u. bei nicht vereinigten Knochenbrüchen, pur od. mit Kalkwasser verdünnt, auf den kranken Theil täglich aufzutreiben, auch wohl (wo Beförderung der Resorption durch mechanische Reizung angezeigt: WUTZER) mit einer Bürste zu appliciren], Einreiben [mischet man die Tinct. in einem gewissen Verhältnis mit Seifenliniment, so verliert das anfangs schön dunkelbraune Gemisch unmerklich seine Farbe, u. zeigt nach 24 St. nur noch die Schattirung des Seifenlinim.; Ähnliches geschieht bei der Vermischung mit Öl. Deshalb nur kleine Portionen unmittelbar vor der Anwendung zu mischen.], zu Umschlägen [z. B. Dr. 1 auf *Aq. dest.* *Unc.* 3 (umgeschüttelt): RICORD zur Zertheilung von Ganglien u. hartnäckigen Periostosen. Oder Dr. 1, allmählig bis Dr. 6, auf *Unc.* 3 (man steige so lange, bis das Mittel ein ziemlich lebhaftes Gefühl von Wärme erzeugt, die Haut sich bräunt und unter der in pergamentartigen Schuppen sich ablösenden Epidermis eine „fettige“ Transpiration zeigt; dann in derselben Stärke beharren), 2mal tägl. auf den Hodensack applicirt: Derselbe gegen Hydrocele.], Bädern [LUGOL mit Seesalz gegen Scrofeln; zweckmässiger aber Iodum].

Tinctura kalina. Tinctura Antimonii acris s. Antim. regulina s. Antim. tartarisata. Tinct. Salis Tartari. Ätzkalitinctur. [*Kali caust.* *Unc.* 4 mit *Spir. V. alcohol.* L. 2 einige Tage digerirt, dann decantirt. Neben dem kaustischen Kali bildet sich, durch Zersetzung eines Theils des Alcohols, azeotisches, essigsaur. u. kohlen-

*) Es wäre zwar sehr zweckmässig, wenn so differente Flüssigkeiten so viel als möglich immer nach dem Gewicht dispensirt wurden; da dies indess die Pharmakopöe bei andern eben so differenten nicht vorschreibt, so scheint es auch hier nur ein Versehen zu seyn.

saur. Kali und eine harzähnliche Substanz. — 1 Unze $7\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave* wie bei *Kali caust. sicc.*

Innerl. (≡) zu 10–30 Tropfen 3–4mal tägl., am besten gar nicht, oder nur mit destillirtem Wasser verdünnt, ohne irgend einen corrigirenden Zusatz; jede Einzelgabe aber in einem schleimigen Vehikel. [Gern mit *Liq. Ammon. succin.* (unchemisch, doch erprobt); z. B. 1 Tinct. mit $\frac{1}{2}$ *Liq.*: *Tinct. nervina* STAHL, von ihm bei allen chronischen Krankheiten mit Atonie, irregulärer Wirkung des Nervensystems u. der Absonderungsorgane angewandt. — Verbindung mit *Aq. Laurocer.* s. dort.] Ry 1061.

1061.

Ry *Tinct. kalinae* Dr. 3
— *Opii simpl.* Dr. 1
— *Guajaci ammon.* Unc. $\frac{1}{4}$.

M. D. S. 4mal tägl., umgeschüttelt, 30–40 Tropfen in Haferschleim. (Gegen einen nach der COTUNNischen Methode zurückbleibenden Rest des Hüftwehs.) HUFELAND.

† *Tinctura Kino* PH. SLESV. [10 auf *Spir. V. rftiss.* 60. — 1 Unze 8 Shl.] Wie *Tinct. Catechu*. [Injection: Ry 393 (*Extr. Ratanh.*).]

* *Tinctura Laccae*. Lacktinctur. [*Lacca in Grana* (Körnerlack; vgl. *Resinae*; nur hierzu officinell) 1, Alaun $\frac{1}{2}$, mit *Aq. destill.* 8 auf 6 gekocht, dazu Salbeiwasser u. Rosenwasser ana 2. — 1 Unze enthält also Gr. 24 Alaun aufgelöst. — Schön roth; wird durch Säuren rothgelb, durch Alkalien violett. — 1 Unze $\frac{5}{8}$ Sgr.] Nur als [schönfärbender u. zugleich gelind adstringirender] Zusatz, namentlich zu Mund- u. Gurgelwässern [etwa Unc. 1 auf Unc. 6. — Ry 1062], Zahntincturen [q. v.].

1062.

Ry *Tinct. Myrrhae*
— *Cinnamomi* ana Dr. 1
— *Guajaci Ligni* Dr. 2
— *Lacca* Dr. 3
Spir. Cochleariae Unc. 1.

M. D. — 1 Theelöffel voll mit 2 Essl. Wasser gemischt, umgeschüttelt, damit den Mund auszuspülen. (Bei scorbutischem Zahnfleisch. — Zu der Totalquantität etwa noch *Bals. Peruv. Scr.* 1: dann einer Toilette würdig.) RUST.

† *Tinctura Lupuli Strobilorum* PH. HANN. [10 auf 60. — 1 Unze $3\frac{1}{2}$ Mgr.] Innerl. zu Dr. $\frac{1}{4}$ –1 mehrmals tägl. [Vgl. † *Extr. Lupuli*.]

† *Tinctura Macidis* PH. SLESV., HANN. [12 $\frac{1}{2}$ auf (*Spir. V. rftiss.*: PH. SLESV.) 60. — 1 Unze resp. 8 Shl. und 5 Mgr.] Innerl. zu 20–60 Tropfen mehrmals tägl.

* *Tinctura Moschi*. Bisamtinctur. [1 $\frac{1}{4}$ auf *Spir. V. rft.* u. *Aq. destill.* ana 30; digerirt, bis sich der Moschus fast gänzlich aufgelöst hat. — 1 Drachme $5\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. zu Dr. 1–2 und mehr, mehrmals tägl. [Man kann in ihr den Moschus nicht süßlich in voller Dose geben;

deshalb wird man sie in der Regel nur als Zusatz zu andern flüchtig erregenden Mitteln benutzen. Hierzu passt sie recht gut, da sie — auf eine sehr zweckmässige Weise bereitet — die Wirkung des Moschus wohl recht vollkommen besitzt. — Verb. mit *Tinct. Ambræ* s. dort.] — Äusserl. bisweilen zu Räucherspiritus [vgl. I. S. 197], auch wohl zum Besprengen von Räucherpulvern.

Tinctura Myrrhae. Myrrhentinctur. [10 auf *Spir. F. rassis*. 60. — 1 Unze $4\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerl. (selten) zu 20–40 Tropfen u. mehr, mehrmals tägl.

Äusserl. zu Mund- u. Gurgelwässern [Dr. 1–4 auf Unc. 6. — Ry 285 (*Cort. Chin. fusc.*), 325 (*Cupr. sulph.*), 678 (*Mastiche*), 1062 (*Tinct. Laccæ*)], Pinselsäften [Dr. 1–2 u. mehr auf Unc. 1. — Ry 1060 (*Tinct. Catechu*)], Zahntincturen [Ry 980 (*Spir. Cochlear.*)]; als Zusatz zu Einspritzungen, Verbandwässern [Ry 34 (*Acid. phosph.*), 305 (*Cort. Querc.*)] u. dgl.; zu Salben u. Lini-
menten [z. B. Dr. 2 (–3, was indess der Consistenz der Salbe wegen nicht zweckmässig) mit *Ungt. basilic.* Unc. 1: ein von RUST häufig angewandtes Verbandmittel. — Ry 222 (*Carbo ppt.*)].

† **Tinctura Nicotianæ** Ph. P. [10 auf 60. — 1 Unze $3\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. zu 20–40 Tropfen 3–4mal tägl. [Bei Harnverhaltung während des Trippers nach WESTBERG stündl. 20 Tropfen in Leinsamendecoct; man sey jedoch damit bei heftiger Entzündung vorsichtig.]

† **Tinctura Nucis Vomicae** Ph. P. Krähenaugentinctur. [10 auf 60. — 1 Unze $3\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. zu 12–24 Tropfen (allmählig steigend bis zu Dr. $\frac{1}{2}$, ja Dr. 1), 1–2mal, später 3–4mal tägl. — Äusserl. zum Einreiben [in den Rücken, neben dem innerlichen Gebrauch: SERRES bei Bleikolik].

Tinctura Opii benzoica. *Elixir paregoricum.* Benzoësäurehaltige Opiumtinctur. — Besänftigendes Elixir. [*Opium pulv.*, *Acid. benz.*, *Camph.*, *Ol. Anisi ana* $\frac{5}{8}$ auf 60. Die Unze enthält also ungefähr von $2\frac{1}{2}$ Gran Opium das Lössliche. — 1 Unze $3\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. zu Dr. $\frac{1}{2}$ einigemal, oder zu Dr. 1 1–2mal, tägl. (Kindern von 1–2 Jahren gegen Keuchhusten zu 5–20 Tropfen); meist pur, doch auch mit einem schleimigen Syrup oder *Liq. Ammon. succin.* u. dgl. verbunden, oder in andern Mixturen [Ry 303 (*Extr. Conii mac.*)].

Tinctura Opii crocata. *Laudanum liquidum Sydenhami.* [Bisweilen *Laudanum* schlechtweg, was jedoch zur Verwechslung mit *Opium* Veranlassung geben kann.] *Vinum paregoricum*; *Vinum Opii aromaticum.* Safranhaltige od. SYDENHAMISCHE Opium-

tinctur. Flüssiges Laudanum. [*Opium pulv.* $6\frac{1}{3}$, *Crocus* $2\frac{1}{3}$, Würznelken u. Zimmtcassie ana $\frac{1}{3}$, auf Mallagawein 60. — 12 Tropfen werden ungefähr von 1 Gran Opium das Lösliche enthalten. — 1 Unze $8\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerl. (*ad Guttas triginta!*) zu 2-4 Tropfen zur Erzeugung kleinerer, 8-16 zur Erzeugung mittlerer, 16-48 Tropfen zur Erzeugung stärkerer, betäubender Wirkungen [16 Tropfen werden in der Wirkung ungefähr einem Gran Opium entsprechen. — Auch hier muss man bei heftigen Krämpfen, Starrkrampf u. s. w. oft noch höher steigen: vgl. *Opium.*]; einigemal tägl. (über die Wiederholung der Gaben vgl. *Opium*). Pur oder in Mixturen [Ry 1063-1066; 238 (*Cera*), 503 (+ *Hydrarg. hydrocyan.*), 683 (*Mixt. sulphur.-ac.*), 813 (*Plumb. acet. dep.*), 829 (*Rad. Arnic.*), 1058 (*Tinct. Castor.*)], selten in geringer Menge als Zusatz zu festen od. festweichen Formen [Ry 290 (*Cort. Chin. reg.*)].

Ausserl. [sie färbt die Haut safrangelb, u. die Färbung lässt sich nicht sogleich wieder abwaschen; oft wählt man deshalb lieber die *Tinct. Opii simplex*] zu Zahnpillen [als Constituens], Zahntropfen [Ry 1067], Klystieren [in gewöhnlichen Fällen nicht leicht mehr (meistens aber weniger) als Scr. 1 (25 Tropf.), und dies alle 6-4 St. wiederholt. — Ry 1068; 194 (*Camph.*)], Augenwässern [Zu Augenbähungen Dr. $\frac{1}{2}$ -2 auf Use. 4. Ry 318 (*Cupr. alumin.*), 520-523 (*Hydr. mur. corr.*), 1095 (+ *Zinc. hydrocyan.*). — Zu Tropf- u. Pinsel-Wässern verdünnt oder pur. Ry 1069; 1110 (*Zinc. sulph.*). — Mit 2-3 Theilen destill. Wassers verdünnt (nicht pur!), 2mal tägl. 1 Tropfen einzuflüssen (und hinter dem Ohr eine kleine Vesicatorstelle längere Zeit offen zu halten): KNECHKE zur Heilung des grauen Staars, wo keine bestimmte Causalindication. — Mit *Aq. Sambuci ana*, 2mal tägl. einzustreichen: NIEMEYER bei Augenblennorrhöe Neugeborner.], Augensalben [Gtt. 5-25 (Scr. 1), höchstens Dr. $\frac{1}{2}$, auf Dr. 2. Stärkere Quantitäten würden sich nicht unterbringen lassen. — Ry 500 (*Hydr. ammon.-mur.*), 553 (*Hydr. oxyd. rubr. ppt.*)], auch anderen Salben [z. B. zur HELLMUNDsehen, 8.72], Linimenten [Ry 641 (*Liq. Ammon. caust.*); vgl. *Linim. saponato-camph.*], Fomentationen, Kataplasmen [selten. Ry 463 (*Hb. Camii mac.*)], etc.

1063.

Ry *Mixt. sulphur.-acidæ* Scr. 1
Tinct. Opii croc. Dr. 1
— *Cinnam.* Dr. 3.

M. D. S. Halbstündl. 30-40 Tropfen, mit etwas Haferschleim. (In dringenden Fällen von Metrorrhagie.) Vgl. Ry 683. JAHN.

1064.

Ry *Tinct. Opii croc.* Dr. $\frac{1}{2}$
Decocti Rad. Salep
Aq. Menth. pip. ana Unc. 3.

M. D. S. Alle 2-4 St. 1 Reel. (Für leichtere Fälle der orient. Cholera von Petersburger Ärzten empfohlen.)

1065.

Ry *Tinct. Opii croc.* Gtt. 5-10
— *aromat.* Scr. 4
Aq. Foenic. Unc. 2.

M. D. S. Auf Einmal zu nehmen. (Im Stadium prodromor. der orient. Cholera von Polnischen Ärzten oft mit Nutzen angewandt.)

Beim Zutritt des Wassers scheiden sich

aus der schön klaren, braunrothen *Tinct. aromat.* die harzigen Theile aus, und die Flüssigkeit wird trübe, lehmwasser-ähnlich; besser also nimmt man die Verdünnung (mit Fenchelthee oder Schleim) erst *ex tempore* vor.

1066.

R_y *Tinct. Opii crocat.*
Aether. acet. ana Scr. 1
Aq. destill. Unc. 5
Syr. Flor. Aurantii Unc. 1.
M. D. S. Alle 2–1 St. $\frac{1}{2}$ –1 Essl. (Als *Analepticum.*) SÜNDELIN.

1067.

R_y *Tinct. Opii crocatae*
Spir. sulphurico-aetherei
Ol. Menthae piperit. ana Scr. 1.
M. D. S. Dobberaner Zahntropfen (auf Baumwolle in den hohlen Zahn zu bringen, auch etwas davon in die Backe ein-

zureiben).

Häufig werden Varianten von dieser Composition, mit *Tinct. Opii simpl.*, *Aether sulph.*, *Ol. Cajuputi* od. *Caryophyllor. p. p.* verordnet.

1068.

R_y *Ol. Chamom. cocti* Unc. $\frac{1}{2}$
Gm. Mimos. pulv. Dr. 2
terendo sensim misce c.
Lactis vaccini Unc. 3
ut f. Emuls., cui adde
Tinct. Opii croc. Scr. $\frac{1}{4}$.
M. D. S. Wenig erwärmt, umgeschüttelt, zum Klystier.

1069.

R_y *Tinct. Opii crocat.*
Aq. Rosarum
Mucil. Cydonior. ana Dr. $\frac{1}{2}$.
M. D. S. 4mal tägl. einige Tropfen lauwarm ins Auge zu tröpfeln. VOGT.

† *Tinctura Opii nigra* PH. SLESV. [*Opium* 34 $\frac{2}{3}$, Muskatnuss 6 $\frac{2}{3}$, Safran 2 $\frac{1}{2}$, Bieressig 206; $\frac{1}{4}$ St. gekocht, dann dazu Zucker 17 $\frac{1}{2}$, Bierhofen 8 $\frac{4}{7}$; 6 Wochen gähren gelassen, filtrirt, auf 60 eingedampft. — 1 Drachme 10 Shl., 6 Tropf. 1 Shl.]

Tinctura Opii simplex s. thebaïca. Einfache Opiumtinctur. [*Opium pulv.* 6 $\frac{6}{9}$ auf *Spir. V. rft.* und Wasser ana 30. Gehalt an Opium also wie bei der vorigen. — 1 Unze 5 $\frac{5}{8}$ Sgr.]

Innerl. (*ad Guttas triginta!*) wie die vorige; pur [so z. B. giebt RUST bei Wundstarrkrampf gewöhnlich zuerst 20 Tropfen, dann stündl. 5–10 Tropfen mehr, — bis zur Narkose; dann schwarzen Kaffee bis die Narkose aufhört, u. nun wieder von vorn 20 Tropfen u. s. w. — Vgl. S. 363.] oder in Mixturen [1 mit *Vin. stibiat.* 3, alle 1– $\frac{1}{2}$ St. 15 Tropfen: RICHTER, MONRO u. A. bei rheumat. Ruhr. — R_y 1070–1072; 24 (*Acid. nitric.*), 42 (*Acid. sulph. dilut.*), 272 (*Cort. Angustur.*), 986 (*Spir. Nitri fum.*), 1061 (*Tinat. kalina*); STÜTZ's Meth. gegen Starrkrampf: R_y 582; vgl. auch *Aq. Laurocer.*, *Tinct. Guaj. ammon.*].

Äusserl. zu Mund- u. Gurgelwässern [R_y 321 (*Cupr. alumin.*)], Pinselsäften [R_y 193 (*Camph.*), 391 (*Extr. Ratanh.*), 512 (*Hydr. mur. corr.*)], Zahntropfen [wie *Tinct. Op. croc.* — Oft gegen Zahnschmerzen mit *Aether sulph.* in die Backe einzureiben], Klystieren [wie *Tinct. Op. croc.*] u. a. Injectionen [z. B. für die Harnröhre Dr. 1–4 auf Unc. 6, für die Vagina noch stärker; doch als Zusatz zu andern Mitteln meist in geringeren Dosen. — R_y 516 (*Hydr. mur. corr.*), 808 (*Plumb. acet. crud.*)],

1092 (*Fütiol. alb.*). — Ohrtropfen: Ry 586, 587 (*Kali caust. sicc.*)], Augenwässern [wie *Tinct. Op. crocata*, die jedoch zu diesem Behuf beliebter, weil die *simplex* mit wässerigen Flüssigkeiten in Verbindung trübere, flockige Augenwässer giebt. — Augen-Waschungen und Bähungen: Ry 88 (*Ammoniac. dep.*), 495 (*Hb. Viol. tricol.*); vgl. *Tinct. Castor.* Tropfwässer: Ry 6 (*Acet. plumbic.*), 320 (*Cupr. alumin.*)], Augensalben [wie *Tinct. Op. croc.*] u. anderen Salben [Ry 681 (*Mixt. oleoso-bals.*), 947 († *Res. Pini empyreum. liq.*)], Einreibungen, Linimenten [pur (z. B. ums Auge einzureiben) oder in Verbindungen. Ry 1073, 1074; 652 (*Liq. Ammon. caust.*)], Waschungen [Ry 794 (*Petrol.*)], Bähungen [Ry 12 (*Acet. plumb.*)], Verbandwässern [Ry 30 (*Acid. nitr.*), 125 (*Argent. nitr. cryst.*), 353 (*Extr. Calend.*)]; selten als Zusatz zu Kataplasmen; etc.

1070.

Ry *Tinct. Opii simpl.*
Spir. sulph.-aether. ana Dr. 1
Liq. Ammon. succin. Scr. 2.
M. D. S. Zu 15-25 Tropfen, nach Bedürfniss wiederholt. (Bei hysterischen Krämpfen.) G. A. RICHTER.

1071.

Ry *Ol. Ment. pip.* [od. *Cajeputi*] Scr. $\frac{1}{4}$
Tinct. Opii simpl. [od. *croc.*] Dr. $1-1\frac{1}{2}$
Aether. sulph. [od. *acet.*] Dr. $1\frac{1}{2}-2$.
M. D. — Zu 10-15 (u. mehr) Tropfen, alle $1-\frac{1}{2}$ St. (Compositionen der Art sind häufig bei der orient. Cholera versucht worden, — mannigfacher anderen Verbindungen der Opiumtincturen mit Baldrian-, Bibergeil-, Bisam- u. a. Tincturen, *Liq. Ammon. succin.*, etc. zu geschweigen.)

1072.

Ry *Tinct. Opii simpl.* Dr. 1

+ *Tinctura Opii vinosa* PH. HANN. [6 auf Mallagawein 48, *Spir. V. rst.* 12. — 1 Scrup. $\frac{1}{2}$, 1 Drachme $1\frac{1}{4}$ Mgr.] Innerl. in denselben Gaben wie die beiden vorigen. — Äusserl. zu ähnlichen Zwecken, besonders oft passend zu Augenwässern [wo die Zusätze der *Tinct. Op. crocata* nicht erwünscht sind].

Tinctura Pimpinellae. Bibernelltinctur. [$12\frac{1}{2}$ auf *Spir. V. rstiss.* 60. — 1 Unze $3\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerl. zu 20-60 Tropfen einmal tägl., pur [z. B. bei den ersten Symptomen beginnender Bräune 20-60 Tropfen auf Zucker langsam zu ver-

Acidi sulphurici diluti Dr. 2

Aq. Cerasorum Unc. 6

Syr. Rubi Id. Unc. 2.

M. D. S. 2stündl. 1 Essl. mit Hafer-schleim. (Bei colliquativen Schweissen. — Vgl. Ry 42.) G. A. RICHTER.

1073.

Ry *Bals. Peruviani* Dr. $\frac{1}{2}$
Spir. muriat.-aether.
Tinct. Opii simpl. ana Dr. 2.
M. D. S. Umgeschüttelt zum Einreiben. (Bei Frostbeulen.) HENSCHEL.

1074.

Ry *Aq. Calcariae* Unc. 1
Ol. Amygdal. Unc. 2,
Tinct. Opii simpl. Dr. $2\frac{1}{2}$.
M. D. S. Umgeschüttelt 4mal täglich mittelst eines Charpiepinsels zu appliciren. (Auf schmerzhaftes syphilitische Pusteln.) HEBER.

schlucken, um dem Ausbruch noch vorzubeugen: GÜNTHER] od. in Mixturen [Ry 385 (*Extr. Nuc. Vom. spirit.*), 682 (*Mixt. pyro-tart.*). — 1 mit *Oxym. scillit.*, *Syr. Alth.* ana 4, theelöffelweise langsam zu verschlucken: REIL gegen chronische Heiserkeit. — *Kali acetic.* Dr. 2 in *Tinct. Pimp. Unc.* $\frac{1}{2}$ aufgelöst, 4mal tägl. 20-80 Tr. („in versüßtem Schleim“): BURDACH als Diureticum].

Äusserl. zu Mund- u. Gurgelwässern [Dr. 2-4 oder mehr auf Unc. 6. — Ry 70 (*Alum.*), 325 (*Cupr. sulphur.*), 489 (*Hb. Salo.*), 877 (*Rad. Pyrethri*)]; als Zusatz zu Zahnfleischlatwergen, anodynen Zahntropfen.

* *Tinctura Pini composita. Loco Tincturae Lignorum.* Zusammengesetzte Fichtensprossentinctur. [Turion. Pini 5, Lign. Guajaci $3\frac{1}{2}$, Lign. Sassafr., Bacc. Junip. ana $1\frac{1}{2}$, (zusammen also $11\frac{1}{2}$), auf 60. — 1 Unze $3\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. zu Dr. $\frac{1}{2}$ -1, mehrmals tägl.

† *Tinctura Quassiae* PH. SLESV. [*Cort. Quass.* 10 auf 60. — 1 Unze 6 Shl.] und PH. HANN. [*Lign. Quass.* $12\frac{1}{2}$ auf 60. — 1 Unze 3 Mgr.]. Innerl. zu Dr. $\frac{1}{2}$ -1, einigemal tägl.

* *Tinctura Ratanhae saccharata.* Zuckerhaltige Ratanhatinctur. [*Rad. Ratanh.* 12, gebrannter Zucker 6, auf Spirit 48, Wasser 12. — 1 Unze $4\frac{1}{2}$ Sgr.] Innerl. zu Dr. $\frac{1}{2}$ -1, mehrmals tägl., meist wohl nur als Zusatz zu Mixturen. — Äusserl. zu Mundwässern [Ry 192 (*Camph.*)].

† *Tinctura Rhei amara* PH. SLESV. [*Rheum* 5, *Rozian* $1\frac{1}{4}$, *Rad. Serpentar. Virg.* $\frac{1}{2}$, auf 60. — 1 Unze 8 Shl.] Innerl. wie *Tinct. Rhei vinosa*.

Tinctura Rhei aquosa. Anima Rhei. Infusum Rhei kalinum. Wässerige Rhabarbertinctur. [*Rheum* 6, *Kali carbon.* $1\frac{1}{2}$ auf etwa 60 Wasser, wobei etwas *Aq. Cinnam. vincta*. — 1 Unze 3 Sgr.] Cave wie bei *Kali carb. e Tart.* und wie bei *Rad. Rhei*. — Innerl. zu Dr. $1\frac{1}{2}$ -3, einigemal tägl.; — als Abführmittel [selten; sehr unsicher] Unc. $1\frac{1}{2}$ -2, in einem Paar Portionen rasch hinter einander. Pur [nur etwa noch mit einem geschmackverbessernden Zusatz von *Tinct. Cinnam.*] oder in Mixturen [Ry 1075; 366 (*Extr. Colombo*), 668 (*Magnes. carbon.*), 710 (*Natr. carbon. acidul.*); vgl. auch *Liq. Kali acet.*].

1075.

Ry *Mannae electae* Unc. $\frac{1}{2}$
solve in

Aq. Foeniculi Unc. $1\frac{1}{2}$

cola, adde

Tinct. Rhei aquosae Unc. $\frac{1}{2}$.

M. D. S. Stündl. 1 Essl. (Abführmittel für ein 2jähriges Kind.)

† *Tinctura Rhei composita* PH. HANN. [*Rheum* 5, *Ra-*

zian $1\frac{1}{2}$, Rad. Serpent. Virg. $\frac{5}{8}$, auf weissen Franzwein u. Spir. V. rst. ana 30. — 1 Unze 6 Mgr.] Innerl. wie *Tinct. Rhei vinosa*.

Tinctura Rhei vinosa. Loco Tincturae Rhei Darrelii. Weinige Rhabarbertinctur. [Rhabarber 5, Pomeranzenschalen $1\frac{1}{4}$, Cardamom $\frac{5}{8}$, Mallaga 60, Zucker $7\frac{1}{2}$. — 1 Unze 5 Sgr.] Innerl. zu Dr. 1-2, einigemal tägl. (nicht als Abführmittel), pur od. in Mixturen [etwa mit *Aq. Cinnam. simpl.* — R₂ 1076].

1076.

R₂ *Tinct. Colocynthid. Scr.* 1
— *Rhei vinosae*

Aq. Menth. pip. ana Unc. $1\frac{1}{2}$.
M. D. S. 3mal tägl., umgeschüttelt,
1 Essl.

* **Tinctura Rosarum acidula.** Sauerliche Rosentinctur. [Essigrosen 3, mit verdünnter Schwefelsäure 1 u. heissem Wasser 24 infundirt; filtrirt. — Schön roth. — 1 Unze 1 Sgr.] *Cave* wie bei *Acid. sulph. dilut.* — Innerl. [selten] als Zusatz zu antiseptischen Mixturen [etwa Dr. 2-Unc. 1 auf Unc. 6]; zum Getränk [etwa Unc. 2-3 mit *Syr. Cerasor.* Unc. 1 auf 1 Quart]. — Äusserl. zu Mund- u. Gurgelwässern [etwa Unc. 1-3 auf Unc. 6, mit *Syr. Moror.*], Pinselsäften [etwa zu gleichen Theilen mit *Mel rosat.*].

† **Tinctura Sabinæ** PH. HANN. [10 auf 60. — 1 Unze 3 Mgr.] Innerl. zu 30-60 Tropfen mehrmals tägl.

† **Tinctura salina** PH. SLESV. Anhg. [Pomeranzengelb, Ranzian ana 1, Kali carbon. 4, mit Wasser 12, dem später noch Spir. V. rst. 5 zugesetzt wird, digerirt. — 1 Unze 6 Sbl.] *Cave* wie bei *Kali carb. e Tart.* — Innerl. zu 20-50 Tropfen einigemal tägl., etwa in Bier.

† **Tinctura Scillae** PH. SLESV. [10 auf 60. — 1 Unze 6 Sbl.] und PH. HANN. [12 $\frac{1}{2}$ auf 60. — 1 Unze 3 $\frac{1}{2}$ Mgr.] Innerl. zu resp. 15 und 12 Tropfen, allmählig steigend bis zu resp. 90 Tropfen (1 Drachme) und 72 Tropfen; mehrmals tägl.

Tinctura Scillae kalina. Kalihaltige Meerzwiebeltinctur. [*Scilla* 10, *Kali caust.* $1\frac{1}{4}$, mit Spir. V. rst. 60 digerirt. — 1 Unze 3 $\frac{3}{4}$ Sgr.] *Cave* wie bei *Kali caust. sicc.* — Innerl. zu 10-20, allmählig steigend bis zu 40 Tropfen, einigemal tägl.; pur [wenn sie den Magen angreift, mit *Tinct. bromat.*; bei empfindlichen Personen die Einzeldosen in Hafer Schleim] oder in Mixturen [vgl. *Tinct. Digital. simpl.*].

* **Tinctura Sennae.** Sennestinctur. [*Fol. Senn.* 5, nebst grossen Rosinen, ein wenig Kümmel u. Cardamom auf Spirit 60. — 1 Unze 3 $\frac{1}{4}$ Sgr.]

Als Zusatz zu andern Abführmitteln drachmenweise; als Reizmittel etwa zu Dr. $\frac{1}{4}$ (od. mehr) einigemal tägl. [Ry 451 (*Helminthochort.*)].

+ *Tinctura stomachica Lentini* PH. HANN. [Kalmus, Galgant, Enzian, Zittwerwur, Cardobenedictenkr., Pomeranzengelb, Rhabarber, Cardamom, zusammen $9\frac{5}{8}$, Coccionelle $\frac{1}{4}$, auf 60. — 1 Unze 3 Mgr.] Innerl. zu Dr. $\frac{1}{2}$ - 1, mehrmals tägl.

* *Tinctura Stramonii Seminis.* Stechapfelsamentinctur. [12 $\frac{1}{2}$ auf 60. — 1 Unze 3 $\frac{2}{3}$ Mgr.] Innerl. (*ad Guttas viginti!*) zu 5-15-20 (und vorsichtig mehr) Tropfen einigemal tägl. — Äusserl. zu Augenbähungen [Dr. 1 auf Unc. 3: HUFELAND gegen scrofulöse u. andre chronische Augenentzündungen mit grosser Empfindlichkeit des Auges, Lichtscheu u. s. w.], Einreibungen.

Tinctura Succini. Bernsteintinctur. [15 auf *Sp. V. alcoh.* 60. — 1 Unze 6 Sgr.] Innerl. zu 25-50 Tropfen (Dr. $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$) einigemal tägl.

+ *Tinctura Toxicodendri* PH. P. Giftsumachtinctur. [10 auf 60. — 1 Unze 3 $\frac{5}{8}$ Sgr.] Innerl. etwa anfangs zu 2-4 Tropfen, allmählig vielleicht bis zu Dr. 1; 2-3mal tägl. (Vgl. *Fol. Toxicod.*)

+ *Tinctura Trifolii fibrini* PH. HANN., SLESV. [10 auf 60. — 1 Unze resp. 3 Mgr. und 68hl.] Innerl. zu Dr. $\frac{1}{2}$ - 1, mehrmals tägl.

Tinctura Valerianae. Baldriantinctur. [12 $\frac{1}{2}$ auf *Spir. V. rftiss.* 60. — 1 Unze 3 $\frac{5}{8}$ Sgr.] Innerl. zu 40-70 Tropfen, mehrmals tägl. [Ry 657 (*Liq. Ammon. succin.*)].

Tinctura Valerianae ätherea. [7 $\frac{1}{2}$ auf *Spir. sulph.-aeth.* 60. — 1 Drachme $\frac{5}{8}$ Sgr.]

Innerl. wie *Spir. sulph.-aeth.* [Wenn schon in den beiden andern Baldriantincturen der Gehalt an Baldrian so gering ist, dass man denselben in ihnen bei weitem nicht in voller Dose geben kann, so gilt des in noch weit höherem Grade von dieser, die man fast als reinen *Spir. sulph.-aeth.*, der nur jetzt gelbbraun aussieht u. ein wenig nach Baldrian riecht, zu betrachten hat. Das Mittel ist recht brauchbar, wenn man halb gelehrten Kranken den *Spir. sulph.-aeth.* unkenntlich geben will.] pur oder in Mixturen [z. B. 1 mit 2 *Elixir Aurant. comp.*, 3mal tägl. 30-40 Tropfen: G. A. RICHTER gegen krankhafte Empfindlichkeit des Magens u. dadurch bedingtes chronisches Erbrechen. — Oft mit äther. Ölen (wie *Spir. sulph.-aeth.*). — Ry 931 (*Rad. Valer. min.*), 1058 (*Tinct. Castor.*); vgl. auch *Extr. Hyosc.*].

Tinctura Valerianae ammoniata s. volatilis [10 auf *Liq. Ammon. vinos.* 60. — 1 Unze $4\frac{1}{2}$ Sgr.] Wie **Tinctura Guajaci ammoniata**.

† **Tinctura Vanillae** PH. SLESV. [10 auf 60. — 1 Drachme $2\frac{1}{3}$ Sgr.] Innerl. zu Dr. $\frac{1}{2}$ - 1, einigemal tägl.

† **Tinctura Zingiberis** PH. SLESV. Anhg. [10 auf 60. — 1 Unze 6 Sbl.] Innerl. zu Dr. $\frac{1}{2}$ - 1, einigemal tägl.

★★ **Trochisci bechici.** Brust- od. Husten-Kügelchen. [Aus *Gm. Mimos.*, *Rad. Irid.*, *Flor.*, Liquiritiensaft (Hauptbestandtheil) u. Liquiritienwurzel, Fenchel, Anis, Zucker u. Traganteschleim. — 1 Unze $3\frac{1}{2}$ Sgr.] *Ad libitum*.

★★ **Trochisci Ipecacuanhae.** Brechwurzelkügelchen. [Aus einem *Infus. Rad. Ipecac.* (Dr. 2) Unc. 1 mit *Sacch. albiss.* Unc. 16, *Gm. Tragac. q. s.*; daraus 4 granige Trochisken, deren also jeder den Auszug von etwa $\frac{1}{20}$ - $\frac{1}{15}$ Gran enthält. — 1 Unze $4\frac{1}{2}$ Sgr.] Als *Expectorans* öfters einige Stück; um Ekel zu erregen, 15-40-60 Stück mehrmals tägl. [Doch wird man sie schon hierzu, der so voluminösen Gabe wegen, selten anwenden; als Brechmittel, versteht sich, nie.] — Zweckmässiger, durch genau bestimmten und grösseren Gehalt, sind die **Troch. Ipecac.** PH. SLESV. (1 Unze 8 Sbl.), deren jeder $\frac{1}{4}$ Gran des Pulvers der Ipec. enthält.

* **Turiones (Gemmae) Pini.** Fichtensprossen; richtiger Kiefersprossen. [Von *Pinus silvestris* L. Werden oft mit den, übrigens in gleicher Art gebrauchten, **Turiones (Gemmae) Abietis**, Tannen- od. Fichten-Sprossen, von *Pinus Abies* L. und *P. Picea* L., verwechselt. — Hauptbestandtheile: Harz, äther. Öl und Gerbstoff. — 1 Unze conc. $1\frac{1}{2}$ Sgr.]

Innerl. zu Unc. $\frac{1}{2}$ - 2 tägl., in Aufguss [namentlich Digestionsaufguss; meist in Tisänenform, vom Kranken selbst zu bereiten (R_y 1077); auch wohl mit Wein infundirt. — Bisweilen auch im kalten Aufguss, der zwar nur schwach extrahiren kann: R_y 827 (*Rad. Armorac.*)], oder auch wohl mit Bier leicht abgekocht [als Surrogat des Sprucebiers].

Ausserl. bisweilen zu Dämpfen [s. I. S. 382 sub 2)].

1077.

R_y **Turionum Pini** Unc. 4
Ligni Sassafras
Sem. Petroselin ana Unc. 1
Baccar. Juniperi

Rad. Glycyrrh. glabr. ana Unc. $\frac{1}{2}$.
C. C. M. f. Spec. D. — Den 6ten Theil mit 4-5 Tassen heissen Wassers übergossen, $\frac{1}{2}$ St. an einer warmen Stelle ziehen gelassen, durchgeseiht, tägl. zu verbrauchen.

UNGUENTA. Salben. — Es sind die I. S. 35 sub 10., zum Theil auch die sub 8. p. p., aufgeführten Verbindungen zu mei-

den, obwohl man es freilich bei äusserlichen Mitteln selten so streng nimmt. — Diejenigen Salben der PH. BOR., welche eine abweichende Consistenz haben, sind I. S. 277, Anm. 1., aufgeführt.

† *Unguentum Althaeae s. flavum* PH. SLESV., HANN. [Schleimiges Decoct von Eibischwurzel u. Leinsamen (und von Bockshornsamensamen: PH. SLESV.) 32, Gilbwurzpulver 1, Fett 48 gekocht, bis das Wasser verdampft ist, dann Wachs 8 dazu. — Wird durch Alkalien gebräunt. — 1 Unze resp. 3 Shl. und 3 Mgr., 4 Unz. 10 Mgr.] Einreibe- und Verband-Salbe [meist aber wohl in beiden Qualitäten durch reines Fett zu ersetzen].

* *Unguentum Aeruginis s. Aegyptiacum* [vgl. *Liniment. Aerug.*]. Grünspanalbe. Ägyptische Salbe. [*Cupr. acetic.* 1, *Tart. depur.* 3, mit Wasser gekocht, bis sie hinreichend aufgelöst; co-
hört, zur Trockne abgedampft; zu dem an feuchter Luft von selbst zerflossenen Rückstand *Mel comm.* 12. — Keine Salben-, sondern Mollago-Consistenz. — 1 Unze 2½ Sgr.] Wie *Linimentum Aerug.*

Unguentum basilicum (basilicum flavum). Königsod. Basilicum-Salbe. [Baumöl 3, Wachs, Colophonium, Hammeltalg ana 1, *Terebinth. comm.* ½. — 1 Unze 2 Sgr.] Viel benutzte Verband-salbe [Verbindung mit *Tinct. Myrrh.* s. dort].

† *Unguentum basilicum nigrum* PH. SLESV. [Baumöl 3, Wachs, Colophonium, Hammeltalg, Schiffspech, *Tereb. comm.* ana 1. — 1 Unze 2 Shl.] Verbandsalbe.

Unguentum Cantharidum s. irritans. Spanischfliegensalbe. Reizsalbe. [3 Unz. zerquetschte Canthariden mit 8 Unz. Mandelöl 12 St. im Wasserbade digerirt, zur Colatur von 6 Unz. 4 Unz. weisses Wachs. — Von etwas festerer Consistenz. — 1 Unze 10 Sgr.] Theils als Verbandsalbe, theils zum Einreiben benutzt [vielleicht mit Unrecht zu dem letzteren Behuf seltner, da sie leicht Blasen zieht (wenigstens thut dies das Präparat der PH. BOR., die schwächeren der PH. HANN. u. PH. SLESV. vielleicht nicht so sicher) und überdies weniger als die Canthariden in Substanz auf die Harnorgane wirken soll (vgl. S. 102)]. [R_x 530 (*Hydr. muriat. corr.*)].

Unguentum cereum. Ceratum simplex PH. HANN. *Ungt. emolliens*. Wachssalbe. [Weisses Wachs 1, Provençer Öl 2½. — 1 Unze 3½ Sgr.] Eine ziemlich feste Salbengrundlage, passend für die wärmere Jahreszeit, oder wenn man einen starken Zusatz von flüssigen Substanzen machen will, oder wo Schweinefett nicht vertragen wird.

Unguentum Cerussae s. album simplex [nicht mit *Ungt. simplex* zu verwechseln]. Bleiweissalbe. [*Ceruss.* 1, *Ungt. simpl.* 2. — 1 Unze 2½ Sgr.] Verbandsalbe.

★★ *Unguentum Cerussae camphoratum s. album camphoratum.* Campherhaltige Bleiweissalbe. [Ungt. Ceruss. 2℥, Campher 1. — 1 Unze 2 $\frac{1}{2}$ Sgr.] Verbandsalbe.

Unguentum Elemi. Balsamum Arcae. Elemi-salbe. [Elemi, *Terebinth. latic.*, Hammeltalg u. Schweinefett ana. — 1 Unze 2 $\frac{1}{2}$ Sgr.] Verbandsalbe. [℞ 473 (Hb. Digital.).]

★★ *Unguentum Hydrargyri album.* Ungt. mercuriale album Werlhofii. Ungt. mundificans Zelleri. Salbe von weissem Präcipitat. [1 auf 9 Fett. — 1 Unze 3 $\frac{1}{2}$ Sgr.] Vgl. *Hydrarg. ammoniato-muriat.* — Meist einzureiben; seltner als Verbandsalbe.

Unguentum Hydrargyri cinereum s. caeruleum; auch oft vorzugsweise Ungt. mercuriale. Ungt. Neapolitanum. Graue od. blaue Quecksilbersalbe. Neapelsalbe, Reiter- od. Franzosen-Salbe. [Hydrarg. depur. 1 mit Hammeltalg $\frac{2}{3}$, Schweinefett 1 $\frac{1}{2}$. — 1 Unze 5 $\frac{1}{2}$ Sgr.] Cautelen beim Einreiben s. unter *Unguenta*. [Wenn beim Gebrauch der Salbe Speichelfluss unerwünscht eintritt, so muss man neben andern Mitteln dagegen auch sorgfältige Reinigung der Haut von der Salbe durch warmes Wasser u. Seife nicht vergessen.]

Man hat diese Salbe innerlich gegeben — wohl nicht empfehlenswerth, da sich allmählig fettsaures Quecksilberoxydul in ihr bildet, so dass sie nicht immer gleich wirken kann —; in der Regel nur granweise, so dass 2-3mal tägl. $\frac{1}{2}$ -6 Gran Quecksilber [von der Salbe, je nach ihrem Gehalt, verhältnissmässig mehr] gereicht wurden; selten drachmenweise. [Die kleineren Gaben sind namentlich von französischen Ärzten empfohlen und meist in Pillenform gegeben worden, etwa die Salbe (nach der PH. GALL. die Hälfte ihres Gewichts an Quecksilber enthaltend) mit Amylum (q. s.) zur Pillenmasse gemacht, oder auch noch etwas Seife (etwa $\frac{2}{3}$ der Salbe) dazu. Von der Salbe der PH. BOR. müsste man, wollte man jene Verordnungen nachahmen, verhältnissmässig grössere Dosen geben; oder man müsste die Salbe magistral so concentrirt als die der PH. GALL. darstellen lassen; z. B. ℞ 1078. (Daneben etwa Diät wie sonst bei antisyphilitischen Curen.) — Große Gaben hat neuerdings v. BIERKOWSKI empfohlen; er lässt, wo, wegen Abneigung des Kranken oder Mangels an einem passenden Local, an der nöthigen Beaufsichtigung, die RUSTsche Schmier- und Hunger-Cur (s. S. 520) nicht angewandt werden kann, an den von RUST für die Einreibungen vorgeschriebenen Tagen des Morgens Dr. $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$ einer nach der PH. BOR. bereiteten Salbe, in Oblate gehüllt, einnehmen; Nahrungsmittel, Regimen und therapeutische Cautelen dabei ganz ähnlich wie bei der RUSTschen Cur.]

Ausserl. lässt man, zur Erzeugung bloss örtlicher Wirkungen, nach der Grösse des Theils, einer Linse bis einer Bohne

oder einer Haselnuss gross 1–3mal tägl. einreiben. [Besondere Vorsicht ist in der Gegend der Speicheldrüsen nöthig, weil hier am leichtesten Salivation, Reizung und Anschwellung dieser Drüsen u. s. w. erfolgt. — Entsteht Hautentzündung oder Eruption, Aussetzen oder doch Wechseln der Stelle.] Man verbindet sie auch zu diesem Endzweck oft mit einer indifferenten Salbe [um ihre Wirkung zu mildern], oder mit *Ol. Hyosc. coct.*, *Linim. ammoniat.* oder selbst *Liq. Ammon. caust.* [R_y 655. Vgl. *Rad. Scill.*], mit Opium [z. B. 1 mit $\frac{1}{2}$ Opium, Abends einer Erbse gross in die Augengegend einzureiben: HIMLY gegen *Epiphora arthritica*], verschiedenen Extracten [z. B. Dr. 1 mit *Extr. Belladonn.* Scr. 1: FISCHER zu Einreibungen ums Auge bei Hydrophthalmie (um der gehörigen Salbenconsistenz willen wohl zweckmässiger nur 15 Gran Extract)], Campher, Terpenthin, Iod [vgl. *Iodum u. Kali hydroiod.*] u. dgl. m. [nach der Verschiedenheit des Falls in sehr verschiedenen Verhältnissen]. Besonders aber steigert man wohl bisweilen die Wirksamkeit der Salbe, indem man sie nur mit halb so viel Fett [also Quecksilber u. Fett zu gleichen Theilen. — So z. B. ausser der schon erwähnten Salbe der PH. GALL. auch das *Ungt. mercuriale fortius* PH. AUSTR. (Quecks. 1, Cacaobutter, Schmalz ana $\frac{1}{2}$), während das (gewöhnliche) *Ungt. mercuriale* derselben Pharmakopöe 1 Quecksilber auf 4 Fett (Hammeltalg 1, Schmalz 3) enthält. Auch R_y 1079.] bereiten lässt, oder ihr etwas Sublimat [Gr. 1–2 auf 1 Unze Salbe. — Beispiel: R_y 1079] oder rothen Präcipitat [einige Gran auf die Unze] zusetzt. [Von der Verbindung mit Terpenthin ist noch zu bemerken, dass sie nicht bloss in einigen Pharmakopöen recipirt ist (meist $\frac{1}{2}$ Terpenthin auf 1 Quecksilber; so besteht z. B. das *Ungt. Hydr. ciner. cum Terebinth.* PH. HANN. aus Quecks. 1, *Tereb. comm.* $\frac{1}{2}$, Schmalz 4), sondern dass auch früher manche Apotheker sie sich stillschweigend — mit einer geringeren Menge Terpenthins, die man nur schwer durch den Geruch entdeckt — erlaubten, weil sich das Quecksilber mit dem Terpenthin leichter und rascher als mit blossen Fett verreiben lässt. Die Salbe wird zwar dadurch eindringlicher, aber auch zugleich reizender für die Haut, und manches Erythem, das man der grauen Salbe zuschrieb, mag wohl nur diesen Ursprung gehabt haben. Aber auch ohne Terpenthin ist die graue Quecksilbersalbe, theils durch ihr Schweinesfett, theils und wohl noch mehr durch das sich bildende fettsaure Quecksilberoxydul, für manche zartere Haut schon zu reizend, macht leicht Erythem oder Exanthem, besonders wenn man sie an zarteren Theilen, z. B. den Augenlidern, anwendet; bisweilen kann man das verhüten, wenn man sie mit Cacao- und Mandel-Öl bereiten lässt (R_y 1080).] — Einige hieher gehörigen Vorschriften: Beim beginnenden *Panaritium subcutan.* empfehlen SERRE u. A. als ein sehr rasch wirkendes „*traitement abortif*“, viertelstündl. etwas Salbe einzureiben, dann ein Leinwandläppchen damit bestrichen umzuschlagen. (1 oder ein Paar Drachmen reichten gewöhnlich zur gänzlichen Heilung hin.) — V. VERING's Cur der Krätze: Nach einem Seifenbade am Morgen reibt sich der Kranke Abends auf jede Kratzpustel eine äusserst kleine Quantität des *Ungt. mercur. fortius* PH. AUSTR. langsam ein, geht zu Bett und nimmt eine Tasse Sennesaufguss (oder ein anderts Abführmittel). Am Morgen werden die eingeriebenen Stellen mit scharfer Lauge sorgfältig abgewaschen oder mit Ätzkalialösung bestrichen, und, wenn nicht ge-

giebige Stühle erfolgt sind, noch eine Tasse Sennesaufguss genommen. Wo es thunlich, wird jeden zweiten Morgen nach einem starken Seifenbade (noch besser einem Schwitzbade, nach welchem man den Körper mit Flanell und Seifenschaum abreiben lässt) Leib- u. Bett-Wäsche durchaus gewechselt. So — bei Vermeidung von Morgen-, Abend- und nasakalter Luft, von fetter, schwerverdaulicher, stark gesalzener und reichlicher Kost — bis zur Heilung, welche meist in 14 Tagen erfolgt; dann noch einige Seifen- oder Schwitz-Bäder. — Beim Rothlauf lassen Nordamerikanische Ärzte die Salbe etwas erwärmen, noch lauwarm und flüssig mit einem Federbart aufstreichen, trockne Charpie darauf legen, und das Bett hüten. — Rx 1081.

Zur Erzeugung allgemeiner Wirkungen — namentlich gegen Syphilis — instituiert man die Einreibungen gewöhnlich mehr methodisch, in bestimmten Terminen und Quantitäten, und mit der unvermischten [doch lässt RUST bei seiner S. 520 zu erwähnenden Schmiercur für reizlosere Personen oft noch Scr. $\frac{1}{2}$ rothen Präcipitat jeder Unze der Salbe zusetzen] Salbe, ausser etwa in Fällen, wo alles auf eine rasche Einwirkung ankommt, wie z. B. bei Tetanus, Hydrophobie u. dgl., wo man sich dann nicht an bestimmte Dosen und Termine binden kann, sondern sich nach den sichtbaren Äusserungen der Einwirkung der Salbe, namentlich nach dem Speichelfluss, richten muss. — Für die methodischen Einreibungen lässt man wohl [wie für den innerlichen Gebrauch nach v. BIERKOWSKI] die Salbe in dispensirten Dosen [s. I. S. 282] verabreichen. — Wir erwähnen [ausser VELPEAU's (sehr vehementer und wohl nicht gefahrloser) Methode bei Peritonitis und Phlebitis uterina, besonders bei Kindbetterinnen; nach vorangeschickten allgemeinen u. örtlichen Blutentziehungen 2stündl. Dr. 2–3 einreiben, bis zum Nachlass der Erscheinungen; bei sehr gesteigerter Krankheit daneben noch allgemeine Bäder und 2stündl. 2 Gran Calomel. — Ähnlich verfährt auch TONNELLÉ.] folgende wichtigeren Einreibungsmethoden:

1. Die kleine Schmiercur (eine äusserliche Extinctions- oder Dämpfungs-Methode, d. h. eine solche, bei der man es nicht bis zum Speichelfluss kommen zu lassen beabsichtigt); am gewöhnlichsten etwa in folgender Art (nach CULLERIER): der Kranke, durch ein oder mehrere lauwarne Bäder vorbereitet, wird bei knapper Diät in einem temperirten Zimmer [wenigstens 15 ° R.] gehalten, und ihm jedesmal Abends vor Schlafengehn, anfangs alle 2 Tage die Quantität von Dr. 1–2 Salbe, später, wenn das nicht stark genug wirkt, tägl. Dr. $\frac{1}{2}$ –1, (selten mehr), langsam [etwa binnen 20 Minuten, doch auch mehr od. weniger, je nachdem es die Haut aufnimmt] eingerieben; ist der Theil behaart, so müssen die Haare abrasirt werden. Die Wahl des Theils ist ziemlich gleichgültig; in der Regel wählt man [als reinlichen Leuten am wenigsten unangenehm] die Beine oder nur einen Theil derselben. Dabei fleissig Bäder, anfangs etwa alle 2 Tage, jedesmal einige Stun-

den vor der Friction, später etwa alle 4 Tage eins. — Die Totalquantität der auf diese Weise zu verbrauchenden Salbe muss nach der Individualität des Kranken und der Krankheit verschieden ausfallen, etwa zwischen 40 und 100 (bisweilen auch noch mehr) Drächmen; doch können unangenehme Erscheinungen während der Cur, falls sie sich nicht durch leichtere Mittel beseitigen lassen [entsteht erysipelatöse Eruption, so setzt man die Einreibungen ein Paar Tage aus, oder wenn die Eruption bloss Folge von unsanftem Reiben oder Reiben an einer behaarten Stelle ist, so reibt man anderswo ein. Bei Reizung des Darmcanals Aussetzen, Kalb- od. Hühnerfleisch-Brühe, Eibischaboud, Bäder, Klystiere. Bei Verstopfung Bouillon mit Glaubersalz, Klystiere, gelind eröffnende Diät. Bei Salivation Aussetzen und die geëigneten — bekannten — Mittel], dieselbe auszusetzen oder ganz abbrechen nöthigen.

2. Die grosse Schmiercur, gewöhnlich mit der Hungercur verbunden, nach RUST: 1. Vorbereitungscur. Ein leichtes Abführmittel, etwa aus *Rad. Jalap. u. Tart. depur.* oder aus *Inf. Sennae comp.* u. Glaubersalz; vom folgenden Tage an tägl. ein warmes Bad; so in der Regel 12 Tage [bei schwächeren, reizbaren Personen weniger; bei reizloseren, mit trocknerer Haut, auch wohl noch länger] hinter einander; am 14ten Tage wieder ein ähnliches Abführmittel. [Gebietet die Krankheit Eile, so wird die Vorbereitungscur so abgekürzt, dass am 1ten Tage gebadet und purgirt, am 2ten gebadet, am 3ten wieder gebadet und purgirt, am 4ten gebadet und gleich darauf eingerieben wird; oder es wird in noch dringenderen Fällen auch wohl ohne Vorbereitungscur sogleich und zwar eine grössere Menge Salbe eingerieben.] Während dieser Zeitschmale Diät, diaphoretisches Getränk und Verhalten. — 2. Hauptcur. Äusserst schmale Diät, strenges Hüten des warmen Zimmers, die Wäsche nicht wechseln u.s.w. Einreibungen, in der Regel jede von Dr. 2 Salbe [doch auch mehr od. weniger], am 1ten, 10ten u. 18ten Tage in die Unterschenkel, am 3ten, 12ten u. 20ten Tage in die Oberschenkel, am 6ten, 14ten u. 22ten Tage in die Arme, am 8ten, 16ten u. 24ten Tage in den Rücken; die 7 ersten Einreibungen des Morgens, die 5 letzten spät Abends. Am 17ten, 19ten, 21ten, 23ten u. 25ten Tagefrühmorgens ein Abführmittel. [Umstände machen indess auch in dieser Anordnung oft Abänderungen, sehr frühzeitig eintretender, gar zu starker Speichelfluss oder andre bedenkliche Zufälle oft sogar das gänzliche Abbrechen der Cur nöthig.] Am 26ten Tage (der Hauptcur) ein reinigendes Bad, Wechsel der Wäsche u. des Zimmers. — 3. Nachcur — in der Regel ein Paar Wochen — zur Regulirung aller Functionen. — Es ist übrigens bei dieser hochwichtigen, eben so wirksamen, als gefährlichen, immer mit der grössten Umsicht und Vorsicht zu leitenden Cur so ungemein viel zu bemerken, dass wir es in RUST's *Magazin f. d. gesammte Heilk.* Bd. 1. Heft 3. Berl. 1816. nachzulesen dringend bitten müssen. — So vielfach erprobt diese Methode ist, so verdienen dennoch

die von mehreren Ärzten gegen die Zweckmässigkeit einzelner Vorschriften derselben geäusserten Bedenken Beachtung, und es dürfte sich wohl die Art, wie z. B. L. W. SACHS die Einreibungen administriert, in der Folge beliebter machen: SACHS verwirft die ohne Vortheil schwächende Vorcur, sucht vielmehr nur in einer 8-14tägigen Vorcur etwanige Nebenkrankheiten nach allgemeinen Grundsätzen zu beseitigen und die Thätigkeit der Haut durch laue aromatische Bäder (von nur 10-15 Minuten Dauer) zu erhöhen, lässt als Hauptcur einen um den andern Tag Dr. 1-1½ Salbe einreiben; dabei, in einem Zimmer von nur 15° Temp., diätetischer Gebrauch des Holzthees, leicht verdauliche und nahrhafte Pflanzenkost, zum gewöhnlichen Getränk Zuckerwasser, leichtes Bier, auch bei daran Gewöhnten etwas Kaffee oder Thee. Beim Erscheinen des Speichelflusses oder überhaupt heftiger Mercurialwirkung die Einreibungen 2 (od. mehr) Tage aussetzen, das Bett hüten, aromat. Seifenbäder, bessere Kost, etwas Wein, ein bitter-ätherisches Infusum, bei zu heftigen Darmausleerungen Opium.

Bei Syphilis Neugeborner ist statt der gewöhnlichen Quecksilbersalbe eine nach der Vorschrift Ry 1080 [nur in grösserer Quantität] angefertigte vorzuziehen; man mag nach SIMON etwa anfangs Ser. ½, später Ser. 1, zu jeder Einreibung verwenden.

1078.

Ry *Hydrarg. depurati*
Adipis suilli ana Gr. 36
tere in mortar. lapid. ad perfect. Hy-
drargyri extinctionem; tunc adde
Saponis med. pulv. Gr. 48
Amyli q. s.
ut f. Pilulas 72. Consp. Sem. Lycop.
D. — 2-3mal tägl. 1-12.

1079.

Ry *Hydrarg. muriat. corrosivi Gr. 2½*
— depur. Dr. 6
Sebi ovilli Dr. 2
Adipis suilli Dr. 4.
Tere in mortar. lapid. ad perfect. Hy-
drargyri extinctionem. D.
Ungt. Hydr. ciner. fortius PH. HANN.
[1 Unze 8½, 4 Unz. 27 Mgr.]

1080.

Ry *Hydrargyri depur. Scr. 1*

Olei Cacao Dr. ½

tere in mortario lapid. calefacto ad
perfectam Hydrarg. extinctionem; tunc
adde

Olei Amygdal. Scr. ½ - 1.

M. exactiss. D. in olla alba. S. 2-3mal
tägl. einer Linse gross in das Hagelkorn
(Chalazium) einzureiben. (Im Sommer
nehme man vom Ol. Amygdal. nur
Scr. ½, im Winter Scr. 1, um die rechte
Consistenz zu treffen.)

1081.

Ry *Opü puri Scr. ½*

Extr. Hyosc. Scr. 1

redige c. Aq. comm. pauxillo in pulvem,
adde

Ungt. Hydrarg. ciner. Dr. 2.

M. exacte. D. S. Augensalbe. (Bei Pho-
trophobie, syphilitischer u. a. schmerz-
haften Augeneptzündungen.)

V. GRÄFE.

Unguentum Hydrargyri citrinum. Balsamum
mercuriale. Gelbe Quecksilbersalbe. [*Hydrarg. depur. 1*
in Acidi nitr. q. s. durch Digeriren aufgelöst, mit 12 Schweinefett. — Enthält
tetzaures Quecksilber- Oxydul u. - Oxyd, und wohl auch salpetersaures Quecksil-
ber. Ist blaugelblich und von Ceratconsistenz, auch in Tafelchen ausge-

geseh, wird aber durch Zersetzung mit der Zeit weicher und weiss oder, häufiger, gran. — 1 Unze 3 Sgr.] Als Verbandsalbe und zum Einreiben [z. B. bei Krätze od. a. chronischen Hautausschlägen Morgens u. Abends einer Bohne od. Haselnuss gross in die kranken Hautstellen einzureiben].

★ *Unguentum Hydrargyri rubrum. Balsamum ophthalmicum rubrum.* Salbe von rothem Präcipitat od. Quecksilberoxyd. [*Hydr. oxyd. rubr. ppt.* Scr. $\frac{1}{2}$ auf 1 Unze *Ungt. simplex.* — 1 Unze 3 Sgr.] Vgl. *Hydr. oxyd. rubr. ppt.*

★ *Unguentum Kali hydroiodici.* [Dr. 1 mit *Magn. carbon.* Gr. 6 auf *Ungt. rosat.* Unc. 1. — Weiss, mit der Zeit gelblich; doch rührt diese letztere Farbe von einer Zersetzung durch entstandene ranzige Säure her, und man sollte dann die Salbe nicht mehr anwenden. — 1 Drachme 1 Sgr.] 2-3mal tägl. einer Linse od. Bohne (selten einer Haselnuss) gross einzureiben, dann den Theil (Kropf od. dgl.) mit Flanell zu bedecken. Man verstärkt die Salbe später wohl noch durch einen Zusatz von *Iodum* (Gr. 5-15 auf Unc. 1).

★ *Unguentum Linariae.* Leinkrautsalbe. [Bereitung: s. I. §. 170. — 1 Unze 2 Sgr.] Beliebt zum Auflegen auf schmerzhaftes, entzündete Hämorrhoidalknoten [etwa noch mit wirksameren Mitteln, eigensam Blei, *Narcoticis* od. dgl. in Verbindung].

★ *Unguentum (Butyrum) Majoranae.* Mairan-Salbe od.-Butter. [Wie die vorige bereitet. — 1 Unze $2\frac{1}{8}$ Sgr.] Ein wohlfeiler künstlicher Balsam [zum Einreiben in den Unterleib etwa noch mit einem kleinen Zusatz von *Ol. Rosimar.* oder *Bals. Nucist.* — Sonst reibt man es auch wohl jungen Kindern bei Stöckchneupfen in die Nasenwurzel ein oder bringt selbst etwas in die Nasenlöcher, um Niesen zu erregen].

† *Unguentum pediculorum* PH. HANN. Läusealbe. [Enthält regulin. Quecksilber, *Sem. Staphidis agr.*, *Rad. Helleb. albi*, Looröl, spanische Seife und Schweinefett. — 1 Unze 3 Mgr., 4 Unz. 10 Mgr.] Vorsichtig anzuwenden [vgl. I. §. 223 sub b)].

Unguentum plumbicum s. saturninum. Cera- tum Saturni (Goulardi). Bleisalbe; Bleicerat. [*Acet. plumb.* 1, *Ungt. simpl.* 12. — 1 Unze $2\frac{1}{8}$ Sgr.] Verbandsalbe [R_y 76 (*Alum.*); vgl. auch *Hydrarg. oxyd. rubr. ppt.*]; seltener als adjuvirende Grundlage von Einreibesalben [R_y 75 (*Alum.*)].

Unguentum Resinae Pini Burgundicae. Loco Unguenti Althaeae. Salbe von Burgundischem Harz. [Schweinefett 16, gelbes Wachs, burgundisches Harz ana 1. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr.] Da nur so wenig Harz darin ist [das mit dem Wachs hauptsächlich dazu

dient, auch in wärmerer Jahreszeit, wärmerer Zimmertemperatur die gehörige Salbenconsistenz zu erhalten], so ist diese Salbe ziemlich als ein reines Fett zu betrachten, das man bequem als Salbenexcipiens [vgl. I. S. 277 Z. 5] für wirksamere Dinge gebrauchen kann, oder das man auch wohl statt eines einfacheren Fettes zum Einreiben, seltener als Verbandsalbe, verschreibt — um doch etwas zu verschreiben.

Unguentum Rosismarini compositum. *Unguentum nervinum.* [Rosmarin, Mairan, Rauten, Lorbeeren u. Bertramwurzel mit Fett gekocht u. s. w., dazu Rosmarin- und Wachholder-Öl. — 1 Unze 5 Sgr. — Das *Ungt. Rosism. comp. (s. nervin.)* PH. MIL. (Rosmarinöl u. kohlessaur. Ammon. ans 1 auf 8 Salbengrundlage; 1 Unze $2\frac{3}{4}$ Sgr.) ist noch kräftiger.] Ein ziemlich wohlfeiler [und das noch wohlfeilere *Ungt. Majoran.* an Kraft überrtreffender] künstlicher Balsam, der viele beliebte magistrale Formeln entbehrlich macht, [Verbindg. m. *Bals. Copaiv.*, mit *Liq. Ammon. anis.*, s. dort.]

Unguentum rosatum s. pomadinum. Rosensalbe. Rosenpomade. [Schweinefett 4 mit weissem Wachs 1 geschmolzen u. nach dem Erkalten 1 Rosenwasser dazu geführt. — 1 Unze $2\frac{1}{2}$ Sgr.] Seltener pur [als indifferente Verbandsalbe, statt eines einfachen Fettes, oder als Lippenpomade] wie als Vehikel [vgl. I. S. 276] anderer Mittel; namentlich auch zu Augensalben beliebt.

† **Unguentum Salicis** PH. P. [Saft frischer Weidenblätter mit Fett. — 1 Unze $2\frac{1}{2}$ Sgr.] Verbandsalbe.

Unguentum simplex. Einfache Salbe. [Wie *Ungt. rosat.*, nur statt des Rosenwassers mit gewöhnlichem Wasser, bereitet. — 1 Unze 2 Sgr.] Wie *Ungt. rosat.* — für Leute, die keine wohlriechende Salbe mögen, und für Arme.

Unguentum sulphuratum compositum. *Ungt. ad Scabiem.* Zusammengesetzte Schwefelsalbe. Krätzsalbe. [1 Schwefel, 1 Zinkvitriol (vom Krystallisationswasser befreit), 4 Schweinefett. — 1 Unze $1\frac{3}{4}$ Sgr.] Anwendungsart wie bei *Ungt. sulphurat. simpl.* [Man verzeihe uns, wenn wir auch hier, wohin es eigentlich nicht gehört, die Gelegenheit wahrnehmen, gegen den leider noch immer sehr häufigen, höchst gefährlichen Mißbrauch der alleinigen oder zu raschen äusserlichen Anwendung der Schwefelsalben ohne gleichzeitigen innern Gebrauch passender Mittel bei nicht mehr ganz frischer, oder bei nicht deutlich durch Ansteckung entstandener Krätze zu warnen. Am gefährlichsten sind, rücksichtlich der Unterdrückung des Anschlages, die mit (thierischem od. vegetabilischem) Fett bereiteten Salben, zumal wenn sie, wie das *Ungt. sulphurat. simpl.*, bloss Schwefel, und nicht zugleich, wie verschiedene zusammengesetzte Schwefelsalben, andre die Haut stark reizende Dinge,

z. B. Zinkvitriol, Salmiak, Potasche p. p., enthalten; am wenigsten gefährlich in dieser Hinsicht sind die mit Seife bereiteten Salben, und die HORNsche Salbe z. B. dürfte wohl vor allen andern unten aufgeführten in den bei weitem meisten Fällen den Vorzug verdienen, vielleicht nur die allerhartnäckigsten Fälle ausgenommen.]

— Ausser dem *Ungt. sulph. comp.* der PH. BOR. sind die nahmhaftesten zusammengesetzten Schwefelsalben folgende [vgl. auch R_y 263]:

1082.

R_y *Ammon. muriat. crud. subt. pulv.*
Scr. 1

Sulphuris depur. Unc. 1

Adipis suilli Unc. 2.

M. D. —

FRITZE.

1083.

R_y *Ammon. muriat. crud. subt. pulv.*

Aluminis subt. pulv. ana Gr. 32

Sulphuris depur. Unc. 1

Adipis suilli Unc. 2.

M. D. —

Ungt. sulfurat. ad Scabiem

PH. GALL.

1084.

R_y *Ammon. muriat. crud. subt. pulv.* Dr. 1

Sulphuris depur. Unc. 1

Adipis suilli q. s.

ut f. *Ungt.*, cui adde

Tinct. Cinnamomi Gtt. 15.

M. D. — In 5 Tagen zu verbrauchen, so dass die einzelnen, von der (veralteten) Krätze befallenen Theile abwechselnd eingerieben werden, z. B. am ersten Tage ein Arm, am 2ten ein Schenkel u. s. w.

PRINGLE.

1085.

R_y *Sulphuris depur.* Unc. $\frac{1}{2}$

Kali carb. e Cin. clav. subt. pulv.

Dr. 2

Adipis suilli Unc. 2.

M. D. S. 3mal tägl. einzureiben. (In Verbindung mit Schwefelbädern.)

ALIBERT.

1086.

R_y *Natri carbon. dep. sicci* Unc. $\frac{1}{2}$

Sulphuris depurati

Ol. Olivarum ana Unc. 1

Aq. commun. Dr. 2.

M. D. S. 2mal tägl., umgerührt, einzureiben.

MELIER.

1087.

R_y *Sulphuris depurati*

Vitrioli albi subt. pulv.

Baccar. Junip. subt. pulv. ana Dr. 2

Ol. Lauri q. s.

ut f. *Ungt.* D. S. Abends in die Hohlhandflächen einzureiben.

JASSER.

Das *Ungt. contra Scabiem Jasseri* der PH. HANN. (1 Unze 3 Mgr., 4 Unzen 10 Mgr.) und das *Ungt. sulphurat. comp.* (*Ungt. ad Scab. Jasseri*) der PH. SLESV. (1 Unze 3 Sbl.) haben, von der ursprünglichen Vorschrift abweichend, statt der Wachholderbeeren Lorbeeren und statt des Lorbeeröls resp. 1 Unze Rosenöl und Dr. 10 Schweinefett (das eine wie das andere giebt aber noch eine sehr steife Salbe). Die PH. SLESV. lässt den Zinkvitriol vor dem Pulvern vom Krystallisationswasser befreien, wodurch das Pulvern erleichtert, aber auch (da die Gewichtsangabe dieselbe bleibt) die Salbe merklich verstärkt wird.

1088.

R_y *Sulphuris depur.* Unc. 1

Saponis domest. nigri Unc. 2

Aq. comm. q. s.

ut f. *Ungt. molle.* D. — 3-4mal tägl. alle krätzigen Stellen damit einzureiben, und es auf der Haut trocknen zu lassen. Dabei 2-3mal wöchentlich ein Bad, und, zumal gegen das Ende, sorgfältige Reinlichkeit.

HORN.

Dieselbe Composition ist das *Ungt. sul-*

phurat. (s. ad Scabiem) PH. MIL. (1 Unze $\frac{3}{4}$ Sgr.). — Eben diese Salbe wird auch in der Charité zu Berlin (in vielen Fällen — in andern die Chlorkalkwaschungen, S. 118) angewandt: der Krätzigte reibt sie 3mal tägl. über den ganzen Körper, nur Gesicht u. Geschlechtstheile ausgenommen, besonders aber an den leidenden Theilen, ein; dabei innerlich Schwefel mit *Conch. ppt.*, 2mal wöchentlich Glaubersalz und 3mal wöchentlich ein laues Bad mit schwarzer Seife.

Bei feineren Leuten oder bei Kindern kann man dieser Salbe die folgenden, weniger unangenehme, substituiren.

1089.

Ry *Sulphuris depurati*
Saponis domest. ana Unc. 1
(Kali carb. e Cin. clav. Dr. 1)
Aq. comm. fervid. q. s.
ut f. Ungt. molle, cui refriger. adde
Ol. Bergamott. Scr. 1
— Cass. cinnam. Gtt. 3.
M. D. — Wie die vorige.

1090.

Ry *Kali nitr. dep. subt. pulv. Gr. 15*
Rad. Helleb. albi subt. pulv. Unc. $\frac{1}{2}$
Sulphuris depur.
Sapon. domest. nigri ana Unc. $1\frac{1}{2}$
Adipis suilli Unc. $4\frac{1}{2}$.
M. f. Ungt. D. —
Ist das Ungt. sulphurat. comp. PH. LOND.,

das *Ungt. Hellebori albi* PH. SLESV. (1 Unze 3 Sht.); am bekanntesten unter dem Namen englische Krätzsalbe. Auch das *Ungt. sulphurat. comp.* (*Ungt. Anglorum contra scabiem*) PH. HANN. (1 Unze $2\frac{1}{2}$, 4 Unz. 8 Mgr.) unterscheidet sich nur durch etwas geringeren Gehalt ($\frac{3}{4}$ so viel) an *Helleb. alb.*

Die Salbe wird nach verschiedenen Vorschriften angewandt, von denen wir 2 mittheilen:

1) Nach sorgfältigem Baden u. Reinigen wird der Kranke nackt zwischen wollne Decken gelegt, u. 3mal tägl., am ersten Tage 1 Unze, später nur $\frac{1}{2}$ Unze, am ganzen Körper eingerieben. Sobald alle, auch die neu hervorgebrochenen, Pusteln abgetrocknet, das Jucken gänzlich beseitigt, verlässt der Kranke die Decken, u. wäscht sich mit lauem Seifenwasser rein.

2) Der Kranke reibt sich den ganzen Körper, besonders aber die befallenen Theile, mit 4 Unz. der Salbe ein, hüllt sich entblösst in eine wollene Decke und legt sich mit dieser zu Bett. Bald bricht ein allgemeiner Schweiß aus, welcher 36 St. lang (bei schwächeren Subjecten, Kindern, frischem Fall nur 24–12 St.) abgewartet werden muss. Dann wird der ganze Körper mit schwarzer Seife gewaschen und der Kranke soll in der Regel geheilt seyn.

Unguentum sulphuratum simplex. Einfache Schwefelsalbe. [1 Schwefel auf 2 Schweinefett. — 1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr.] Gewöhnlichste Anwendungsart gegen Krätze: nach Reinigung der Haut mit lauem Seifenwasser, bei bedeutender Verunreinigung mit schwarzer Seife, reibt man die Salbe (1 oder einige Drachmen, selbst bis zu 1 Unze) 1–2mal tägl. in alle krätzigen Theile oder nur in die vorzüglich befallenen ein, und fährt damit nicht bloss so lange fort, bis der Ausschlag verschwunden ist, sondern noch 8–14 Tage länger, um neues Hervorbrechen zu verhüten. Will man besonders vorsichtig verfahren, so reibt man nur einen krätzigen Theil nach dem andern ein. Dabei Unterstützung der Hautausdünstung durch passendes Regim, einigemal wöchentlich laue Seifenbäder, und, besonders gegen

das Ende der Cur, öfteres Wechseln der Wäsche. Den unangenehmen Geruch der Schwefelsalben tilgt ein Zusatz von etwas äther. Öl [z. B. auf Unc. 1 der Salbe *Ol. Lavand.* oder *Ol. Bergamott.* Gtt. 6-12]. — Vgl. übrigens *Ungt. sulphur. comp.*

★★ *Unguentum Tartari stibiati.* Brechweinstein-salbe. Pocken- od. Pustel-Salbe. Auch wohl [uneigentlich u. unzweckmässig, wegen Verwechslung mit der Salbe gegen Decubitus, R_y 7] Autenriethsche Salbe. [1 *Tart. stib.* auf 4 Schweinefett. — 1 Drachme 18gr.] Einzureiben [etwa 2mal, doch auch bisweilen nur 1mal oder, so möglichst rascher Einwirkung, 3mal tägl.]; selten als (ätzende und höchst schmerzhaft) Verbandsalbe. Man wird oft bei Erwachsenen die Quantität des *Tart. stib.* vermehren, bei Kindern verringern, indem man die Salbe magistral verschreibt. Vgl. *Tart. stib.*

★★ *Unguentum Terebinthinae.* *Ungt. digestivum.* Terpentinsalbe. [*Terebinth. laric.* 12, *Mel comm.* 4, Baumöl 3, Aloë 1. — Ungewöhnlich dünn; sich leicht entmiegend; deshalb jedesmal umzurühren. — 1 Unze 28gr.] Meist als Verbandsalbe; nicht selten als Salben-Excipiens sehr reizender Stoffe.

† *Unguentum de Uvis* PH. HANN. [Schweinefett 2, Wachs 1, Cedro- u. Bergamott-Öl ana $\frac{1}{3}$. — Cerat consistenz; in Täfelchen ausgegossen. 1 Unze 3Mgr.; 4 Unz. 10Mgr.] Beliebt zum Auflegen auf Vesicator-Stellen, die man zuheilen will.

★★ *Unguentum Zinci s. de Nikilo.* Zinksalbe. [*Zinc. oxydat. via humida par.* 1 auf *Ungt. simpl.* 9. — 1 Unze 68gr. — *Ungt. Zinci* PH. P.: 1 auf 8; 1 Unze 5 $\frac{1}{2}$ Sgr.] Verbandsalbe. Vgl. *Zinc. oxyd.*

† *Valeriana celtica* [die ganze Pflanze]. Speike. Wie *Rad. Valer. min.*, doch in etwas grösseren Dosen.

Vanilla. Vanille. [Hauptbestandtheile: eine aromatische (für sich nicht darstellbare) Substanz, fettes Öl, Benzoesäure und (?) Extractivstoff. — 1 Scrup. 3 $\frac{1}{2}$ Sgr. — Manchmal durch *Bala. Peruv.* zu ersetzen.]

Innerl. zu Gr. 4-10 (bei Geisteskrankheiten mehr), mehrmals tägl.; in Pulver, Trochisken [R_y 219 (*Carbo ppt.*)], Pillen, Aufguss [besonders bei fieberhaften Krankheiten: Dr. 2-4 auf Unc. 6, 2stündl. od. stündl. 1 Essl. R_y 919 (*Rad. Serpentar. Virgin.*)]. — Als Thee (in leichteren Fällen) Gr. 15-30 auf 2 Tassen (stärker schmeckt er weniger angenehm). — Doch muss man, des Preises wegen, das Mittel überhaupt, besonders aber die Aufgussform, selbst bei Wohlhabenden oft vermeiden]. Als Corrigenz. Als Conspergens [etwas vertheuernd].

Ausserl. als Kaumittel [bei üblem Mundgeruch].

+ *Veratrinum* (-ium, -ina, -ia). *Sabadillinum*. Veratrin. Sabadillin. [Sehr giftiges Alkaloid; leicht auflöslich in Alcohol, ziemlich leicht in Äther, höchst schwer oder nicht in Wasser. Bildet mit Säuren und Salz-bildern, auch durch Zersetzung mehrerer Metallsalze, die Veratrin-Salze, die leicht löslich in Wasser und ebenfalls sehr giftig sind; wird durch concentr. Salpetersäure zerstört.] Bis jetzt scheint nur die äusserliche Anwendung besondere Aufmerksamkeit zu verdienen; in Salben [Gr. 4, allmählig bis 20 u. mehr, auf 1 Unze Fett, etwa 2mal tägl. einzureiben, dem Krankheitssitze möglichst nahe. Wenn man grosse Flächen einreibt, z. B. bei Wassersuchten den Unterleib, so darf auf jede einzelne Application nicht mehr als etwa 5 Gran Veratrin kommen.]; auch geistige Auflösungen dürften zu versuchen seyn.

. *Vinum*. Wein.* [Besteht hauptsächlich aus Weingeist und Wasser; enthält aber ausserdem noch mehr od. weniger Weinstein- (und Äpfel-) Säure, alkalische und alkalisch-erdige Salze dieser Säuren (namentlich Weinstein), Zucker, extractive, färbende Stoffe p. p.; bisweilen auch eisenbläuenden Gerbstoff (namentlich die rothen Weine), Kohlensäure (die müssirenden Weine, namentlich in der Champagne u. Bourgogne, doch jetzt auch an andern Orten bereitet**) und — namentlich wenn der Wein längere Zeit in Flaschen gelagert hat — ätherartige und ätherisch-ölige Producte (von denen die sogenannte Blume, *le bouquet*, herrührt). — Ausser den unten aufzuführenden officieellen Weinen benutzt das Publicum bekanntlich noch mannigfaltigere Sorten, die meist nach ihrem Geburtsort, ihrer Farbe u. a. Eigenschaften benannt werden. — Über den Alcoholgehalt der Weine lassen sich keine genauen Angaben mittheilen, indem er nicht bloss bei den verschiedenen Sorten, sondern auch bei einer und derselben nach Jahrgängen, Bereitung, Alter p. p. variiert und sehr oft durch Zusatz von Weingeist oder auf andere Weise*** gleich am Geburtsorte künstlich erhöht ist. Leichte Weine haben 6-9, stärkere (wie z. B. die vorzüglichen Rheinweine) 10-13, die stärksten (aus südlichen Ländern) 14-23 Procent Alcohol. — Der Most (ungegohrner Traubensaft, hauptsächlich Zucker, Gummi, Äpfelsäure, Weinstein, Kalksalze, kleberartigen Stoff, wenig äther. Öl, und Wasser enthaltend), in den Weinländern zur Bezezeit viel getrunken, ist süss, nicht berauschend, aber schwerverdaulich.] Die PH. BOR. führt folgende Sorten auf:

1. *Vinum Gallicum album*. Weisses Franzwein. [1 Unze 1½ Sgr.]

*) Vgl. G. H. RITTER *Weinlehre*. 1817; — SCHÜTZ *de Vino. Diss. inaug. Berol.* 1829. 8.

**) Man kann auch künstlich Wein mit Kohlensäuregas, auf dieselbe Art wie Wasser, imprägniren, und durch Einlegen einer durchschnittenen grossen Rosine in eine Flasche gewöhnlichen Weins (bei wohl befestigtem Kork) bekommt man öfters den Wein nach einigen Monaten müssirend.

***) Wenn der Wein dadurch, dass man die Trauben, am Stock oder auf Stroh, stark eintrocknen liess, oder dadurch, dass man einen Theil des Traubensafts bis zu grösserer Concentration abdampfte, oder dass man Traubenzucker, Rohrzucker oder braunen Syrup dem Traubensaft vor dem Gähren zusetzte, verstärkt ist, so nennt man solchen Wein gewöhnlich Ausbruch, Essenz, Sect, *Fino secco* oder Strohwein, *Fin de paille*.

2. *Vinum Gallicum rubrum.* Rother Franzwein. [1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr.]

3. *Vinum Hispanicum s. Malacense.* Spanischer od. Malaga - Wein. [1 Unze $1\frac{1}{2}$ Sgr.]

4. *Vinum Rhenanum.* Rheinwein. [1 Unze $2\frac{1}{2}$ Sgr.]
Die PH. HANN. ausserdem noch:

5. \dagger *Vinum Lysitanicum album.* Weisser Portugiesischer Wein. [1 Unze $2\frac{1}{2}$, 1 L. 24 Mgr.]

Und die PH. SLESV.:

6. \dagger *Vinum Hispanicum (album) Xeres dictum.* Xereswein. [1 Unze 2 Sbl.]

Innerl. theils für sich als Arzneimittel [Kindern theelöffelweise, Erwachsenen esslöffel- od. gläserweise (z. B. in typhösen Fiebern alle 2–1 St. 1–2 Essl.; will man steigen, so verkürze man lieber die Zwischenräume, anstatt die einzelnen Gaben zu erhöhen) — falls nicht Gewöhnung noch grössere Dosen nöthig macht. Alte Leute pflegen verhältnissmässig viel Wein zu vertragen.], theils als Vehikel beim Einnehmen für unangenehme oder schwerverdauliche Mittel [z. B. Chinapulver], theils als Constituens von Mixturen [doch in der Regel nur für an geistige Getränke Gewöhnte], theils zur Bereitung von flüssigen Auszügen [vgl. I. S. 144, 146 (Z. 1), 147, 153. — Am häufigsten benutzt man dazu den weissen Franzwein, doch auch, wo man einen geistigeren Wein wünscht, den spanischen od. portugiesischen Wein, oder wo man etwas Säure wünscht, den Rheinwein, der, wenn er nicht sehr alt und edel ist, diese mehr als andere Weine enthält. Nur wenn man die Substanz recht lange — mehrere Tage oder noch länger — mit dem Weine digeriren lassen will, ist es nicht rathsam, süuerliche oder auch sehr süsse Weine zu wählen, weil diese dabei leicht in Gährung gehn; dann ist also alter Franzwein am zweckmässigsten. — Meistens benutzt man den Wein nur zu kalten Aufgüssen und zu Digestionen (bei welchen letzteren man ihn am zweckmässigsten kalt — nicht schon vorher erwärmt — auf die Substanz giesst und dann an einem mehr oder weniger warmen Orte stehen lässt), seltener (weil er als Wein doch immer durch die Hitze verliert) zu eigentlichen heissen Aufgüssen (so dass man ihn siedend auf die Substanz giesst) oder zu Ebulktionen, nie zu länger fortgesetzten Abkochungen]. — Weinmolken s. I. S. 317, II. S. 450; verschiedene Getränke im Auhang.

Ausserl. [kalt, seltner warm; wo es der Preis erlaubt, in der Regel unverdünnt; wo man ausser der belebenden, stärkenden auch adstringirende Wirkung wünscht, den Rothwein (namentlich schwere u. wohlfeile Roussillon - Weine). — Surrogat für Arme: Brantwein mit Wasser (und — will man Rothwein surrogiren — mit gerbestoffigem Zusatz, z. B. etwas *Extr. Ratanh. venale*).] zu Mund- u. Gurgelwässern, Klystieren [man fange in der Regel vorsichtig erst mit schwächeren Arten (und mit Wasserzusatz) an, und gehe zu stärkerem über: RITTER] u. a. Einspritzungen [z. B. zur Heilung der Hydrocele aus 3 Theilen rothen Portweins (einer besonders geschätzten, doch meist künstlich durch

Weingeist verstärkten, Sorte des portugies. Weins) und 1 Theil Wasser, oder aus 5 rothen Burgunder Weins und 1 Wasser; nur sehr selten wird man es nöthig finden, die Einspritzungen noch stärker zu machen, so dass man z. B. das Wasser weglässt oder selbst noch etwas Weingeist (etwa $\frac{1}{16}$ Franzbranntwein) zusetzt]; zu Waschungen, Bähungen, Kataplasmen [Semmel mit rothem Portwein als Katapl. gegen Brand aus England empfohlen. (Da aber der nach England geführte Portwein mit mehr Weingeist versetzt ist als der nach Deutschland gebrachte, so dürfte es bei uns nöthig seyn, noch etwas Rum oder andern Weingeist zuzusetzen, oder statt des Portweins Branntwein und rothen Franzwein anzu nehmen: RADIUS.)], Bädern [zu denen man soviel Wein nehmen kann, als die Vermögensumstände erlauben; um hier wenigstens etwas zu sparen, kann dasselbe Bad mehr als einmal benutzt werden. Man könnte sich auch wohl der in neuerer Zeit erfundenen Vorrichtungen zu Staubbädern (vgl. I. S. 375) zu nicht übertrieben theueren Weinstaubbädern bedienen]; auch wohl zu Dampfbädern und zur Entwicklung von Weindämpfen, um sie in Höhlen des Körpers zu leiten [der Unterleib, an dem man bis jetzt gewagte Versuche der Art angestellt hat — vgl. RICHTER *Arzneimittell.* III, S. 231, 232 — dürfte, wie SCHÖNLEIN bemerkt, weit weniger dazu geeignet seyn als die Pleurahöhlen, in denen Entzündung, Exsudation u. Adhäsion bekanntlich eben so oft getragen werden als in der Peritonäalhöhle selten].

Vinum Colchici (e Radice). Zeitlosenwein. [1 der frischen Wurzel mit 2 Malaga digerirt. — 1 Unze $4\frac{2}{3}$ Sgr.] Innerl. zu 10–30 Tropfen (u. mehr) einigemal tägl.; pur, seltner in Mixturen.

† *Vinum Colchici e Semine* PH. SLESV. [10 mit Malagawein 60 digerirt. — 1 Unze 6 Shl.] Innerl. zu Scr. 1–Dr. 1, einigemal tägl., pur oder in Mixturen [z. B. Dr. 2 mit *Decoct. Ligni Guaj.* (Dr. 2; $\frac{1}{2}$ St. gekocht) L. 1, alle 2 St. $\frac{1}{2}$ Tasse: v. HILDENBRAND gegen chronische Gelenkschmerzen. — Vgl. *Hydrarg. mur. corr.*].

* *Vinum ferruginosum s. martiatum s. chalybeatum.* *Infusum Martis vinosum.* *Tinctura Ferri vinosa.* Eisenwein; Stahlwein. [Metallisches Eisen 1, *Cass. cinnam.* $\frac{1}{2}$, Rheinwein 12, einige Tage digerirt. — 1 Unze $4\frac{2}{3}$ Sgr.] Zu 1–2 Essl., steigend bis zu einem Weinglase, einigemal tägl.; pur [falls man ihn nicht magistral verordnet, wo man dann wohl noch bittere od. bitter-aromatische Pflanzenstoffe od. dgl. mit extrahiren lässt; doch nicht gerbstoffhaltige, z. B. China, was eine schwarze Tinte giebt; schon der wenige Gerbstoff der *Cass. cinnam.* giebt eine dunkle Farbe].

Vinum stibiatum s. emeticum. *Vinum Antimonii Huxhami.* *Aqua benedicta Rulandi.* Brechwein. Spiessglanzwein. [Auf 1 Unze Mallagawein 2 Gran *Tart. stib.* — 1 Unze 2 Sgr.]

Innerl. zu 20 Tropfen bis Dr. 1 [Gr. $\frac{1}{16}$ – $\frac{1}{4}$ *Tart. stib.*] alle 3–2 St.,

par. od. häufiger in Mixturen [Ry 83-85 (*Ammoniac. depur.*), 370 (*Extr. Pulsam.*), 455 (*Hb. Belladonn.*), 494 (*Hb. Viol. tricol.*), 619, 620 (*Kali tartar.*), 643 (*Liq. Ammon. acet.*), 786 (*Opium*); vgl. auch *Extr. Acon.*, *Myoc.*, *Pulsam.*, *Flor. Samb.*, *Tinct. Canthar.*, *Opti. simpl.*]. — Als Brechmittel Unc. 1½-2, binnen ½, höchstens ¾ St. in getheilten Dosen, meist pur. [Kleinen Kindern als Brechmittel theelöffelweise alle 10 Minuten bis zur gehörigen Wirkung, pur oder mit etwas *Oxymel scillit.* — Für Erwachsene ist, wo man durch schon vorhandene Neigung zum Erbrechen des Erfolges sicher ist, der Brechwein unvermischt unter allen Brechmitteln das angenehmste. — Ry 871 (*Rad. Ipocac.*).]

Äusserl. (selten) zu Augentropfwässern [verdünnt oder pur] u. s. w.

Viscum album. Mistel (weisse). Mit Unrecht auch wohl *Visc. quernum* (vgl. den folgenden Art.). [Hauptbestandtheile: Extractivstoff, Schleim, äther. Öl (?) und Vogelkoth. — 1 Unze conc. 1½, sub. pulv. 1½ Sgr.] Innerl. zu Dr. ¼-1, 3-4mal tägl. In Pulver [Officinell: *Pulvis antiepilepticus*. — Vgl. auch *Lapid. Canceri.*], Latwerge, Ebullition [Ry 1091] oder leichter Abkochung [tägl. Unc. ½-1 mit Unc. 8 auf Unc. 6].

1091.

Ry *Visci albi*

Rad. Valerianae minor.

Fol. Aurantii ana Dr. 2

Sem. Foeniculi Scr. 1.

C. C. M. f. Species. D. in sextuplo. — Tägl. eine Portion mit 3½ Tassen heissen Wassers zu übergossen, nach einigem Aufwallen durchzuseihen u. mit jedem Pulver eine Tasse voll zu nehmen. (Gehört zu den Pulvern: Ry 744.) Veet.

+ **Viscum quercinum s. quernum** (*verum s. veterum*)
PH. AUSTR. Eichenmistel (echte Eichenmistel der Alten, von *Loranthus europ.* L.). — Wie die vorige.

Vitriolum album. *Zincum sulphuricum venale.* *Sulphas zincicus venalis.* Weisses Vitriol. Kupferrauch. Gallitzenstein. Käuflisches schwefelsaures Zinkoxyd. [Vgl. die Synonyme von *Zinc. sulphur.* — 1 Unze ¾ Sgr.] *Sol.* 2-3. — *Cave* wie bei *Zinc. sulphur.*

Nur äusserl. [± — zum innerlichen Gebrauch und zu Mund- u. Augen-Mitteln das vom Apotheker selbst bereitete, reinere *Zinc. sulphur.*], zu Schnupfpulvern [vermischt und pur, z. B. gegen Nasenbluten, um Polypen zu verkleinern oder nach Ausrottung derselben das Wiederentstehen zu verhindern], Injectionen [z. B. für die Harnröhre Gr. 2-6-8 auf Unc. 1 (filtrirt), für die Vagina merklich stärker. — Ry 1092, 1093. — Ohrtropfen: Ry 1094], Salben [z. B. Scr. 1-2 auf 1 Unze Fett; HEGEWISCH gegen Krätze — (verächtlich!); oft als Zusatz zu andern Krätzsalben, so z. B. zum officinellen *Ungt. sulphurat. comp.* u. zu der JASSERschen Salbe, Ry 1087], Waschungen [z. B. Dr. 1-2 in 10-12 Unzen Wasser oder einer saturirten Abkochung von *Cort.*

Ulmis inter. oder (noch stärker, bei reizlosen Subjecten, inveterirtem Fall) *Rqd. Helicis*: HARLESS gegen Krätze], styptischen Bähungen [Dr. $\frac{1}{2}$ - 1 auf Unc. 1], Verbandwässern [meist nur einige Gran auf die Unze, doch auch wohl stärker].

1092.

Ry *Vitrioli albi* Gr. 4

solve in

Aq. destill. Unc. 1

filtra, addo

Tinct. Opii simpl. Dr. 1

Aq. Laurocerasi

Mucil. Gm. Mimos. ana Unc. $\frac{1}{2}$.

M. D. S. Stark umgeschüttelt 2mal tägl. einzuspritzen. (Bei veraltetem u. ganz schmerzlosem Nachtripper.) RÜST.

Weniger stark u. zugleich wohlfeiler ist die folgende Formel.

1093.

Ry *Vitrioli albi* Gr. 6-12

solve in

Aq. destill. Unc. 6

filtra, addo

Extr. Opii Gr. 8

Gm. Mimos. electi Dr. 3.

Denuo solve. D. — Wie das vorige.

VOGT.

1094.

Ry *Vitrioli albi* Gr. 1-2

solve in

† *Aq. Baccar. Junip.* Unc. $\frac{1}{2}$

addo

Liq. Myrrhae Dr. 1.

M. D. — Umgeschüttelt, einige Tropfen in den zuvor durch Einspritzen gereinigten Gehörgang zu gießen, dann denselben mit Baumwolle zu verstopfen. (Bei atonischer Otorrhöe.) VOGT.

† *Zincum aceticum. Acetas zincicus cum Aqua.* Essigsäures Zinkoxyd. [Schmeckt herb metallisch. — 1 Drachme 68hl.] Leicht auflöslich in Wasser. — *Cave* stärkere Säuren; Alkalien, alkal. Erden, und deren Salze [die essigsauren ausgenommen]; Schwefellebern; Schleime [Mimosenschleim weniger]; (Gerbstoff); *Aq. cym.*

Innerl. [noch wenig geprüft] in ähnlichen oder etwas grösseren Dosen und denselben Formen wie *Zinc. sulphur.* [auch als Brechmittel. — Bei Rasenden nach RADEMACHER zu Dr. $1\frac{1}{2}$ in 24 St.].

Ausserl. zu Injectionen [bei *Gonorrhoea secundar.* Gr. 4-5 auf Unc. 2-3 Wasser oder Schleim; nach HENRY soll man die Auflösung so stark machen, dass sie einen leichten Schmerz erregt]. Augenwässern [z. B. Gr. 4 auf Unc. 4 Rosenwasser, mit Gummischleim Dr. 6, Opiumtinct. Dr. 1; STEHLER zum Bähn bei *Ophthalmia neonatorum*; — Gr. 2 auf Unc. 4 Rosenwasser; DEWEES zum Bähn im spätern Zeitraum der *Ophthalmia neonatorum*, wenn die Augen wieder geöffnet werden; — Gr. 10 auf Unc. 4: WARE zum Waschen gegen chronische Blennorrhöen].

† *Zincum hydrocyanicum s. borussicum s. montanum s. cyanatum s. cyanogenatum* [abkürzlig: *cyanicum*]. *Cyanuretum zincicum.* Blausäures Zinkoxydul. Blaustoffzink. Zinkcyanür. [Weisses, geschmackloses Pulver; in Wasser u. Weingeist unlöslich; wird in der Hitze zerstört; starke Säuren entwickeln daraus Blausäure.] Und

+ *Zincum ferro-hydrocyanicum*. '*Zincum ferro-cyanicum* (s. *hydrocyanicum*) PH. HANN. *Zinc. hydrocyanicum* PH. SLESV. Anhg. *Cyanuretum ferro-zincicum*. Blausaures Eisenoxydul-Zinkoxyd. Zinkeisencyanür. [Weisses, geschmackloses, in Wasser unlösliches Pulver; wird in der Hitze zerstört. — Resp. 1 Gran $\frac{1}{2}$, 1 Scrup. 4 Mgr. und 1 Drachme 6 Sbl.]

Beide [wir müssen sie vereinigen, weil sie so gewöhnlich mit einander wechselt werden, dass man bei den Angaben der ärztlichen Autoren fast nie weiss, welches gemeint ist; doch scheint auch kein wichtiger dynamischer Unterschied stattzufinden] innerl. zu Gr. $\frac{1}{4}$ –1 (u. allmählig mehr); 2–4mal tägl.; in Pulver [z. B. 4stündl. Gr. $\frac{1}{2}$ mit *Magnes. ust.* Gr. 4, Zimmt Gr. 3: HENNING (nach MAGENDIE) gegen nervöse Magenleiden, besonders Magenkrampf; auch gegen Dyspepsie und Koliken von verminderter Menstruation], Pillen [z. B. früh u. Abends Gr. $\frac{1}{2}$ (mit *Rad. Valer. min.* u. *Extr. Valer.* zur Masse gemacht): ROSENSTIEL u. HERKENRATH gegen Vekstanz]; — selten äusserl. [Rx 1095].

1095.

Rx + *Zinci hydrocyanici* Gr. 8–20
tere cum

Gm. Mimos. electi Dr. 2

sensim addendo

Aq. Cerasor. Unc. 3

et delendo

Tinct. Opii croc. Scr. 1

Aq. Laurocer. Unc. $\frac{1}{2}$.

M. D. S. Augewasser, stark umge-

schüttelt, mit einer kleinen Compresse aufzulegen, u. den Verband stündl. zu erneuern. (Bei reiner, scrofulöser [dann auch noch allgemeine Behandlung, so wie äusserl. Ableitungsmittel, besonders *Empl. Canthar. perp.* hinter die Ohren] und beginnender rheumatischer Augenentzündung, so wie katarrhalischer Augenliedersentzündung. — Bisweilen etwas weniger blausaures Zink u. dafür etwa Scr. 1 Zinkblumen.) v. ANNON.

Zincum oxydatum. Flores Zinci. Zincicum. Lina philosophica. Oxydum zincicum (sublimatum s. sublimatione paratum). Zinkblumen. Zinkoxyd auf trockenem Wege bereitet. [Sehr feines Pulver. — 1 Drachme 2 $\frac{1}{2}$ Sgr.] Und

Zincum oxydatum via humida paratum. Magisterium Zinci ustum. Zinkkalk. Zinkoxyd auf nassem Wege bereitet. [Feines Pulver. — 1 Drachme 3 $\frac{1}{2}$ Sgr.] *Cave Säuren, saure Salze u. Säfte.*

Innerl. [man wähle hier das v. *hum. parat.* als das zuverlässiger vollkommen reine] zu Gr. 1–3, steigend bis zu Gr. 6–8; 2–4mal tägl. in Pulver [Rx 1096, 1097; 744 (*Ol. Cajep.*), 865 (*Rad. Ipecac.*)], Trochisken [Rx 1098], Pillen u. Bissen [Rx 1099], Schüttelmixturen [doch nur in zäherem Menstruum, weil es eigentlich schon zu schwer für eine Schüttelmixtur. — Rx 1100].

Äusserl. [hier ist, selbst zu Augenmitteln, das auf trockenem Wege bereite rein genug, und zu Augenmitteln sogar, weil es ein feineres, lockeres Pul-

ver ist, beliebter. Die in neueren und besonders älteren Vorschriften. zu Augenpulvern. Salben oft vorkommenden unreinen (und oft ganz verfälschten) Zinkoxyde, *Nihilum album*, *Pompholyx* (1 Unze *præp.* 1½ Sgr.) und *Tutia* (*Alexandrina*) *præparata* (*Cadmia fornacum*; — 1 Unze 2½ Sgr.; — vgl. z. B. R_z 326, 499, 501, 1106), sind durch dieses Präparat, in derselben oder einer etwas geringeren Dose; zu ersetzen.] zu Augenpulvern [nicht unvermischt], Streupulvern [R_z 1101], Salben [officiell *Ungt. Zinci*, 1 auf 9; doch kann man, versteht sich, mit diesem Verhältniss variiren. — R_z 1102-1104], namentlich Augensalben [Gr. 5 - Scr. 1 auf Dr. 2. — R_z 1105, 1106; 502 (*Hydr. ammon. - mur.*), 555 (*Hydr. oxyd. rubr. ppt.*)]; selbst zu Augenwässern, [umgeschüttelt; doch sind hier die Schüttelmixturen wohl noch weniger als zum innerlichen Gebrauch zu empfehlen, am wenigsten als Tropfwässer, Waschwasser und bei empfindlicheren Augen. — Zu Augenbähungen (bei leichten katarthalschen Affectionen des Auges u. dgl.) etwa Dr. 1-2 (nach Anderen weniger) auf Unc. 4, mit Gummischleim, gelinden Narcoticis p. p.]. — Endermatisch, bis jetzt noch wenig und ohne Erfolg versucht.

1096.

R_z *Zinci oxyd. v. hum. par.* Gr. 2
Magnes. carbon. Gr. 6
Elaeos. Cajeputi Scr. ½.
M. f. Pulv. Disp. tales nr. 8. *D. in charta cerata.* S. Alle 3 St. ein Pulver.

SCHUBARTH.

1097.

R_z *Zinci oxyd. v. hum. par.* Gr. 1 (allmählig bis 5 od. 6)
Extr. Hyoseyami Gr. 1
Rad. Valer. min. Dr. ¼
Ol. Valerian. Gtt. 1.
M. f. Pulv. Disp. tales nr. —. *D. in charta cer.* S. 3mal täglich 1 Pulv.
Pulv. antepilepticus PH. P.
 (1 Drachme 1½ Sgr.)

1098.

R_z *Zinci oxyd. v. hum. par.* Scr. 1
Rad. Valer. min. pulv. Scr. 8
Sacch. albi pulv. Unc. 1
Mucil. Gm. Tragac. q. e.
ut f. Trochisci, Pulv. Sem. Foenic. conspergendi, lenissime torrendi, nr. 40.
D. S. 3mal tägl. 2. (Etwa für ein Kind von 8 Jahren.)

1099.

R_z *Asas foet. depur.* Gr. 3

Zinci oxyd. v. hum. par. Gr. 1

Extr. Jugland. Nucum Scr. ¼.

M. f. Bolus. Cons. Pulv. Rad. Irid., Flor. Disp. tales nr. 10. *D. in vitro.* S. 3mal tägl. 1 Stück. (Etwa für ein Kind von 8 Jahren.)

1100.

R_z *Opti pulv.* Gr. 3
Zinci oxyd. v. hum. par. Scr. 1
tere cum

Mucil. Gm. Mimos. Unc. 1

Syr. Amygdal. Unc. 2

dein adde

Liq. Ammon. succin. Dr. 2.

M. D. S. Stündl., umgeschüttelt, 1 Theelöffel. (Bei krampfhaftem Husten, manchen Asthmaformen u. dgl.)

1101.

R_z *Zinci oxydati* Scr. ¼
Sem. Lycopodii Unc. ¼.

M. f. Pulv. D. S. Streupulver. (Die Menge des Zinkoxyds hat hier nichts Bestimmtes; je mehr man zusetzt, um so schneller trocknen die wunden Stellen, aber um so leichter auch Suppression.)

Vogt.

1102.

R_z *Cerae flv.* Gr. 45

Ol. Oliban. Unc. ½.

lent col. Nigella adhaerens

Boli Armen. ppt. Dr. ½

Zinci oxydati Gr. 15.

P. Ungt. D. —

Ungt. exsiccans PH. HANN. (1 Unze

4 Mgr., 4 Unz. 12 Mgr.)

1103.

Ry Zinci oxydati

Sem. Lycopadii ana Gr. 15

Ungt. rosati Unc. ½.

M. D. — (Bei Schwärzungen der Brustwarzen, eiternden Flechten, hartnäckigen Ueberresten eingewurzelter Krätze, u. s. Hautgeschwüren.)

HUFELAND.

1104.

Ry Zinci oxydati Scr. 1—Dr. ½

Ol. Corticis Citri Gtt. 2-3

Ungt. rosati Unc. ½.

M. D. — (Gegen hartnäckige Flechten, Finnen, Gesichtsausschläge der Frauen,

Gesichtsausschläge onaniertender Mädchen, u. s. w.)

WETTER.

1105.

Ry Zinci oxydati Gr. 7-8

Ol. Nucum Juglandis Gr. 15

Adipis pulli Dr. 2.

M. exactio. D. in olla alba. S. 2wöl
tägl. einer Linse gross mit einem Pinsel
in das Auge zu streichen. (Gegen Horn-
hautflecke. — In der wärmeren Jahres-
zeit setzt man noch, damit die Consis-
tenz nicht zu weich sey, Scr. ½-1 weis-
ses Wachs zu.)

J. AD. SCHMIDT.

1106.

Ry Aloë lucid. sub. pulv.

Hydrarg. murat. mitis ana Gr. 1

† Tutiae ppt. Dr. ½ [lieber Zinci
oxyd. Scr. 1]

† Butyri recent. insulsi Dr. 2.

M. exactio. D. in olla alba. S. 3-4mal
tägl. einer Erbsen gross ins Auge zubrin-
gen. (Gegen scrofulöse Augenentzündun-
gen.)

SCARPA.

Zincum sulphuricum. Vitriolum Zinci. Sal ve-
mitorium Vitrioli. Sulphas zincicus cum Aqua. Zink-
vitriol; Brechvitriol; weisser Augenstein. Schwe-
felsaures Zinkoxyd. [Vgl. die Synonyme von *Vitriol. alb.* — 1 Unze
1½ Sgr.] *Sol.* 2½; siedend 1; unauflöslich in Weingeist, der es sogar
aus wässrigen Auflösungen mehr oder weniger vollständig nte-
derschlägt. — *Cave* Alkalien, alkal. Erden, und deren Salze mit
schwächeren Säuren (also auch Seifen); *Botus alba* u. *Armena*;
Schwefellebern; Bleisalze; Schleime [Mimosenschleim weniger]; (Gerb-
stoff); *Aq. comm.*

Innerl. zu Gr. ½-½ alle 2-3 St., steigend, bis Uebelkeiten
entstehen, so dass man zuletzt oft mehrere Gran *p. dosi* geben
kann; — als Brechmittel zu Gr. 5 alle 10 Minuten [in Auflösung; —
bei der Darreichung als Brechmittel werden in der Regel ähnliche diätetische u. s.
Anordnungen zu treffen seyn, wie wir sie bei *Rad. Ipacac.* angegeben haben]. — In
Pulver [mit *Pulv. gummos.*], Pillen [Ry 1107], Auflösungen
[Ry 1108].

Ausserl. zu Mund- u. Gurgelwässern [Scr. ½-Dr. ½ auf
Unc. 6], Pinselsäften [Gr. 5-10 auf 1 Unze Saft], Augenpulvers

[nicht pur, sondern nur etwa Scr. $\frac{1}{2}$ - Dr. $\frac{1}{4}$ auf Dr. 2. — Ry 79 (*Alum. ust.*)].
Augensalben [Gr. 2-8, zweckmässig vorher in destill. Wasser aufgelöst, auf Dr. 2 Fett, Ry 1109. — Bei Psorophthalmie u.s.w. bedient man sich wohl folgenden (sehr starken!) Mittels: man schneidet ein hartgekochtes, noch heisses Ei mitten durch, nimmt den Dotter heraus, legt an die Stelle desselben gepulvertes Zinkvitriol, bindet die beiden Eihälften wieder lose zusammen, u. lässt sie bis zum Erkalten liegen; es fliesst dann eine Auflösung des Vitriols in Eiweiss aus, u. diese streicht man ein Paar Mal tägl. mit einem Miniaturpinsel auf die excoriirten Stellen der Liedränder]. **Augenwässern** [geru mit Schleim, auch mit Narcoticis. — Zu Augen-Waschungen u. -Bähungen Gr. 4-20 auf Unc. 4. (*Collyrium e Zinco sulph. s. e Vitriolo albo* PH. MIL.: Gr. 4 auf Unc. 4.) — Zu Tropfwässern Gr. 1-4 auf Unc. $\frac{1}{2}$; z. B. Gr. $\frac{1}{2}$ in *Aq. Opii* Dr. 2, 1-2mal tägl. einzutropfen: JÜNGKEN gegen Schwäche u. Empfindlichkeit der Augen nach Entzündungen; — Ry 1110. — Zu Pinselwässern Gr. 2-5 auf Dr. 2. — Gr. 2-6 in *Aq. Opii* Dr. 3-2, tägl. 3-4mal zu appliciren: v. AMMON gegen Hornhautflecke nach Augenentzündung Neugeborner („für diese sehr stark!!“), gegen chronische Ekanthis u. s. w.]. Sonst ist für die äusserliche Anwendung das käufliche Salz, *Vitriolum album* [s. den Art.] rein genug.

1107.

Ry *Asae foetidae depur.* Dr. 1
Zinci sulphurici Scr. 1
Extr. Valerianae q. s.
 ut f. *Pilulas* 30. *Consp. Pulv. Rad. Irid.*
Flor. D. in vitro. S. 2-3mal tägl. 1-3.
 G. A. RICHTER.

1108.

Ry *Zinci sulphurici* Scr. $\frac{1}{2}$
 solve in
Aq. Rosarum Unc. 4
 adde
Mucil. Gm. Mimos. Unc. $\frac{1}{2}$.
M. D. S. Alle 3 St., umgeschüttelt, 1 Essl.
 (Gegen *Gonorrhoea secundaria*).
 WALCH.

1109.

Ry *Zinci sulphurici* Gr. 8

solvo in

Aq. destill. fervid. q. s.

adde

Ungt. corvi Dr. 2.

M. exactiss. f. *Ungt. D. in olla alba.*
S. Morgens u. Abends einer kleinen
 Erbse gross auf die geschlossene Lied-
 spalte einzureiben. (Bei *Blepharophthal-*
mia glandulosa u. s. w.)

1110.

Ry *Zinci sulphurici* Gr. 3
 solve in
Aq. Rosarum Dr. 3
 adde
Mucil. Gm. Mimos. Dr. 1
Tinct. Opii crocat. Dr. $\frac{1}{2}$.
M. D. S. 1-2mal tägl. umgeschüttelt
 1 Tropfen ins Auge fallen zu lassen.
 (Gegen torpide Augen-Entzündungen
 u. -Blennorrhöen.) (v. GRAËF.)

A n h ä n g e.

I.

Kurze Anleitung zur ersten Hilfsleistung bei acuten

V e r g i f t u n g e n.

Wir haben im Allgemeinen die Indicationen:

1) das Gift zu entfernen; — oder wo dies nicht vollständig oder rasch genug möglich ist,

2) es möglichst unschädlich zu machen, indem wir es entweder

a) chemisch zersetzen [so z. B. den Brechweinstein, den Sublimat], oder es

b) an einen andern Stoff binden, so dass ein weniger schädliches Product entsteht [Beispiel: arsenichte Säure mit Eisenoxydhydrat], oder es

c) einhüllen od. verdünnen; — endlich

3) bereits durch die Vergiftung hervorgerufene Krankheitszustände nach allgemeinen therapeutischen Regeln zu beseitigen.

Wir wählen als am meisten praktisch diejenige Eintheilung der Gifte, welche sich auf die wichtigste Differenz ihrer Wirkung gründet. Unter den Hauptabtheilungen führen wir einzelne Gifte besonders auf, doch nur diejenigen, bei denen für die Behandlung etwas Besonderes zu bemerken, namentlich etwa ein eigentliches, chemisches Gegengift anzugeben ist. Jeder Hauptabtheilung ausserdem noch ein Verzeichniss aller andern dazu gehörenden Gifte, bei denen nichts Besonderes zu bemerken ist, beizufügen, halten wir

für überflüssig, da jeder Arzt Entzündung von Narkose zu unterscheiden wissen soll, also jeden ihm vorkommenden Vergiftungsfall nach den Erscheinungen leicht unter eine von unsern Hauptabtheilungen unterordnen und sich dann keinen Vorwurf zu machen haben wird, wenn er bloss nach den für diese Abtheilung aufgestellten allgemeinen Regeln handelt. Sollte aber etwa der Arzt gerufen werden, wo jemand ein Gift verschluckt und dies seine Wirkung zu entfalten noch nicht begonnen hat, so ist die Unterordnung unter eine von unsern Hauptabtheilungen überflüssig, und ein tüchtiges Brechmittel aus *Ipecacuanha*, viel wässriges oder schleimiges Getränk — besonders passend eine Ebullition von gewöhnlichem Thee, weil gerade für die allermeisten von denjenigen Vergiftungen, die im Anfang über ihren Charakter noch im Zweifel lassen, der Gerbstoff fast als ein Universalgengift zu betrachten ist —, und Abwarten etwaniger Erscheinungen entspricht dann allen Indicationen. — Dosen für die bei Vergiftungen darzureichenden Arzneimittel lassen sich schwer bestimmen; in der Regel wird man wohl thun, sie bei solchen Mitteln, welche selbst nicht indifferent sind, nicht viel grösser zu greifen als die von uns aufgestellten gewöhnlichen Dosen, aber sie viel rascher auf einander folgen zu lassen, so lange als nöthig. Bei ganz indifferenten Gegenmitteln dagegen gilt der Grundsatz: je mehr, desto besser. Wo man aber nicht mehr mit dem Gifte selbst, sondern mehr nur mit den durch dasselbe hervorgerufenen Krankheitszuständen zu thun hat, da ganz wieder die gewöhnlichen Dosen in den gewöhnlichen Zwischenräumen. — Lässt man Mittel aus der Apotheke holen, so seyen diese möglichst einfach, so dass ihre Verabreichung nicht viel Zeit erfordert, und das „*Citissime*“ auf dem Recept erfüllt werden kann; die Signatur bleibe in der Regel weg [vgl. I. S. 123].

Zum rascheren Aufsuchen einzelner Gifte kann der Artikel: Vergiftungen im Register dienen.

I. Entzündende Gifte.

(Wir fassen unter dieser Benennung die scharfen u. die ätzenden Gifte mancher Schriftsteller zusammen, weil zwischen diesen beiden Abtheilungen wohl kein wesentlicherer Unterschied als der graduelle seyn möchte, namentlich sich kein wesentlicherer Unterschied für die Behandlung durchführen lässt, auch bei der ätzenden Wirkung im Umkreise der zunächst und hauptsächlich getroffenen Stelle die Entzündung nie fehlt, und gewöhnlich ein u. dasselbe Gift concentrirt ätzend, verdünnt nur scharf wirkt.)

Die erste und wichtigste Indication ist die Entfernung des Giftes. Ist schon freiwilliges Erbrechen eingetreten, so unterh<lt und befördert man dies durch Kitzeln des Schlundes mit dem Finger

oder einer beölten Feder und durch reichliche Quantitäten eines milden, fade-lauwarmen Getränkes: laues Wasser, Milch, oder besonders zweckmässig Thee-Ebullition [a. S. 537 Z. 10] oder Wasser mit Eiweiss und mit Zucker od. Honig, indem diese letzteren Substanzen zugleich viele und zwar gerade die gefährlichsten metallischen Gifte zersetzen; oder man giebt auch, wenn die Art des Giftes bekannt ist, andre — bei den einzelnen Giften zu erwähnende — Gegengifte in dem zur Beförderung des Erbrechens gereichten Wasser, und erfüllt so mit der ersten Indication zugleich auch die zweite, die Zersetzung des Giftes. Auch wirkt in den bei weitem meisten Fällen schon die blosse Verdünnung des Giftes und die Anfüllung des Magens durch das Wasser, indem sie das Gift in einen grösseren Raum vertheilt, wohlthätig, weshalb man, wenn im ersten Augenblick der Behandlung kein laues Wasser zu haben ist, unverzüglich zum kalten [im Nothfall auch zu Fleischbrühe, Bier] greifen muss. — Erfolgt aber auf diese Weise kein gehörig ergiebiges Erbrechen, dann *Ipecacuanha* [kein metallisches Brechmittel, denn ein solches würde nur die Magenentzündung befördern; vom *Tartarus stibiatus* wäre überdies zu befürchten, dass er purgirend wirkte und so das Gift auch durch den Darmcanal leitete] in starken und rasch auf einander folgenden Dosen: einem Erwachsenen etwa von 5 zu 5 Minuten Gr. 15–20 des Pulvers, mit etwas Wasser angerührt. Sollte, etwa wegen Verhinderung des Schlingens oder aus einer andern Ursache, das Brechmittel nicht zu appliciren seyn, dann Anwendung einer Magenpumpe [mittelst deren man wiederholt durch Einspritzen einer — ebenfalls wieder möglichst zersetzend zu wählenden — Flüssigkeit das Gift verdünnt und die Flüssigkeit wieder herauszieht. — Im Nothfall ist jede Spritze mit einem langen elastischen Rohr dazu brauchbar; doch hat man auch zweckmässigere, eigens dazu bestimmte.] oder Infusion von *Tartarus stibiatus* in eine Vene [vgl. S. 487]. — Nur wenn die Symptome (namentlich Kolikschmerzen, Durchfall, Tenesmus) schliessen lassen, dass das Gift bereits in den Darmcanal auf eine beträchtliche Strecke übergegangen sey, sind Purgirmittel und Klystiere, oder auch unter Umständen der zugleich Erbrechen und Purgiren erregende *Tartarus stibiatus* angezeigt. Wenn die Art des Giftes bekannt ist, wird man zweckmässig auch in die Purgirmittel und Klystiere die passenden Gegenmittel, soweit dies angeht, aufnehmen [also z. B. basische sauren Blei Glaubersalz oder Bittersalz]; sonst aber enthalte man sich lieber der gewöhnlichen eröffnenden Salze, Seifen, Öle etc., weil diese Dinge unter Umständen Übel ärger machen könnten, und begnüge sich, grosse Quantitäten der oben angegebenen lauwarmen Flüssigkeiten einzuspritzen, die man allenfalls, wenn sie nach einigem Au-

enthalt im Darmcanal nicht spontan wieder ausgeleert werden, mit der Spritze vorsichtig wieder ausziehen versuchen kann. — Ist durch die Hülfe der Kunst oder der Natur so viel Erbrechen (und Durchfall) erfolgt, dass man sich von fernerer Entleerung nichts mehr versprechen kann, so kann man nun den Versuch machen, einen etwa noch unzersetzt im Leibe befindlichen Rest des Giftes chemisch zu neutralisiren durch die Mittel, die wir dazu bei einzelnen Giften angegeben haben.

Die fernere Behandlung muss sich ganz nach allgemeinen Grundsätzen gegen den durch die Vergiftung hervorgerufenen Krankheitszustand richten. Es wird also entweder gegen die hervorgerufene Unterleibsentzündung allgemein u. örtlich antiphlogistisch zu verfahren seyn [Aderlass (diesen wendet man nicht gern früher an, als bis das Gift mehr oder weniger vollständig ausgeleert ist, weil er durch Entleerung der Blutgefässe die Absorption befördert), Egel, erweichende Umschläge u. Klystiere, Bäder], oder wenn bei zeitiger Hülfe, geringerem Grade der Vergiftung, es nicht zu einer förmlichen Entzündung, nur zu einer mässigeren Reizung kam, involvirend, besänftigend und ableitend [*Mucilaginoso, Oleoso, Narcotico*, — Mandelemulsion mit *Extr. Hyoscyami* oder *Opium* —; *Sinapismen*, Bäder]; bisweilen wird eine unnütze Hyperemesis oder Diarrhöe durch bekannte Mittel [vgl. z. B. S. 399] zu stillen seyn; später werden sich oft Analeptica u. dgl. nöthig machen; Congestionen nach diesem oder jenem auch nicht zunächst betheiligten Organ [hervorgerufen durch Consens, namentlich bei schon vorhandener Disposition, oder durch die Anstrengungen beim Erbrechen] werden durch bekannte Ableitungsmittel zu beseitigen, verletzte Stellen der Deglutitionsorgane, wenigstens anfangs, mit erweichenden oder kühlenden Mitteln [Milchrahm, Schleim, Öl, Honig — oder kaltes Wasser] zu behandeln seyn; u. s. w.

Es gehören hieher die meisten Gifte des Mineralreichs, ausserdem eine Anzahl vegetabilischer und einige thierische. Nur bei den folgenden haben wir noch etwas Besonderes zu bemerken:

Alcalien; kaustische und kohlensaure. Gegengift: gehörig verdünnte Säuren, namentlich Essig od. Citronensaft mit Wasser; in Ermangelung dessen fettes Öl.

Arsenichte Säure. (*Arsenicum album*.) Beförderung des Erbrechens durch reichliche Mengen lauen Zucker- od. Honig- od. Eiweiss- Wassers, lauer Fleischbrühe, Milch oder schleimiger Abkochungen. — Gegengift: Eisenoxydhydrat [*Ferrum oxydat. fusc.* PH. BOR.; welches, falls es aus der Apotheke nicht rasch genug zu haben wäre, sich auch in manchen Schmiede- u. Schlosser-Werkstätten im Ablöschwasser, als ein rostfarbiger Schlamm auf dem Boden des Ge-

fässes findet. — BUNSEN und BERTHOLD wollen das Eisenoxydhydrat sogleich, ohne vorangeschicktes Brechmittel, angewandt haben; nur, wenn eine sehr grosse Quantität Gift genommen, wenn gerbstoffhaltige Stoffe (z. B. Thee) oder Schwefelwasserstoff entwickelnde (z. B. Schwefel oder Eier) genossen worden, oder wenn der Magen durch Speisen überfällt ist, rathen sie, zuerst ein Brechmittel anzuwenden.], drachmen- oder unzenweise [auf 1 Theil arsenichter Säure sind zur vollkommenen Sättigung 10-12 Theile Eisenoxydhydrat nöthig; da man jedoch selten weiss, wie viel Gift verschluckt ist, gebe man lieber mehr als weniger], in Pulver, mit Wasser angerührt [am besten wirkt ein frisch bereitetes Eisenoxydhydrat oder ein, nach dem Vorschlage von BUNSEN und BERTHOLD, nicht getrocknetes, sondern nach dem Auswaschen in Breiform in verschlossenen Gefässen bewahrtes]; — wenn die arsenichte Säure in Substanz, in Pulver, in den Magen gekommen, so setze man jeder Gabe des Gegengifts 10-20 Tropf. *Liq. Ammon. caust.* zu. Erfolgt Erbrechen, so wiederhole man das Eisenoxydhydrat in kleineren Gaben (drachmenweise), bis das arsenichtsäure Eisenoxyd durch den After ausgeleert wird [was sich durch eine weisse, bei Mitgebrauch verhältnissmässig vielen Ammoniaks rothe, Farbe zu erkennen geben wird]. Glaubt man das Gift auch schon in den Darmcanal übergegangen, gleichzeitig Klystiere von Glaubersalz mit [durch Umschütteln so gut als möglich suspendirtem] Eisenoxydhydrat. — Alle andern als eigentliche Gegengifte vorgeschlagenen Mittel sind theils verwerflich, theils sehr unzuverlässig*; allenfalls kann man Kohle anwenden. — Wo durch äusserliche Anwendung des weissen Arseniks eine Vergiftung entstanden, wende man, nach möglichster Entfernung des Gifts, als Gegengift für das doch noch zurückbleibende ebenfalls Eisenoxydhydrat an, — wenn das Gift mit Fett angewandt worden, in einem Liniment mit Seife (namentlich schwarzer) und warmem Wasser, — Ebenso bei Vergiftungen durch die *Solutio arsenicalis* (die arsenichtsäures Kali enthält), doch bleibe die gleichzeitige Anwendung von Alkalien oder Seifenwasser hier ganz weg.

Baryt, salzsaure. Gegengifte: Glaubersalz oder Bittersalz; auch ein Brunnenwasser, welches, wie nicht selten, schwefelsauren Kalk (Gyps) enthält, kann in grosser Menge einigermassen [indem der salzsaure Kalk, der sich durch die Zersetzung bildet, weniger schädlich ist] nützlich werden. — Dieselben Gegenmittel

*) Es fragt sich indess, ob nicht in der Folge einmal ein solches Urtheil auch über das Eisenoxydhydrat ergehen wird, ob man dies nicht jetzt überschätzt. Aus theoretischen Gründen sollte man meinen, Kalkwasser müsste dasselbe leisten, und doch hat man das Kalkwasser geprüft und wieder aufgegeben.

dienen auch bei Vergiftungen mit kohlen-saurem Baryt (Witherit) oder mit kaustischem; nur wird man hier dem Bittersalz den Vorzug geben, oder wenn mangelnöthig ist, Glaubersalz zu wählen, es mit verdünntem Essig oder doch mit sehr vielem Wasser reichen, damit das frei werdende Natron nicht selbst wieder ätzend wirke. (Essig allein aber nützt nichts.)

Blei — in allen Formen [denn die Erscheinungen sind — die Verschiedenheit der Fälle abgerechnet — immer ziemlich ähnlich und auch für die Behandlung kaum ein Unterschied nöthig. — Die Vergiftung ist zwar, wenn man will, auch eine „entzündende“, doch mit besondern Modificationen, weshalb man das Blei auch wohl ein adstringirendes oder ein austrocknendes Gift genannt hat. Acute und chronische Vergiftung lassen sich hier weniger als sonst in der Regel unterscheiden, die chronische macht oft plötzlich ziemlich acute Erscheinungen]. Sorge für Erbrechen — wozu hier Zinkvitriol besonders empfehlenswerth — und, zumal bei chronischer Vergiftung, auch für Darmausleerung, oder für beides zugleich (*Tartarus stibiatus*). Die Darmausleerung befördert man durch Glaubersalz oder Bittersalz [die zugleich, wie auch die Schwefelsäure, für die auflöselichen Bleipräparate, namentlich für den Bleizucker, eigentliche Gegengifte sind; sonst zersetzen auch Seifenwasser, Eiweiss, Milch u. s. w. die auflöselichen Bleipräparate] und durch Öle, namentlich *Ol. Ricini* [die auf die Bleioxyde auch vielleicht chemisch einwirken]; diese Mittel innerlich [vgl. z. B. Ry732] und in Klystieren. Ausserdem Bäder, erweichende Umschläge u. Einreibungen, schleimiges Getränk; zur Besänftigung von Schmerzen u. Krämpfen oft Narcotica, Valeriana-Klystiere u. dgl.; namentlich wird man oft, selbst bei der acuten Bleivergiftung, nicht ohne Opium [selbst in etwas grossen und häufigen Gaben, z. B. wohl Gr. $\frac{1}{2}$ - 1 alle 2 St.] fertig, das hier nicht verstopft, sondern eröffnet. Andre-mal machen wieder entzündliche Erscheinungen allgemeine u. örtliche Antiphlogistik oder die ableitende Methode nöthig, namentlich auch entzündliche Erscheinungen in Hirn u. Rückenmark; bei Symptomen von Reizung des Gehirns reizende Fussbäder [etwa von Salpetersäure u. Salzsäure], Senfumschläge auf die Waden, Blasenpflaster in den Nacken u. s. w.; bei Rückenschmerzen und beginnender Lähmung der Extremitäten blutige Schröpfköpfe u. Einreibungen von grauer Quecksilbersalbe mit etwas Opium auf das Rückgrat. Oft wird auch eine Ableitung auf die äusseren Bauchdecken nützlich — durch reizende Einreibungen, reizende Pflaster [z. B. Brechweinsteinpflaster], die bei eigentlich entzündlichen Unterleiberscheinungen begreiflich schaden würden.

Brechweinstein (*Tart. stibiat.*). Gegenmittel: Gerbstoff*. —

Oft werden, wenn die zersetzende Methode nicht ausreicht, gegen Hyperemesis u. Hyperkatharsis die S. 399 u. 486-angeführten Mittel nöthig.

Brechwurzel (*Ipecacuanha*) und ihr Alkaloid: Emetin; auch dessen Salze. — Sollten die gewöhnlichen Mittel gegen Hyperemesis (vgl. S. 399) u. Involventien nicht ausreichen [namentlich wäre auch Theeabkochung, als leicht herbeizuschaffen, empfehlenswerth], so wären kräftigere Gerbstoff-Mittel (vgl. unten die Note) anzuwenden. Bei Emetin u. Emetinsalzen fange man wo möglich gleich mit *Tinctura Gallarum* oder *Tinct. Chinae simpl.* an.

Canthariden. Brechmittel (*Ipecac.*) und — innerl. und in Klystieren — schleimige Flüssigkeiten (namentlich Leinsamenabkochung) mit Campher, besser vielleicht mit *Hyoscyamus*. Auch *Ipecacuanha* in kleinen Dosen wird empfohlen. Vielleicht wäre Chlor (*Aq. oxymuriat.*) ein eigentliches Gegengift. — Örtliche (u. allgemeine) Antiphlogistik gegen die Entzündung der Harn- u. Geschlechts-Organen: Egel, besänftigende Umschläge, Einspritzungen, Bäder u. s. w. [J. DAVY empfiehlt gegen die Strangurie vorsichtiges Einbringen des Catheters bis in den Blasenhalt und Liegenlassen während mehrerer Stunden; es soll dies fast immer augenblicklich erleichtern und selten schmerzhaft seyn.] Auch wenn die Vergiftung durch äusserliche Anwendung der Canthariden erfolgt ist, dieselbe Behandlung, nur ohne die Brechmittel. — *Oleosa* sind da, wo sie mit den Canthariden in unmittelbare Berührung kommen, also z. B. innerlich, wenn die Vergiftung

*) Am reichlichsten erhält man den Gerbstoff aus den Galläpfeln. Doch hat man auch China häufig zur Anwendung desselben bei Vergiftungen benutzt. Am raschesten wird man ihn in der Regel im chinesischen Thee zur Hand haben. Im Nothfall kann man etwas Rinde von Eichen-, Buchen- od. irgend einem andern Eichen-Holz abbrechen. — Erlaubt es die Zeit, nach der Apotheke zu schicken, so lasse man die Galläpfel (oder China) gepulvert kommen, gebe dem Kranken zuerst von dem Pulver, dann mache man eine Ebullition und gebe ihm hiervon (vgl. *Gallae*, S. 214). Bei Thee und Baumrinde passt nur die Ebullition. — Wo es, wie z. B. wenn zu grosse Dosen eines Alkaloids oder Alkaloidsalzes üble Zufälle gemacht haben, nur einer geringeren Quantität Gerbstoffs bedarf, dabei aber darauf ankommt, diese möglichst rasch in den Körper zu bringen, würde die (als Reagens in den Apotheken zu findende) *Tinct. Gallarum*, oder auch die *Tinct. Chinae simplex*, am zweckmässigsten seyn, wenn man sie rasch genug zur Hand hätte. — (Der Gerbstoff ist, kann man wohl sagen, unter allen bei Vergiftungen im Allgemeinen vorgeschlagenen Gegenmitteln das wichtigste, wegen seiner höchst ausgedehnten Anwendbarkeit, worauf wir noch bei den narkotischen u. narkotisch-scharfen Giften zurückkommen, und weil er überall rasch zu haben ist.)

durch innerlichen Gebrauch entstand, streng zu vermeiden; sonst aber kann man z. B. *Oleum camphoratum* zu Einreibungen in die Pudendalgegend und die innere Seite der Schenkel anwenden.

Chlorzinn (*Stannum muriaticum*). Gegenmittel: phosphorsaures Natron, *Kali carbon. acidul.*, *Aq. hydrosulphurata* (becherweise), Milch; in Ermangelung derselben Fleischbrühe, süsse schleimige Abkochungen, laues Wasser.

Chromsäure und doppelchromsaure Salze. Gegengifte: nach BUCHNER am besten *Magnesia carbon.*, in Wasser gerührt, nächstdem *Natr. carb. acidul.*; auch vom Eisenoxydhydrat in beträchtlicher Quantität kann man sich [wie bei der arsenichten Säure] etwas versprechen; auch *Aq. hydrosulphurata* ist empfohlen. Im Nothfall verfare man wie bei „Mineralsäuren“ (s. S. 544).

Gold, salzsaures. [Noch kein Vergiftungsfall bekannt.] Da es so leicht zersetzlich ist, genügt die allgemeine Behandlung [Eiweisswasser, Theeabkochung, Fleischbrühe, oder eine andere organische Substanz].

Iodine. *Amylum* oder Waizenmehl mit vielem Wasser oder Milch, zu einem dünnen Kleister gekocht, in reichlicher Menge.

Kalk, gebrannter. Öl in beträchtlicher Quantität. In Ermangelung dessen gehörig verdünnter Essig od. Citronensaft; auch ein stark kohlenensäurehaltiges Wasser [Selterser Wasser; Brausepulver mit vielem Wasser]. — Reines Wasser, ohne Säuren, könnte hier — eine Ausnahme von der Regel — bisweilen nachtheilig werden, wegen der Erhitzung beim „Löschen“; doch wird dies schwerlich statt finden, wenn nur wenig Kalk verschluckt ist und man eine sehr beträchtliche Quantität Wasser auf Einmal nehmen lässt [denn sollte in diesem Falle auch noch nicht aller Kalk durch die Flüssigkeit des Magens gelöscht seyn, sollte also beim Eintritt des Wassers in den Magen neue Erhitzung erfolgen, so würde doch das überschüssige Wasser diese Hitze alsbald dämpfen]. — Bei äusserlichen Verletzungen durch gebrannten Kalk, namentlich z. B. am Auge, suche man den Kalk mit Öl, halbgeschmolzener Butter od. dgl. abzuspülen, oder, wenn dies nicht rasch genug zu haben ist, mit einem trockenen weichen Tuche abzuwischen. Erst wenn aller Kalk entfernt ist, wende man kaltes Wasser [wenn man es zur Hand hat, Selterser Wasser] als Antiphlogisticum an, und zwar dann auch im ersten Augenblick viel Wasser auf Einmal [für den Fall, dass noch Kalkpartikelchen unentdeckt zurückgeblieben wären — aus dem oben angegebenen Grunde].

Kupferpräparate. Gegenmittel: Eiweiss mit Wasser; phosphorsaures Natron; weniger kräftig Syrup [tassenweise], Zucker- oder Honig-Wasser, Milch.

Mineralsäuren. (Schwefelsäure, Salpeters., Salzs., Phosphors.) Gegengifte: Seifenwasser, besser noch *Magnesia usta* od. *carbon.* mit vielem Wasser; weniger gern Auflösungen von *Kali* oder *Natr. carbon.*, doch im Nothfall selbst eine schwache Potaschlösung, Lauge von Laubholzasche; Kreide. — Bei äusserlichen Verbrennungen den Theil in kaltes Wasser [oder Seifenwasser, Aschenlauge] tauchen.

Phosphor. Brechmittel mit vielem schleimigen Getränk, dann etwas *Magnesia usta* mit Wasser, um die entstandenen Säuren des Phosphors zu sättigen. [Ob es rathsam ist, statt des Schleims Öl anzuwenden u. dadurch den Phosphor aufzulösen, so dass er, statt auf einen geringen Raum höchst heftig, auf einen grösseren Raum milder heftig einwirkt, hat die Erfahrung noch nicht entschieden; jedenfalls müsste man möglichst viel Öl verschlucken lassen.]

Sauerkleesalz (*Oxalium*) u. Sauerkleesäure (*Acidum oxalicum*). Gegengifte: Kalk, Kalkwasser, gepulverte Kreide in Wasser zerlassen; allenfalls auch *Magnesia*.

Schwefelleber, alkalische (*Kali sulphuratum*). Eigentliche Gegengifte sind nicht wohl anzuwenden [BUCHNER schlägt vor, wenn nicht von selbst hinreichendes Erbrechen erfolgt, den Brech Weinstein in etwas starken Gaben zu reichen, der zugleich zersetzend wirken würde. Sollte dieser indess in so grosser Dose angewandt werden, dass er die Schwefelleber vollständig zersetzte, so würden die Producte wieder nachtheilig werden. Zweckmässiger reicht man also wohl, wo ein Brechmittel nöthig wird, *Ipecac.*]; vielmehr die gewöhnliche allgemeine Behandlung [namentlich wird fettes Öl empfohlen]. Vor Säuren hüte man sich.

Seemuscheln. Bei der acuten Vergiftung durch dieselben: Aderlass, kalte Umschläge auf den Kopf, dann erst ein Brechmittel aus *Ipecac.* mit [wider die von uns gegebene allgemeine Regel] *Tart. stib.* (KRIMER.)

Silber, salpetersaures; Höllenstein. Gegengift: Kochsalz. — Auch wenn es bei der äusserlichen Anwendung allzu heftige Schmerzen erregt, hilft eine Kochsalzauflösung.

Sublimat. (*Hydrargyr. muriatic. corrosivum*.) Gegenmittel: Eiweiss, doch nicht zu viel, etwa alle 2 Minuten 1 Eiweiss mit vielem Wasser, so lange als es nöthig scheint [1 Eiweiss soll 4 Gran Sublimat unschädlich machen (PESCHIER)]. In Ermangelung desselben Mehl mit Wasser zu einem dünnen Kleister gekocht [oder zu An-

sang auch bloss mit Wasser angerührt}, Zucker- od. Honig- od. Seifen-Wasser, Fleischbrühe, Schleime, Milch, od. selbst blosses laues Wasser, in grosser Menge.

Wismuthniederschlag. (*Bismuthum nitricum præcipitatum*.) Hauptsächlich süsse u. schleimige Getränke etc.

Zeitlose. (*Cokchicum*.) Gegengifte wie bei den unten [z. 9 ff. v. u.] erwähnten alkaloidischen Giften im Allgemeinen.

Zinkvitriol. (*Zincum sulphuricum*.) Gegenmittel: Gerbstoff [vgl. S. 542, Note]; Involventien (namentlich Milch). Gegen spätere Hyperemesis Brausepulver, Opiate u. a. S. 399 erwähnte Mittel.

II. Betäubende (narkotische) Gifte.

Wenn man den Kranken schon ganz oder fast ganz asphyktisch findet [wo dann freilich wenig Hoffnung], so tritt zunächst die gewöhnliche, jedem Arzt bekannte, Behandlung der Asphyxie ein, und namentlich ist die künstliche Unterhaltung der Respiration durch [nöthigenfalls mehrere Stunden hindurch fortgesetztes] Einblasen von Luft und Wiederausdrücken derselben wichtig. — In den meisten Fällen aber wird man die Behandlung mit einem Brechmittel beginnen müssen, und zwar wird die durch das Gift abgestumpfte Reizbarkeit des Magens ein recht starkes, *Zincum sulphuricum* [etwa Dr. $\frac{1}{2}$ in 3 Unzen destill. Wassers aufgelöst, auch, wohl noch mit Zusatz von etwas *Ipecacuanha* (Schüttelmixtur); davon alle 10 Minuten 1 Essl.] nöthig machen, dessen Wirkung man durch Schlundkitzeln und vieles fade-lauwarne Getränk (Wasser, Milch, Thee) unterstützt. Lässt sich das Brechmittel nicht beibringen, dann auch hier Anwendung einer Magenpumpe oder Infusion von *Tart. stibiat.* in eine Vene. — Purgirmittel und Klystiere, oder Mittel, die zugleich Erbrechen und Purgiren erregen (*Tart. stibiat.*), sind auch hier nur unter denselben Umständen wie bei den entzündenden Giften (s. S. 538) erlaubt. — Nach der nöthigen Entleerung hat man an die Gegengifte zu denken. Für die durch Alkaloide wirkenden Gifte (Opium, Bilsen [*Hyoscyamus*], Bittersüss [*Solanum Dulcamara*] u. a. Solanum-Arten, Belladonna, Stechapfel [*Stramonium*] p. p.), so wie auch für die reinen Alkaloide und Alkaloidsalze, kann man im Allgemeinen den Gerbstoff [vgl. S. 542, Note] als Gegengift empfehlen; wenigstens wird dieser in der Regel nützen und nie schaden. Auch reine u. kohlensaure Alkalien können oft nützlich werden [indem sie die Alkaloide aus ihren salinischen Verbindungen ausscheiden und schwerlöslich machen]. DONNÉ empfiehlt, bei Vergiftungen durch Alka-

loide (und Alkaloidsalze), als Gegenmittel Chlor, Iod od. Brom anzuwenden, aber es fragt sich sehr, ob diese Empfehlung nicht zu allgemein ausgedrückt ist; namentlich scheint die Empfehlung des Chlors etwas unzuverlässig, da mehrere salzsaure Alkaloidsalze leichtlöslich und sehr giftig sind; mit Iod und Brom aber ist, da sie selbst giftig sind, mislich umzugehen. — Das Einhüllen oder Schwächen eines etwa zurückbleibenden Giftrestes durch Verdünnung mit vieler Flüssigkeit, durch *Mucilaginosa* u. dgl., gelingt hier im Allgemeinen weniger als bei den entzündenden Giften. — Hat man den Indicationen, das Gift zu entfernen oder es möglichst unschädlich zu machen, genügt, so wird man dann oft gegen noch fortbestehende Narkose zu wirken haben. Ist dieselbe bedeutend, so ist wohl die energische Anwendung der Kälte auf den Kopf das wichtigste Mittel. Für geringere Grade der Narkose empfehlen sich: öfteres Bespritzen des Gesichts mit kaltem Wasser, fortdauernde Bewegung des Kranken [damit er nicht einschlafe; — oft am passendsten so, dass man ihn von 2 Männern auf und ab führen lässt, nöthigendfalls stundenlang, auch wenn er sich dagegen sträubt], verdünnte Säuren [namentlich Essig — vgl. 8. 12. Doch ist mit den Säuren bei den alkaloidischen Giften, die dadurch wirksamer werden könnten, die Vorsicht nöthig, dass man sie — innerl. und in Klystieren — nicht eher gebe als bis man von der völligen Entfernung des Giftes überzeugt seyn kann.] oder schwarzer Kaffee. — In anderen Fällen wird man gegen allgemeine Abspannung und Erschöpfung leichtere Analeptica [Wein, Hoffmannstropfen u. dgl.] oder auch kräftigere Erregungsmittel [*Liq. Ammonii carbon.*, Campher, *Serpentar.*, Terpenthinöl u. a.], gegen Verstimmlung des Nervensystems Alterantia [z. B. Valeriana, kleine Gaben von Ipecacuanha, auch wohl von Opium], Bäder u. dgl. anwenden. Besonders oft aber wird es nöthig seyn, Congestionen nach edlen Organen, namentlich den Centralorganen des Nervensystems, durch bekannt repulsive u. derivative Mittel zu besänftigen [Aderlass (bisweilen aus der Jugularvene), Egel, Schröpfköpfe, kalte Umschläge oder Begießungen, Sinapiemen, reizende Fussbäder, reizende Klystiere u. s. w.].

Es gehören hieher meistens nur vegetabilische Gifte, doch nicht so viele als zur folgenden Abtheilung; nur in sehr wenigen Pflanzengiften spricht sich die narkotische Wirkung ganz oder doch ziemlich frei von Schärfe aus. — Nur bei den folgenden haben wir noch etwas Besonderes zu bemerken:

Blausäure (*Acidum hydrocyanicum*) und die sie enthaltenden Vegetabilien: Lorbeerkerse (*Laurocerasus*), bittere Mandeln u. s. w.; auch die ätherischen Öle dieser Pflanzen. — Gegenmittel: Chlor, innerl. [*Aq. oxymuriat.*, eestöfweise] und äusserl. [vorsichtiges Einathmen von aus Chlorkalk und verdünnter Salzsäure entwickeltem Chlorgas; Klystiere von *Aq. oxymuriat.* (etwa mit Wasser ana Unc. 2)]; nächst dem *Liq. Ammon. caust.*, innerl. [etwa 10–15 Tropfen in einer Tasse schleimigen Ge-

tränks od. Wasser; nach Bedürfnisse wiederholt] u. äusserl. [als Riechmittel, ein Stückchen Zeug damit getränkt auf die Stirn legen; im Klystier: etwa 20-30 Tropfen, unmittelbar vor der Application mit einem Paar Tassen lauen Schleims oder Wassers vermischt u. s. w.]. Übrigens die gewöhnliche Behandlung narkotischer Vergiftungen. (HERBST empfiehlt ganz besonders anhaltendes Begiessen des Kopfs u. Rückens mit kaltem Wasser.) Man mag auch EMMERT's Mittel: von Zeit zu Zeit 1 Theelöffel voll Terpenthinöl, versuchen.

III. Betäubend-entzündende (narkotisch-scharfe) Gifte.

Es lässt sich hier noch weniger als bei den beiden vorigen Abtheilungen eine allgemeine feste Norm der Behandlung aufstellen. Je nachdem die Erscheinungen der Entzündung oder die der Betäubung vorwalten, wird die Behandlung bald mehr wie *sub I.*; bald mehr wie *sub II.* einzurichten seyn [man wird also zum Brechmittel bald *Ipecacuanha*, bald Zinkvitriol wählen u. s. w.]; meistens wird aber im Anfang der Behandlung die betäubende, später die entzündende Eigenschaft der Gifte vorzugsweise ins Auge zu fassen seyn. — Von den alkaloidischen Giften (weisse Nieswurz [*Hellebor. alb.*, botan. *Veratrum album* u. *V. Lobelianum*], Sabadille, Brechnuss [s. unten], Taback, Fingerhut [s. S. 548], Schierling [*Conium macul.*], Wasserschierling [*Cicuta piroea*], Eisenhut [*Aconitum*-Arten], p. p.) gilt hier ganz dasselbe, was *sub II.* (s. S. 545). — Von Einhüllung und Schwächung des Gifts durch Verdünnung, durch Mucilaginoso etc. ist auch hier im Ganzen wenig die Rede. Mit den Säuren (Essig) sey man auch hier, wie bei den betäubenden Giften vorsichtig, u. wende sie nicht an, ehe man von der völligen Entfernung des Gifts überzeugt ist, oder wo man von ihnen Steigerung einer schon vorhandenen entzündlichen Reizung des Magens zu befürchten hat.

Es gehören hieher die meisten vegetabilischen Gifte. Aber nur etwa bei den folgenden lässt sich eine etwas bestimmtere Behandlung andeuten:

Brechnuss (*Nux Vomica*). Die gewöhnliche Behandlung alkaloidischer Vergiftungen. — Kaffee soll [in der Regel] die giftige Wirkung vermehren, also wenigstens nicht zu früh; eher kann man mässige Gaben Opium versuchen. Zur völligen Wiederherstellung Wasser mit Äther versetzt u. Terpenthinöl.

Campher. [Wenigstens ORFILA rechnet ihn hieher — ob mit Recht?] Brechmittel; dann als Gegengift *Aqua oxymuriat.*; dann Pur-

ganzen und Klystiere. — Essig u. Kaffee sollen auch hier die giftige Wirkung vermehren, Wasser mit Äther versetzt, Terpenthinöl, Wein die völlige Wiederherstellung befördern.

Fingerhut. (*Digitalis*.) Je nachdem die Pflanze mehr ihre scharfe oder mehr ihre narkotische Wirkung entfaltet, ist das Brechmittel verschieden zu wählen, u. nach demselben als Gegengift Gerbstoff, darauf entweder Involventien oder zur Hebung des Pulses Campher, Äther, *Serpentar.*, *Ol. Menth. pip.*, auch wohl Opium, anzuwenden.

Geistige Flüssigkeiten. (Branntwein, Wein, auch wohl ätherische Mittel u. s. w.) Oft wird die Behandlung wie bei einer *Apoplexia sanguinea* nöthig. Sonst Brechmittel [nöthigenfalls Beförderung des Erbrechens durch Druck auf das Epigastrium; wenn auch dadurch kein Erbrechen erfolgt, Anwendung der Magenpumpe] u. *Liq. Ammon. caust.* od. wohl zweckmässiger *Liq. Ammon. acetici*.

Giftsumach. (*Toxicodendron*.) Die sonderbaren Erscheinungen, welche auf die Berührung der frischen Pflanze (*Rhus radicans* od. *Toxicodendr.* — in Gärten) oder das Einathmen des Dampfs beim Verbrennen derselben oft erfolgen [selbst wohl erst nach einem Zwischenraum von mehreren Tagen — ödematöse Anschwellung verschiedener Theile des Körpers, mit Jucken u. Brennen, Blasenbildung, Abschuppung der Oberhaut etc.], sind nur scheinbar gefährlich, vergehen meist nach mehreren Tagen von selbst. In einem Falle schien sich die äusserliche Anwendung von Eis hilfreich zu zeigen, in einem andern linderte eine schwache Alaunauflösung.

Mutterkorn. (*Secale cornutum*.) Die narkotische Eigenschaft praevalirt. — *Aq. oxymuriat.* dürfte [da Chlor das Ergotin zerstört] das beste Gegengift seyn. COUCHAULT empfiehlt Ammonium, innerl. [tropfenweise in einer Chinainfusion] u. äusserl.

Pilze. Da die Wirkung der giftigen Pilze meist sehr langsam erfolgt, die Erscheinungen oft erst 10, 12 St. nach dem Genuß hervortreten, so sind hier ausser dem Brechmittel auch Abführmittel u. Klystiere angezeigt; also etwa *Tart. stib.* mit Glaubersalz; nur, wenn schon entzündliche Unterleiberscheinungen eingetreten, lieber Ricinusöl innerl. u. in Klystieren. — Nach Entleerung der Pilze entweder leichte ätherische Mittel, oder *Liq. Ammon. caust.*, Campher, oder Essig, oder auch Antiphlogistik.

Strychnin und Strychninsalze. Die gewöhnliche Behandlung alkaloidischer Vergiftungen. — Bei äusserlicher Application des Gifts dieselben Gegengifte; ausserdem trockne Schröpfköpfe, die man etwa $\frac{1}{2}$ St. auf der Stelle liegen lässt. Bei

an starker Wirkung des endermatisch angewandten *Strychnin. nigrum*, hat sich *Morphium acet.*, auf dieselbe Stelle applicirt, hülfreich gezeigt.

IV. Einige schwer zu rubricirende Gifte.

Anthraxgift; Milzbrandgift; Gift der schwarzen, böartigen Blatter. Entweder Exstirpation oder doch Scarificationen u. Ätzmittel [*Liq. Stibii muriat.* mittelst eines Charpiepfropfes oder *Kali caustic. fusum* mittelst eines gefeuchteten Pflasters applicirt; die Ätzung nach 5, 6 St., wenn noch nicht alles Kranke entfernt seyn sollte, wiederholt]. Dann Verbinden mit gelind reizenden oder antiseptischen Mitteln [*Ungt. Terebinthinae* mit *Tinct. Myrrh.*, *Campherwein*, *Chinapulver* od. dgl.]. Allgemeine Behandlung: bisweilen ein Aderlass; übrigens ein Brechmittel aus *Turt. stibiat.*, u. dann nach Umständen China, Mineralsäuren, oder flüchtige Reizmittel, oder Opium u. s. w.

Biss giftiger Schlangen [in dem grössten Theile von Deutschland nur *Vipera Berus*, Kreuzotter, Otter od. *Viper* schlechtweg (grau, braun od. schwarzgrün), mit ihren Geschlechts- und Altersvarietäten: *Vip. Chersaa*, Kupfer- od. Feuer-Schlange (kupferfarben) u. *Vip. Prestar*, schwarze *Viper*; in einigen Gegenden von Süd-Deutschland auch *Vip. Redii*, *Viper* schlechtweg, u. *Vip. Ammodytes*, *Sandyper*]. Besteht die Verletzung nur in einem oberflächlichen Ritz, so reicht Abwaschen mit Wasser oder Speichel, u. wenn der Ritz einigermassen bis ins Corium eingedrungen ist, Abwaschen und eine leichte Ätzung hin; im ersteren Falle wird es gar keiner innerlichen Behandlung bedürfen. Ist aber ein Giftzahn stechend eingedrungen, so ist ausser dem Abwaschen, um das etwa noch an der Oberfläche haftende Gift zu entfernen, eine kräftigere Einwirkung in die Tiefe nöthig. Man schneide entweder mit einer scharfen Scheere oder einem sehr scharfen Messer die ganze Stelle aus [die Zähne unserer deutschen Giftschlangen dringen nie über 1½ Lin. tief ein], oder erweitere doch mit einem spitzigen Messer die feine Wunde [arbeite aber nicht mit stumpfen Instrumenten an derselben herum], wasche nun aus, und befördere das Blut durch Drücken in der Richtung vom Herzen nach der Wunde zu, und durch warmes Wasser. Dann ätze man mit einer Auflösung von kauftischem Kali, oder mit kauft. Ammonium, *Eau de Luce* [R 649; doch nur, wenn man es vorräthig hat], oder allenfalls mit schwarzer Seife, Potaschlösung, Lange von Laubholzasche, Mineralsäuren od. dgl. Fehlt es (im Freien) an allen schneidenden Instrumenten u. Ätzmitteln, so kann man et-

wa ein kleines spitziges Eisen glühend in die Stichwunde hindrängen, oder die ganze Stelle mit einem glühenden Holze brennen. Fehlt es auch hieran, so mag der Gebissene, so lange bis mehr Hülfe geschafft werden kann, durch starkes Drücken auf die Wunde mit dem Daumen (oder, weil dieser ermüden könnte, einem darauf gebundenen Steinchen, Stückchen Holz, Grasklumpen od. dgl.) die Resorption aufzuhalten suchen [ein Schröpfkopf wäre zweckmässiger, wird aber nie zu haben seyn]; man kann auch einen einschnürenden Verband oberhalb der Wunde anlegen, nur nicht gar zu fest. (Das Aussaugen der Wunde wird von fast allen u. von den gewichtigsten Autoritäten als ganz gefahrlos sehr empfohlen, nur WAGNER u. LENZ warnen davor — ob mit Recht?) Entsteht Geschwulst um die Bissstelle, so reibe man warmes Baumöl ein, und gehe davon später allmählig zum *Linim. ammoniat.* über. — Innerlich, wenn sich Symptome von Affection des Nervensystems zeigen, ein starkes Brechmittel [aus *Ipecac.* u. *Tart. stib.*]. Sonst, oder gleich darauf, flüchtige Reizmittel, namentlich *Liq. Ammon. caust.* [od. *Eau de Luce*]. Sobald einige warme Schweisse erscheinen, statt dessen *Rad. Serpentar.* oder *Rad. Senegas* mit Campher und etwas Ätherisch-öligem [etwa einen Aufguss von *Rad. Serpentar.* abwechselnd mit Pulvern aus Campher, *Ol. Ment. pip.* und *Pulv. gummos.*], auch Wein od. statt dessen Branntwein [bisweilen auch wohl Opium]; diaphoretisches Regim. Dies so lange fortgesetzt, bis sich kräftige Reaction im Gefäßsystem, anhaltender warmer Schweiß und Entzündung in der Wunde zeigt. — Bei Zeichen von Zersetzung der Säfte zu den obigen Reizmitteln noch *Mixt. sulphurico-acida*, Essigäther, später auch wohl China. — Wohl nur selten wird eine antiphlogistische u. vom Kopf ableitende Behandlung nöthig seyn; gegen Schlafrunkenheit u. a. Symptome haben kalte Begiessungen des Kopfs genützt. — Die spätere örtliche [auch bei auftretendem Brande] und allgemeine Behandlung nach allgemeinen Regeln.

Biss toller Hunde, Wölfe, Füchse etc. (Nach RUST, mit Varianten nach Anderen.)

I. Prophylactisch (die Wasserscheu zu verhüten): Ist die Wunde noch frisch, so schneide man sie [ohne mit dem Messer die Wunde selbst zu berühren!] völlig aus, in allen Richtungen über die Merkmale des Bisses hinaus, lasse sie gut ausbluten [ein trockner Schröpfkopf (BARRY) würde wohl hier zu mehrerer Sicherheit recht zweckmässig seyn], und bewirke durch Einlegen eines fremden Köt-

pers (einige Leinwandfädchen) thätige Entzündung und hinterher durch bekannte Mittel eine ergiebige chronische Eiterung. — Ist aber die Wunde schon Tage alt, wohl gar schon vernarbt, so ist das Ausschneiden allein nicht mehr sicher genug (schon deshalb, weil man die Grenzen des Bisses nicht mehr recht unterscheiden kann), also ausserdem noch Ätzmittel nöthig, am zweckmässigsten das Ätzkali; man schneide also wie oben aus, lasse ausbluten, u. wasche dann die Wunde mit einer Auflösung von *Kali caustic. sicc.*, Dr. $\frac{1}{2}$ auf *Aq. destill.* L. 1, lege auch ein damit getränktes Charpiebäuschchen auf die Wunde; dies wiederholt man tägl. 3–4mal; lässt es die Reizbarkeit des Kranken und die sonstige Beschaffenheit der Wunde zu, so kann man zu mehrerer Sicherheit am 2ten od. 3ten Tage nach der Ausschneidung eine höchst saturirte Auflösung des Ätzkali, Dr. 1 auf Unc. 1, mittelst Charpie anwenden [„waram nicht lieber anfangs die starke, später die schwache, Auflösung?“], dadurch einen oberflächlichen Brand erzeugen, und die Abstossung des Brandigen der Eiterung überlassen. Dies Verfahren (Ausschneiden und Ätzen) ist bis zum Ausbruch der Wasserscheu passend und hinreichend. — Ist das Ausschneiden wegen vielseitiger Verletzung, wichtiger Theile od. dgl. nicht anwendbar, oder ist man von der Tollheit des Thiers nicht ganz überzeugt, so passt MEDERER's Methode: bloss Erweitern und Scarificiren, u. dann mit Ätzkali wie oben behandeln. — [Andere Autoren empfehlen andere Ätzmittel, doch sind nur flüssige recht passend, weil nur diese zuverlässig in alle Vertiefungen der Wunde eindringen; das Glüheisen ist höchstens im Nothfall, wenn man kein Ätzmittel hat, zu empfehlen. — ZEIDLER's Methode: Zuerst wäscht man die verwundete Stelle gut mit lauem Salzwasser oder Essig und Wasser, und trocknet sie wieder. Dann setzt man einen Glaszylinder (etwa ein Lampenglas) so auf, dass die Wunde ganz von demselben umfasst wird (widerigens falls man das Verfahren wiederholen müsste), lässt ihn von einem Gehülfen festhalten, giesst $\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{2}$ Zoll hoch concentr. (englische) Schwefelsäure hinein, lässt sie 6–10 Minuten stehen, und entfernt sie dann vorsichtig (so dass keine benachbarten Körpertheile oder Kleidungsstücke beschädigt werden; — etwa durch Umbeugen des Körpertheils mit dem festgehaltenen Cylinder zugleich; — der Autor rath, man solle die Schwefelsäure durch Zugiessen von Wasser verdünnen, aber die dabei entstehende Erhitzung würde wohl oft den Cylinder sprengen und die heisse Mischung den Kranken stärker verbrennen als die unverdünnte Säure). Dann 6 Wochen lang durch reizende Salben die Eiterung der Wundfläche unterhalten; innerl. in der Regel nichts. — KRUETTGE's Methode, gewiss weniger empfehlenswerth, s. S. 102.] — Nach jeder der obigen Behandlungsarten ist Verwandeln der Bissstelle in ein Geschwür, u. Unterhalten desselben 3–6 Monate lang, nöthig. Auch suche man 2mal tägl. die MAROCHETTischen Bläschen an beiden

Seiten des Zungenbändchens in der Gegend, wo sich die Ausführungsgänge der *Glandulae submaxillares* u. *sublinguales* münden; erscheinen sie, ausschneiden u. mit dem Glüheisen ausbrennen. — Allgemeine Behandlung: ausser dem Reguliren etwa gestörter Functionen und dem Antreiben aller Excretionsorgane ein od. das andere Specificum: am meisten Vertrauen verdienen hier wohl die Canthariden [s. S. 101 u. R. 212.], das Quecksilber [in jeder Form, besonders aber in Inunctionen; dreist], vielleicht auch die Belladonna (s. S. 386); [nach *BUISSON* besonders russische Dampfbäder und allnächtliches Schwitzen unter Federbetten].

II. Curativ (gegen die bereits ausgebrochene Wasserscheu): Unter den vielen in der Regel fruchtlos angewandten Mitteln verdienen wohl noch die meiste Aufmerksamkeit: wiederholte Aderlässe bis zur Ohnmacht, Belladonna u. Blausäure in grossen Dosen, graue Quecksilbersalbe zu ganzen Unzen einge-
rieben, sehr lange dauernde russische Dampfbäder, *Liq. Ammon. caust.* in grossen Gaben, das Glüheisen in den Nacken und auf die vernarbte Wunde. Psychische Behandlung, so lange sie anwendbar. Euthanasie. [SCHOTTIN's Verfahren bei Spuren der ausbrechenden Wasserscheu: die Bisswunde so dicht als möglich scarificiren, dann ununterbrochen mit *Infus. † Hb. Anagallidis (arvensis L.)* fomentiren; den Rücken des Kranken mit *Acet. concentr.* reiben, dann von oben bis unten zu beiden Seiten der Dornformätze ein 2 Finger breites Spanischfliegenpflaster; ein Brechmittel; 4 St. nachher ein Purgans aus Glaubersalz, und sobald dies zu wirken aufhört, etwa 6 St. darnach 2stündl. eine reichliche Gabe von Campher u. Salpeter; der Kranke trinke (da er gewöhnlich, wenigstens in den ersten 24 St. der Krankheit, bei einiger Willenskraft noch zu trinken vermag) ein *Infus. † Hb. Anagallidis* und ausserdem demulcirende Getränke (besonders Buttermilch).]

Gasarten, schädliche. [Bequemlichkeits halber handeln wir sie hier zusammen ab, obgleich ihre Wirkungen sehr verschieden sind.] In der Regel hat man nur die Asphyxie zu behandeln, und von Zersetzung einer etwa in den Körper aufgenommenen Portion des Gases ist eben nicht die Rede. Nur bei einigen werden zu diesem Behuf eigentliche Gegenmittel empfohlen: so beim salzsauren und salpetrigsauren Gase Riechen und vorsichtiges Einathmen von Ammoniumgas; beim schwefligsauren Gase ebenfalls von Ammoniumgas oder [HÄNLE] von Dämpfen rauchender Salpetersäure; beim Chlorgase von sehr verdünntem Schwefelwasserstoffgas oder ebenfalls von Ammoniumgas, oder auch von Alcoholdampf [Weingeist auf Zucker in den Mund nehmen]; beim Ammoniumgase von verdünntem Chlorgas od.

Essigsäure; beim Schwefelwasserstoffgase ebenfalls von verdünntem Chlorgas; beim Kohlenoxydgase von Sauerstoffgas. [Bei Vergiftungen durch kohlensaures Gas Verfahren wie bei Blausäure, S. 546.] Doch können alle diese Mittel nur fruchten, wenn man sie sehr rasch bei der Hand hat; auch müssen sie, die Essigsäure als Riechmittel etwa ausgenommen, sehr vorsichtig und nicht lange angewandt werden, wenn sie nicht mehr schaden als nützen, und selbst wieder zu Giften werden sollen. Das Ammoniumgas wird man also etwa anwenden, indem man den Kranken an *Liq. Ammon. caust.* riechen oder einen Badeschwamm, damit getränkt, vor dem Munde halten lässt; das Schwefelwasserstoffgas, indem man ihn an mit Wasser od. Essig befeuchtem *Kali sulphuratum*, das Chlorgas, indem man ihn an mit Wasser od. Essig befeuchtem Chlorkalk riechen lässt; u. s. w. Kommt es bloss darauf an, Reizung der Luftwege — durch die ursprünglich vergiftenden Gase oder auch wohl durch die als Gegenmittel angewandten — zu beseitigen, so möchten vielleicht Dämpfe von warmem Wasser dazu zweckmässig seyn; ausserdem aber eine mehr od. weniger umfassende antiphlogistische Behandlung. — Wenn jemand durch Kloakengas betäubt in die Kloake hineingefallen ist und Wasser aus derselben verschluckt hat, ein Brechmittel (*Ipecac.*). (Um Asphyktische aus einer Kloake herauszuschaffen, mag man zuvor in derselben Chlorgas, aus Chlorkalk und einer Säure, entwickeln.) — Wo es darauf ankommt, kohlensaures Gas aus einem Raum zu entfernen, damit man sich ohne eigene Lebensgefahr einem darin Verunglückten nähern könne, da erinnere man sich, dass das kohlensaure Gas, so lange es sich nicht — was nur allmählig geschieht — mit der atmosphärischen Luft vermenget hat, in derselben durch seine spezifische Schwere zu Boden sinkt, dass es also aus einem bloss nach oben geöffneten Raum, z. B. einem Brunnen, nur sehr langsam entweicht. Man bringt deshalb Luftzugöffnungen am besten am untern Theile oder doch an der Seite des Raums an, damit das kohlensaure Gas daraus gleichsam wie Wasser abfließen könne; die Retter müssen sich aber dabei in Acht nehmen, dass sie nicht selbst von dem Gase überschwemmt werden, müssen also wenigstens ihren Kopf über der Öffnung halten. Wo es nicht rasch genug möglich ist, auf diese Weise einen Abzug des kohlensauren Gases zu bewirken, kann man versuchen,

durch über dem Raume angebrachtes Feuer (Anzünden von Strohwischen) Luftzug und möglichst Entfernung der Kohlensäure zu bewirken; oder man giesst Wasser od. noch wirksamer Kalkmilch (frisch gelöschten Kalk mit vielem Wasser) in den Raum. Der Retter, der sich nun in den Raum hinein wagt, nehme einen mit verdünntem Salmiskgeist oder mit Kalkwasser befeuchteten Schwamm in den Mund und ein brennendes Licht in die Hand, und wage sich nicht weiter als bis das Licht erlischt. Bei andern Gasarten aber könnte das brennende Licht gefährlich werden.

Insektenstiche. (Wespen, Hornissen, Bienen, Hummeln.) Man ziehe vorsichtig, am besten mit einer Pincette, den Stachel aus dem Fleisch, ohne dabei die Wunde stark zu drücken. Dann Ueberschlagen von kaltem Wasser, Bleiwasser, geschabten rohen Kartoffeln od. kalter schwarzen Gartenerde; oder Einreiben mit Öl; Waschungen od. Umschläge von einer ziemlich gesättigten Kochsalz-Lösung [CARILLON rühmt bei Wespenstichen das Kochsalz auch innerl.; doch dürfte, wo es einer innerlichen Behandlung bedarf, ein Brechmittel wohl das erspriesslichste sein]; am besten wohl Waschungen od. Umschläge von *Liq. Ammon. carbon.* oder [bei zarter Haut verdünntem] *Liq. Ammon. caust.*

Käse gift. Bei dem durch spontane chemische Zersetzung des bereits fertigen Käses entstandenen Gift (das man wohl hauptsächlich in PROUST's Käsesäure od. SEATURNER's saurem Käsefett, WYTING's oxydirter Fettsäure, zu suchen hat) scheint nach den bisherigen Erfahrungen die beste Behandlung folgende: Brechmittel aus *Ipecac.*; dann als eigentliches Gegengift *Liq. Ammon. carbon.* oder ein andres kohleensaures Alkali; ausserdem als lavolventien dicker Mehlbrei mit Milch bereitet, oder bloss Milch, doch bringe man nicht zu viel Flüssigkeit in den Magen; gegen etwanige bedeutende entzündliche Symptome Verfahren nach allgemeinen Grundsätzen. — Für Fälle, wo der Käse durch Milch von kranken Thieren oder Thieren, die schädliche Kräuter gefressen hatten, oder durch giftige Samen statt des Kümmels, vergiftet, oder durch fehlerhafte Bereitung od. Aufbewahrung blei- oder kupfer- haltig oder blausäurehaltig wäre, würden freilich andre Behandlungsweisen nöthig werden. Ist aber nicht rasch genug eine chemische Untersuchung möglich, so bleibt nichts übrig als sich nach den Erscheinungen zu richten.

Sections gift. Gegen die Ausdünstungen stark faulender Leichen

Chlorkalkauflösung (s. S. 120); Bei geschwerner Verletzung prophylaktisch (ein trockner Schröpfkopf u.) Auswaschen mit *Liq. Kali caust.* od. schwarzer Seife, allenfalls auch mit Terpen-
thinöl, Chlorkalkauflösung od. irgend einer andern reizenden Flüssigkeit. Entstehen üble Zufälle: Behandlung nach allgemeinen Grundsätzen.

Wurstgift (BUCHNER's Wurstfettsäure, SCHUMANN's Wurstfettgift). Brech- u. Abführmittel. Dann nach BUCHNER; vegetabilische Säuren, abwechselnder Gebrauch von Säuren und Alkalien in Waschungen u. Bädern, Essig- u. Seifen-Klystiere abwechselnd; nach BONENMÜLLER Schwefelleber [der Autor verordnet sie in einer unchemischen Formel, in welcher wohl hauptsächlich *Aq. hydro-sulphurata* wirksam sein wird]; nach RANLUS Belladonna in kleinen Gaben, Wein, vegetabil. Diät [namentlich Obst; Säuren zum Getränk], laue Bäder, warme Weinfomentationen um den Hals, Essigwaschungen der Extremitäten; nach SCHUMANN gelinderregende, die Secretionen befördernde [hierher würde auch KERNER's Vorschlag, mehrere Tage lang gelinde elektrische Schläge auf die Gegend des Herzens u. der Speicheldrüsen anzuwenden, um Herzs Schlag u. Speichelsecretion wieder zu heben, gehören], und später kräftig reizende u. stärkende Mittel.

II.

Getränke.

Die folgenden Vorschriften sollen dem Arzte theils dienen, um unbedenklichen Röchinnen- oder Wüstern Abweisungen zu geben, theils — da mehrere dieser Compositionen sich für diätetische Zwecke in der Regel nicht qualificiren — um, wenn ihnen derselben erwähnen, ihren medicinischen Werth oder Unwerth kundig beurtheilen zu können. Einfachere oder mehr medicinische Vorschriften sind im Hauptwerke selbst zu suchen.

Man übersehe nicht den Unterschied zwischen Quart und Flasche (die Weinflasche, worin auch Rum, Arrak p. p. verkauft werden, ist, wenigstens in der Regel, um $\frac{1}{2}$ Quart).

Äpfelgetränk. 3 Borsdorfer Äpfel, geschält und geviertheilt, mit 1 Quart Wasser gekocht, bis sie zerkocht sind; zur Colatur Zucker g. l., auch wohl noch ein wenig Citronensaft.

Oder: Borsdorfer oder Reinetten, geschält u. geviertheilt, 20 Loth, mit 1 Quart Wasser in einem zugedeckten Topfe 1 St. gekocht; *sub finem coct.* 1 Quentchen zerriebener Muskatennuss zugesetzt; zur stark ausgepressten Colatur zwei Loth zerriebener Semmel (oder zerstoßener Zwiebacks), 4 Loth Rheinwein und Zucker q. s.

Äpfelmolken. 2 starkriechende Reisetten geschält, in kleine Stücken geschnitten und mit 2 Pf. Melken $\frac{1}{2}$ St. gekocht; mit Colatur Zucker *q. l.* (GROSFREY.)

Bavaroise. Weisse Milch mit Capillarsyrup *q. l.* (Hier u. da wird mit „Bavaroise“, ein schwacher Weippunsch ohne Rum oder Arrak bezeichnet.)

Beef-tea. Eine schwache Auflösung von Tafelbouillon (etwa 4 Loth auf 1 Quart Wasser), vor welcher gewöhnliche Fleischbrühe den Vorzug verdient.

Bischof. 1 grosse oder 2 kleine, recht reife (gelbe) Pomeranzen (oder auch 1 kleine gelbe und 1 kirsch- oder höchstens kastaniengrosse grüne) mit einem scharfen Messer sehr fein geschält (so dass die Augen mitten durchgeschnitten werden); Schalen und Pomeranzen in einem Topf oder einer Terrine mit 1 Flasche guten Rothweins (feiner Burgunder, Medoc; auch wohl ein schwerer Rothwein, Pontac od. Cahors - Grand - Constant) übergossen; gut zugedeckt; die Pomeranzen nimmt man nach $\frac{1}{2}$ Stunde heraus, die Schalen lässt man aber wenigstens 2-3 Stunden, besser noch, wenn es seyn kann, 6-8 Stunden ziehen, an einem mässig warmen Orte, etwa in der Sonne; dann abgessen und Zucker *q. l.* ($\frac{1}{2}$ Pf. od. mehr) dazu. — Man kann mit den Pomeranzeneschalen auch noch ein Paar Gewürznelken, ein Stüchchen ganzen Zimmt, oder eine Cardamomkapel mitziehen lassen. — Will man warmen Bischof, so thut man am zweckmässigsten zu dem nach der obigen Vorschrift bereiteten unmittelbar vor dem Gebrauch eine kleine Quantität siedenden Weins oder — besonders wenn man zur Extraction einen schweren Wein genommen hat und einige Schwächung nicht unerwünscht ist — siedenden Wassers. (Man kann dann auch mit diesen heissen Flüssigkeiten zuvor die angegebenen kleinen Portionen von Gewürzen infundirt haben.)

Oder (ungewöhnliche, mehr medicinische Vorschrift): 1 Flasche guten Rothweins, 1 Kruke Selterser oder Geilnauer Mineralwasser, 1 Unze Tinct. Cort. Aurant, $\frac{1}{2}$ Pf. fein gestossenen Zuckers. (MENZGER.) — Noch wohlfeiler und ohne die Verdünnung durch so viel Wasser kann man einen moussirenden Bischof darstellen, indem man ungefähr 1 Drachme Natr. carbon. acidul. und 48 Gran Weinstein säure (beides in Stücken, so dass es sich nur langsam auflöst) in 1 Flasche schon zubereiteten Bischofs, unmittelbar vorher, ehe er getrunken werden soll, wirft.

Brendel. Rum angezündet und Stücke Zucker, auf einer Gabel darüber gehalten, in ihn hineinschmelzen lassen.

Brodwasser [nicht ganz passend — weil man die Dose nicht bestimmt (vgl. S. 555) — auch wohl „Brodwasser“]. $\frac{1}{2}$ Bt. Semmel oder Zwieback mit 4 Quart Wasser in einem gut zugedeckten irdenen Topf 1 St. gekocht, dann wieder so viel kochendes Wasser dazu gegossen, als verdampft ist; durchgeseiht. — Hierin, wenn man will, noch 3 Loth Citronensaft, 1 Loth einfaches Zimmtwasser, $\frac{1}{2}$ Quart Rheinwein und gestossenen Zucker *q. l.* (MENZGER.)

Oder: $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ Pf. haubacken Brod in Scheiben geschnitten, diese auf beiden Seiten am Feuer geröstet; mit einem Messer von den etwa entstandenen Kohlen geläubert, in einem irdenen Topf mit 1 Quart kochenden Wasser übergossen und $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ St. an Feuer, unter jeweiligem Umrühren mit einem hölzernen Löffel, ziehen gelassen, mit Hülfe eines Siebes in eine Terrine abgessen, die gelbe Schale und den Saft von 1 Citrone, (auch wohl 1 Weinglas Franzwein und etwas gestossenen Kandel), und Zucker *q. l.* dazu gethan. (MENZGER.)

Broihankaltchale s. Kaltschale.

Cardinal. Unterscheidet sich vom Bischof wesentlich nur dadurch, dass er mit weissem Wein (weissen Franzwein, oder auch alter, vorzüglicher Rheinwein, p. p.; auch wohl mit Zusatz von etwas weissem Burgunder oder, wenn eine grössere Quanti-

ist Cardinal angefertigt wird, von 1 Flasche Champagner] bereitet wird; er wird in der Regel nur kalt getrunken. Man nimmt bisweilen weniger Pomeranzen als zum Bischof, z. B. auf 1 Flasche Wein nur eine halbe (grüne oder gelbe), doch in der Regel eine ganze; — auch wohl etwas weniger Zucker, auf 1 Flasche etwa 6 Loth, nur bei nicht säurefreiem Rheinwein $\frac{1}{4}$ Pf.; — auch wohl statt der Pomeranzen Apfelsinen (die Hälfte derselben kann man, in Scheiben geschnitten, im Getränk lassen) oder Ananas (in Scheiben geschnitten) und dann noch weniger Zucker.

Chaudrau. $\frac{1}{4}$ Quart Wein (rother oder weisser, auch wohl Champagner) wird kalt mit 3 Eidottern zusammengequirlt, dann auf Kohlen gestellt, Zucker nach Gutedünken zugesetzt, u. das Gemisch, sobald ein recht hoher Schaum entstanden ist, sogleich aus einer grossen Tasse getrunken.

Citronenwasser s. Limonade.

Dreifuss s. Eierglühwein.

Eierbier s. Warmbier.

Eiergetränk, Eiwasser. 1 Dotter in einem Glase warmen Wassers verührt, dazu Zucker q. l. Erkalten gelassen.

Oder: 1 Dotter, etwas hart gekocht, in einem Glase kalten Wassers allmählig auseinander gerieben; dazu entweder 1 Weinglas Franzwein und etwas gepulverten Zucker und Zimmt, oder bloss etwas Zucker und gepulverte Muscatblüthe. (MENZENZ)

Oder: 2-3 Dotter mit $\frac{1}{2}$ Quart Wasser zusammengequirlt; dazu 2-3 Loth Zucker und $\frac{1}{2}$ Weinglas Madera oder Malaga (oder $\frac{1}{2}$ Essl. Rum). (SUNDELIN.)

Oder: 2 Dotter mit $\frac{2}{3}$ Quart Wasser zusammengequirlt; dazu 2 Loth Zucker, 4 Loth Kornbranntwein und $\frac{1}{2}$ Quentchen gepulverter Würznelken. (Nach HUFFLAND „für Arme in Ermangelung kräftiger Fleischbrühen u. des Weines, bei Krankheiten von grosser Schwäche mit Erschöpfung der Säfte, ein kräftiges, nährend befeuchtendes Getränk für einen Tag.“ *Potus analepticus* PH. P. — Freilich nicht angenehm, besonders durch das Fuselöl des Kornbranntweins und durch den für ein Getränk sehr beträchtlichen Zusatz gepulverter Würznelken, falls anders diese durch Umrühren des Getränks mitgenossen werden sollen.)

Eierglühwein. $\frac{1}{4}$ Quart Rothwein mit $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ Loth Zimmt, $\frac{1}{2}$ Quentchen Gewürznelken, auch wohl noch $\frac{1}{4}$ Vanillenschote und etwas Muskatennuss, einmal aufgekocht, der Colatur 3-4, zuvor mit etwas Wein angerührte, Eidotter und $\frac{1}{4}$ Pf. zerstoßenen Zuckers zugesetzt; unter stetem Schlagen noch einmal aufgekocht.

Oder: 1 ganzes Ei und 1 Eidotter mit $\frac{1}{2}$ Quart Weisswein, einem Stückchen Zimmt und 3-4 Loth Zucker auf dem Feuer geschlagen, bis es in die Höhe steigt.

Eiermumme. 1 grosses Weinglas voll Braunschweiger Mumme [ein sehr dickes, süss, hinterher etwas bitter schmeckendes, sehr nährendes und sättigendes Bier] leicht aufgekocht und mit einem Eidotter abgequirlt. (Etwa Morgens und Abends eine solche Portion, und dies wohl eine Zeitlang fortgesetzt.)

Eierpunsch. $\frac{1}{4}$ Pf. Zucker mit 2 Citronen abgerieben, in $\frac{1}{2}$ Quart Wein und $\frac{1}{4}$ Quart Wasser aufgelöst, die Auflösung mit 3 ganzen Eiern und 3 Dottern in einem Kesselchen über Feuer zusammengequirlt; sobald sie kocht, vom Feuer genommen, und unter fortwährendem Schlagen $\frac{1}{4}$ Quart Rum und der (schon vorher colirte) Saft der 2 Citronen zugesetzt.

Oder: 1 Flasche Rheinwein mit $\frac{2}{3}$ Pf. Zucker und dem colirten Saft von 4 Citronen in einem geräumigen Topf einmal aufgekocht; dann 6-8, zuvor mit etwas Wein angequirlte, Dotter in den kochenden Wein gethan und Alles über Kohlen zu Schaum verquirlt; endlich $\frac{1}{4}$ Quart etwas erwärmten Rums hineingegossen und gut verrührt.

Ei-Limonade. 1 Eidotter mit so vielem fein gestoßenem Zucker verreiben, dass es ein feuchtes Pulver wird; dies mit dem Saft einer Citrone und 1 Quart (oder weniger) Wasser umgequirt.

Erdbeerwasser. 1 Quart voll Erdbeeren (denen man auch noch $\frac{1}{2}$ Quart Himbeeren zusetzen kann) wird in einem Topf zerquetscht, etwas Citronensaft dazu gedrückt, 1 Quart Wasser darauf gegossen, das Gemenge nach $\frac{1}{2}$ St. mit starkem Auspressen colirt, in der Colatur Zucker *q. l.* aufgelöst; dann noch einmal ohne Auspressen colirt.

Fletsch. $\frac{1}{2}$ oder 1 Citrone wird auf Zucker *q. l.* abgerieben, und dieser in $\frac{1}{2}$ Flasche (auch wohl $\frac{1}{2}$ Quart) Pontac und $\frac{1}{2}$ Quart Wasser aufgelöst.

Flip bedeutet bei den Engländern eine Mischung von heissem Bier, Rum (oder Brantwein) und Zucker; in Deutschland wird es bisweilen als Synonymon von Warmbier gebraucht.

Gerstenkaffee (als Surrogat des gewöhnlichen Kaffees für Unbemittelte). Gerste in einer Kaffeetrommel geröstet, bis sie ziemlich dunkelbraun wird; dann gemahlen; $\frac{1}{4}$ St. lang gekocht, etwa 1 Essl. des Pulvers auf 3 Tassen Wasser; mit Milch und Zucker.

Gerstentrank aus ungeschälter Gerste (diese giebt — was von der Schale abhängt — ein etwas scharfes, bitteres, gelind eröffnendes Getränk, das nicht mit dem häufiger benutzten „Graupenschleim“ oder „Gerstenschleim“ aus geschälter Gerste verwechselt werden darf. Zu diesem letzteren bedarf keine Rücksicht einer Vorschrift; zum Überflus vgl. S. 441). Man wäscht 8 Loth Gerste und 4 Loth Rosinen, zerschneidet die letzteren und kocht beides mit 3 Quart Wasser, bis die Gerste aufspringt; dann füllt man den Topf wieder bis zu 3 Quart an, lässt das Wasser noch einmal aufwallen, stellt es vom Feuer, drückt den Saft einer Citrone hinein; u. lässt erkalten. (Man kann auch noch etwas Zucker oder Fruchtsaft dazu thun.)

Gerstentrank mit Wein. 1 Quart Gerstenwasser (aus ungeschälter Gerste und Wasser wie oben bereitet) mit dem Saft und dem Gelben von 2 Citronen und 4 Loth gerösteten Weissbrods oder Zwiebacks 2 St. ziehen gelassen; zur Colatur 2 Weingläser Wein u. 4 Esslöffel Maulbeer- oder Himbeersyrup (nebst Zucker *q. l.*).

Gloriat. 1 Tasse verästeten schwarzen Kaffees mit 1 - 2 Theelöffeln Arrak, Cognac oder Kirschgeist.

Glühwein. Man lässt $\frac{1}{2}$ Quart Rothwein mit $\frac{1}{2}$ Loth Zimmt, $\frac{1}{2}$ Quentchen Gewürznelken und $\frac{1}{4}$ Pf. Zucker einmal aufkochen, dann durch ein Sieb laufen. (Bisweilen werden andere Gewürze, Cardamom, Ingwer p. p. gewählt.)

Oder: zu heissem versüßten Rothwein *Tinct. aromat. q. l.* (etwa Dr. 2 - 4 auf 1 Flasche) gesetzt.

Grog. $\frac{3}{8}$ Quart Rum, $\frac{3}{8}$ - $\frac{1}{2}$ Pf. Zucker, $\frac{1}{2}$ Quart kochenden Wassers.

Oder (ungewöhnliche Vorschrift, welche man nach Analogie von Weinpusch „Weingrog“ nennen könnte): 2 Muscatennüsse und 1 Muscatenbohne werden auf $\frac{1}{2}$ Pf. Zucker gerieben und dieser in 1 Flasche Champagner und $\frac{1}{2}$ Flasche Arrak aufgelöst.

Hafertrank aus ungeschältem Hafer (verhält sich ähnlich wie der Trank aus ungeschälter Gerste, s. oben). 8 Loth Hafer mit 2 Quart Wasser $\frac{1}{2}$ St. gekocht; zur Colatur entweder 4 Essl. Citronensaft, eben so viel Maulbeer- oder Himbeersyrup, 1 Essl. Zimmtwasser und Zucker *q. l.*, — oder 1 Schoppen Wein und 4 Essl. eines jener beiden Syrupe.

Hambuttentrunk. 1 Handvoll sorgfältig ausgeputzter und abgepülter Hambutten mit $1\frac{1}{2}$ Quart kochenden Wassers infundirt, ein Paar St. digerirt, zur Colatur der Saft von $\frac{1}{4}$ Citrone und Zucker *q. l.*

Himbeerwasser. Am häufigsten aus Himbeeressig, Wasser und Zucker *q. l.* zubereitet; bisweilen auch (weniger sauer, so dass es vielen Kranken früher zuwider wird, und zugleich theurer) aus Himbeersyrup und Wasser oder aus Himbeergelée und Wasser.

Hippocras. Man übergiesst 2 Loth Zimmt, 2 Gran weissen Pfeffers, die fein geschälte Schale von 1 Citrone und 1 Pf. Raffinade mit 4 Flaschen guten Rhein- oder Franzweins und lässt es, gut zugedeckt, 24 St. stehen. Dann bindet man 1 Gran Ambra, mit ein wenig Zucker fein gestossen, in ein feines Tüchelchen, und legt dies in einen Filtrirsack, durch welchen man den Wein einigemal hindurchlaufen lässt. (Man kann auch 12 Borsdorfer oder Reinetten-Äpfel, in Scheiben geschnitten, mit in den Wein thun.)

Hoppelpoppel. 1 oder 2 Eidotter mit gestossenem Zucker (etwa 2 Loth; — bisweilen wird Candiszucker genommen) und 1 - 2 Theelöffeln, oder mehr) Rum (in Ermangelung dessen Kirschgeist, Branntwein) tüchtig umgerührt; unter fernerm Rühren 1 Tasse heissen Thees oder Wassers zugesetzt; warm getrunken.

Imperial. Man setzt 3 Pf. ($1\frac{1}{2}$ Quart) Wasser mit $\frac{1}{2}$ Loth Weinsteinrahm, $\frac{1}{4}$ Pf. Zucker und der Schale von 1 Citrone in einem Kesselchen aufs Feuer, deckt unterdess eine Serviette über einen Topf, presst den Saft der Citrone darauf, giesst das Wasser, sobald es einmal aufgeköcht, hindurch, und lässt (damit keine Fliege hinein fällt, ein Haarsieb übergedeckt) erkalten (wo dann freilich ein Theil des Weinsteinrahms zu Boden fällt; liesse man es theewarm trinken, so könnte man weniger Wasser nehmen oder beträchtlich mehr Weinsteinrahm darin auflösen).

Johannisbeerwasser. Wie das Erdbeerwasser (s. oben) bereitet, nur ohne Zusatz von Citronensaft.

Kaltschale. $\frac{3}{4}$ Quart Bier (gewöhnlich weisses, namentlich wohl der in mehreren Theilen Norddeutschlands beliebte Broihan; — schwere, dicke Biere, wie z. B. Englisch Ale, Porter, Braunschweiger Mumme, eignen sich nicht dazu), 1 - 2 Esslöffelvoll fein geriebenes Brod (gewöhnlich Braunbrod; auch wohl Schiffszwieback; statt des geriebenen Brods auch wohl eine am Feuer geröstete Scheibe Schwarzbrod), einige Citronenscheiben, 4 Loth Zucker, mit welchem vorher etwas Citronengelb abgerieben, eine kleine Handvoll gewaschener Korinthen; umgerührt. (Bisweilen wird auch noch etwas weisser Franzwein, gestossener Zimmt, Cardamom, oder dach dazu gethan.)

Kirschenwasser. 4 Loth gedürfter sauren Kirschen sammt den Kernen zerstoßen, mit 1 Quart Wasser $\frac{1}{2}$ St. gekocht; *sub fin. coct.* 1 Quentchen Zimmt und Zucker *q. l.* zugesetzt; durchgeseiht und erkalten gelassen.

Oder: 4 Loth gedürfter sauren Kirschen, sammt den Kernen zerstoßen, und 3 Loth gestossener Perlgrauen mit 3 Pf. kochenden Wassers übergossen, einmal aufgewallt; zur Colatur Zucker *q. l.*

Oder: $\frac{1}{4}$ Pf. gedürfter schwarzen Kirschen sammt den Kernen zerstoßen; dazu in einem irdenen Topf $\frac{1}{4}$ Pf. gestossener Perlgrauen oder gestossenen Reises und etwa 3 Pf. kochenden Wassers; einmal aufgewallt; durch ein Haarsieb geseiht; dazu Citronensaft, Zucker und etwas Wein. (MENZZER.)

Man kann auch aus frischen Kirschen ohne die Kerne eben so wie aus dem Erdbeeren, nur ohne Zusatz von Citronensaft, ein Wasser bereiten; vgl. Erdbeerwasser.

Korn- od. Roggen-Kaffee. Zu demselben Zweck wie Gersten-Kaffee; auch eben so bereitet.

Kraftwein. Semmelscheiben gelbbraun geröstet, schichtweise in eine Schale gelegt, Zucker (und etwas Kaneel) dazwischen gestreut, und Weisswein darüber gegossen. Man verdünnt den so erhaltenen Kraftwein bisweilen durch Selterser, Gailnauer, Pyrmont oder blosses Brunnen-Wasser. (MENZGER.)

Limonade od. Citronenwasser. 1 Quart Wasser (in der Regel kaltes, doch verordnet der Arzt auch bisweilen lauwarms oder warme Limonade), der Saft von 3 - 4 Citronen, $\frac{1}{2}$ Pf. (oder mehr) Zucker (mit welchem Manche vorher das Gelbe von 1 oder 2 Citronen abreiben); colirt. Man kann auch noch $\frac{1}{4}$ Quart weissen Weins (Rheinwein, Graves p. p.) dazuthun. — Statt gewöhnlichen Brunnenwassers nimmt man auch wohl Selterser oder Gailnauer (dann ist es aber rathsam, jedes Becher des Getränks apart, mit wenig Citronensaft und gestossenem Zucker zurecht zu machen und während des Mussirens auszutrinken), oder auch ein mit Gerstengrößen, Hafergrütze oder Reis (auf 1 Quart 2 - 4 Loth) abgekochtes Wasser. — Auch den *Syrupus Succi Citri* kann man ganz einfach mit Wasser verdünnt als Limonade geben, doch kommt dies theurer.

Malzwasser. 2 - 3 Loth zerstoßenes Mals mit 2 Quart Wasser auf die Hälfte eingekocht; zur erkalteten Colatur etwas Wein (namentlich Rheinwein) und Zucker; auch thut man wohl Citronen- oder Pomeranzen-Scheiben hinein.

Mandelmilch od. Orschade (frz. *Orgeat*): eine schwache Mandel-Emulsion, s. *Amygdalae dulces*.

Milchwasser. Milch u. Wasser ana $\frac{1}{4}$ Quart, Pomeranzenblüthwasser 1 - 2 Essl., Zucker *q. l.*

Neaguas (nicht „Nigus“, wie es wohl nach einer schlechten Aussprache geschrieben wird) bedeutet bei den Engländern (kalten) Weisswein mit Citronensaft, Zucker und etwas Muskatennuss. In Deutschland kommt auch folgende Vorschrift unter diesem Namen vor:

1 Flasche Rothwein mit etwas ganzem Zimmt, Gewürznelken, Muskatennuss und 4 Loth (oder mehr) Zucker in einem bedeckten Gefäss auf Feuer gestellt, bis es kochend heiss wird; dann colirt.

Orangeade bedeutet bald Pomeranzenwasser, bald Bischof.

Orgeat, Orschade s. Mandelmilch.

Pabst. Wie Cardinal, nur mit Tokayer Wein bereitet.

Pfirsichwein. Eine Scheibe von einer recht reifen Pfirsich in ein Weinglas weissen Weins (namentlich Rheinwein) gethan; dazu Zucker *q. l.*

Pfirsichkaltschale. Von 6 - 8 Pfirsichen die Steine ausgeßet und in einem Mörser zerstoßen; dann Pfirsiche und Steine in einen Topf; dazu $\frac{1}{4}$ Quart Rhein- oder Graves-Wein, eben so viel kochendes Wasser, etwas gestossenen Zimmt, Citronenschale, 4 - 8 Loth Zucker, 1 zerstoßenen Zwieback; einmal ebullirt, colirt; kalt getrunken.

Pomeranzenwasser. Der Saft von 1 reifen Pomeranze, 8 Loth Zucker (etwa mit dem Pomeranzengelb abgerieben), $\frac{3}{4}$ Quart Wasser.

Ponche à la Romaine s. Weinpunsch - Gefrorenes.

Ponche royal s. Weinpunsch.

Punsch. 8 - 12 Loth Zucker (mit welchem Manche vorher das Gelbe von

1 Citrone abreiben) werden mit $\frac{3}{4}$ Quart kochenden Wassers (oder schwachen Thees) übergossen, der Saft von 2 Citronen durch ein Colatorium dazu gepresst, dann $\frac{1}{4}$ Quart Rum (oder Arrak; doch ist der eigenthümliche, fast baumölartige Geruch und Geschmack des Arraks nicht Jedem angenehm, und Vorsichtige nehmen deshalb, wenn sie Punsch für verschiedene Zungen zubereiten, nur etwa 1 Theil Arrak auf 3 Theile Rum) dazugegeben. Wird in der Regel warm getrunken (nur der, später zu erwähnende, Weinpunsch oft kalt). — Man kann zu der angegebenen Quantität auch noch $\frac{1}{4}$ Quart oder $\frac{1}{2}$ Flasche Wein (am zweckmässigsten weissen, weil eine so geringe Quantität von rothem nur eine mittelmässige rothe Farbe giebt) zusetzen (setzt man mehr Wein zu, so verdient die Mischung schon den Namen Weinpunsch). — Wenn man grössere Quantitäten Punsch anfertigt, so ersetzt man wohl Eine Citrone durch eine gelbe Pomeranze, die man dann auch wohl am Zucker abreibt. — Statt des Citronensafts wird bisweilen auch Berberizensaft oder Weinsteinssäure (vgl. S. 30) genommen. So z. B. ist folgendes eine wohlgeschmeckende Mischung: Weinsteinssäure $\frac{1}{2}$ ($-\frac{3}{4}$) Quentchen, Zucker 6 Loth, in siedend. Wasser 20 Loth aufgelöst, dazu Franzbranntwein 4 Loth, Cedro-Öl 2-3 Tropfen.

Punsch, amerikanischer s. Weinpunsch.

Punsch, englischer. $\frac{3}{4}$ Pf. Zucker, mit 4-5 Pomeranzen abgerieben; 1 Quart heissen Thees (von 2 Loth bereitet); 1 Flasche Rum oder Arrak.

Punsch-Gefrorenes. 1 Pf. Zucker mit 2 Citronen (und 1 Pomeranze) abgerieben, in $\frac{1}{2}$ Quart Wasser aufgelöst, dazu der colirte Saft von 6-8 Citronen (und 1 Pomeranze), $\frac{1}{4}$ Quart Arrak. Die Mischung in die Gefrierbüchse.

Reinetten-Molken s. Äpfelmolken.

Reiswasser. 4 Loth Reis, gereinigt, mit 1 Quart Wasser $\frac{1}{2}$ St. schwach gekocht, *sub fin. coct.* 1 Quentchen Zimmt und zur Colatur Zucker *q. l.* zugesetzt. (Wird leicht sauer.)

Roggen-Kaffee s. Kornkaffee.

Salpgetränk s. S. 407.

Sapajou. 6 Eier in einem Kesselchen zerschlagen; dazu $\frac{1}{2}$ Pf. Zucker mit 3 Citronen abgerieben, der colirte Saft dieser Citronen und 1 Flasche Rheinwein; die Mischung auf dem Feuer geschlagen, bis sie aufwallt, dann abgehoben, noch ein wenig geschlagen, und warm in Tassen gegeben.

Oder: 3 Citronen mit Zucker abgerieben; dazu der colirte Saft derselben, $\frac{1}{2}$ Quart heissen Thees (von 1 Loth bereitet) und 5-6, zuvor mit etwas Thee verquirlte, Eier; gut verrührt; warm in Tassen.

Sorbet, sherbet. Bei den Türken ein aus Fruchtsäften, Zucker, Rosenwasser und Ambra bereitetes Getränk. In Deutschland wird die Benennung in vagen Bedeutungen bald für Limonade, bald für kalten Weinpunsch, Punsch-Gefrorenes p. p. gebraucht.

Soya. Eine aus Champignons durch geistige Gährung erhaltene Flüssigkeit.

Thee, englischer. 1 Esslöfel voll Thee, die Schale einer Citrone, ein halbfingerlanges Stück einer vollen Zimmtrolle und Zucker *q. l.* werden in einer Kanne Milch ebullirt, dann colirt und in einen Topf zu 6, zuvor gequirlten, Eidottern unter fortwährendem Quirlen gegossen, das Ganze von Neuem ans Feuer gesetzt, und so lange gequirlt, bis es im Topfe hohl klingt und Alles in Schaum aufgelöst ist. (WILDBERG.)

Tscherbet s. Sorbet.

Vin brûlé. $\frac{1}{2}$ Flasche Wein (weisser oder rother) bis zum Kochen erwärmt, dann in eine Schale, worin 3 Loth Zucker, ein wenig Zimmt, Nelken und fein geschälte Citronenschale, gegossen, dabei mit einem brennenden Fidibus angezündet; wann es von selbst erloschen ist, $\frac{1}{2}$ St. auf eine warme Stelle gesetzt; colirt.

Warmbier. $\frac{1}{2}$ Quart Weissbier wird aufgeköcht, dann 2 - 3 Eidotter (zuvor mit etwas heissem Bier verquirlt), 1 Quentchen Zimmt (die Hälfte davon gepulvert), 4 Loth (oder mehr) Zucker (etwa noch mit einer halben Citronenschale abgerieben), auch wohl noch $\frac{1}{2}$ Tasse weissen Weins, unter stetem Umquirlen dazugesetzt; dann lässt man das Bier noch einmal aufkochen. (Bisweilen werden statt des Zimmtes andre, erhaltendere, Gewürze, Ingwer, englisch Gewürz p. p., gewählt.)

Oder: Ein grosses Bierglas voll Weissbier mit einer Haselauss gross Butter, etwas Citronenschale, ganzem Kameel (oder noch besser gestoßenem Cardamomsamen) und Zucker einmal aufgeköcht, und mit einem Paar Eidotter abgequirlt. (MENZGER.)

Wasserkaltschale. 8 Loth fein geriebenen Schwarzbrot, 4 Loth gereinigter Korinthen, 1 Quart Wasser, Citronensaft und Zucker q. l. (Bisweilen noch — ein Übergang zur folgenden — etwas Wein dazu.)

Weinkaltschale. Wein (gewöhnlich Franzwein) und Wasser (bisweilen Säuerlings - Wasser) zu gleichen Theilen, mit Citronensaft, auf Citronengelb abgeriebenem Zucker, fein gestoßenem Zimmt, fein geriebenem Brod (gewöhnlich Weissbrod) und gereinigten Korinthen; gut umgerührt.

Weinpunsch. Man pumpt dazu entweder reinen Wein [sehr verschiedene Sorten; am liebtesten sind jedoch zu kaltem Weinpunsch: Rheinwein, Champagner, eine Mischung von Rheinwein, Champagner und Burgunder, dann Moselwein p. p.; zu warmem (welcher seltner getrunken wird) Rothwein, namentlich Medoc] oder Wein mit Wasser [in der Regel höchstens eben so viel Wasser als Wein]. Auf $\frac{2}{3}$ Quart dieser Grundflüssigkeit nimmt man gewöhnlich dieselben Quantitäten von Rum (oder Arrak), Citronen und Zucker (von diesem bisweilen etwas mehr), wie wir sie oben beim gewöhnlichen Panoche angegeben haben. Bisweilen jedoch, zumal wo man reinen Wein anwendet oder das Getränk nur schwach haben will, lässt man auch den Rum ganz weg. Bisweilen beliebt man noch andere, ausserwesentliche Zusätze. — Also z. B.:

A. Kalt zu trinken.

$\frac{1}{2}$ Flasche Burgunder, eben so viel Wasser, $1\frac{1}{2}$ Citronen, $\frac{1}{2}$ Pf. Zucker. (Sehr schwach.)

Rheinwein und Burgunder, von jedem $\frac{1}{2}$ Flasche, Champagner 1 Flasche, 1 Citrone, 1 Ananas (zerschnitten), $\frac{1}{2}$ Pf. Zucker.

Moselwein und Wasser, von jedem $\frac{2}{3}$ Quart, Rum oder Arrak $\frac{2}{3}$ Quart, 2 Citronen, 12 - 16 Loth Zucker.

$1\frac{1}{2}$ - 2 Pf. Zucker, mit 2 Pomeranzen abgerieben und in Wasser q. s. aufgelöst; dazu der colirte Saft von 8 Citronen, Rheinwein, Champagner, Burgunder und Arrak, von jedem 1 Flasche.

Champagner 1 Flasche, Arrak $\frac{1}{4}$ Quart, der colirte Saft von 1 Citrone und 1 Apfelsine, $\frac{1}{2}$ Pf. Zucker.

Rheinwein oder Champagner 1 Flasche, Rum oder Arrak $\frac{1}{2}$ Flasche, 3 Citronen, $\frac{1}{2}$ Pf. Zucker.

B. Warm zu trinken.

Rheinwein $\frac{1}{2}$ Flasche, kochendes Wasser (mit welchem man, wenn's beliebt, vorher etwas Zimmt oder Vanille infundiren kann) eben so viel, Rum $\frac{2}{3}$ Quart, $1\frac{1}{2}$ Citronen, 12 - 16 Loth Zucker.

1 Flasche Medoc mit 2 Quentchen ganzen Zimmts einmal aufgekocht, dazu 2 Citronen, 12 Loth Zucker; zur Colatur $\frac{1}{2}$ Quart Arrak.

$\frac{1}{2}$ Quart rothen Franzweins bis fast zum Kochen erwärmt; dazu Portwein und Arrak, von jedem $\frac{1}{4}$ Quart, 2 Citronen, $\frac{1}{2}$ Pf. Zucker. (Sehr stark.)

Weinpunsch - Gefrorenes. 1 Pf. Zucker in Wasser q. s. aufgelöst; dazu der colirte Saft von 6 Citronen, 1 Flasche Champagner, $\frac{1}{2}$ Flasche Arrak. Die Mischung in die Gefrierblüthe. — Vor dem Auftragen wird bisweilen noch das zu einem starken Schnee geschlagene Weisse von 4 Eiern darunter gearbeitet; dann heisst es *Ponche à la Romaine*.

Whist (Varietät des warmen Weinpunsches). 6 Loth Zucker mit $\frac{1}{2}$ Citrone abgerieben, der colirte Saft von 1 Citrone, $\frac{1}{2}$ Quart Medoc, eine kleine Tasse starken Thees; die Mischung über Kohlen mässig erwärmt.

Zuckerwasser. Bekannt genug. Ein Zusatz von 2 Tropfen Essigäther auf 1 Quart giebt ihm einen ananasähnlichen Geschmack.

Register

zum zweiten Theil.

Wie schon S. 7 angedeutet, sollen sich das Register und die alphabetische Ordnung des Werkes selbst gegenseitig ergänzen, indem wir die mit der grössten Schrift gedruckten Hauptbenennungen der Mittel hier nicht aufgenommen haben. — Doch geben noch eine Anzahl von Zusammenstellungen an, wie viel Theile von einer u. derselben Pflanze, wie viel Präparate u. Composita von einem Simplex, u. s. w. wir aufführen, und deuten auch zugleich bestimmter den Ort an, wo in der alphabet. Ordnung man sie zu suchen habe. So sieht z. B. der geneigte Leser unter *Hyoscyamus*, dass wir die Blätter, dann das Extract, das gekochte Öl, die Tinctur u. das Pflaster derselben, — ferner den Samen nebst dem Extract u. der Tinctur desselben, als besondere Artikel aufführen, und zwar die Blätter als *Folia* (nicht als *Herba*), das Extract des Samens als *Extr. Hyosc. Semin.* (nicht als *Extr. Semin. Hyosc.*), u. s. w. Seitenzahlen beizufügen war deshalb meist bei diesen Zusammenstellungen überflüssig. [Eine viel vollständigere, instructive Zusammenstellung aller in die neueste Preuss. Pharmacop. aufgenommenen Mittel findet sich in der 1829 (Beßlin, b. Herbig) erschienenen „Tabellar. Übersicht.“] — Von Heilvorschriften, selbst namhaft gemachter Autoren, sind hauptsächlich nur diejenigen im Register citirt, denen Indicationen, besondere Benennungen od. dgl. beigegeben sind. Die Benennungen vieler Formeln der S. 1, 2 sub 2-4) erwähnten u. einiger andern fremden Pharmacopöen, bei denen es sich von selbst versteht, unter welchem Artikel des Werks man sie aufzusuchen habe (z. B. *Inf. Calami* PH. MIL., *Elect. Sarsapar. comp.* PH. SLESV.), sind nicht ins Register aufgenommen worden; eben so wenig solche Benennungen jener Pharmacopöen, welche unter gleichlautenden Artikeln des Hauptwerks mit abgehandelt worden (z. B. *Pulv. aromat.* PH. P., *Spec. ad Catapl.* PH. MIL.). Wohl aber sind die gleichlautenden Benennungen anderer Pharmacopöen aufgenommen worden, wenn sie unter einem andern Artikel abgehandelt werden oder wenn die Formeln in *Recéptform* wiedergegeben sind.

— Eine nach den Krankheiten geordnete Übersicht der von uns aufgeführten Heilvorschriften nehmen wir, des hier gar zu nahe liegenden Missbrauchs wegen, absichtlich nicht auf, wohl aber eine Anzahl kosmetischer, antisymptomatischer und die Krankenwartung betreffender Vorschriften, bei denen ein Missbrauch weniger zu fürchten ist, und die man in anderen Werken minder leicht auffinden möchte. — Oft, wo wir kurz die Zahl eines Rezepts citiren, ist die Anmerkung am Schlusse desselben gemeint, die man dann nicht übersehen müge. — Die chemischen Hauptbestandtheile der Simplicia sind nur ausnahmsweise, wo ihre Benennung nicht schon deutlich genug auf den Artikel des Hauptwerks hinweist, ins Register aufgenommen. Die in alphabet. Ordnung aufgeführten Getränke des 2ten Anhangs sind hier nicht wieder aufgenommen, wohl aber manche andere aus dem Hauptwerk. — Chlor- und Cyan-Metalle sind meist als salzsäure und blausäure Salze unter den Benennungen der Basen zu suchen. — Einiges Specielle, was des Zusammenhange wegen im 1ten Theil abgehandelt werden musste, ist hier, wo man es eher suchen wird, aufgeführt.

Die Zahlen, vor denen ein ', sind Receptzahlen, die übrigen Seitenzahlen.

Aachener Wasser, künstliches ' 113

ABERNETHY Einspr. b. Geschwüren des Mastdarms, d. Vagina, d. Harnröhre ' 151; reizend-ausleer. Klyst. ' 365
Abrotanum. Hb.

Absinthium. Hb.; Extr.; Tinct.; Tinct. A. alcal.; Tinct. A. comp.; Ol. A. äther.; Ol. A. terebinth.; Ol. A. coct.

Acetas cupricus c. Aq. 145; — *hydrargyrosus* 249; — *calicus* 272; — *morphicus* 318; — *natricus c. Aq.* 323; — *plumbicus c. Aq. crudus* und *depur.* 374; — *strychnicus* 465; — *zincicus c. Aq.* 531

Acetosa. Fol. I. 168; ' 824

Acetum antisepticum 13; — *bezoardicum* 13; — *camphoratum* ' 187; — *concentrat. PH. SLESV.* 19; — *concentratissimum* 19; — *crudum* 12; — *glaciale* 19; — *lignum* 26; — *Lithargyri* 14; — *pestilentielle* 13; — *prophylactic.* 13; — *radicale* 19; — *saturnin.* 14; — *Vini* 12

Acidum acetikum dilutum 14; — *aëreum* 214; — *arsenicum* 71; — *Borussicum* 21; — *carbonicum. Gas;* *Aq.* 34; — *Coerulei Berolinensis* 21; — *Cretae* 214; — *hydrochloricum* 22; — *hydrocyanicum vegetabile* 340; — *hydrothio-*

nicum 217; *h. liquidum* 58; *Gas A. h.* 217; — *lignum* 26; — *muraticum* 21; *m. crudum* 22; *Gas A. m.* 216; — *oxygenat.* 65; *Gas* 2' 7; — *nitricum crudum* 23; — *nitroso-nitricum* 457; — *oxymuraticum* 65; *Gas* 217; — *phosphoricum ex Ossibus* 25; — *Salis communis s. culinaris s. marini* 22; — *stibiosum et stibicum* 463; — *Tartari* 29; *T. destillatum* 305; — *Vini* 29; — *Vitrioli deparat. od. rectificat.* 28; *V. tenuis* 28; — *zooticum od. zootonicum* 21

ACKERMANN Waschung bei veralteten gichtischen Contracturen ' 779

Aconitum. Hb.; Extr.; Extr. Ac. Hb. rec.; Tinct.; Tinct. Ac. äther.

ADAIR Pillen gg. Wechselfieb. ' 324. — Klyst. b. Ruhr, kachekt., Durchfällen 15

Adelheidsbrunn 61

Aër dephlogisticatus 217; — *factitius* 214; — *fixus* 214; — *hepaticus* 217; — *vitalis* 217

Aerugo crystallisata s. destillata 145
Aes 145

Aether iodatus 269; — *muraticus alcoholisatus* 457; — *nitricus alcoholisatus* 458; — *sulphuricus alcoholisatus* 459; *A. s. camphoratus* 94; *A. s. phosphoratus* 33

Aethiops antimonialis 267; — *martialis* 152; — *mercurialis* od. *mineralis* 268

Aetzammoniumflüssigkeit 298

Aetzkali 276; geschmolzenes 276

Aetzkali - Flüssigkeit 305; - Tinctur 506

Aetzlauge 305

Aetznatron, trockenes 327

Aetznatronflüssigkeit 305

Aetzstein 276

Agaricus 87

Agaricus albus 87; — *chirurgorum* 87

Agstein 467

Ahlbeeren 78

Ahlkirschenrinde 139

Alant s. *Helenium*

Alaun, gebrannter 39; gemeiner od. roher 36. — Molken 449, I. 317; - Zucker 427

ALBERS. Linctus b. Croup / 1016

Albumen Ovi 366

Alcali s. *Alkali*

Alcanna (*spuria*). *Rad.*

Alcohol (Chemisches) 31 Note

Alkohol Aceti 19; — *Martis* 194; — *Vini* 461

Ale (engl. Bier) 113

Alembrothsaltz 253 Note

Alfranken 464

ALIBERT Mixt. gg. Bandwurm 356. — *Ext.* b. Grind 104, 274; Krätzsalbe / 1085

Alkali causticum 276; — *mineralia aëratum* 325; *m. causticum* 327; *m. crudum* 325; *m. depurat.* od. *mita* 325; *m. pulveratum* 326; — *vegetabile aëratum* 274; *v. nitratum* 280; *v. purum* 276; — *volatile crudum* 41; *v. depurat.* 42; *v. satum* 44

Alkalische Wässer 61

ALLEN Salbe b. Psorophthalmie, Augenhieder - Flechten, - Kupfer / 1007

Allium Cepa. Bulbi.

— *sativum. Bulbi.*

Alö. *Extr.*; *Extr. Al. Acido sulph. correct.*; *Tinct.*

Alpranken 464

ALQUEN (D'). Ableitend. Pflast. / 971

Althaea. Hb.; *Rad.*; *Ungt.*; *Syr.*

Altschadenwasser 67

Alumen calcinatum 39; — *crudum* od. *glaciale* od. *saccharinum* 36

ALYON's oxygenirte Pomade 12

Amber, grauer s. *Ambra gris.*

Amberkraut 238

Ambra flava 467

— *grisea. Tinct. (äther.)*

— *liquida* 466

Ameisen s. *Formicae*

Ammenpulver / 662 (ROSENSTEIN), / 888 (NEUMANN)

Ammenthee 441 (ROSENSTEIN)

AMMON (V.). *Int.* b. Entzündg d. *Orbicularis ciliar.* 84; gg. *scroful.* Augenentzündgn 116; gg. *Pannus* etc. / 911- / 913. — Einreibg b. *rheumat.* Augenentzündgn u. beginnend. *Cataract* 318; bei *arthrit.* Augenentzündg 168; b. *chron. Wassers.* d. Augenlieder 262; Augenw. gg. *Hornhautflecke* Neugeborner u. *chron. Entkathis* 535; Bähg b. *versch. Augenentzündgn* / 1095

Ammonia pura liquida 298

Ammoniacum. A. depur.; *Empl.*; *Syr.*

Ammoniak vgl. *Ammoniacum* und *Ammonium*; — *Gummi s. Ammoniacum*; — , *Kali*, *weinsteinsaures* 482; — *Kupfer*, *schwefelsaures* 146; — *Milch* 40; — *Pflaster* 155; — *Salben*, *ätzende* 299

Ammonia retum Cupri 146

Ammonium aëratum crud. 41; *a. depur.* 42; — *bernsteinsaures, flüssiges* 302; — *causticum. Liq. A. c.*; *Gas A. c.*; — *essigsäures, flüssiges* 296; — *hydrothionichtsaures, flüssiges* 301; — *hydrothionsaures, flüssiges* 301; — *kohlensaures, brenzlich-üliges* 43; *kohlens.*, *gereinigt.* 42, *rohes* 41; — *muraticum martialium* 46; — *nitricum*, *magistral* *bereitet* 42, / 92; — *salzsaures* 44; *salz. m. salz. Eisenoxyd* 46; — *sulphuratum* 301; *A. s. hydrogenat.* 301

Ammoniumdampfäder 217

Ammoniumflüssigkeit, *brenzlich-üliges kohlensäure* 298; — *geistige* 302; *geschwefelte* od. *schwefelwasserstoff-*

saure 301

Ammoniumgas 217**Ammoniumliniment** 295**Ammonium-Quecksilber-Chlorid** 253 *)**Ammoniumweinstein** 482**Amomum. Sem.****Amygdalae amarae. Ol. Am. am. aether.; Aq. Am. am. (concentr.);****Aq. Am. am. diluta** 49**— dulces. Ol. A.; Syr. A.; Furfur A. Amylum Hordei** 190**ANDERSON Ext. b. Tetanus u. Trismus traumat.** 205**Andora, weisser s. Marrubium****ANDREAE Ext. gg. Eisensplitter im Auge** '23; **gg. Hornhautflecke** 59, 267, '554; **Bähg gg. Brand d. Augenhäuter** '257; **b. beginnend. Cataract u. Irisausschwitzung** '521; **Augenspir.** 34; **Salbe gg. Blepharitis glandulosa u. impetigin.** 375, **b. seroful. Ophthalmien, Hornhauttrüb.** '554**Anothum. Sem.; Ol.****Angelica. Rad.; Extr.; Tinct.; Spir. A. comp.****ANGELOT Ext. b. exulcerirtem Zahnfleisch** '255**Angustura. Cort.****Anima Rhei** 512**Anis s. Anisum vulg.****Anisette** 454**Anisum stellatum. Sem.****— vulgare. Sem.; Aq. 49; Spir.****Ankerwurzel s. Calamus****Antimonium s. Stibium****— crudum alcoholisatum od. praeparatum** 463**— diaphoreticum ablutum** 463**— hydrosulphuratum luteum** 472; **h. rubeum** 473**— tartaricatum** 485.**Äpfel** 376**Apothekerschwamm** 462**Aqua Acidi carbon.** 54; **— aërata** 54;**— Amygdal. amar. concentr.** 52,**A. a. diluta** 49; **— Anisi** 49; **—****Anthos comp.** 458; **— aurea** 67;**— Baecar, Junip.** 49; **— benedicta****Rulandi** 439; **— Binelli** 142; **—****Calcis** 53; **— Carmelitana** 456;**— Carvi** 49; **— Chlori** 65; **— Cinamomi sine Vino** 54; **— coelestis** 30, 55; **— Cortic. Aurant.** 49; **— crystallina** '1028; **— emetica PH. MIL.** 486; **— fontana** 55; **— fortis** 23; **— grisea** 303; **— hepatica** 58; **— Hungarica** 458; **— hydrocyanica vegetabilis** 340; **— hydrothionica** 58; **— Hyssopi** 49; **— Juniperi PH. MIL.** 349; **— Lavandulae** 49; **— laxativa Mannagettiae s. Viennensis** 269; **— Luciae** '649; **— Magnesiae** 307; **— mephitica alcalina** 275, 324; **— Naphae** 57; **— Nicotianae** 205; **— nigra** '548; **— ophthalmica coelestis od. coerulea** 55; **ophth. Conradii** '520; **ophth. mercurialis PH. P.** 255; **ophth. saphirina** 55; **ophth. saturnina PH. P.** 15; **— Petroselin. Radicis** 49; **— phagedonica nigra** '548; **— Palegii** 49; **— Rabelii** 316; **— Reginae Hungariae** 458; **— Rorismarini** 49; **— saphirina** 30, 55; **— saturnina** 67; **— Scandicis odorat.** 50; **— scolopetariae spirituosus** 69; **scolopet. Thedeni** 317; **— strumalis** 105; **— sulphurata PH. P.** 68; **— Supercarbonatis Sodae PH. HANN.** 324; **— Tanacetii** 50; **— Tiliae** 50; **— traumatica spirituosus** 69; **— Valerianae** 50; **— Vitae** 460; **— vulneraria acida od. Thedeni** 317**Aquae medicatae od. minerales** 60**— destillatae Vegetabilium** 49**Arcanum duplicatum depurat.** 285**— Tartari** 272**ARCET (D') Trochisken (Pastillen) b. beachwerl. Verdauung** '708**Argentum vivum** 249**Argilla rubra** 87**Armoracia. Rad.; Oxytel****Arnica. Flor.; Extr. A. Flor.; Tinct. — Hb. — Rad.; Extr. A. Rad.****Arquebusade, Thedensche** 317; **weisse** 69**Arrak** 461**Arrorut** 49**Arrow-root-meal** 49**Arsenicum. A. album; Solutio arsenical.****— Auripigmentum**

- (*sulphurat.*) *citrinum s. flavum* 75
 Arsenik, gelber 75; — weisser 71
 Arsenik-Auflösung 450; — Blumen 71;
 — Kalk 71
Artemisia. Rad.
Arum. Rad.
Asa dulcis 85
 — *foetida. A. f. depur.*; *Tinct.*; *Tinct.*
A. f. ammoniata; *Aq.*; *Aq. A. f.*
comp.
 Asand (stinkender) s. *Asa foet.*
 — wohlriechender 85
Asarum. Rad. — *Hb. A. c. Rad.*
 ASCHERSON Pflast. gg. Überbeine 279;
 Waschg gg. *Porrigio lacrata* u. a. Ge-
 sichtsausschläge / 524, b. rothen Nas-
 sen d. Damen 455
Aselli 315
 Asphalt 75
Aspredines, Waschw. dagg. / 580
 Athem, übelriechender. Kaumittel 313,
 526. — Trochisken: / 80 (HEN-
 SCHEL), / 219 (CHEVALLIER),
 / 252. — Zahnpulver: / 256, 320.
 — Zahntincturen: 142 (BUCHNER),
 495. — Mundwässer: 66 (LOCK-
 STAEDT), / 253 (MOST), / 254
 (Pneumatokatharion), / 678
 ATLEE Pulv. z. Beförder. d. Wehen 435
 Atropin 228
 Attig-Beeren, -Muss 468
 AUBERGIER Pomade gg. Ausfallen d.
 Haare / 295
 Augenbrunnen (Pyrmonter) 60
 Augenstein 145; weisser 442
 Augenwasser, schwarzes von v. GRÄFE
 / 541
 AUGUSTIN *Int.* b. chronisch-asthen.
 Gicht 306; b. Scorbut, Bleichsucht
 / 828; b. Torpor d. Darmcanales, Bor-
 borygmen, asthen. Meteorism. 384.
 — *Pasta epilatoria* 75. — Etc.
Aurantium. Fol. — *Flor.*; *Ol. Aur. Flor.*;
Aq. Fl. A.; *Syr. Fl. Aur.* — *Cort. Po-*
mor. Aur.; *Extr. Aur. Cort.*; *Ol. A.*
C.; *Tinct. C. A.*; *Aq. C. A.* 49; *Syr. C.*
A.; *Elix. A. comp.* — *Poma Aur. in-*
mat.; *Tinct. A. P. imm.*; *Extr. A. P.*
imm.
 Aurin, wilder s. *Gratiola*
Aurum mercuriale natronatum 76
 Ausbruch 527 ***
 Auschowitz Ferdinandsbrunn 60
 Austerschalen, präparierte 125
 Auszehrungskräuter, Liebersche 236
 AUTENRIETH Salbe b. Decubitus / 7,
 Pocken- od. Pustel-Salbe b. Keuch-
 husten 487, 526; Waschgn b. Krätze
 283. — Etc.
Avena. Sem. Av. excort.
 — *decorticata* 436
Axungia Porci 30
 Azotsäure 23
Baccas Ebuli 468; — *Mori nigrae* 211;
 — *Rhamni cathart.* od. *Spinac*
cervin. 480
 Bachungen s. *Hb. Beccabungae*
 BACHER's tonische Pillen / 374
 BACHNER. *Pomade vésicatoire* / 215
 BACKER gg. Wechselfieber 435
 Badeliſiment / 950
 Bäder, aromatische 226
 Badeschwamm 462; — Kohle 105
 Badespiritus 296, / 767 (KLUGE)
 Badian 436
 Bähungen s. Fomentatt.
 Bärentraubenblätter 209
 Bärlappsamen 442
 BAGLIV Fieberpulver 130; Pulv. gg.
 Scrofeln, Rhachit. 195
Balaustia 199
 BALDINGER. Anthelminth. Mixt. / 451;
 Pulv. gg. adynamische Hornhauttrü-
 bungen / 165. Etc.
 Baldrian s. *Valeriana minor*
 BALDWIN Öleireibungen gg. Pest 354
 Balsam, peruvian., schwarzer 83
 Balsame, künstliche 78; — natürliche 78
Balsamum (us) Arcasi 517; — *Com-*
 mendatioris 497; — *Copahu* 80; —
Frahmii / 1046; — *Indicum nigrum*
 83; — *Italicum* od. *Locatelli* / 1048;
 — *mercuriale* 433; — *Nucistas*
 353; — *ophthalmicum Janini* / 501;
ophth. rubrum 522; *ophth. St. Yves*
 / 555; — *Opodeldoc* 296; — *Sa-*
turni 14; — *stomachicum PH.*
SLEEV. / 765; — *Storacis* 466; —
Sulphuris Beguini 301; *Sulph. Ru-*
landi 361; *Sulph. simplex* 351;

- Sulph. terebinthinatum* 361; — *terebinthinatum Frahmii* / 1046; — *traumaticum* 497; — *universale* PH. SLESV. 15; — *Vitae externum* 434; *Vit. Hoffmanni* 315; *Vit. PH. P.* 315; *Vit. Rudandi* 361
- Balsamum Peruvianum*; *Syr.*; *Tinct.* Bandwurmcuren (Litt.) 223
- Bardana. Rad.*
- Bärges-Wasser, künstliches / 114
- BAREZ Pustelsalbe / 498
- BARLOW Waschung b. Grind / 608
- Basilicum. Hb.*
- Basilicum - Salbe 516
- Basillienkraut 228
- Bassoria 220
- BATEMAN *Ext.* gg. *Pruritus* 255 (*pudendi muliebr.*), / 850
- Baumfarnwurzel 403
- Baumöl 354
- Baumwolle, aromatische 97
- BEAUCHAMP *Ext.* b. *Porrigio decalvans* 487
- Beccabunga. Hb. I.* 168; / 461
- BECK (EDW.) *Meth.* gg. *Lepra vulg.* / 948
- BECKER Bähg b. Kopfgeschwulst Neugeborner 455
- BEDDOES. *Mixt.* b. *scroful. Lungensucht* / 177; *Pillen* b. Harnsteinen / 720
- BEER *Pulv.* b. Hornhautverdunkeln / 79; Einreibg b. chron. Augenentzündgn, *scroful. Lichtscheu* p. p. 262; *Salbe* gg. *Scirr.* d. Augenlieder 96. — *Etc.*
- BEHR *Salbe* b. *Zona* 318
- Beifusswurzel 384
- Beinwellwurzel 416
- Beissbeerfrucht 210
- Beisselbeeren 77
- BELL *Ext.* gg. *Warzen* 44; b. *Ophthalmia gonorrhoeica* / 557; gg. flechtenartige Hautausschläge / 809
- Belladonna. Hb.*; *Extr.*; *Extr. B. Hb. rec.*; *Tinct.* — *Rad.*
- BENEDICT Bähg gg. torpide Augenentzündgn / 318; Waschg gg. *Ophthalmia e Crusta lact.* / 495; Umschl. b. beginn. *Herpes oed. nasi* 255
- Benedictwurzel 389
- BENNATI Gurgelw. gg. Heiserkeit / 69
- Benzoë. Tinct.*; *Tinct. B. comp.* — *Flor.* 20
- Benzoë-Blumen 20; -Harz 85; -Säure 20
- BÉRARD (*jun.*). *Ext.* Anwendung d. Kälte 57
- Berberis. Baccas*; *Syr.*
- Berberitzen s. *Berberis*
- BERENDS *Int.* b. Hartleibicht 35; *Pulv.* gg. einfach nervöse Wechselfieber / 290, b. Lungenlähm / 15, b. activ. Congestionen zum Uterus, Abort drohend. Uterinkrämpfen / 229, gg. Gichtbeschwerden u. Unterleibsstockungen / 938; auflösende u. expector. *Pillen* / 1012; *Latw.* b. aton. Wassers. / 1044; *Brechmixt.* für *Sensible* / 868; abführ. *Limonade* / 730; *Mixt.* gg. Atonie d. Darmcanals, aton. *Diarrhöen* / 839, gg. *Scorbut* / 673, gg. *Sodbrennen* / 669; *Analepticum* / 53; feines *Nervinum* / 311. — *Mundwasser* b. athen. *Aphthen* u. Halsentzündgn d. *Kinder* / 119, *Pinsels.* gg. *Mercurialgeschwüre* im Munde / 193; *ausleer.* *Klyst.* 350, desgl. f. *Sensible* 350; *antiphlogist.* *Klyst.* / 599; *Katapl.* b. *Gangrän*, *Decubitus* / 288. — *Etc.*
- BERG *Pulv.* b. inveter. *Syphilis m. Scrofula* / 540
- Bergamotta. Ol.*
- Bergamotten 377
- BERGIUS *Pulv.* gg. bössartige Wechselfieber 210
- Berg-Öl 369; -Salz 327
- Berlinerblausäure 21
- BERNDT, *Int.* gg. Wechselfieb. 130, / 376 (*Quartanf.*), gg. *Diabet. mellit.* 142, *Prophylact.* gg. *Scharlach* 170
- BERNHARDT *Ext.* b. *Plethora venosa*, Anschwellgn d. Leber p. p. / 27, / 28
- Bernstein s. *Succin.*; — schwarzer 75
- Bernsteinsäure, gereinigte u. rohe 27
- Bernsteinsalz 27
- BERTON Dämpfe b. *Phthis.*, *Hämoptya* 279
- Bertramwurzel 404
- BESTUCHEFFSche Nerventinctur 460
- Bezoaressig 13
- Bibergeil s. *Castoreum*. — *Canadisches* 109; deutsches 108; englisches 109;

- polnisch., russisch., sibirisch. 108
- Büternelle s. Pimpinella**
- Bicarbonas kalicus c. Aq.** 273
- **natricus c. Aq.** 323
- Bichloratum Ferri** 192
- **Hydrargyri** 253
- Bier 112; - Schaum 113; - Hefe 192
- BIENKOWSKI (V.)** innerl. Ersatz d. Schmiercur v. RUST 517
- BIERMANN Pulv. b. Eclamps. infant.** 385
- BIESTER's** Magentropfen 495
- BIETT Ext.** gg. syphil. Mund- u. Rachen-Geschwüre '511; Einspr. b. Geschwüren d. Harnröhre '388; Waschg b. Grind '608; Salbe gg. entzünd. syphilit. Hautleiden u. Flechten '506, gg. Flechten 123, b. *Herpes pustulos.* '496, b. *Prurigo* '722, b. Grind 311, '547, '1008, b. Krätze '850
- Biliner Wasser** 61
- Bilis bovina** 191
- Bilsen s. Hyoscyamus**
- Bimsstein** 290
- Bioxalas kalicus c. Aq.** 367
- BIRD Pulv. b. Lungenschwinds.** 444
- Bisam** 320; - Tinct. 507
- Bistorta. Rad.**
- Bisulphas kalicus** 284
- Bisulphuretum Hydrargyri** 123
- Bitartras kalicus c. Aq. depur.** 483
- Bittererde, gebrannte od. kaustische** 310; kohlen-saure 307; schwefel-saure 309; weisse 307
- Bitterholz s. Quassia**
- Bitterklee s. Trifolium fibr.**
- Bitterkresse I.** 168
- Bittermandel-Öl, Äther.** 340; - Wasser 52
- Bittersalz** 309; rohes 309; - Wasser 61
- Bittersüss-Extract** 177; - Stengel 464
- Bitumen Judaicum** 75
- Blackflachbein** 365
- BLANC. Narkot. Salbe** 446
- Blanc d'Espagne** 86
- Blankenheimer Thee** 236
- Blasenpflaster, gewöhnl.** 155; anhalten-des od. JANIN'sches 157
- Blasen-Salbe** '215; - Taffent 102
- BLASIUS** Einreibg z. Beförder. d. Aufsaug 171; Salbe gg. Augenblennor-rhöen 267, b. Lupus 279; Waschg gg. *Prurigo* 283
- Blättererde** 272; krystallis. 323
- Blatt-Gold** 76; - Silber 69
- BLAUD Ext.** gg. chron. Hautkrankh'n u. krebsart. Geschwüre 211
- Blauholz** 293
- Blausäure** 21
- Blaustein** 147
- Blaustofftrink** 531
- Bleibalsam** 14
- Bleibougies** 112
- Bleicerat** 522
- Bleicinnober** 315
- Blei-Essig od. -Extract** 14
- Bleiglätte** 306; - Pflaster, einfaches u. zusammenges. 159
- Bleikerzen** 112
- Bleioxyd** 306; Auflös. v. basisch. essig-saur. 14; essig-saures gereinigt u. roh. 374; kohlen-saures 113, 376
- Bleisafran** 315
- Bleisalbe** 522
- Bleisuperoxyd** 315
- Bleiwasser** 67; GOULARD'sches 68
- Bleiweiss** 113; - Pflaster 157; - Salbe 516, campherhaltige 517
- Bleizucker, gereinigt u. roh.** 374
- Blitzpulver** 442
- Blutegel** 247
- Blutholz** 293
- Blutlungenmoos** 291
- Blutwurstarme (Waschg v. NEUMANN)** 453
- Blutwurzel** 416
- Bockshornsamen** 441
- BOERHAAVE. Liq. digestiv.** 272. — Pulv. b. Hornhautverdunkeln '992
- BOHLIG** Blasensalbe '215
- Bohnen, weisse** 190; brasilianische 190
- Bohnenmehl** 190
- BOILEAU DE CASTELNAU** Einreibgn b. Krätze 354
- Bolus** — 87 (2 Artikel)
- Bonbons, schwarze** 320
- BONORDEN Int.** gg. (entzündl.) Ruhr 329
- Boras natricus c. Aq.** 87
- Boraschkraut** 229
- Borax** 87; *B. Sodae alcalinus* 87

- Borax-Säure 21; -Weinstein 482
Borrage. *Hb.*
 Borretschkraut 229
Botrys Mexicana; *Hb.* 231
 Bougies; Blei - 112; einfache 112
Bovis; *Bilis* 191. — *Medulla*. — *Sebum*
 BOWES Mixt. gg. oriental. Cholera / 985
 Boysalk 327, 427
 BRACH Tropfwasser b. contagiöser Augenentzündg 299
 BRANDE Pulv. b. Wassersucht 177
 Branntwein 460, 461; - Spüllicht 462
Brassica Rapa. *Rad.*
 Braunstein 311
 Brausemischungen / 579 (*Kali carb. acid.*), / 583 (*Kali carb. e Tart.*), 298 (*Liq. Ammon. carb.*)
 Brausepulver / 578 (*Kali carb. acid. m. Acid. tart.*); 379 (*Offic. a. Magn. carb. m. Acid. tart.*); 307, / 610 u. / 665 (*Magn. carb. m. Tart. dep.*); / 666 (*Magn. carb. m. Citronensaft*); 379 (*Offic. a. Natr. carb. acid. m. Acid. tart.*); / 706 u. / 707 (*Natr. carb. acid. m. Citronensaft*); / 719 (*Natr. carb. dep. sicc. m. Tart. dep.*)
 Brechmittel (allgem. Bemerkgn.) 398
 Brechnuss s. *Nuces Vomicae*
 Brechnuss-Alkaloid 463
 Brechstoff 153
 Brechvitriol 534
 Brechwein 529
 Brechweinstein 485; - Salbe 526
 Brechwurzel s. *Ipecac.*
 Breiumschläge, gährende 216
 BREMER (*sen.*) gg. Wechselfieber / 306
 BREMSER anthelminth. Latw. / 965; Meth. gg. Bandwurm 358; d. Gegenwart e. Bandwurms zu erforschen 392
 Brennkraut 231
 Brennessel 246
 BRERA Pillen gg. syphilit. Knochenschmerzen 168; Bissen b. gereizt. Nervensykt. / 690, a. Beruhigg d. Blutsystems / 691, b. Rheumatismen, Gicht, Lymphgefässentzündg etc. / 692, b. sensibler Amenorrhöe / 693; Latw. b. Wechselfieb. m. nervös. Zufällen / 278; Haustus b. Schlaflosigkeit, heftigen Schmerzen / 687; anthelminth. Mixt. 244. — Bähg b. chron. Augenentzündg m. Gefässschwäche / 88; Inject. b. Amenorrhöe 299, b. chron. Metritis m. beginn. Scirrhusität / 456, b. Otalgie, entzündl. Tripper, hämorrhoidal. Stuhlzwang, 318; Eisereibg b. Wassers. 412, b. Priapism., Pollutionen, Harnverhalten, Amenorrhöe, Koliken p.p. 96. — Etc.
 BRESCHET *Ext.* b. complic. Fracturen 57
 BRETONNEAU *Ext.* b. Croup 37
 BROCKMÜLLER gg. Wechselfieber 116
 Brodkohl 104
 BROGLIA DAL PERSICO *Ext.* b. Neuralgien 59
 Brom 89; - Kalium 278
 Brombeersyrup 480
Brometum Kalii c. Aq. 278
Bromium 89
Bromum. — *Kali hydrobrom.*
 Brucin 332
 BRÜCKMANN Alantsalbe b. Krätze / 848
 Brunnen-Curen 62; - Geist 214; - Kresse s. *Nasturt. aquat.*; - Wasser 58
 Brust-Elixir 153; - Kräuter, LIEBERSCHE 236; - Kügelchen 515; - Pulver 380 (*CURELLA*), / 1001 (*WEDEL*), etc.; - Thee 452; - Wurzel 382
 Brustwarzen, wunde, Mittel dagg.: 77 (*VOGT*), / 154 (*DANNEMANN*), / 155 (*JÖRG*), / 172 (*HARLESS*), 214 (*STRAHL*), 240, / 490 (*KLUGE*), / 1103 (*HUFELAND*)
Bucco. Fol.
 BUCHANAN Obrinjectionen / 35, 70; Pinselg b. versch. Gelenkhübeln, Knochenbrüchen 506
 BUCHHAVE Mixt. b. Wassers. / 818
 BUCHNER Ersatz d. Copalwabals. 489; Tinct. b. cariösen Zähnen 142
 BUCHOLZ Mixt. b. fieberlosem Anasarca nach Scharlach 498
 Buchäuerling (Glasshübel) 61
 Buchblätter 202
 BÜTTNER Mixt. gg. Keuchhusten / 476. — Salbe gg. contagiöse u. a. Augenentzündungen 250
Bulbus Colchici 390; — *Scillas* 411
 BURCHARD Pulv. gg. chron. Halserk 280

- BÜRDACH INT.** b. Blutungen 25; di-
ret. Tropfen 512
BÜRDACH (in Triebel) gg. Epilepsie
384; Tropf. b. acuter Gicht 254
BURSENIUS Int. b. Blutpeien 56
Butter 91; - Blume s. *Taraxac.*
Butyrum Antimonii 306; — *Cacao* 342;
— *Majoranae* 522; — *Nucistae*
353
Cacao. Sem.; *Cort. Exc. tost.*; *Ol.*; *Pa-*
sta C. c. Lich. Isld.
— *ppt. c. Lich. Isld.* 369
Cacao - Butter 342; - Masse 437; - Scha-
len - Kaffee 127; - Seife 342
Cacumina Spartii 286
CADET DE VAUX Wassercur 56
Cadmia fornacum 533
Cajuput. Ol.; *Ol. C. rectificat.*
Calnea. Rad.
Calamina 289
Calamus. Rad.; *Extr.*; *Ol.*; *Tinct.*;
Tinct. C. comp.
Calcane 91
Calcaria chlorata od. *chlorinea* od. *chlo-*
ross 117; — *extincta* 93; — *oxy-*
muratica 117
Calciumoxyd 93
Calendula. Hb.; *Extr.* — *Flor.*
Calisaya (China) 133
Calomel, Calomelas 260
Calx Antimonii c. Sulphure 93; *C. A.*
sulphurata PH. P. 93; — *Arsenici*
71; — *caustica* od. *pura* 93; — *sa-*
lita 91; — *viva* 93
Campecheholz 293; - Extract 182
Campher s. *Camphora*; - Essig / 187;
- Seifen-Liniment 296; - Wein / 209
Camphora. Mixt.; *Spir.*; *Spir. camphora-*
to - crocat.; *Ol.*; *Linim. ammoniato-*
camphorat.; *Linim. saponato - cam-*
phorat. — *Acid. acetic. aromat. cam-*
phorat.; *Ungt. Ceruss. camphorat.*
Candiszucker 426
Canella Ceylanica 124
Caniramin 332
Cannabis. Sem.
Cantharides. Tinct.; *Tinct. C. concentr.*;
Ol. C. infus.; *Ungt.*; *Empl. C. or-*
dinar.; *Empl. C. perpet.*
Capillarsyrup 477
Capillus Veneris. Hb.
Capsicum annuum. Fruct.; *Fruct. C. A.*
ppt.; *Tinct.*
Capuciner - Samen 444
Carabe 467
Carbo animalis 103, *praeparat.* 103;
— *Carnis* 103; — *Ossium* 126; —
Panis 104; — *purus* 104; — *Spon-*
giae 105; — *vegetabilis* 104
Carbonas ammonicus admixto Ol. em-
pyreum. anim. 43; *C. A. crudus* 41;
C. A. depur. 42
— *halicus crudus* 273; *C. k. e. Cin. clau-*
und e Tartaro 274
— *magneticus c. Aq. et Hydrate ma-*
gnae. 307
— *natricus c. Aq. crudus* 325, *depur.*
325; *C. n. depur.* 326
— *plumbicus* 113, 376
Carbonsäure 214
Cardamine amara L. I. 168
Cardamomen, kleine 106; — lange 106
Cardamomum minus. — *Tinct.*
Cardobenedicten-Extr. 172; - Kraut 230
Cardus benedictus. Hb.; *Extr.*
Carex arenaria. Rad.
Carlina. Rad.
Carmeliterwasser 456
CARMICHAEL Ext. b. Krebs 193, 196
Carotin 391 Z. 10 v. u.
Carotte 391
Carrageen, *Carrageen*, *Carragean*
290; - Schokolade 290
CARVELA. Antirrhachit. Meth. 35
Carvl. Sem.; *Ol.*; *Aq.* 49
Caryophyllata. Rad.
Caryophylli. — *Ol.*; *Tinct.*
Cascarilla. Cort.; *Extr.*; *Tinct.*
CASPER Balsampaste / 143; Breehmix-
tur / 871. — *Ext. b. Tinea* 326.
— Etc.
Cassia. Flor. — *Pulpa.*
— *cinnamomea. Ol. Cass. cinn.*; *Elaeo-*
sacch. Cinnamomi; *Tinct. Cinnam.*;
Syr. Cinnam.; *Aq. Cinnam. simpl.*;
Aq. Cinnam. vinosa
— *Fistula* 378
Cassien-Mark 378; - Muss 378; - Rinde
108
Castaneas equinas tostae 210

CASTELLA (Y.) Klyst. gg. Wechselfieb. 117

Castoreum. Tinct.; Tinct. C. äther. —
C. Canadense. Tinct. C. C.; Tinct.
C. C. äther.

Castoröl 355

Cataplasma acre KERNDL. 90; — *resolvens* d. Pariser Kinderspitale 430

Cataplasmen, gährende 216

Catechu; Tinct.

Caules Dulcamaras 464

Causticum alcalinum 276; — *antimoniale* 306; — *lunare* 71

Cayennepfeffer 210

Cedroöl 346

Centaurium minus. Hb.; Extr.

Cera viridis 111

Cerasa. C. acida; Syr.; Aq. — C. acida
siccata; Aq. Cerasor, amygdalata

Ceratum Calaminas '626; — *ad Fonticulus* PH. AUSTR. 315; — *fuscum*

PH. AUSTR. 307; — *Goulardi* 522;

— *labiale album* u. *rubrum* 112; —

Resinae Pini 112; — *Saturni* 522;

— *simplex* PH. AUSTR. 110, PH.

HANN. 516; — *viride* 111

Cereoli dilatatorii od. *exploratorii* 112;

mitigantes od. *saturnini* 112

Cerevisia 112; — *Armoraciae* PH. P.
'826

Cerevisiae Fermentum 192

Cerussa (alba). Ungt.; Ungt. C. camphorat.; Empl.; (Empl. adhäsiv. c.

Ol. Lini; Empl. consolidans; Empl.
defensiv. rubr. '332)

CERUTTI Int. gg. Scrofula 276. Verbandw. b. scroful. Geschwüren 277

Cetaceum. Cerat. C. alb. und rubr.

Cetin 114

CHABERT's Öl gg. Bandwurm 358

Chaerophyllum sylvestre. Hb.

CHALMER anodyne u. krampfstill. Einreibg '791

Chamomilla Romana. Flor.

— *vulgaris*. Flor.; Extr.; Extr. C. frig. par.; Tinct. C. v. Flor.; Ol. C. simpl.; Ol. C. coct.; Ol. C. citrat.; Ol.

C. terebinthinat.; Aq.; Syr.

Charité z. Berlin: Behandl. d. Syphilis ohne Mercur 309; Decoct. Sarsapar.

comp. 309-310; Curen gg. hartnäck. syphilit. Übel 304, '550; Behandl. d. Krätze 118, '1088; Luftreinigung 119

— z. Paris: Salbe gg. Flechten '544. — Etc.

CHAUSSIER. Schwefelleber-Syrup '605, — Linctus '606. — Einreibg in d. Muttermund b. Geburtszögerg 171

Chelidonium majus. Hb.; Extr. — Rad. CHRLIUS Bähungen b. Augenliederkrebs 282

Chenopodium ambrosiacum. Hb.; Tinct.

CHERTON Rxt. b. h. scart., schmerzhaften Geschwüren, Lippenkrebs 425

CHEVALLIER Houst. gg. saures Aufstoßen '648; Trochisk. gg. Magensäure '672, gg. niebend. Athem '219; Mundw. desgl. '254

China. Cort. Ch. fuscus; Extr. Ch. fuscus;

Extr. Ch. fusc. frigide parat.; Extr.

Chin. spirituos.; Tinct. Chin. simpl.;

Tinct. Chin. comp.; Syr. Ch. — Cort.

Ch. regius; Extr. Ch. regiae; Extr.

Ch. r. frig. par. — Cort. Ch. ruber.

— Alkaloide 114, 115, 123. — Resina Ch. ppl.

— Calisaya 133; — flava 133; — grisea 128; — Huamalies 128; —

Huanuco 128; — Jaën 128; —

Loxa 128; — regia 133; — Ten 128

— ponderosa. Rad.

China- Alkaloide 114, 115, 123; - Bier

134; - Harz, präpar. 422; - Kaffee

134; - Schokolade '284; - Wurzel 398

Chinin u. Chininsalze 115

Chinioidina 114

Chinium resinoso-sulphuricum 115

Chiococcin 388

Chlor. Einathmungen 120; - Gas 217,

- Gasbäder 212; - Kalk 117, Kalk-

Flüssigkeit käufliche 120 Z. 3; - Na-

trium 327; - Natron 122; - Natrium-

Flüssigkeit 305; - Quecksilber im

Maxim. d. Chlors 253, im Minim. 260;

- Räucherungen 212; - Stibium-Flüs-

sicht 306; - Wasser 65; - Wasser-

stoffsäure 32

Chloras kalicus depur. 281

— natricus c. Aq. 329

- Chloratum Auri* o. *Chlorato Natrii*. 76;
 — *Burii* c. *Aq.* 84; — *Calcariae*
 117; — *Calcii* 91; — *Calcis* 117;
 — *Ferri* 193; — *Hydrargyri* 260;
 — *Natri* 122; — *Natrii* 327
Chlorina liquida 65
Chloris calcicus 117; — *natricus* 122
Chlorum s. *Chlor*; — *gasiforme* 217
Chocolade s. *Schocolade*
Chocolata c. *Lich. Lisd.* 369
CHOPART Mixt. gg. Nachtripper / 148
CHRESTIEN Goldsalbe b. Babonen u.
Feigwarzen 75; Goldesreibg 76;
Eiureibg b. Wassersucht 244, 503, b.
Wahnsinn 124, 502, b. Durchfällen,
Veitstanz p. p. / 747, b. Priapism.,
Pollutionen, Harnverhalten, Amenor-
rhöe, Rheumatismen, Koliken p. p. 96
Christwurz 396
Cichoreum. *Hb.* — *Rad.* — *Extr.* *C. liq.*
Cicuta s. *Conium maculat.*
Cider 376
CIMA Mixt. b. scroful. Drüsen / 251;
Salbe dabei 119
Cina. *Sem.*; *Extr.* *C. aeth.*
Cinchonin, schwefelsaures 123
Cineros clavellati 273
Cinnamomum acutum. *Ol.*; *Tinct.*
— *Ceylonense* 124; — *Judicum* 107;
— *occidentale* 108; — *orientale*
oil. verum 124
Cinnober 123
CIRILLO antiyphilit. Heilmeth. 256
Citrea 377
Citronat 135
Citronelle 227
Citrone s. *Citrus*; —. - Kraut 227; - Me-
lisse s. *Melissa*; - Schale 135
Citrus. *Poma*; *Aq.* — *Succ.*; *Syr.* *Suc-*
ci Citri. — *Cort.*; *Ol.* *Citri* *Cort.*
CLARI Klyst. gg. Ruhren, *Hämorrhoides*
internae 399
CLARKE Inject. b. Gebärmutterkrebs 70
CLARUS Pulv. gg. Gicht 206, gg. Kropf
/ 223, b. Hypertrophie d. Ovarien u.
d. Uterus 193; Mixt. gg. Blutspeien
234
Clavelli Cinnamomi 198
Clavus scalinus 435
Clematis erecta. *Hb.*
CLESS Mixt. b. *Dalr. tremens* 234
CLOQUET *Ext.* b. Krebsgeschwüren
234; b. Uhlens Geruch a. d. Nase 239
COATES Inject. b. Taubht 70
Cochenille 124
Cochlearia. *Hb.*; *Spir.*; *Spir. C. comp.*
Cocosnussöl - Soda - Seife 429
Codain 362
Codia 103
Coffea. *Sem.*
Cognac 461
COHEN *Int.* b. habituell. Verstopf 208
COINDET Infusion b. *Tetanus hyster.*
364
Colchicum. *Rad.*; *Acet.*; *Oxygmel.*; *Vi-*
num; *Tinct.* *C. e Rad.* — *Sem.*;
Tinct.; *Fin.* *C. e Sem.*
Colla Pistach. 268
Colocythis. *Poma*; *Coloc. ppt.*; *Extr.*;
Extr. C. comp.; *Tinct.*
Colombo (*Columbo*) *Rad.*; *Extr.*; *Tinct.*
Commandenbalm 497
Coni Huon. s. *Lupuli* 464
Conium maculatum. *Hb.*; *Extr.*; *Empl.*;
Ol. C. aeth.
CONQUEST Einreibg b. Geburtsögerung
171
CONRADI Augenwasser / 520; *Linim.*
gg. verschied. Hautleiden 274; Salbe
gg. Schwammwüchse in Geschw.
ren / 660
Conserva Cochleariae 232; — *Hederae*
terrestr. 237; — *Sabinae* 242
Convallaria majalis. *Flor.*
COOPER *Int.* gg. Nachtripper / 442
— (SAM.) Räucherb. b. Halageschwüren
123
Copaivabalsam 80
Corallina Corsicana 225
Coriandrum. *Sem.*
CORNELIANI Einreibg b. Flechten,
Krätze 142
Corpus pro Balsamo Sulphuris 351
Cortex (*Cortices*) *Aurantiorum* 138; —
Cassiae albae 101; — *Chinae fla-*
vus 133, *Oh. officinalis* 128; —
Cinnamomi 124; — *Citri conditi*
135; — *corticosis* 101; — *Grana-*
torum 137; — *Peruvianus* 128; —
regius 133; — *Sassafras* 295 Z. 3

— *Winterianus spiritus* 101
Corticin 129 Z. 3 v. u.
COSME (*Frères*) Ktsend. Pulv. '126
Cremor Tartari 483; *C. T.* (*Borace*)
solubilis ed. *boraxatus* 483; *C. T.*
volatilis 481
Crocus; *Tinct.*; *Spir. camphorato-cro-*
cat.; *Syr.*; *Empl. ocyroco.*
— *Martis adstringens* 194, *M. aperiti-*
tivus 193; — *Saturni* 315
Crotonöl 346
CRUVEILHIER Klyst. b. Gastro- u.
Entero-Malacie 165
Crystalli lunares 69; — *Tartari* 483
Cubeben 144; — *Extract* 177
Cucumera asinini 177
Cudowa 61, 216
CULLERIER *Int.* gg. *Syphilis* '896.
Kleine Schmiercur 519; Salbe bei
janchend. syphilit. Geschwüren 122
Cumtuum. Sem.; *Ol.*
Caprum ammoniacale ed. *ammoniatum*
146; — *subaceticum* 30
Cureuma. Rad.
CURELLA. Brustpulver 380
Cusparia 127 Z. 5
Cyanidum Hydrargyri 252
Cyanuretum ferro-sineicum 532; —
Mercurii 252; — *sineicum* 531
Cydonia (178); *Sem.*; *Mucil.*
Cynoglossum. Rad.; *Massa Pilul. e Cyn.*
Dacrydium 434
DAM (VAN) Verbandw. b. Wasserkrebs
'264
Damascener Rosen 201
Dämpfe, schwellig-saure 469; schwefel-
saure 470
DANNEMANN Linim. b. wunden Brust-
warzen '154
Daphnin 136 Z. 17 v. u.
DARLING Waschg gg. *Prurit. genita-*
lium 329
Daturia 245
DAUBENTON Trochisk. b. *Dyspepsie m.*
Neigg u. Durchfall '856
Daucus. Rad.; *Succ. D. insipiss. depur.*
DAUVERGNE Waschg gg. *Herpes cru-*
stosus flavescens '573
Decoctum album SYDENHAMI '268; —
Althaeae PH. MIL. 381; — (*antisy-*

phill.) FALSCH '892, POLLINI '893,
ST. MARIE. '897; — *Chinas functi-*
tiae PH. F. 129, *Ch. regias c. Aci-*
do mur. PH. MIL. '294; — *Cort.*
Chinas PH. MIL., PH. F. 134; —
Crystallorum Tartari PH. HANN.
483; — *Lignorum* PH. MIL. 452;
— *Quereus* PH. MIL. 139; — *Sar-*
saparill. comp. d. Charité a. Berlin
309 - 310; — *Sulphureti Calcis*
Hoffmanni 63
DELPECH Mixt. gg. Nachtripper '147
Delfphin 447
DERMOTT Ext. b. Gesichtsschmerz 205
Desinficirung verschiedener Sachen 66,
120, 213, 216 (*Gas Ac. mur.*)
DEWEES *Int.* u. Klyst. b. *Cholera d.*
Kinder 439, 327. Ext. gg. *Harnruhr b.*
Kindern 360; Mundw. b. *Aphthen Neu-*
geborener 87; Bähg. b. *Augenentzündg*
Neugeborener 531
Diachylon-Pflaster, einfaches 159, *zusam-*
meniges. 159
Diacodiensyrup 478
Diaeta alba 288
Diagrydion 434
Dickaustüge 160
DIEFFENBACH Ext. b. syphilit. Nasen-
geschwüren 123; Infusion b. *Epito-*
pischen 466
Diète blanche 288
Digitalis. Hb.; *Extr.*; *Tinct. D. simpl.*;
Tinct. D. ether.; *Acet.*
Dill-Öl 340; - *Samen* 436
Diptam - Dosten s. Origan. crast.
Dobberaner Zahntropfen '1067
DÖBEREINER. Künstl. Seidschütter
Wasser '670; künstl. Schwefelwa-
sser 92; — *Eisenbäder* 196; *Schwe-*
felbad 92; *Gährbad* 216; *Luftreini-*
gung in Krankenzimmern 104
DOERFFURT Salbe f. *wurmkrankte Kin-*
der '771
Doppelsalz 285
Dost, Dostenkraut, gemein. 240; *kret-*
isch. 240
Drachenblut 428
Dreifaltigkeitsblume 247
Driburger Wasser 60
DROSTE *Int.* b. *Croup* 147

- DUBLA** Einreibg b. Steinköthen 171
DUBREUIL Infusion b. Tetanus 185
DUCHESNE-DUPARC Krätzsalbe 424
Dulcamara. Stip.; Extr.
DUPASQUIER Räuchergn b. chron. Rheumatismen 96
DUPUYTREN Ätzmittel (b. Krebsgeschwüren p.p.) '127; Salbe b. chron. Gelenkgeschwülsten '546; Waschb. Krätze '607
DURANDE Mixt. gg. Gallensteine '52
DYRSÉN Tropf. b. oriental. Cholera 495
DZONDI Heilmeth. gg. Syphilis '508; *Int.* gg. Scrofeln 276
Eau de Cologne 55; — *de Lavande* 456; — *de Luca* '649
Eberraute 227
EBERS. Quecksilber gg. *Ilcus* 251
Eberwurzel 389
Ebulus. Succ. E. inspiss.
Ebur ustum 126
ÉCCARD Dämpfe b. Croup 197
ECKENSTADT Präservativ gg. Keuchhusten 321
Eger-Franzensbrunn 60, -Polterbrunn 216, -Salzquelle 61
Ehrenpreiskraut 246
Eibisch s. Althaea
Eichel-Kaffee 218; -Schokolade 218
Eicheln, geröstete 218
Eichen-Mistel 530; -Rinde 139
Eichfarngurzel 403
Ei-Dotter od. -Gelb 366; **Eieröl** 354
Eisen (Mineralw.) 61, 217
Eisen, auflösliches 484; gepulvertes (metall.) 195; kohlen-saures 193; phosphor-saures 194; salz-saures, grünes 193, salz-saures, rothes 192
Eisenbäder 196, 218, 303
Eisenextract, äpfelsaures 178; — m. Quittensaft bereitet 178
Eisenfeile, präparirte 195
Eisenhaltiger Liquor 460
Eisenhüttlein s. Aconitum
Eisenliquor, schmerzstillender 460
EISENMANN Waschgn b. Varioloid 66
Eisenmoor 194
Eisenoxyd, braunes, 193; — phosphor-saures 194; — rothes 194; — salz-saures 192, Tinctur dav. 503, äther. Tinct. 460; — -Auflösung, salzsaure 303; — -Kali, weinsteinsaures 484
Eisenoxydul, salzsaures 193, Tinct. dav. 503; — schwarzes 194; — schwefelsaures 195; — -Auflösung, salzsaure 303; — -Zinkoxyd, blaues, res. 532
Eisensafran, adstringirender 194; — eröffnender 193
Eisensalmiak 46
Eisensplitter aus d. Auge z. entfernen '23
Eisenvitriol 195
Eisenwasser 60
Eisenwein 529, '828
Eisenweinstein 484; -Kugeln 218
Eis-Essig 19; -Kraut L. 168
Eiweiss 366
Elaeosacchar. Aurantior. 150; — *Chamomill.* 150; — *Cinnamomi* 150; — *Flavedinis Citri* 150; — *Macis* PH. AUSTR. 150
Elaterium (nigrum) 177
Electrum 467
Electuarium anthelminthicum PH. F., PH. SLESV. '965, *anthelminthic. Störckii* PH. HANN. '965; — *dentifricium* PH. HANN., SLESV. 290; — *gingivale* PH. HANN., SLESV. 290; — *lenitivum* 150; f. *Arme* '433, PH. MIL. '328; — *mundificans* PH. HANN. '434, PH. SLESV. 498; — *Semin. Cinæ comp.* PH. SLESV. '965; — *e Senna* PH. MIL. '328; — *theriacale* 151
Elemi-Harz 151; -Salbe 517
Elisir acidum Halleri 316; — *amarum, amarum concentrat. u. amarum ordin.* PH. MIL. 152; — *balsamicum* '150; — besänftigendes 508; — *paregoricum* 508; — *pectorale (Regis Danias)* 153; *pectorale* PH. MIL. 153, PH. F. 412; — *robicans Whyttii* 501; — *e Succo Liquir.* PH. MIL. 153; — *viscerale (Hoffmanni, Kleinii p.p.)* 152; — *Vitrioli anglicanum s. Mynsichti* 496
ELLER antarthrit. Tropfen (b. asthen. Gicht, Cholera, Krämpfen p.p.) '656
ELLIOTSON *Int.* gg. Anschwellg d. Leber u. Milz 278; Pulv. gg. hartnäck.

Durchfall 147. — Dämpfe gg. Lungenaucht 139

Bluteraugen s. Hühneraugen

Bluterlehrinde 127

Embrocatio frigida PH. MIL. 43

Bumetis 153

Emplastrum album coctum 157; —

Anglicanum 154; — *Cantharidum*

Jänini 157; — *cephalicum* 159;

— *de Cicuta* 157; — *citrinum* 112,

PH. P. 112; — *Conii c. Ammonia-*

co 157; — *Cumini* PH. HANN.

'755; — *defensiv. rubr.* PH. HANN.

'332; — *Diachylon comp.* 159,

Diach. c. Gummatibus od. *gummo-*

sum 159, *Diach. simplex* 159; —

diaphoretic. Mynsichti 490; — *Eup-*

phorbi PH. AUSTR. 160; — *febrif-*

fug. v. GARDES 490; — *glutino-*

sum 154; — *griseum* PH. SLESV.

290; — *de Labdano* 155; — *de*

Lapide calamin. 290; — *Matris*

158; — *mercuriale* 158; — *Minii*

adustum 158; — *miraculosum* 159;

— *nigrum* 158; — *nigrum sulphu-*

rat. 159; — *Noricum* 158; — *Pi-*

cis liquidas '946; — *resolvens* 157;

— *Spermatie Ceti* 112; — *stoma-*

chicum 155; — *vesicatorium ordi-*

nar. 155; — *v. perpetuum* 157

Emser Wasser 61, I. 323

Emulsio Amygdalar. PH. HANN, SLESV.

47; *Amygd. comp.* '967; — *amy-*

gdalina 47; — *communis* 47, PH.

MIL. 47; — *guajacina* PH. SLESV.

422; — *oleosa* PH. MIL. '737

Euema foetidum PH. EDINB. '1051

Engelstusswurzel 403

Engelwurzel s. *Angelica*

Enula s. *Helenium*

Enzian s. *Gentiana rubra*

Erbrechen durch Fahren, Mittel dagg.

458; — b. Seekrankh., Pflast. dagg.

'334

Erdpäder 215

Erde, japanische 109

Erdgalle s. *Centaur. min.*

Erdpech, schlackiges 75

Erdrauch - Extract 178; - Kraut 235

Erdschlerling s. *Conium macul.*

Erdschwefel 442

Ergotin 405

Eruca. Sem.

Erweiterungs-Bougies od. - Kerzen 112

Eselienmilch 288

Eschkürbis - Extract od. - Saft 177

Essentia Terobinthinas 359

Essentiae 491

Essent. 527 ***)

Essig 12; concentrirter 14; destillirter 14

Essigäther 32; - Geist 453

Essigalcohol 19

Essige (Allgemeines) 12

Essiggeist, versäßter 453

Essigmolken 449, I. 317

Essignaptha 32

Essigrosen 201

Essigsäure 19; versäßte 453

Essigsalzmiak 296

Ethyl 31 *)

ETTMÜLLER Räucherq b. *Melancho-*

lia puerperatum 364

Euphorbium-Harz 159; - Tinctur 503

EVERS Pflaster b. Grind 40

Excremente z. desinficiren 37, 120

Extractum Catechu 109; — *cathob-*

icum 187; — *Cicutas* 176; — *Co-*

nii sicc. 176; — *Fellis* 191; —

Filicis resinosa 178; — *Hyoscy-*

ami sicc. 181; — *Ipecacuanhas*

153; — *Lactucae sativ.* 289; —

Liquiritiae 179; — *Malatis Ferri*

178; — *Martis cydonist.* 178;

Martis c. Succo Pomor. 178; —

panchymagogum 187; — *Satur-*

14; — *Thebaicum* 362

EYR Int. gg. Mundgeschwüre nach Se-

livation 282

Fabae Coffeae 439; — *Pechurim* 190

Fachinger Wasser 61

Faeces 165

Faecula 48

Faerherröthe 407

Falkkraut s. *Arnica*

FANTONETTI Ext. gg. Krätze 119

Farfara. Flor. — *Fol.*

Farina Fabarum 190; — *Semina Li-*

ni 442; *Sem. Sinapis* 445

Farnkraut s. *Filix.* — - Öl 178

Faulbaumrinde 139

- FAURE** Ersatz d. Copaivabals. 489
FATERMAN *Int.* b. Hydrophobie 15
FEHR Mixt. b. Rhachitis '762. — Waschg
 b. Arthritis '11
Feigen, trockne 106
Feldkümmel s. *Serpyllum*
Feldmohnblumenblätter 200
Feldpappel 204
Feldpolei s. *Serpyllum*
FELS antisypilit. Decoct '892
Felsensalz 280
Fenchel s. *Foenicul.* — Fenchelholz 295
FENG Mixt. b. Wassers. nach Scharlach
 '922
Ferdinandsbrunn (Marienb.) 60
Fermentum Panis 446
FERRARI. Moxen 282
Ferrum alcoholisatum 194; — *ammo-*
 niacale 46; — *carbonatum* 218;
 — *carbonicum* 193; — *muriati-*
 cum 192, 193; *m. rubrum* 192; —
 permuriaticum 192; — *potabile*
 Willisii 484; — *purum limatum*
 194; — *subcarbonicum* 193; —
 sulphuricum venale 195; — *tarta-*
 risatum 484
Feuerschwamm 87
Fichten-Harz 423; — -Sprossen 515;
 — Tinctur, zusammenges. 512
Ficus passae 106
Fieberklee s. *Trifolium fibr.*
Fieberrynde, graue 127
Fila Ferri praeparata 194
Filix. Rad.; *Extr. F. aether.*
Fingerhut s. *Digitalis*
Finnen, Salbe dagg. '1104 (WETZLER),
 Waschw. '105 (HERRMANN)
Fischbein, weisses 365
FISCHER *Int.* gg. org. Übel d. Prostata
 u. Harnröhre 44. — Mundw. b. rheu-
 mat. Zahnschmerz '464; Gurgelw. b.
 Rachenschankern 193; Klyst. b. Ischu-
 rie 229; Bähg gg. chron. Augenlie-
 derkrampf 504; Tropfw. b. Augen-
 blennorrhöen 118, Verschlüssg d. Pu-
 pille z. verhüten 171; Einrbg b. scro-
 ful. Lichtscheu u. Augenliederkrampf
 171; Salbe b. scroful. Augenliederdrü-
 sen - Entzündg '552, gg. Verknotung
 od. Verhärtg d. Augenliederandes 265,
 gg. Hagelkörner 279, b. Hydrophthal-
 mie 518; Grindaalbe 256. — Eto.
Fischleim 268
Flavido Cortic. Aurantior. 138; —
 Cort. Citri 135
Flechte, Isländische 291
FLEISCH. Klyst. gg. Askariden 225
Fleischköhle 103
Flecke, syphilit., im Gesicht. *Ext.* dagg.
 458 Z. 1
Flleder s. *Sambuc.*; — -Milch 201
Fliegen, spanische s. *Cantharides*
Flöhe (Mittel gg.) 202, 241
Flohkraut s. *Pulegium*
Flöhsamen 444
Flores Arsenici 71; — *Balaustiorum*
 199; — *Benzoës* 20; — *Cyani* L.
 195; — *Humuli* 464; — *Lilii con-*
 vallii 199; — *Lapuli* 464; — *Mal-*
 vae rubrae 199 - 200, *M. silvestris*
 200; — *Naphae* 198; — *Paeonias*
 L. 195; — *Papaveris erratici* od.
 Rhoeados 200; — *Salis Ammoniaci*
 martiales 46; — *Spicae* 199; —
 Sulphuris comp. 35; *Sulph. loti*
 470; — *Viridis Aeris* 145; —
 Zinci 532
Foeniculum. Sem.; *Ol.*; *Aq.*; *Syr.*
 — *aquaticum. Sem.* 444
Foeni Gracum. Sem.
Folia Acastosae L. 168; '824; — *Acri-*
 folii, Agrifolii od. *Aquifolii* 203; —
 — *Argenti* 69; — *Auri* 76; —
 Buccae, Buchu od. *Diosmae crena-*
 tae 202; — *Rhois radicans* od.
 Toxicodendri 209
Fomentationen, kältemachende 91, 280,
 L368; *Foment. frig.* P.B. HANN. 280
Fontanellsalbe '530
Formicae; *Spir.*; *Tinct.*
FOURCROY Einspritz. h. Harnsteinen 23
FOWLER Tropf. b. Wassers. u. Dysurie
 '426; Arsenikaussüßung 450
Fracturen, unbewegl. Verbandapparat b.
 366
FRAENKEL Einreibg b. eingeklemmt.
 Brüchen 171
FRAHM Terpenthin - od. Verband - Bal-
 sam '1046
FRANK (L.) gg. Wechselfieber 373;

- künstl. abführend. Mineralw. 308
FRANK (P.) Pulv. gg. chron. Diarrhöe 390; Pillen gg. gichtische Kachexie u. chron. Hautausschläge '560; Mixt. b. Amenorrhöe '705, gg. Wechselstieber '293. — Salbe gg. Sommersprossen, Leberflecke '972; Katapl. gg. Erbgrind '462. — Etc.
FRANK (in Montpellier) Int. b. traum. Verletzungen 485
FRANK (in Posen) Mixt. gg. Wechselstieber '106
Fransbrautwein 461
Fransensbrunn (Eger) 60
Franzosenholz s. Lign. Guajaci
Franzosenalbe 517
Franswein, rother 528; weisser 527
Frauen-Haar 230; -Syrup 477
Freisamkraut 247
FREYBERG Ext. gg. *Condylomata lata* '527; *Pneumatokatharterion* '254
FRICKE Behandl. d. Syphilis ohne Mercur 309; Mixt. b. secundär. Syphilis '984, b. Tripper in d. Entzündungsperiode 59, gg. Nachtripper '152; Tropf. gg. *dolores osteocopi* 466. — Ext. b. tiefen, lange dauernden Geschwüren 110; Inject. b. Uterinblennorrhöe 457; Bäder b. syphilit. Ausschlägen 255, 458; Verbandw. b. schwammigen primären Schankern 148; schwarze Verbandsalbe b. Schankern '124; zum Betupfen syphilit. Flecke im Gesicht 458
FRIEDRICH Int. gg. Mundfäule, Leukorrhöe, Nachtripper '568
FRITSCH Int. gg. Veitstanz 385
FRITZE Krätzsalbe '1082
Fronde Sabinas 242
Fructus Anisi stellati 436; — *Aurantior. immaturi* 377; — *Colocynthis* 377; — *Cydoniae* 178; — *Lauri* 77; — *Mali* 376; — *Momordicae* 177; — *Ribis nigri* 78; — *Tamurindorum* 481
Frumentum. Spir.
Fucus crispus s. Irland. 290
Fuligo (splendens); Tinct.
Fumria. Hb.; Extr.
Fumigationes Chlorig. od. Guyton-Morveauianae 211
Fungin 435
FUNK Int. gg. Wechselstieberrückfall 383
Fusschweisse, übelriech., Streupulv. dagg. 194
Gährbad 216
Gährungsluft 214
Gänsefuss, mechan. 231
Gänsepappel 204
Gätscht 113
Galanga. Rad.; Tinct.
Galbanum. G. depur.; Tinct.; Ol.; Empl. de Galb. crocatum
Galeopsis grandifl. Hb. G. g. c. Florb.
Galgant s. Galanga
Galipot 423
Galläpfel 213
Gallitenstein 530
Galmel 289
GARDES. Empl. febrifugum 490
Gargarisma sodatio. SWEDIAUR. 185
Garöfel 389
Garten-Brunn (Karlsbad) 61; — -Lettig 288; — -Raute s. *Ruta*; — -Salz 288, I. 168; — -Schnecke 225; — -Thymian s. *Thymus*
Gas Acidi oxymuriatici 217; — *calcereum* 214; — *Chlori* 217; — *Cretae* 214; — *hydrsulphuratum* 217; — *kohlensaures* 214; — *mephiticum* od. *Musti* 214; — *oxydirt-saures* 217; — *salzsaures* 216; — *sylvestre* 214; — *vinosum* 214
GEBEL Int. u. Klyst. gg. Cholera '110, '111
GEDDINGS Gurgelw. b. *Mercurialisivation* 360
Geigenharz 124
GEIGER (Litt.) 2
Geister 453
Gelatina Cornu Cervi PH. SLESV. '270;
 — *Lichen Iold. PH. HANN.* '632;
 — *L. amar. u. edulcorata PH. SLESV.* '633
Gemmae Abietis 515; — *Pini* 515; — *Populi* 203
GENDRIN Int. gg. Bleikolik 36
Genista. Hb.
Gentiana rubra. Rad.; Extr.; Tinct.
Geoffröenrinde 135

GEORGE Waschb. Pollutionen 96; Streupulv. b. Pockenpusteln 290
 Georgenbrunn (Eilsen) 61
 Gerberlobe 139 Z. 4 y. u.
 Gerbstoff als Gegengift 542*)
 GERHARD (W. W.) endermat. Purgans 176
 Germerwurzel, weisse 395
 GERSON Verbandw. b. Hospitalbrand 24
 Gerste, gerollte od. geschälte 441; —
 - Graupen 441; - Kraftmehl 190;
 - Malz 310; - Mehl 190; - Schleim 558; - Schokolade 437
 Gestank tilgende Mittel vgl. Desinficirg u. Excremente, auch I. 391
 Gesundheitschokolade 437
 Getränke, geistige, Surrogat '638
 Gewächsalcali 274
 Gewürz, englisches 436; — - Essig 13;
 - Nägelein od. Nelken 107; - Schokolade 437; - Tinctur 496, saure 496
 Gichtbeeren 78
 Gichtrose 206; - Samen 443; - Wurzel 402
 Gichttrübe 387
 Giesshübel 61
 Giftlatti-Extract 182; - Kraut 237
 Giftmehl 71
 Giftumach-Blätter 209; - Tinctur 514
 Giftwurzel 387
 Gilbwurzel 391
 GIMBERNAT Tropfw. gg. Hornhautflecke 277
 GIRTANNER Inject. gg. Nachtripper '4
 Glanzruss 211
 GLAUBER. *Sal mirabile* 330; *Tinct. Martis aperitiva* 504
 Glaubersalz, getrocknetes 331; gereinigt. 330; rohes 330; verwittert. 331
 Glaubersalzwasser 61
 Globuli martiales s. *Tart. martiati* 218
 Gluten, animale 124
 Glycion 393
 Glycyrrhiza. *Rad.*; *Succ. Gl. depur.*; *Extr.*; *Syr.*; *Pasta*; *Pulv. Gl. comp.*; *Elixir o Succo Gl.*
 Gnadenkraut s. *Gratiola*
 GÖLLS. Pulv. b. hitziger Hirnhöhlenwassersucht 234, b. Keuchhusten '695.
 — *Extr.* gg. Keuchhusten 387

GÖTZE Mixt. gg. Bleikolik '65
 GOLA Pulv. gg. Wechselfieber '1032
 Gold, metallisches 75; — - Glätte 306;
 — - Oxyd-Natron, saures 76; —
 - Pulver 75; — - Schwefel 472; —
 - Wurzel s. *Chelidon. maj.*
 GONDRET ätz. Ammoniaksalbe 299
 Gottesgnaden s. *Gratiola*
 GOULARD. Bleiwasser 68; Bleicerat 522
 GRÄFE (V.) Mixt. gg. Amaurose u. Cataract '483. — Augentwasser b. Blennorrhöen 70, 229, '541 (schwarzes Augentw.), '1110 (auch b. torpiden Augentzündgn), gg. versch. atonische Zustände d. Auges 209; Pinselg b. Hornhautflecken 299; reizend. Augendampfmittel '651; Salbe b. Augenblennorrhöen u. chron. Conjunctivitis (auch b. hartnäck. Gonorrhöen) '123, b. Photophobie u. schmerz. Augenentzündgn '1081, gg. Excoriation d. Wangen b. Augenentzündgn 315, gg. schwierige Flechten '497; *Ungt. corrosivum s. escharoticum* '531; Umschlag b. Hydrocele v. Kindern 44; aromat. Baumwolle b. aufgesetzten Nasen 97
Graisse résolutive d. Hôtel-Dieu '546
 Gramen. *Rad.*; *Extr.*; *Extr. Gr. liq.*
 Grana Sago 426
 Granat s. *Granatum*
 Granatölöl 346
Granatum. Cort. Pom. Gr.; — *Cort. Rad. Gr.*; — *Flor.*
 Granuliren 2*)
 Graswurzel s. *Gramen*
Gratiola. Hb.; *Extr.* — *Rad.*
 Graubraunsteinerz 311
 Graupenschleim
 GREENHOW Salbe b. Verbrenngn 360
 Griechisch - Heu - Samen 441
 GRIFFITH. *Mixt. antihetica* '417. — Schnupfpulv. gg. Nasenbluten '74
 GRILLE Salbe b. Grind, Flechten, Krätze, Schankern 311
 Grindwurzel 402
 Grinseng s. *Millefol.*
 GRÖTZNER Salbe b. Verhärtn p. p. 76
 Grünspan 30; destill., gereinigt., krystallis. 145; — - Cerat 111; - Liniment

- 295; - Salbe 516; - Sauerhonig 295
Grutum Avenae 436
 Guajacin 422
Guajacum. Lign.; Extr. G. Ligni; Tinct. G. Ligni; Resina Ligni G. — Resina G. nativa; Tinct. G. Resinae; Tinct. G. ammoniata; Sapo guajacinus
 Guajakharzeife 432
 GÜNTHER gg. beginn, Bräune 512 Z. 1
 GUERARD gg. *Tinea favosa* 352
 GUERIN Tropfw. gg. Hornhautflecke 298
 Gürtelkraut 227
Gummata ferulacea 221
Gummi Acaciae 219; — *Ammoniac. dep.* 40; — *Arabicum* 219; vgl. *Gm. Mimos.*; — *Gambianse* 287; — *Guttas* 223; — *Senegal* 219
Gummi Mimosae; Mucil. G. M.; Pasta gummosa; Pulv. gummos.
 Gummi-Bonbons 219; - Harze 220; - Paste 369
 GUMPRECHT Pulv. gg. Keuchhusten 182
 Gundel-Rebe od. - Rüben 237
 Gundermannkraut 237
 Gurken 144
 GUTHRIE Salbe b. Auger''ennorrhöen u. chron. Conjunctivit. '123
Guttas febrifugae Fowleri 450
 Haare. Mittel gg. d. Ausfallen ders.: Pomaden '295 (AUBERGIER), '361, Waschn '174, b. Ausfallen nach syphilit. Ausschlägen '1054, '1055. — Gg. d. Grauwerden ders. 355. — D. Wachsen ders. u. befördern 346, '361. — Wegzuschaffen: 75 (AUGUSTIN), 328 (MERKEL)
 HAASE Pulv. b. *Crusta lact.* '432, '493, '1010; Mixt. gg. faulige Ruhr, Diarrhöe nach Typhus, Faulfieber 293. — Waschn b. *Crusta lact.* 93, 283
 HACKER Tropf. b. acuter Gicht 254
 Hämatin, Hämatoxylin 293
 HAEN (DE) Pulv. gg. colliquative Nachtschweisse 87
 Hafer, geschälter 436; — Grütze 436, - Grütz-Schleim 436; — Kümmel 440; — Schleim 436
 HAGEN (V.) Linct. gg. Croup '1015
 HAHNEMANN's auflösl. Quecksilb. 266
 HALLER's saures Elixir 316
 Hammeltalg 435
 HANAY Pustel-Salbe u. - Wasser '1041
 HANDEL. Anodyne Zahnlatw. '789
 HANDSCHUCH Ext. b. Hodenverhärtg nach unterdrückt. Tripper 277
 Hanseamen 437
 HARGENS. Tropfw. b. Hornhautfleck. 59
 Harlemer Öl 361
 HARLESS Waschg gg. Krätze 531; Linim. b. wunden Brustwarzen '172; Ext. Salbe b. Gesicht- u. Lippen-Geschwür '128. — Etc.
 Harz, burgundisches, gelbes, gemein. od. weisses 423; Salbe v. b. H. 522
 Harze 420
 Harseifen 420
 Haselwurzel 385; - Kraut 238
 Hasenpappel 204
 HAUFF Bad b. falschem Wehen 205
 Haubechelwurzel 402
 Hausenblase 268
 Haus-Klystiere 350; - Lauch L. 168, Kleiner 244; - Seife 430; - Syrup 480; - Wurz, kleine 244
 Haut, aufgesprungene, Mittel dagg.: Cerate 112, '201; Salbe '203; Waschg 455 — , rothe a. Blutwurstarne — , spröde, Mittel dagg.: Cerat 112; Waschnpulv. 213, '443; Waschw. '105
 Hautflecke nach Scorbut. Ext. dagg. 246 — , rothe. Ext. dagg. 244
 HEADLEY Gurgelw. b. brandiger Bräune 210
 HEBER Linim. b. schmerz. syphilit. Pusteln '1074
 HEBERDEN Waschg b. *Phthiriasis* alter Leute '780
Hedera terrestris. Hb.
 Hefe 48; vgl. *Ferment. Cerevis.*
 Hefensyrup 192
 Heftpflaster 154; engl. 154; gelbes 112
 HEGEWISCH. Krätzesalbe 530
 Heiligegeistwurzel 382
 Heilpflaster 157
 HEIM. Pulv. gg. Pyrosis '217; auflösende Pillen '445; Pillen b. Asthma '346, b. Husten, krampfhaftem Asthma '860, b. Krampfhusten '378, b. Wassersucht '903, b. Wassersucht mit Hartleibig-

keit '904, mit Durchfall '905, b. Brustwassersucht '906; gewöhnliche abführende Pillen '342, stärker abführende '345, Purgirpillen für Hypochondristen '344; Latw. b. habitueller Hartleibigkeit '330; Abführmixtur '343, desgl. f. sensible Personen, Damen '331; Mixt. gg. chron. Unterleibverstopfungen 502, gg. Herpes 306, '834, b. Gonorrhöe 84, b. Hysterie mit Dysmenorrhöe '112. — Mundwasser gg. Brennen d. Mundhöhle 53; Einreibg zur Erregung des Stuhlgangs, zur Zertheilung geschwollener Drüsen 502
HEINEKEN Pulv. b. Wassers. 177
Helenium. Rad.; Extr.; Tinct.
Helleborus albus. Rad.; Tinct. — Feratrinum
— niger. Rad.; Extr.
HELLER gg. *Vomitus gravidarum* 495
HELLING Augenitzmittel '43^l
HELLMUND Ext. gg. Krebs '126
HELMENSTREIT (KNOD V.) Int. gg. hartnäck. Rheumatismen, Kreuz-, Hüft-, Gesichts-Schmerz 282
HENNING Pulv. gg. nervöse Magenleiden, Dysmenorrhöe 532
HENRY. Zahnkitt '680; Inject. b. Nachtripper 531
HENSCHEL Int. gg. Nachtripper '140, '149, '414; Trochiscen b. üblem Mundgeruch '80. — Linim. b. Frostbeulen '1073. — Etc.
HENSER. Ext. b. zurückgetretenem Friesel '525
Hepar Antimonii calcareum 93; — *Calcis* 92; — *Sulphuris alcalinum* 282; *S. calcareum* 92; *S. salinum* 282; *S. volatile* 301; *S. vulgare* 282
Herba Anthos 241; — *Beccabungae* L. 168, '461; — *Bismalvae* 228; — *Botryos Mexicanae* 231; — *Cerefolii* L. 168; — *Cerefolii Hispan.* 244; — *Cicutae (terrestris s. vulgar.)* 232; — *Flammulae Jovis* 231; — *Galeopsidis ochroleuc.* 236; — *Jaceae* 247; — *Lysimachiae purpur.* 243; — *Nasturtii aquat. s. Nast. aq.*; — *Rorismarini sylvestr.* 237; — *Sedä major.* L. 168, *S. minoris* 244; —

Sempervivi L. 168, *S. minoris* 244; — *Tabaci* 204; — *Trifolii aquatici* 246; — *Urticae minor.* 246
Herbae 226
HERKENRATH Pillen gg. Veitstanz 532
HERBSTÄDT China-Auszüge 130
HERMES Verbandw. b. Wasserkrebs 329
HERRMANN Einspr. b. Eiterung u. Caries im Gehörgang 70; Waschw. gg. Finnen u. spröde Haut '105
HEUN Thee b. hyster. Krämpfen 385
Hexenmehl 442
HEYFELDER Meth. gg. Krätze 431
HICKMAN Ext. b. *Naevus vascular.* 487
HILDEBRAND Ext. b. Blattern 455
HILDENBRAND (V.) Int. gg. Epilepsie 385; Pulv. gg. *Lichen leproïd.* 218, gg. *Mercurialkachexie* 470, gg. Säuerzittern 363; Tisane gg. chron. Gelenkschmerzen 529; Tropfen b. Brustwassers. 503. — Einreibg gg. *Gastrodynie* 296. — Etc.
Himbeeren s. *Rubus Idaeus*
HIMLY Pulv. b. katarrhal. Heiserkeit 470, '1002; Kaumittel b. Neigg z. Anginen 95. — *Spirit. ophthalm.* '746; Tropfw. gg. Hornhautverdunkelung 275; Salbe gg. *Erythema arthrit.* 518; Quecksilbereinreibg ums Auge 267; Eisenbad 196
Himmelbrand s. *Verbascum*
Hippocastanum. Cort. — Fruct. H. tosti
Hirschhorn 126; weissgebranntes 126, schwarzgebranntes 126; — Geist, bernsteinsaurer 302, rectificirter 298; — Öl 341, rectific. 340; — Salz 43
Hitzblätterchen, Waschw. dagg. 88
Hüllenstein 71
HOFFMANN (FR.) Myrrhenzucker b. Schleimschwinden. 183; *Pilulae majores* '507; *Liq. anodyn. mineral.* 459; Magenelixir s. *Eliz. Aurant. comp.*
HOFFMANN Ätzm. b. Milzbrandcarbunkel 22
Hoffmannstropfen 459
Hohlzahn (gelber, grossblüth.) 236
Holunder s. *Sambucus*
Holz-Essig 26; — Säure, rectificirte 26; rohe 26; — Thee 451
Honig 313, 314 (mehrere Artikel)

Honigkleekraut 238

HOPE Mixt. gg. orient. Cholera '986

Hopfen s. *Lupulus*; spanischer s. *Origan. cretic.*

Hordeum. Farina; Farina H. ppt. — Sem. H. excoct.; *Malthum Hord.*

— *mundatum* od. *perlatum* 441

— *praeparatum* 190

HORN Int. b. Wassers. '467, 503, gg. hartnäck. Wechselfieber 129, gg. Blasenlähmung nach Niederkunft '485; Pulv. b. *Pneumonia athen.* '16; Mixt. b. typhösen Fiebern '419; Tropf. gg. Lähmungen '769, b. chron. Rheumatismen 341, b. Prosopalgie-Paroxysmen 340. — Inject. b. Nachtripper '505; Verbandw. gg. Schanker 252; Salben gg. Condylome 242, '661; Krätzsalbe '1088; reizendes Katapl. 90. — Etc.

HOSPITAL Krätzsalbe '263

Hôtel-Dieu z. Paris: *Graisse résolvative* '546

Humalies u. *Huanuco* (China) 128

HUC Schnupfp. b. intermitt. Kopfschmerz 116

Hühneraugen, Pflast. dagg. 111, '48

Hühnereier 365

Hülsenblätter 203

Hüttenrauch 71

HUFELAND 2 (Litt.). — Int. gg. Wechselfieber 136, 386, '799; anti-syphilit. Heilmeth. 256; Pulv. b. chron. Leber- u. Milzleiden, auch Krampfkrankh. 386, b. Brustwassers. '379; Mixt. b. Ruhr '383, b. Kropf '226, '709, diuretische b. Wassers. 377, b. Husten '115; Tropf. b. Melancholie u. Manie '348, z. Prophylax. gg. Scharlach 170, b. Krämpfen d. Schlundes u. Darmcanales, chron. Erbrechen, beginn. Magenverhärtgn, Gemüthskrankh. 170, b. chron. Erbrechen '1050, gg. Rest d. Hüftwehs '1061; Tinct. b. Strangurien kleiner Kinder '968; Theeb. entzündl. Tripper '961; Ersatz d. *Pulpa Tamar.* 483; nährend-belebendes Getränk 557. — Zahnpulv. '286; Linim. gg. Hornhautverdunkeln 267; Bähung b. scroful.

u. a. chron. Ophthalmien u. Empfindlichkeit, Lichtschau 514; Frostsalbe 88; Salbe gg. Mesenterialschrofen '202, b. wunden Brustwarzen, eiternd. Flechten, Ueberresten d. Krätze '1103, gg. Krätze kleiner Kinder '848; Eiarbg b. Flechten 353; Waschg gg. Leberflecke, Hitzblättchen, rothe Nasend. — Damen 88. — Etc.

Huflattig s. *Farfara*

Hundskürbis 387

Hundstungenwurzel 391

Hungercur 520

HUNNIUS. Infusion b. soporösen Zustand 97

Hustenkügelchen 515

Hydrargyrum Borussic. od. *cyanatum* od. *cyanicum* 252; — *sulphuratum rubrum* 123; — *zooticum* s. *zootenic.* 252

Hydras ferricus 193; — *calicus* 276, *k. fusus* 276; — *natricus sicc.* 327

Hydrobromas Potassae 278

Hydrochloras ammonicus crudus 43, *depurat.* 44; *H. a. c. Oxyde hydrargyr.* 250; *H. a. c. Sesquichlorato Ferri* 46; — *morphicus* 319; *quinicus* 115; — *strychnicus* 466

Hydroödas calicus 278

Hydrosulphuretum ammonicum 301

— *Ammonii liquidum* 301

Hydrothionsäure 217; flüssige 58

Hydrothion - Schwefelammoniak 301

Hyoseyamua. Fol.; Extr.; Ol. H. coct.; Tinct.; Empl. — Sem.; Extr. H. Sem.; Tinct. H. (Sem.)

Hypericum. Hb.; Ol. H. coct.

Hyssopus. Hb.; Aq. (49)

Jacea. Hb. 247

JADELOT Augensoment '312; Krätzsiment '609

JÄGER (Fr.) Int. gg. Pannus '911, b.

— Eiarreibg b. torpid. Zuständen d. Auges 316

Jaŕn (China) 128

JAHN Bissen b. Drüsenverhärtgn '602; Pillen b. Gesichtsschmerz '367, b. Lungen sucht, Blatpeien, Metrorrhagie '812; Mixt. b. pituitöser Lungen sucht '469, b. Ruhr '861, b. galligen Bahren

- u. Durchfällen '357, bei Metrorrhagie '1063, b. Milchborke, Grind '494
JAHN (jun.) Pulv. b. Gehirnwassers. d. Kinder '567. — Augenw. b. chron. Ophthalmien 77; Salbe b. Eierstockwassers. 270; Verbandw. b. syphilit. Geschwüren u. Auswüchsen 77
Jalapa. Rad.; *Tinct. J. Rad.*; *Resina*; *Resina J. ppt.*; *Tinct. J. Resin.*; *Sapo jalapin.*; *Pilulae Jal.*
 Jalappenhart 423; -Seife 432
JAMES Pillen b. Dyspepsie, Stuhlverstopf 398
JANIN Augenwasser b. *Hypopyon* p. p. '420, b. Gerstenkörnern p. p. '430; Augenbalsam '501
JASSER Krätzsalbe '1087
IDELER Latw. gg. Epilepsie '564. Infusion desgl. 466
Ilex Aquifolium. Fol.
Imperatoria. Rad.
 Indig, Indigo 268
Infusum Chinae c. Magn. usta PH. HANN. 131; — *Ipecacuanh.* PH. HANN. '872; — *Juniperi* PH. MIL. 77; — *laxativ.* PH. P. '565; *laxat. Mannagettas s. Viennense* 269; — *Martis vinosum* 529; — *Rhei kalium* 512; — *Sennae comp.* PH. MIL. '566
 Ingber, Ingwer s. *Zingiber*
 Insecten im Ohr zu tödten 343
 Inulin 395
 Iod, Iodine s. *Iodum*; — -Kallum 278; — Mineralwasser 270
Iodetum Kali 278
Iodum; *Tinct.* — *Kali hydroiod.*; *Ungt. K. h.*
JÖRG *Ext.* b. Keuchhusten 487, b. wunden Brustwarzen '155
 Johannisbeeren 78; schwarze 78
 Johannisbrod 450
 Johanniskraut 237; -Wurzel 392
Ipecacuanha. Rad.; *Syr.*; *Trochisci*; *Pulv. Ip. opiatum*; — *Emetina*
Iris Florentina. Rad.
ITARD Fumigat. b. Otalgie 459
ITH saure Fußbäder '29
 Judenpech 75
JÜNGKEN Augenpulver gg. adynam. Hornhauttrübgn '540, '991; Augenwasser desgl. '103, b. Schwäche u. Empfindlichkeit d. Augen nach Entzündgn 535, b. ägypt. Ophthalmale 118; Salbe b. scroful. Augenliederdrüsenentzündg u. b. katarthal. Augenblennorrhöe '552; Einreibungen ums Auge 171, 364; Einspritz. u. Wiederherstellg d. Trippers 487
Juglans. Nuclei J. immaturae; *Extir. J. Nucum*; *Succ. Nucum insp.* — *Cort. Nucum J. viridis.* — *Ol. Nucum J.*
Jalapum moschat. PH. HANN. '698
Julep e Camphora 315
 Jungfern-Honig 314; -Milch 497
Juniperus. Baccas; *Ol. J. Bacc.*; *Aq. Bacc. J. 49*; *Spir. J.*; *Succ. J. insp.* — *Lign.*
 Kablianthran 352
 Kaddigbeeren 77
 Kälber-Laab 464; -Kropfkraut 231
KÄMPFF. „Rothe-Backen-Pillen“ '416. Visceralalkystiere 417, '457, '923
 Käsepappelkraut 204
 Kaffeebohnen 439
KAHLEIS Mixt. gg. Bandwurm 178
 Kaiserwurzel 397
 Kakao s. *Cacao*
Kali ammoniato-tartaricum 481; — *bioxalicum* 367; — bromwasserstoffsaures 278; — *carbonicum crystallizat. s. neutrale s. perfecte saturat.* 273; — *chloricum dep.* 281; — *chlorsaures* 281; — *essigsaures* 272; — *hyperoxygenirt-salzsaur.* 281; — *iodwasserstoffsaur.* 278; — *kohlensaur.* a. Potasche 274, a. Weinstein 274; *koblens., unreines* 273; *kohlens., saures* 273; — *mildes* 274; *muraticum hyperoxygenat. (oxygenat.) depur.* 281; — *natronato-tartaric.* 484; — *nitricum crud.* 280; *oxydirt-salzsaur.* 281; — *purum mito* 274; — *salpetersaur.* 280; — *sauerkleesaur., saures* 367; — *schwefelsaur.* 285, *saures* 284; — *subcarbonic.* 274; — *tartaricum acidulum* 483; *t. ferratum* 484; *t. natronatum* 484; — *weinsteinsaures, neutral.* 285, *saures* 483
 Kali-Flüssigkeit, essigsaure 304; köh-

- lensaure 304; -Metall 287
Kalium iodatum 278
Kaliumoxydhydrat 276
 Kalk, chlorichtsaure mit etc. 117; ge-
 brannter 93; gelöschter 93; geschwe-
 felter 92; oxydirt-salzsaurer 117;
 salzsaurer 91. — Kalk-Öl 91; -Schwe-
 felleber 92; -Wasser 53
Kalmus s. Calamus
Kamillen (gemeine) s. Chamomilla vul-
gar.; — edle od. römische 198
 Kaneel 124; weisser 101
 Karbe 438
 Karlsbader Salz 427
 — Wasser 61, '716, I. 323
 Kartoffelbranntwein 461
 Kataplasmen, gährende 216
 Kathartin 207
 Katzen-Klase 204; -Kraut 238; -Kräut-
 lein 244; -Wurzel 417
 KAUSCH Digestivpulver '432
 KEATE Foment b. Hydrocele '95
 Keller-Aseln od. -Esel 315; -Hals-Rinde
 136; -Würmer 315
 KERKSIG Krätzsalbe 86
Kermes mineralis 473
 KERNDL. *Cataplasma acre* 90
 Kerzen, Blei- 112; — einfache 112
 Kesselbrunn (Ems) 61, I. 323
 Kiefersproussen 515
 Kindespulver 380; vgl. *Pulv. Pueror. u.*
Pulv. (pro) Infant.
 Kinin 115; -Salze 115
Kino; Tinct.
 Kirschen s. *Cerasa*
 Kirsch-Geist 461; -Lorbeer-Blätter 204,
 -Wasser 58; Kirsch- u. Mandel-Was-
 ser 54; -Wasser 54, Baseler 461
 Kissinger Ragozi 61
 Klapperrosen 200
 KLAPROTH. Künstl. Karlsbader Wasser
 '716; äther. essig. Eisentinctur 503
 Klatschrosen 200; -Syrup 479
 Klebepflaster 154
 Kleiderläuse, Mittel dagg. 321, 445
 KLEIN *Solamen hypochondriacorum* '614
 KLEIN (V.) Streupulv. b. veraltetem Pro-
 laps. ani 125
 Klettenwurzel 385
 Klopfpulver 442
 KLOSE Mixt. gg. Epilepsie 190
 KLUGE Behandlg. d. Syphilis ohne Mer-
 cur 309. — *Exst.* b. syphilit. Con-
 dylomen '526, gg. Aphthen, auch gg.
 wund.Brustwarzen '490, b. Schwämm-
 chen d. Säuglinge '173; Badespirit. '767
 Klystiere, gewöhnh. eröffnende 314, 350
 KNESCHKE Salben b. Hornhaut-Trü-
 bungen u. -Geschwüren 250; Tropfw.
 gg. Cataract 509
 Knoblauch 90; -Milch 90
 Knochen-Asche 126; -Kohle 126; -Mark
 313; -Öl 341; -Säure 25
 KNOD s. HELMENSTREIT
 KNOX gg. Bandwurm 359
 KOCH (C. A. L.) Einrbg b. rheumat. An-
 genentzündgn u. beginn. Cataract 318
 Kochsalz 327; -Wasser 61
 KOECHLIN *Int.* b. Syphil. m. Scorbut 23
 KÖHLER Einspritzg in Lymph- u. Balg-
 Geschwülste, kalte Abscesse, Fistel-
 geschwüre 487
 Kölnisches Wasser 55
 KÖNIG Mixt. b. Torpor d. Nieren '1052
 Königs-Chinarinde 133; -Kerze s. *For-*
bascum; -Salbe 516
 Körbel I. 168; spanischer s. *Scandix*
odor.; wilder 231
 Körnerlack 507
 Kohlbaumrinde 135
 Kohle, thierische 103; vegetab., präp. 104
 Kohlensäure (Gas) 214
 Kohlenschokolade 104, '218
 Koloquinten s. *Colocynthis*
 Kolombo s. *Colombo*
 Kopfläuse, Mittel dagg.: I. 223 *sub b*),
 II. 250, 373, 522, '54
 KOPP *Int.* b. passiven Hämorrhagien,
 Leukorrhöe, bösartigen Verhärtgn u.
 Geschwüren, Flechten-Cachexie 193,
 gg. Blutfl. u. Ausdehn d. Uterus 242,
 s. Verstärk. d. Wehen 88, b. hefti-
 gen Neuralgien 193; Pulv. gg. Ma-
 genschwäche, Anorexie 116, b. chron.
 Übelkt u. Vomiturit. '163, b. Keuch-
 husten '136, '831; Linct. b. katarrhal.
 od. gemildert entzündl. Brustzafälle
 v. Säuglingen '1006; Mixt. gg. aton.
 Dysmenorrhöe '487; Tropf. b. Dy-
 surie '426, b. paralyt. Enuresis 498.

- Mundw. b. hirtzsch. Speichelfluss 325; Gurgelw. gg. chron. Anginen 242; Painsaft b. Mundfäule 118; Klyst. b. heftigen Ruhen u. Diarrhöen 513, gg. Askariden 514, desgl. u. gg. Hämorrhoidalbeschwerden im Mastdarm; Verdickung desselb. 539; Inject. (Schwamm) b. Leukorrhöe, Erschlaffg u. Vorfall d. Vagina 393; Bähg gg. scroful. Ophthalmien, geschwächtes Sehvermögen nach Anstrengn 504; Pflast. b. Gebärmutter-Atonie u. -Blutfl. 357; Pustelsalbe 498; Bäder b. hartnäck. Gicht 255, b. localer Gicht 528, b. scroful. Hand- u. Fuss-Geschwüren 119, Linim. b. Herpes, Erbsgrind 119
- Koriandersamen 440
Korigeen 290
 Korinthen 368
 Korn-Blumen L. 195; -Branntwein 460; -Rosen 200
- KORTUM Bissen b. Drüsenverhärtgn 602
 Krähenaugen s. *Nuces Vomicae*
 Krähchen (Ems) 61
 Krätzsalbe, englische 1080, der PH. BOR. 523, d. PH. GALL. 1089, d. PH. HANN. 1087, 1080, d. PH. LOND. 1090, d. PH. MIL. 1088, d. PH. SLESV. 1087, 1090
- Kräuter, aromatische 226
 Kraftmehl 45
 KRANZ Augenpulv. gg. Leukome 724
 Krappwurzel 407
 KRAUS Tropf. v. Auflö. v. Gallensteinen 351. — *Ext.* b. Neuralgien 59
- Krautseminze s. *Mentha crispa*
 Krezom - Schokolade 437
 Krebs-Augen od. -Steine 289
 Kreen v. *Armoracia*
 Kreide, weisse 143; — -Luft 214
 Kreidnelken 107
 Kreesot 141, -Wasser 142
 Kreuz-Beeren 480; -Blume, bittere 240, deutsche od. gemeine 240; -Brunn (Marienbad) 61; -Dornbeeren 480, -Syrup 480; -Kümmel 440
- KREYSIG *Int.* b. Krampfsucht 417
 KRICHOW *Int.* gg. Wechselfieber 46
 KRIMER *Int.* b. gefährl. Hämorrhagien 411, gg. Wechselfieber 373. — Augenw. gg. Eisensplitt 23; Dämpfe b. Brustkrankh. 58
- Kron-China 128; -Kümmel 440
 KRÜGER-HANSEN Salbe b. Croup 543
 KRUKENBERG *Int.* gg. rheumat. Zahnschmerz 505
- KRUTTGE *Ext.* gg. Wasserscheu 102
 Küchensalz 327
 Küchenschelle, schwarze 241; -Birn 186
 Kümmel's. *Carvi*; römischer 440
 Kürbis L. 168, -Kerne od. Samen 444
 Kuh-Milch 287; -Ställe 215
 KUNKEL Schwefelspiessglanzmorsell 320
- Kupfer, essigsaures, basisch. 30; Neutral. 145; — metallisch. 145; — schwefelsaur. 147; — Alaun 145; — Ammonium 146; -Feile 145; -Rauch 530; -Salziak 146; -Vikriol 147
- Kuttelkraut s. *Serpyllum*
 Labiaten 226
Lac. — *Sacch. Lactis.* — *Sera Lactis* 448, 450
Lac ammoniacale od. *Ammoniaci* 40; — *Asae foet.* 74; — *asininum arab.* PH. HANN. 225; — *mercuriale* 230; — *Sulphuris* 472
Lacca in Granis 507; *Tinct. Lacc.*
 Lachenknoblauchkraut 244
 Lactinctur 507
Lactuca sativa L. 288; L. 168; *Lactocarium*
 — *Scariola s. sylvestr. Extr.*
 — *vitrosa. Ab.*; *Extr.*
- Lärchenschwamm 87
 LAFFECTEUR *Roob antisyphilit.* 4894
 LAGNEAU. Antisyphilit. Tisane 4998.
 — Inject. gg. Nachtripper 417
 Lakritzen s. *Glycyrrhiza.* — -Stängelchen 845, 997
- LALLEMAND Salbe b. spasmod. Harnröhrenstricturen 318
 LALUETTE *Ext.* b. Wasserscheu 498
 LAMOTTE. Goldtropfen 436
Lana philosophica 532
 LANGE gg. Bandwurm b. Kindern 536
 LANGEMEYER Salbe b. syphilit. Geschwüren 122
Lapathum acutum. Rad.

Lapis causticus Chirurgorum 276; —
divinus 145; — *infernalis* 71; —
ophthalmicus 145
LASSÈRE Teig, künstl. Geschwüre z. hil-
 den 19
LATTA Infusion b. Cholera 328
Lattig s. *Lactuca sativa*, *L. Scariola*, *L.*
virosa
Lattig-Opium 288
Latwarge, eröffnende (offic.) 150
Laudanum 362, 508; süßes 509
 — *liquidum Sydenhami* 508
Laugenbäder 274
Langeneals, flüchtiges, gereinigt. 42, ro-
 hes 41; mineralisches, ätzendes 327,
 rohes 325; vegetabil., ätzend. 276
LAURENT Infusion b. Tetanus 188
Lauracerasus. Fol.; *Aq.*
Laurus. Baccas; *Ol.* — *Fol.*
 Läuse 4. Kleiderläuse, Kopfläuse u. Phthi-
 rias. — -Kürner 447; -Salbe 522;
 -Samen, mexican. 444
LAVAGNA Inject. b. Amenorrhöe 289
Lavandula. Flor.; *Ol.*; *Spir.*; *Spir. L.*
comp.; *Aq.* 49
Lebens - Elixir 151; -Luft 217
Leberflecke, *Ext.*, dagg.: Waschn 88
 (HUFELAND), 383, 467; Salbe '972
Leber-Luft-Wasser 58; — -Thran 352
Lederzucker, brauner 369; weißer 369
Ledum palustre. Hb.
LE FEBURE Bähg b. Gangrän d. Augen-
 lieder '199
LEHMANN *Int.* b. secundärer. Syphilis
 76. — *Ext.* b. beginn. Croup 57
Leichdornen s. Hühneraugen
Leichen zu conserviren 120, 256
Leichenwasser 118
Leimkrautsalbe 522
Lein-Kuchen 442; -Öl 350, geschwefelt.
 351; -Samen 442, -Samenmehl 442
LENTIN *Int.* b. acuter Gicht 254. —
Inject. b. Harnblasenvereitern 268
LEO Behandl. d. Cholera 86
LESSER gg. Gastroenteritis 261
LEVACHER gg. Cholera 366
LEVEISEUR Einreibg b. oriental. Cholera
 '653
Levisticum. Rad.; *Extr.*
Lichen Island.; *Syr.*; *Pasta Cacao c. L.I.*

LIEBHACHE Kräuter 236
Lieb-Stengel od. -Stöckel s. *Levistic.*
Lignum Campechianum; *Extr.*
 — *sanctum* 293; — *sandalinum rubr.*
 294
Limaces 224
Limatura Martis ppt. 194
 — *Stanni* 462
Limettae, Limetten 377
Limona, Limonen 377
Limnade 560; abführende '730
Limonadenpulver '45
Linaria. Ungt.
Linctus emeticus PH. P. '866
 — *leniens PH. HANN.* '1018
Lindenblüthe s. *Tilia*
Liniment, flüchtiges 296
 — —, campherhaltiges 295
Linimentum ad ambustiones PH. SLEST.
 54; — *ammoniato-phosphor.* '805;
 — *antarthrit. Pottii* 27; — *caustic.*
Vogelii 93; — *diuretic. PH. HANN.*
 '775; — *occitans Smith.* '1056;
 — *Ferri nitrici* 303; — *gingivale*
mundific. DISP. FULD. '382; —
mercurio-terebinthinat. 27; — *re-*
solvens d. Hoep. St. Antoine 343;
 — *volatile* 295, v. camphorat. 295
**Linum. Sem.; *Ol.*; (*Ol. L. sulphurat.*)
Lippenpomade, rothe 112; weiße 112
Liquamen Martis 302; — *Myrrhae* 305
Liqueur de Labarraque 305
Liqueurs 462
Liquidambar 466
Liquiritia s. *Glycyrrhiza*
Liquor 459; — *Acetatis ammoniaci* 296,
A. kalici 304; — *Alcali vegetabil.*
acetatus 304; — *Ammonii* 298, *A.*
acetici PH. MIL. 296; *A. hydrosul-*
phurati PH. SLEST. 301, *A. oleoso-*
aromaticus '658, *A. succin. aether.*
 '656, *A. sulphurati PH. BOR.* 301,
PH. HANN., PH. P. 301; — *an-*
odynus martialis 460, *Klaprothii* 503;
anodyn. mineral. Hoffmanni 459;
anod. vegetabil. Westendorffii 453;
 — *antarthritic. Elleri* '656; *a. Pot-*
tii 27; — *antorethicus PH. P.* '116;
 — *Antimonii chlorati* 306; — *er-*
cenical. od. Arsenici kalinus 450; —**

- Belladonnae cyanic.* PH. P. 170; — *Bellostii* 303; — *Calcar. chloratae s. oxymuriat.* 118; — *Carbonatis ammonici* 297; *c. Ol. empyreum.* 298; *Carbonatis kalici* 304; — *Chloreti Stibii* 306; — *Chlori* 65; — *Cornu Cervi succinat.* 301-302; *digestiv. Boerhaavii* 272; — *discutiens* PH. MIL. 13; — eisenhaltiger 460; — *fumans Boylei* 301; — *Hydratis kalici* 305; *H. natrici* 305; — *hydrosulfuretic. pro Baln.* 92; — *Kali acet.* PH. MIL. 272; *K. a. niger* 272; — *mercurial.* 303; — *Myrrhae c. Melle* PH. SLESV. 305; — *nervinus* PH. HANN., SLESV. 94; *nerv. Peerbomii* 776; — *Nitratris hydrargyriati* 303, *N. hydrargyrosi* 303-304; — *oleosus Sylvii* 658; — *Plumbi acet.* PH. MIL. 374, *P. a. basiei* 14; — *Salis Tartari* 304; — *Sesquichloreti Ferri* 303; — *stypticus Looffii* 27; — *Subacetatis plumbici* 14; — *Succinatiss ammonici* 302; — *Tartari stibiatii* PH. MIL. 486; — *Terras foliat. Tart.* 304
- LISFRANC *Ext.* b. Verbrennung 2ten Grades 119
- Lixivium causticum* 305; — *natricum* 305; — *purum* od. *Saponariorum* 305; — *Sodas* 305
- LIZARS. *Meth. gg.* Cholera 328
- Locatellbalsam 1048
- LOCKSTÄDT Pillen b. torpid. Dysmenorrhoe p.p. 484, gg. Wechselfieber 741; Abführmitt. 434, 754; Tropf. b. Krampfaufäll. hysterischer 781. — Mundw. gg. üblen Geruch 66; Zahnpulver 267, 392, 679; aromat. Bäder 480; Salbe b. Frostbeulen, aufgesprungener Haut 203. — Etc.
- LOEBENSTEIN - LÖBEL Linim. gg. Lähmungszustände d. Auges 804
- Löffelfarnwurzel 403
- Löffel-Kraut, -Kresse s. *Cochlear.*
- LÖFFLER *Ext.* b. Bräunen 37
- LÖWENHARDT Pulv. gg. falschen Schwindel 186. — *Ext.* b. Schnupfen 70
- Löwenzahn s. *Taraxacum*
- Looch pulmonale* PH. HANN. 1017
- Looröl 349
- Lorbeeren 77; -Blätter 304; -öl 349
- Loxa (China) 128
- LUDWIG's Eisentinctur 504
- LÜDERS. Tropf. b. Paraplegien 466
- Luft, dephlogistisirte 217; fixe 214; hepatische 217; — -Austrocknung 27, 91, 93; — -Reinigung 37, 66, 104, 119, 216 (*Gas Ac. mur.*), 440; — -Säure 214; — -Wurzel s. *Angelica*
- LUGOL versch. innerl. u. äusserl. Iodmittel 270, 271, 279, 506, 570-572
- Luna nitrica 69
- Lupulin u. Lupulit 465
- Lupulus. Strobili; Extr. L.; Tinct. L. Strob.*
- Lycopodium; Sem. Macis; Ol.; Tinct.*
- MACKENZIE Pinselw. b. Diphtheritis 70
- Märzveilchen 202
- MAGENDIE. *Int. gg.* Epilepsie 278; Pulv. gg. nervöse Magenleiden, Dysmenorrhoe 532; Bissen b. Anschwellen u. Scirrhusit. d. Prostata u. Harnröhrenschleimhaut 216; Chininsyrup 116; Ersatz d. *Syr. Diacodion* 318; *Tinct. sedativa* 688. — Augenw. b. scroful. Augenentzündg. 590; Kerzen b. Harnröhrenstricturen 279; Salben gg. Scrofulgeschwülste 89, 278. — Etc.
- Magenmorsellen 833, L. 231
- Magenpumpe 538
- Magisterium Bismuthi s. Marcasit.* 86; — *Sulphuris* 472; — *Zinci ust.* 532
- Magnesia* 310; *adusta* od. *alba* 307; *calcinata* od. *caustica* 310; edinburgher 307; *effervescens* 307; englische, leichte od. lockere 307; *Murias* 307; *nigra* 311; *pura* 310; *Salis amari s. cathartici* 307; *subcarbonis* 307; *sulphurica dep. sicca* 309; *vitriariorum* 311
- Maisamen, weisser 443
- Maiblumen 199
- Majorana. Hb.; Ol.; Ungt.*
- Mairan s. *Majorana*
- MAITRE JEAN Tropfw. b. Hornhautleiden 93

- Malva cithra* 377
MALACARNE *Int. b. Arthritis vaga* 354
 Mahgawein 528
Malicorium 137
Malva. Fol.
 — *arbores. Flor.*
 — *vulgaris. Flor.*
 Malvenblüthen 200
 Malt s. *Malikum Hordei*
 Mandel-Kleie 213, präpar. '443; -Milch 47; -Öl 339; -Syrup 477
 Mandeln, bittere 46; süsse 47
MANDT *Ext. b. kramph. Verengerg d. Muttermundes* 171
 Mangan-Hyperoxyd 311; -Oxyd, schwarzes 311
Manganeseum 311
Menna; Syr.
 — *tabulata* 312, '677
Maranta. Amylum
Marcanita alba 86
MARCUS *Int. b. Husten* '244. — Etc.
MARIE (St.) Decoct gg. veraltete Syphilis '897
 Marienbad 60, 61
MARINE *Int. b. Arthritis vaga* 354
MARQUART *Insect. b. Tripper* 179
Marrubium. Hb.; Extr.
MARRYAT *Ext. b. Kopfgrind* 205
Mars s. Ferrum; — *colubilis* 434
MARSELLINI *Int. gg. Bandwurm* '840
MARTIN *Mixt. b. Phlegmasia alba dol.* '613
MARTINET *Int. gg. Neuralgien, besonders Hülftweh* 359. — Klyst. gg. Hülftweh 360
MARTIUS. Oxysecharum liquid. Hb. Digitalis 472
Marum verum. Hb.
Marsca Pilularum vgl. *Pilulas*
 — *anodynar. PH. HANN.* 363
 — *majorum Hoffmanni PH. HANN.* '507
 — *s. Resina Jalap. PH. HANN.* 432
 — *scilliticarum PH. HANN.* '908
Mastiche. Spir. M. comp.
Mastix s. Mastiche
Matricaria. Hb.
MATTHEI *Meth. gg. Bandwurm* '990
 Mauch-Esel 315; -Pfeffer 244
 Mauchheeren 211; -Syrup 479
MAYER *Ext. gg. Nasenpolypen* 238
MAYOR gg. Bandwurm 392
MEAD *Pulv. gg. Kröpf* '223
MEASED Bandwurmsch 751
Meconium 362
Medulla bosina 313; — *Panis* 314
 Meer-Rettig 383; -Salz 427; -Schwamm 462; -Kohle 105; -Zwiebel s. *Scilla*
 Mehl s. *Farina* (S. 190, 191, 576)
MERLHAUSEN gg. Wechselfieber 435
 Meisberg (Bad) 216
METZNER Waschw. gg. Kahlheit nach Syphilis '1055
 Meisterwurz 397
 Mekonia 362
 Mekonsäure 362
Mel 313, 314 (mehrere Artikel)
MELIER. *Kräutsalbe* '1086
Melilotus cithra. Hb. M. e. c. Florib.; Engd. Mel. — Flor.
Melis 426
Melissa (cithra). Hb.; Aq.; Spir. M. comp.
 Mellago - Consistenz 160
Mellago Graminis 179
 — *Taraxaci* 188
Melo. Sem.
 Melonen I. 168; -Kerne, -Samen 443
 Mennige 315; -Pflaster 158
Mentha crispata. Hb.; Ol.; Ol. M. c. terobinthinatum; Ol. M. c. coct.; Aq.; Syr.
 — *piporita. Hb.; Ol.; Rosulas; Spir.; Aq.; Aq. M. p. vinosae; Syr.*
Mercurius s. Hydrargyrum; acetatus 249; *civereus Moscati* 266; *cosmeticus* 250; *dulcis* 260; *nitrosus (calore u. frigore paratus)* 303; *praecipitatus albus* 250, *praecip. ruber ppt.* 264; *praecip. niger* 266; *purus* 251; *regulatus depur.* 251; *solubil. Hahnemanni* 266; *sublimat. corrosiv.* 252-253; *visus depur.* 251
MERKEL gg. Grauerwerden d. Haare 355; Haare s. vertilgen 328
Mesembryanthem. crystallin. I. 168
MEURER *Erstz d. Eisenwasser* 196
MEYER *Mixt. b. Ruhr* '726
Metereum. Cort.
MICHELSON *Int. gg. uhron. Chorda* 586

Milch-Blume 240; - Curen 288; - Zucker 427

MILLAR b. Asthma '135

Millefolium. Flor. — *Hb.*; *Extr.*; *Extr. M. frig. par.*

Mimosa. Gummi; *Mucilago Gm. Mim.*; *Pasta gummosa*; *Pulv. gummos.*

Mineralalkali 325, getrocknetes 326; rohes 325; verwittertes 326. — - Lauge, ätzende 305

Mineralkermes 473

Mineralwässer (künstl. u. natürl.) 60. Künstliche: Aachser '113; abführende 308, '671, '733; *Barèges* '114; Eisen - 106; Iod - 270; Karlsbader '716; Kochsalz - '712; kohlensaur. 54, '711; Salschützer '670; Schwefel - 92; — zum äusserl. Gebrauch: Eisen - 196; kohlensaur. 54, 216; Schwefel - 92, 284

Minze s. *Mentha crispata* u. *piper.*

Mistel 530

Mitesser, Mittel dagg. '649

Mixtur, brenzlich-weinsteinsäure 316 — schwefelsäure 316

Mixtura acida PH. MIL. '685; — *Ammon. muriat. stibiata PH. MIL.* '99; — *antihctica Griffith.* '417; — *camphorata PH. LOND.* '886; *camphor. acida* '188; — *excitans fortis* u. *mitis PH. P.* '928, '927; — *e Kali nitr. PH. MIL.* '593; — *e Kali tart. PH. MIL.* '616; — *nitrosa PH. MIL.* '593; — *purgans PH. MIL.* 330; — *pyro-tartar. camphorata PH. HANN.* 316; — *simplex* 316

Modellirwachs '1049

Möhre s. *Daucus*

Mohn s. *Papaver*; — weisser 443

Mohnsaft 362

Mohr, mineralischer 268

Mohrrübe s. *Daucus*

Molken 448-450; künstliche 427. — - Curen 448; - Pulver 427

MONRO Latw. b. Wassersucht '1027; Tropf. b. rheumat. Ruhr 510

MONTMAYOU (DE) anhelma. Mixt. '452

Moos, isländisch. 290; isländ. 291; korsikan. 225; — - Pulver 442; - Schokolade 369

Mora 211

Mori. Fructus; *Syr.*

Morphin (-ium) 317; - Salze 318, 319

MORTON Waschg. gg. phthisische Nachtschweisse 37

Moschus; *Tinct.*

— künstlicher '770

Most 527

MOST Mundw. gg. üblen Geruch '253; Einreibg. b. eingeklemmt. Brüchen 171

Mostrich 445

Moxen 282 (FERRARI), 374

Mucilago Tragacanthae 220

Mühlbrunn (Karlsbad) 61

MÜLLER Gurgelw. gg. Mund- u. Rachen-Geschwüre '504; Augenw. b. *Ophthalmia bellica* 72

MÜNCH Meth. gg. Wasserscheu 386

Münze s. Minze

Mumme 112

Mundgeruch, übler, s. *Athem*

Mandhöhle, Brennen d., *Ext. dagg.* 53

Murid 89

MURSINNA Pulv. b. asthen. Pneumonie '855. — Strempulv. b. torpiden Geschwüren 102

Musk 320

Muskat-Balsam od. - Butter 353; - Nuss 332; - Nuss. Öl 353

Muskatenblüthe s. *Macis*

Muskatenbohnen 190

Mutter-Harz s. *Galbanum*; - Korn 435; - Kraut 238; - Kümmel s. *Cuminum*; - Pflaster 158; - Zimmt 108

Muttermäler, Paste gg. 93

MYNSICHT's Elixir 496; diaphoret. Pflast. 490; Brandliniment 351

Myrrha; *Extr.*; *Liq.*; *Tinct.*; *Ol.*

NAFFEL Einreibg. gg. chron. Rheumatismen 188

Napha s. Aurantium (Flores, Aq. Fl. Aur., Syr. Fl. Aur.)

Naphtha (Chemisches) 31*); — *Aceti* 32, *A. martiata* 503; — *Vitrioli* 33

Naphthen 31; verdünnte 453

Narcein 362

Narkotin 362

Nase, rothe, Waschgn dagg. 88 (HUEL- LAND), 455 (NEUMANN, ASCHER- SON)

Nase, übler Geruch a. d., *Ext.* dagg. 339
 NASSE Meth. gg. Wechselfieber 116, 130.

— Eipreibgn gg. hektische u. colliquat.
 Schweisse 354

Nasturtium aquatic. L. 168, '460, '461,
 '824

Natriumoxydhydrat 327

Natron s. Natrum; - Weinstein 484

Natrum bicarbonicum 323; — *boraci-*
cum (natronat.) 87; — *boraxsaur.*,
 basisch. 87-88; — *carbonicum de-*
lapsum 326; c. *neutrale* od. *perfecte*
saturat. 323; — *chloratum, chlori-*
nic. od. *chloros.*, chlorichtsaur 122;
 — *chlorsaur* 329; — *essigsaur* 323;
 — *hyperoxygennirt-salzsaur.* 329; —
 kohlensaures, gereinigt. 325, gesättigt.
 323, getrocknet. 326, rohes 325, sau-
 res 323, verwittert. 326; — mildes
 325, getrocknet. od. verwittert. 326;
 — *muraticum oxygenat.* (*hyper-*
oxygenat.) 329; — oxydirt-salzsaur.
 329, 122; — *oxymuriatic.* 122; —
 phosphorsaur. 329; — salpetersaur.
 329; — salzsaur. 327; — schwefel-
 saur. 330; — *subcarbonic.* 325; —
sulphuricum delaps. 331

Natterwurz 387

Neapelsalbe 517

Nelken-Öl 344; -Pfeffer 436; -Wurzel 389

Nenndorfer Schwefelbrunn 61, 217

NES (VAN) gg. Wechselfieber 422

Nessel 246

Neubrunn (Karlsbad) 61, I. 323

NEUMANN *Int.* b. Lungenschwind. 234,
 b. Wechselfiebern 130, '245, gg. *De-*
lir. trem. 363; Ammenpulv. '888. —
 Wasch bei rothen Nasen u. Armen 455;
 Linim, gg. Herpes '260; Brei auf scor-
 but. Geschwüre 192

Nicotiana. Fol.; *Extr.*; *Tinct.*

NIEL versch. küsserl. Gold-Mittel 75-77

NIEMANN *Int.* b. Scrofeln d. Kinder
 91; gg. Nachtschweisse '488; Schlaf-
 pulver 465; Chinaschokolade '284.
 — Wasch gg. Excoriat. v. langem

Liegen '78

NIEMEYER Pinselang b. Augenblennor-
 rhöe Neugeborner 59

Niesepulver 380 (officinelles), '849

Nieswurz, schwarze s. *Hellebor. niger*;
 weisse s. *Helleb. alb.*

Nihilum album 533

Nitras ammonic. immixto *Oxydo hydrar-*
gyrico 266; — *argenticus* 69, a. *fu-*
sus 71; — *kalicus depur.* 280; —
natricus 329; — *Potassae depur.*
 280; — *strychnicus* 466

Nitrum crudum 280; — *cubicum* 329;
 — *depurat.* 280; — *prismatic.* 279-
 280; — *rhomboidale* 329; — *vitri-*
olat. Schröderi 285

Nuces Vomicae; Extr.; Extr. N. V. spi-
rituos.; *Tinct.* — *Strychninum* u.
 dessen Salze, *acet.*, *muriat.*, *nitr.*

Nucista. Ol.; *Bals.*

Nussöl 353

Nux moschata. — *Ol. Nucist.*

O'BEIRNE Mixt. b. Mercurialism., Ner-
 venkrankh., Drüsenanschwellg.,
 Harnblasenkatarrh 409

Obersalzbrunn 61

Ochsen-Brechwurz 402; -Galle 191, ein-
 gedickte 191; -Mark 313; -Talg 435

Oculi Cancrorum 289

ODIER Meth. gg. Bandwurm 392

Öl, campherhaltiges 342; Dippelsch. 340;
 Harlemer 361; phosphorhaltiges 355

Öle, äther. 332; aufgegossene 336; ausge-
 presste 337; brenzlich-ätherische od.
 brenzliche 337; destillierte 332; fette
 337; flüchtige 332; gekochte 336;
 schmierige 337; wesentl. 331

Ölzucker 149

Olea destillata 332; *empyreumatico-ä-*
therica 337; *essentia* 332; *expres-*
sa 337; *infusa* 336; *unctuosa* od. *un-*
guinosa 337; *volatilis* 332

Oleum Absinthii infus. 339; — *ammo-*
niat. 295; — *animale Dippelii* 340;
 — *Anthos* 356; — *Calcis* 91; —
Cantharid. coct. 344; — *de Cedro*
 346; — *Chamomill. äther.* 345, *Ch.*
infus. 345; — *Conii infus.* 346; —
Cornu Cervi 341, *rfz.* 340; — *Filicis*
Mar. 178; — *Hyoseyami infus.* 348;
 — *Hyperici infus.* 349; *Jecoris Asci-*
li 352; — *laurinum* 349; — *Martii*
per Deliq. 302; — *Menth. crisp. in-*
fus. 351; — *Myrrhae PH. HANN.*

- SLESV.** 305; — *Neroli* 342; — *Palm. liquidum* 355; — *Petrae* 369; — *Provinciale* (Oliv.) 354; — *pyro-animale* 341, *depurat.* 340; — *Ricini artific.* PH. P. 346; — *Tartari per Deliq.* 304; — *Vitrioli* 27; *V. depurat.* 28; *V. dulce* 33; *V. rectificat.* 28
Olivae. Ol.
Ononis. Rad.
ONTYD Mixt. b. Caries '486
Opement 75
Opium. Extr.; Syr. opiat.; Tinct. O. simpl.; Tinct. O. crocata; Tinct. O. benzoica; Tinct. O. nigra; Tinct. O. vinosa; Aq.; Empl. opiat.; Pula. Ipecac. opiat.; (Massa Pilul. e Cynogl.; Electuar. Theriaca). — (Morphium; Morph. acetic. u. muriat.)
Opiumtinctur. Sydenhamsche 508
Opodeldoo 296
OPPERT Verbandw. f. hartnäck. syphilit. Geschwüre '30; Pisselsaft f. syphilit. Mundgeschwüre '26
Or divisé 75
Orangen s. Aurantium
ORFILA Brech-Abführm. b. Vergiftgn 485
Orgeat 47
Origanum creticum. Hb.; Ol. — vulgare. Hb.
Orschade 47; — *Paste* 47, '108
OSANN gg. Bandwurm 359; Mixt. b. Keuchhusten '370; Abführmixt. f. Kinder (z. B. b. Keuchhusten) '619
OSIANDER Pulv. gg. hartnäckige Wechselfieber 229, b. Wassersucht '901
OSWALD Umschläge gg. Flechten 22
Ova gallinacea; Ol. Ov.
OXLEY Bissen b. Lähmungen 404
Oxyeratum 12
Oxydum calcicum 93; — *ferricum* 194, *ferrosum* 194; — *hydrargyric. ppt.* 264; — *plumbicum* 306; — *zincicum* 532
Oxykrat 12
Oxymel Aegyptiac. od. Aeruginis 295
Oxymella 367
Oxysaccharum 477; — *liquid. Hb. Digital.* '472; — *scilliticum* 480
Oxytertus 272
Paeden 394
Paeonia. Rad. — (Flor. I. 195)
PAGANINI Bäder b. Entzündgn, Neuralgien, Geistesarrüthg 59
PAILLARD. Ableitendes Causticum 371
Panacea duplicata od. Holsatica 285
— *mercurialis* 260
Panis. Mica P. albi. — Carbo
Papaver. Capita; Extr. P. albi; Syr. C. P. — Sem.; Ol.
Pappel, rothe wilde 204; *weisse* 228
Pappel-Knospen 203; — *Kraut* 204; — *Salbe* 203
PARENT Salbe b. Schankern '506
Pariglinssäure 408
Parillharz 408
Pasta de Althaea 369; — *Helicum od. Limacum* 225; — *Liquiritiae* 369
Pastilles de Vichy '708
PAYEN Mittel, Gestank z. tilgen 37
PEACOCK Pillen gg. Gesichtsschmerz '975
PEARSON Einreibg, künstl. Exanthem z. bilden '44
Pech, burgundisch. od. griechisch. 374; *schwarzes* 425; *weisses* 374
Pechhaube 425
Pechurim s. Picburim
PEERBOM. Liq. nervinus '776
Pepo. Sem.
Perchloridum Hydrargyri 253
PERCIVAL Pillen b. mangelhafter Gallensecretion 390
PERCY Infusion b. Tetanus 188
Perl-Graupen 441; — *Moos, irländ.* 290; — *Salz* 329; — *Weiss* 86
Perubalsam 83
PESCHIER Int. gg. Kropf '709. *Meth. gg. Bandwurm* 178
Pestessig 13
Peterlein, Petersilie s. Petroselinum
Petit-lait en poudre 427
Petroselinum. Hb. I. 168. — Rad.; Aq. P. R. 49. — Sem.; Ol.; Aq.
PEYSSON gg. Wechselfieb. '1037, '1040
Pfaffen-Kümmel 440; — *Rührlein s. Tarax.*
Pfeffer (schwarzer u. weisser) 373; *jamaikanischer* 436; *indischer od. spanischer s. Capsic. ann., präpar.* 210; *westindischer* 436; *türkischer s. Capsic. ann. — Kraut* 244; — *Kümmel*

- 440; -Minze s. *Mentha piper.*; -Minz-Küchlein 426; -Strauch-Rinde 136
 Pfeilwurzelmehl 49
 PREUFER Meth. gg. Krätze 431
 Pfingstrosen-Sämen 443; -Wurzel 402
 Pflanzenwässer 49
 Pflaster 153; braunes 158; engl. 154; Nürnberger od. schwarzes 158
 Pflaumen s. *Prunus*
 Pfriemenkraut 236
 Phellandrium. Semen
Phosphorus Ferri od. *ferricus* 194; — *natricus* c. *Aq.* 329; — *quinicus* 115
 Phosphor 370. — Vgl. *Phosphorus*
 Phosphorsäure a. Knochen 25; reine 25
Phosphorus; *Ol. phosphorat.*; *Aether phosph.*
 — *Hombertii* 91
 Phthiriae. alter Leute, Waschdagg. '780
 Picharrim-Bohnen 190
 PIEPENBRING Einathmng b. Lungen-sucht m. Übelriech. Ausw. 104
 PIEPER Einreibg b. Keuchhusten 171
Pigmentum Indicum 268
 Pillen, blaue 147
Pilulae, vgl. *Massa Pilul.*; — *adstringentes* PH. P. 36; — *Aloës* c. *Myrrha* PH. SLESV. 35; — *alterant. Plummeri* '532; — *aperientes* PH. SLESV. '341, *aper. Stahlü* '56; — *ex Asa foet.* PH. MIL. '132; — *coeruleae* PH. SLESV. 147; — *gajacinae* PH. MIL. '939; — *hydrargog. Heimii* PH. P. '904; — *ex Hydrarg. mur. corr.* PH. MIL. '510, PH. SLESV. '507; — *major. Hoffmanni* '507; — *mercuriales* PH. HANN. 432; — *ex Opio* PH. MIL. 363; — *purgantes* 373; PH. HANN. 432, *purg. fortes* PH. P. 432, *purg. c. Hydrarg.* PH. SLESV. 432, *purg. mittes* PH. P. 207; — *c. Resina Jalap.* PH. SLESV. 432; — *Rufi* 35; — *scillitic.* PH. P. 411, PH. SLESV. '902; — *sedativae* PH. P. 181; — *tonicae Bacheri* '374
 Piment 436
Pimpinella. Rad.; Extr.; Tinct.
Pinus. Turiones; Tinct. *Pinii comp.* — *Resina Pinii Burgund.*; Ungt. Res.
P. Burg.; *Cerat. Res. Burg.* — *Resina P. empyreum. solida.* — *Resina P. empyreum. liquida*; *Aq. picea Piper caudatum* 144; *Hispanicum* 210; *Jamaicense* 436; *Indicum* 210; *Turcicum* 210
 Pintaden I. 229
 PITSCHAFT Int. b. *Angina pectoris* 59, b. Keuchhusten '427; Pillea b. Trägheit des Dickdarms u. b. mangelnd. Gallenabsonderg 168; Mixt. b. Gastro-Entero-Malacie '37; Prophylact. gg. Scharlach '347; Meth. gg. krankh. Pollutionen 204. — *Ext. b. Zahn-Geschwülsten* u. -Geschwüren 367; Salbe gg. chron. Ophthalmia 88, gg. Flechten 88; Lincm. b. Zellgewebsverhärtg, Drüsengeschwülsten, *Paedarthrocace*, Winddorn 489. — Etc.
Pix Burgund. od. *Graeca* 374; *liquida* 424; *naturalis* od. *nigra solida* 425
Placenta Seminis Lini 442
 PLAGGE gg. Wechselfieber 422
Plantago major. Fol.
 PLENCK Mixt. b. Metrorrhagien '66, gg. Scorbut '827. — Tropfw. gg. Hornhautflecke '170; *Aq. (ophth.) coelestis s. saphirina* 31
Plumbago 218
 PLUMMER *Pilulae alterant.* '532; *Pulv. alterans* '532
 Pneumatokatharterion '254
 Pocken-Holz 293; -Salbe s. Pustelsalbe
 POCTA Pillen gg. paralyt. Enuresis d. Wöchnerinnen '214
 POINTE Einreibg gg. Wechselfieber 116
 Poley, Poleyminze s. *Puleg.*
 POLLAU Faste gg. Muttermiller 93
Pollen Lycopodii 442
 Pollenia 443
 POLLIN antispyllit. Decoct '893
 Polychrestsalz 484
 Polychroit 143 Z. 9
Polygala amara. Hb. — Rad. — (*German. s.*) *vulgaris. Hb. (c. Rad.)*
Polypodium. Rad.
Poma Bergamott. 377; — *Blaterii* 177
Pomade de Garou '299
 — *vésicatoire* '215

Pomeranzen s. *Aurantium*; eingemächtige 377; — Möliken I. 318, '976; — Schalen, eingemachte 138

POMMER Int. b. Magenweichg 193

Pompholyx 533

PÖPPE b. chron. Metallvergiftg 341

Porsch, Porst 237

Porter 113

Portwein 528 Z. 1 v. u.

Pose - Sanguis 248

Potasse, gereinigte 274; rohe 273

Potassa cruda 273; *depurata* 274

Potassium 287

Potio aluminosa d. Maternité '67; — *dibret. d. Charité z. Par.* 368; — *Riverii* '583, PH. HANN. 272

Potus analoptic. PH. P. 557; — *antatrophic.* PH. P. 366; — *spirituos.* PH. P. 461

Pouhon 60

PRADIER's Kataplasmen 409

Präcipitat, rother, präpar. 264, Salbe v. 522; weisser 250, Salbe v. 517

PRESCOT z. Befürd. d. Wehen 435

Presfsafturen I. 339 - 340

Presfschwamm 462

PRIEGER Salbe b. böartigen Flechten u. Grind 278

PRINGLE Krätzsalbe '1064

PRINZ. Gelbe Tropfen 302

PROLLIUS. Brechmittel 153

Protochloridum Hydrargyri 260

Provencer Öl 354

Pruna (domestica) 211

Prunus. Palpa Prunor. dep. — *Fruct.* — *Padus. Cort.*; *Aq.*

Prussias Hydrargyri 252

Psyllium. Sem.

Püllnaër Wasser 61

Pulegium. Hb.; *Aq.* 49

Pulpa Colocynthis 377

Pulsatilla. Hb.; *Extr.*

Pulver, Cosmisches '126; Dowersches 380; gewürzhaft. 379; kühlend. od. niederschlagend. 381

Pulvis ex Acido tart. PH. MIL. '45; — *aërophor.* PH. P. 307; — *alterans Edinburgens. s. Plummeri* '532; — *antatrophic.* PH. P. '410; — *antitopileptic.* PH. P. '1097; — *anti-*

monial. PH. P. '993; — *antiphlogistic.* PH. P. '592; — *antiscrofulos.* GOELIS. 332; — *antispasmod.* *Infantum* PH. P. 289; — *arsenical.* PH. SLESV. Anhg '126 (Ende); — *Chinas factitius* PH. P. 129; — *Cosmi* '126; — *dentifric. niger u. ruber* PH. SLESV., HANN. '220, '1029; — *diaphoretic.* PH. P. '1011; — *digestivus d. dig. Kleini* PH. SLESV. 405; — *diuretic.* PH. MIL. '900, PH. P. '899; — *Doveri* 380; — *Edinburgens.* '532; — *emeticus* PH. MIL. 486; — *errhinus* PH. P. 381; — *ad Brysipelas* 201; — *febrifugus* PH. MIL. 134; — *Foenic. comp.* PH. SLESV. '662; — *galactopius Rosensteini* '662; — *ex Hydrarg. mur. miti et Sulph. stib. aurant.* PH. MIL. '482; — *Jalap. c. Kali sulph.* PH. MIL. 397; — *pro Infantibus* 380; *Infantum u. Inf. Hensleri* PH. SLESV. 380; — *lenitio tartarizat.* PH. HANN. 405; — *Liquirit. comp.* 380, PH. MIL. 380; — *Magnès. c. Rheo* PH. SLESV. 380; — *pectoral. (Carellae, auch PH. MIL., PH. P.)* 380, *pect. Wedelii* '1001; — *Plummeri* '532; — *Puerorum* PH. P. 380, *Puer. citrinus* PH. HANN. '663; — *purgans* PH. MIL. 397, PH. P. 397; — *purificans* PH. P. '937; — *refrigerans* PH. HANN., SLESV. '45; — *resolvens* PH. SLESV. 285; — *Rhei tartarizat.* PH. HANN. 405; — *Scillae c. Natro carb.* PH. MIL. '900; — *sternutator. albus* PH. HANN. '849; — *stypticus* 37; *Sulphuris comp.* PH. HANN. 35; — *vermifugus* PH. SLESV. Anhg 195; — *Visci comp.* PH. SLESV. 379

Pumex. Lapis

Purgir - Cassia 378; - Kraut s. *Gratiola*; - Wurzel 396

Purpurfingerhut s. *Digitalis*

Pastelsalbe v. AUTENRIETH 487, v. BAREZ '498, v. JÖRG 487, v. KOPF '498; offic. 526

Putamen Nucum Juglandum 137

Pyrethrum. Rad.

Pyramonter Wasser 60, 216

Quassia. Lign.; Extr. Q. L. — Cort.; Tinct.

Quassia-Becher 294

Quecken s. *Gramen*

Quecksilber 249; blausaures 252; gereinigt. 251; HAHNEMANN's aufösel. 266; laufendes, lebendig., regulinisch. 251; versüßtes 260

Quecksilber-Chlorid 253; -Chlorür 260

Quecksilber-Cyanid 252

Quecksilbermoor 268

Quecksilberoxyd 264; Salbe v. 522; — salzaures, ätzend. 253

— -Ammonium, basisch-salzsaur. 250

— -Flüssigkeit, salpetersaure 303

Quecksilberoxydul, essigsäures 249; reines 266; salzaures, mildes 260; schwarzes 266; — Flüssigkeit, salpetersaure 304

Quecksilberpflaster 158-159

Quecksilbersalbe, blaue 517; gelbe 521; graue 517; — rothe 522; weisse 517

Quell-Salz 327; -Wasser 55

Quendel 244; -Geist 459; -Öl 244

— römischer s. *Thymus*

Quercus. Cort. — Glandes; Gl. Q. tosta

Quinin, *Quinium* 115; -Salze 115

Quitten 178; -Kerne, -Körner od. -Samen 440; -Schleim 322

Radicalessig 19

RADIUS Int. gg. Mercurialis scorbut, Mundfäule '826; *Mixt. gg. chronische Heiserkeit, übermässige Schleimausscheidung* 403; *Decoct gg. chron. Brustkatarrhe, Eiterauswurf* 236. — *Ext. b. gereizten Augen, b. Ophthalmien* 387; *Klyst. b. Schlagfluss, Koma* 486; *Salbe b. Drüsen- u. Balggeschwülsten, Wassersucht* 279

Radix Acori (veri) 388, *A. vulgaris* 388 *); — *Allii* 90; — *Aronis* 382; — *Cahincae* 388; — *Cardopatii* 389; — *Cepae* 89; — *Colubrinas* 387; — *Consolid. major.* 416; — *Enulae* 395; — *Gei urbani* 389; — *Graminis rubri* 389; — *Hypocacuanhae* 397; — *Inulae* 395; — *Ligustici* 402; — *Liquiritiae* 393; — *Melampodii* 396; —

Ostruthii 397; — *Oxylapathi* 402; — *Polygal. Virginian.* 413; — *Rapae (satio.)* 387; — *Raphan. marini e. rusticani* 382; — *Rhabarbari* 405; — *Rumicis acuti* 402; — *Sassaparill.* 408; — *Serpentar. Brasiliens.* 388, *S. vulgaris* 387; — *Squillae* 411; — *Valerian. sylvestr.* 417; — *Veratri albi* 395

Räucher-species 453

Räucherungen, Guyton-Morveanische od. oxydirt-salzsäure 211; salpetersaure (Smithache) 211

Raffinade 426

RAGOLO gg. Epilepsie '924, '925

Ragosi (Kissinger) 61

Rainfarn s. *Tanacetum*

Rak 461

Ramenta Ferri praeparata 194

Rapa 387

Rapae. Ol.

Rapae Stigani 462

Ratafia 461

Ratapha. Rad.; Extr.; Tinct. R. sacch.

RATIER Umschlag b. Phimose '10

Ratten-Gift 71; -Pfeffer 447

RAUCH Inject. b. Flechten im Gebärgang 255

Rauchmittel gg. Asthma 229, 245

Rauchgelb 75

Raute s. *Ruta*; — wilde s. *Fumar.*

Reglise, braune u. weisse 369

REIL Pulv. gg. entstehende Halsentzündung 427; *Mixt. gg. chron. Heiserkeit* 512, b. *Melancholie* '851. — *Antiphlogist. Klyst.* '600; *Streupulv. b. Blatp.* 125. — *Ec.*

Reinetten 376

REISIG *Ext. b. Verbrennungen* 430

Reissblei 218

Reitersalbe 517

Reizsalbe s. *Ungt. irritans*

REMER *Mixt. b. Ruhr* '829; *Tropf. gg. Scrofeln, Kropf* '176. — *Ec.*

BENARD *Ext. gg. Mercurialisalivation* 366, '391

BERAUD *Ext. b. Bubonen* 157

Resina abietina ed. *alba* 423; — *Benzodis* 85; — *communis* 423; — *Ele-mi* 151; — *flava* 423

Rodius 420

Rhabarber s. *Rheum*

Rheinwein 528

Rheum. Rad.; *Extr.*; *Extr. Rh. comp.*;

Tinct. Rh. aquosa; *Tinct. Rh. vi-*

nosa; *Tinct. Rh. amara*; *Tinct. Rh.*

comp.; *Syr.*; *Pulv. Magnes. c. Rheo*

Rhododendron chrysanthum. Fol.

Rhoeas. Flor.; *Syr.*

Rhus radicans vgl. *Toxicodendron*

Ribes nigrum. Baccas

— *rubrum. Baccas*; *Syr. Ribum*

RICHARD Grindsalbe '721

RICHET Schnupfpulv. b. Gesichtsschmerz 135

RICHTER (— f) *Int.* gg. Wechselfieber 130

RICHTER (A. G.) *Pulv.* gg. Epilepsie

'925, b. allgemein krampfhaft erhöh-

ter Nervenempfindlichkeit '926; dia-

phoret. *Pulv.* '783; Trochisk. gg.

Magenschwäche m. Blähungen '857;

Pillen b. chron. Schleimflüssen '704;

Latw. gg. Wechselfieber '277, '301;

Mixt. b. krampfhaft. Bluthusten '756,

b. Pneumonie '1034, b. typhö. Fie-

bern '761, b. rheumat. Ruhr 510, b.

Bruchbeinklemmung '428, b. Unterleibs-

krämpfen '930, b. Cardialgie v. Er-

kältig '644, gg. Würmer '931; ver-

bessert. Pollinisches Decoct '893. —

Ext. b. Hornhautflecken '94, '171;

Augentropfw. '319; Salben b. chron.

Ophthalmien 290, '551; Einreibg b.

torpid. Amaurose 299, gg. torpide

Frostbeulen 370; reizend-zerthei-

lende u. krampfstill. Einreibg '641;

Injeet. gg. *Fluor alb.* '5, '389;

Verbandw. b. callösen Schankern 148.

— Etc.

RICHTER (A. L.) b. *Delir. tremens* 485

RICHTER (G. A.) *Pulv.* b. Epilepsie

'925; Digestivpulv. b. Verschleimun-

gen '734; Prophylact. gg. Scharlach

170; Pillen b. Unterleibsstockgn, un-

terdrückt. Menstruation '310; Latw.

b. Wassers. nach Wechselfieb. '292;

Electuar. lenitie. f. Arme '433; an-

thelminth. Mittel 135, '962; Mixt.

b. Durchfällen u. Rubren '356, b.

faulig. Ruhr '272, b. Wassersucht '910,

gg. hektische Schweisse '42, gg. col-

liquat. Schweisse '1072; abführende

Mixt. '1024; Tropf. b. starken Me-

trorrhagien '683, b. hyster. Kräm-

pfen '1070, gg. Empfindlichkeit d.

Magens u. chron. Erbrechen 514;

Linctus b. Keuchhusten '368, b. Säure

u. Krämpfen d. Kinder '955, b. trok-

kenem Mund, excoriirt. Zunge in Fie-

bern 356. — *Ext.* b. übelriech.

Ausflüssen a. Ohren, Nase, weibl. Ge-

nitallen '156; Klyst. b. Nervenfie-

bern '193; Einreibg b. Hodenver-

härtg '655; Pflast. b. sehr schmerz-

haft. Rheumatismen '945; Umschl. b.

Sphacelus siccus '206; Streupulv.

b. brandigen Wunden u. Geschwüren

'308, b. parenchymatös. Blutungen

'327; Dämpfe z. Verhütung d. Ty-

phus-Ansteckg 97. — Etc.

RIECKER (in Wiesbaden) gg. veraltete

Hautkrankheiten 352

Ricinus. Oleum.

RICORD Umschläge b. verhärteten Bu-

bonen 255, gg. Ganglien, Peristom-

sen 506, gg. Hydrocele ebend.

Riechmittel (vgl. Riechpulver) I. 350,

H. 14, 19, 20, 32, 34, 118, 299,

'649, 456; — b. ansteckend. Krank-

hcn 118, '187; — f. Hysterische

90, 341, 496, 497, 590; — b. A-

sphyxien 299, 118

Riechpulver 148, '89, '576

RIEKEN Pflast. gg. weisse Geschwulst

'335

Rinde (*πικρὸν ἔξοχρον*) 128

Rinds-Galle s. Ochsengalle; -Talg 435

RING *Int.* b. Gicht 210

Ringelblumen s. *Calendula*

RITSCHER Mixt. b. Pneumonie, Lungen-

sucht '813

RITTER b. Habschmerzen v. Erkältg 95

RITTON Pillen b. Leukorrhöe 390

RITTERICH Salbe b. *Ophthalmoblen-*

norrhoea neonatorum '502

RIVERIUS. Brausepotion '583

Rob s. Rood

Rochellersals 484

Rodisfarther Sauerbrunn 61

Roggenmehl 191.

ROGNETTA *Ext.* b. complicirt. Fracturen, b. Paracitium 57; Verbandparat b. Fracturum 366

Rohr - Cassia 378; - Zucker 426

ROLLO b. Harurühr 301

ROMBERG Salbe b. hydropischen Affectionen d. Brusthöhle 256

RONCALLI Salbe f. scrofulöse Geschwülste 725

Roch. antisyphilit. PH. SLESV. 1895;

— *Dauci depur.* 467; — *Ebuli* 468;

— *Juniperi* 469; — *de LAFEC-*

TEUR 1894; — *Nucum* 469; —

Prunor. 378; — *Sambuci depur.*

469

Rosa. (*Flor. Rosar. incarnatar.*) *Aq.*

Rosar.; *Ungt. rosat.*; *Mel. rosat.*;

Syr. Rosar. — *Flor. Rosar. rubra-*

rum; *Conserua R.*; *Acetum R.*;

Tinct. R. acidula. — *Ol. Rosar.*;

Spir. R.

ROSAS. Schnupfmittel b. unterdrückt.

Schnupfen 288; Bähg. b. Ecchymom

d. Augenlider 197, b. Augenlieder-

krampf m. Schwäche 500; Linim. b.

schmerz- od. krampfhaften Augenlei-

den 318, anodynes b. Augenlieder-

krebs 318

Rosen, Damascener od. rothe 201

Rosen-Essig 16; -Honig 314; -Pappel-

blumen 200; -Pomade od. -Salbe

523; -Zucker 125

ROSENSTEIN Kinderpulv. 663; Am-

menpulv. 662; Ammenthee 441;

Mixt. b. Katarrhalbeschwerden d. Kin-

der 676. — Einreibg b. Durchfällen,

Veitstanz 747

ROSENSTIEL Pillen gg. Veitstanz 532

Rosinen 368

Rosmarin s. *Rosmarin.*; wilder 237

Rosmarinus. *Hb.*; *Ol.*; *Spir.*; *Aq.* 49;

Ungt. R. comp.

Ross-Fenchelsamen 444; -Kastanien, ge-

röstet 210; -Kastanienrinde 136

ROTH Latw. gg. Epilepsie 564

ROUX *Ext.* b. Neuralgien, rheumat. u.

arthrit. Schmerzen 351

Rubia. *Rad.*; *Ext.*

Rubus fruticosus. *Syr.*

Rubus Idaeus. *Baccar.*; *Aq.*; *Syr.*; *Acet.*

Rübe, gemeine od. weisse 387; gelbe 391

Ruböl 355

Rusterrinde 141

Ruhr-Rinde 141; -Wurzel 397, 416

Rum 461

Rumex Acetosa s. *Fol. Acetos.*

Rumicin 402

Runkelrüben 216 *Z.* 10 v. u.

Russ s. *Fuligo*; -Wasser 211

RUST, Inf. b. Wundstarrkrampf 519;

Pulv., antiphlogist. 691, z. Verhütung

d. Wasserscheu 212, b. Hydrophthal-

mus 533, b. Lippitudo 558, gg.

Kropf u. scroful. Affectionen 224, b.

Gonorrhöa secundar., chron. Vagi-

nal- u. Uterin-Blennorrhöen, habituel-

len Metrorrhagien 166, b. Krebs-

geschwüren 76, 193; Pillen b. Krebs-

geschwüren 405, b. Caries 31, an-

arthritische 560, zertheilende 352,

Mixt. b. Arthrocace 400, b. acuten

Wassersuchten 1019; Methode

b. Hundsbiss 550. — *Ext.* b.

Krebgeschwüren 72, 126, 353,

482; b. pervers-asthen. Schwerhö-

rigt 196, 198, 232; Mundw. b.

scorbut. Zahnfleisch 1062; Fimelg

b. Mercurialgeschwüren 343, b. Schan-

kern in Rachen, Nase, weibl. Genita-

lien 512; Zahnpillen 788; Klyst.

b. Brücheinklemmung 205; Inject. b.

Otorrhöen 586, 650, b. Nachtrip-

per 387, 1092, b. syphilit. Phimose

516, 548 (*Aq. phagedän. nigra*);

Katapl. b. Augenentzündgn im 1ten

Stad. 817; Augenbähg b. scroful.

Lichtscheu 169; Tropfw. b. Egypt.

Ophthalmie 29, z. Vernarb v. Horn-

hautgeschwüren 320, b. chron. Au-

genentzündgn 6, 171; Augensalben,

reizende 499, 500, 553, b. Per-

rophthalmie 326; Einreibg b. chron.

Ophthalmie, scroful. Lichtscheu 262;

Augenätzmittel 43; Pflaster, zerthei-

lende, 40 335, b. Frostbeulen 200,

333, b. Hühneraugen 48; Salbe b.

eingeklemmt. Hämorrhoidalknoten 75,

b. scroful. Geschwüren 265, b. se-

cundären syphilit. Hautgeschwüren
 '545, 265, b. fauligen u. brandigen Ge-
 schwüren '289; Digestivsalbe 508;
 Frostsalbe '76; Schmier- u. Hunger-
 Cur 520; Feig b. callösen Geschwüren
 487; Linsim., zertheilendes '652, b.
 torpiden Frostbeulen 24; Waschna b.
 Frostbeulen '108, '153, b. chron. Haut-
 ausschlägen 255; Fomente, zertheilen-
 de '12, '129, b. Hydrocele '95; Ver-
 bandw. b. qualit. schlechter Eiterung,
 zum Vernarben v. Geschwüren: p. p.
 206, '125, b. primären Schankern
 277, '548, b. brandigen Geschwüren,
 Hospitalbrand 119; Streupulv. b.
 feuchtem Brand '208. — Etc.

Rata. Hb.; *Ol.*; *Aq.*; *Acet.*

Sabadilla. Sem.

Sabadillinum 527

Sabina. Hb.; *Ol.*; *Tinet.*

Sabina. Conserve 242; — Salbe 242

Saccharum. Syr. simpl.; *Rotulas*

— *clarificatum* 480

— *Saturni* 374, *depur.* 374

SACHS (A.) Chinabier 134

SACHS (L. W.) Pulv. b. Nervenfib. nach
 Cholera '184. — Mercurialeinreibgn
 521

SACHSE Pulv. b. Tripper-Erectionen,
 Chorda 289; Linct. b. Croup '1016.

— Waschw. gg. Kahlheit nach Syphi-
 lis '1054

Sade- od. Saeben-Baum s. *Sabina*

Säuerlinge 61

Säure, arsenichte 71; preussische od. thie-
 rische 21

Säuren 17; versäzte 453

Safran s. *Croctus*

Saft, Säfte 474

Sagapenum. S. *depur.*

Sago 427

Saidschützer Wasser, künstl. 61, '670

SalAcetosellae 367; — *AlkaliFluor* 298;
 — *amarum depur.* 309; — *Ammoni-*
acum crud. 43, *depurat.* 44; *A. fi-*
acum 91; — *Anglic.* 309; — *Argen-*
ti 69; — *Benzoë acidus* 20; — *Ca-*
rolinense 427; — *catharticum ama-*
rum 309; *cathart. Glauberi depur.*
 330; — *communis* od. *culinare* 327;

— *de duobus* 285; — *diuretic.* 272;
 — *Epsomense* 309; — *essentiale*
Tartari 29; *ess. Fini* 272; — *fon-*
tan., *fossile* od. *Gemmae* 327; —
Martis 195; *M. thuratic.* 192; —
mirabile Glauberi crud. 330, *depur.*
 330; *mir. perlat.* 329; — *miristi-*
cum fixum 91; — *Nitrum* od. *Petræ*
280y — *polychrestum Glauberi* 285;
p. d. Seignette 484; — *Rockellense*
 od. *Rupellense* 484; — *Saidschützer-*
se 309; — *sodativum Hombergii* 20;
 — *Sedlitzense* 309; — *Seignette* 484;
 — *Sodæ crud.* 325, *depur.* 325; —
Succini 27, *depur.* 27; — *Tartari*
 274; *T. crystallisat.* 273; — *usuale*
 327; — *vegetabilis* 285; — *vescum*
 327; — *volatile Cornu Cervi* 42, 43;
v. Fitrioli narcotic. 21; *v. oleosum*
Sylvii '658; — *vomitivum Fitrioli*
 534

Salbe, ägypt. 516; einfache 523; flüchtige
 296; reizende s. *Ungt. irritans*

Salbei s. *Salvia*

Salben 515

Salap. Rad.; *Galat.*; *Mucil.*

Salap, indischer 49

Salicaria. Hb.

Salicin 427

Salix. Cort.; *Extr.* — *Ungt.* — *Salicina*

Salmiak, fixer 91; gereinigt. 44; roher 43

Salmiakgeist (äztend.) 298; anisölhalt. 297;

wässriger 297; weiniger 302

SALMON *Ext.* b. Mastdarmkrebs 364

Salniter 280

Salpeter, gereinigter 280; roher 280

Salpeteräthergeist 458

Salpetergeist, rauchender 457; versäster
 458

Salpetersäure 23; rohe 23; salpétrige 457

Salpeterurpith 303 Z. 11 v. u.

Salvia. Hb.; *Extr.*; *Ol.*; *Aq.*

Salz, englisch. od. Epsomer 309; Karlsba-
 der 427; Saidschützer od. Seidlitzer
 209

Salzäthergeist 457

Salzgeist 22; versäster 457

Salzölgeist 457

Salzölweingeist, ätherischer 457

Salzsäure 22; rohe 22

Sambucus. Flor.; Aq. — Succ. Samb.
(Baccarum) insipies. depur.; Syr. S.
(Baccar.)

Sandarach 428

Sandbeerblätter 209

Sandelholz, rothes 294

Sand-Riedgraswurzel od. Segge 389

SANDTMANN *Est.* b. tiefen u. langen
 dauernden Geschwülsten 110

Santalum rubrum. Lign.

Santonin 438

Sapo Alcantinus 432; — *Ammoniac* 295;
 — *antimonialis* 434; — *chemicus* od.
natronatus 433; — *niger (domest.)*
 430; — *Starkeyanus* 434; — *Sul-*
phuris 282; — *Vanatus* 432; — *vi-*
ridis (domest.) 430

Saponaria. Rad.

Sapones 428

Sarsaparilla. Rad.

Sarsaparille, deutsche 389

Sassafras. Lign.; Ol.

Sassafrasöl 190

Sassaparilla s. Sarsaparilla

Saturatio Salis Tartari PH. NIT. 272

Saturationen '92 (*Ammon. carb. dep. m.*
Acid. nitr.); 272, '534 u. '585 (*Kali*
carb. m. Essig); '1 (*Kali carb. m. Acet.*
aromat.); '14 (*Kali carb. od.*
Liq. Ammon. carb. pyro-ol. m. Acet.
scillit.); '2 (*Magn. usta unvollk. m.*
Acet. Colch.)

Satureja. Hb.

Satzmehl 48

Sauerampfer s. *Fol. Acetosus*

Sauerdornbeeren 77

Sauerhonig (einfacher) 368

Sauerhonige (Allgemeines) 367

Sauerkleesalz 367

Sauerkohl 216 Z. 10 v. u.

Sauerstoffgas 217

Sauerteig 216 (Z. 10 v. u.), 446

SAUNDERS Eiereibg gg. Frostbeulen u. a.
 asthen. Geschwülste 370

Scammonium, aleppisches 434

Scandix Cerefolium L. 168

— *odorata. Hb.; Aq.* 50

SCARPA. *Aq. (ophthalm.) coelestis* od.
saphirina 31; Salbe gg. scroful. Au-
 gementalüden '1106

Schäuf-Garbe s. *Millefol.*; — Milch 288

Schaben 315

Schakarille 127

Scharbockskraut s. *Cochlearia*

Scheidewasser 33; rauchendes 457

Schierling s. *Conium macul.*

Schiffspach 425

SCHINDLER *Polv. b. scrofulösen Drüsen-*
 vereiterungen 104

Schlangebader Wasser 61

Schlammwurzel 387, virginische 415

SCHLEGEL gg. Syphilis 247. *Anodynella-*
 ject: b. heftiger Gonorrhöe '969

Schleimherse 226

SCHMALZ *Polv. gg. Panus oculi* '911

SCHMIDT (C. A.) gg. Bandwürmer '450

SCHMIDT (J. AD.) Salbe gg. Hornhaut-
 flecke '1105; Ammoniumdampfäder
 217

SCHMIDT (J. K.) Einreibg b. Wassers. '177

Schmier-Curen 519, 520; — Salben 295;
 — Seife 436

Schminkweiss 86

SCHMUCKER Schnupfpulv. b. Augen-
 krankh. 262; kalte Fomentatt. 280

Schnecken 225

Schneerosenblätter, sibir. 206

Schnupfpulver 396; vgl. Niesepulv.

Schnupftaback, Schneeberger 385, L 221

SCHÖN Augenw. b. *Ophthalmia neon-*
ator. '522; Tropfw. gg. Hornhautflecke
 77; Salbe gg. Hornhautgeschwüre v.
 gonorrhöisch. Augment. 70

SCHÖNLEIN Mixt. b. Erysipelaceen p.p.
 '595; Kofschocolade b. Aphth.

Lungenphthisischer 104. — Gurgelw.
 b. Residuen v. Anginen 146; Inject. b.
 Ausflüssen a. d. Nase 146, b. unter-
 drücktem Tripper od. weiss. Fluss 299;
 Waschn. b. anomalem Scharlach 66,
 b. *Miliaris rheumat.* 277; Krätznim.
 '261; saure Fussäder '29. — Etc.
 Schönheits-Paste 369; — Pulver 379 (offic.)
 '443; — Seife 429

Schüpsentalg 435

SCHOTTIN Meth. b. Wasserscheu 552

SCHRADER. *Acid. hydrocyan. vegetabi-*
le u. Aq. hydrocyan. vegetabilis 340

SCHUBARTH Brechpulv. '863; Abführ-
 pulv. '749; Pillen b. nervösem Magen-

- krampf/164; Mixt., temperirende/821,
b. Wasseraucht/825. — Inject. in d.
Harnröhre/816; Waschg. kosmetische
/161, f. erfrorrene Zehen/794; Streu-
pulv. gg. Condylome/556. — Etc.
- SCHUPMANN anthelmint. Mittel 175
- Schusswasser, geistiges/69; THEDEN's/317
- Schwalbacher Stahlbrunn 60
- Schwalben-Kraut, -Wurzel s. *Chelidon.*
maj.
- Schwämme, gebrannte 105
- Schwammkohle 105
- Schwanzpfeffer 144
- SCHWARTZE Int. gg. Wechselfieber
/1033, /1036. — Linim. b. Verbren-
nungen/9; Ätzg v. Warzen, Fleisch- u.
Schwamm-Auswüchsen 22. — Etc.
- SCHWARZ Tropfen gg. Bandwurm 370,
b. Mastdarmvorfall 184
- Schwarzwurzel 416
- Schwefel, gefällter 472; gelber 469; ge-
reinigter 470
- Schwefeläther 33; geposphorter 33
- Schwefeläthergeist 459
- Schwefelammonium, einfaches 301; flüssi-
ges od. gewasserstofftes 301; im Maxi-
mo/301
- Schwefelarsenik, gelbes 75
- Schwefelbäder 284; Ersatz d. natürlichen
v. DÖBEREINER 92
- Schwefelbalsam 337, einfacher 351; ter-
penthinöhlhaltiger 361
- Schwefelblumen 201, 470
- Schwefelcalcium (m. schwefelsaurem Kalk)
92
- Schwefelkalium 282
- Schwefelleber, alkalische 282; flüchtige 301
- Schwefelleber - Luft 217; - Syrup /605
- Schwefelmilch 472
- Schwefelpflaster 159
- Schwefelquecksilber, rothes 123; schwar-
zes 268
- Schwefelröucherungen 469
- Schwefelsäure, gereinigte concentr. 28,
gerein. conc. käufliche 28 - 29; rohe
27; verdünnte 28; versäuste 459
- Schwefelsalbe, einfache 525, zusamen-
ges. 523
- Schwefelseife 282
- Schwefelspiessglanz, braunrothes 473;
pomaranzenfarbnes 472; schwarzes
463 - 464
- Schwefelspiessglanzkalk 93; - Außsag 68
- Schwefelspiessglanzmorsellen 320
- Schwefelspiessglanzquecksilber 267
- Schwefelwasser 61
- Schwefelwasserstoff - Ammoniak 301
— - Gas 217; - Wasser 58
- Schweine - Fett od. - Schmalz 30
- Schwererde, saure 84
- Schwindelkürner 440
- Scilla. Rad. ; Extr. ; Tinct. ; Tinct. S.*
kalina; Aet. ; Oxyment; Syr.
- Scordium. Hb.*
- SCUDAMORE Int. b. Gichtparoxysmen/2
- Sebum bubulum* 435; — *hircinum* od.
vervecinum 435
- Secale. Farina. — Sec. cornutum*
Sect 827 ***)
- Sedum acre. Hb.*
- Seemoos, gepulvert od. irländ. 290
- Seesalz 427
- SEGALAS Salbe b. jauchenden syphilit.
Geschwüren 122
- SEGUIN gg. Wechselfieber 366
- Seidelbastrinde 136
- SEIDLER Int. gg. Wechselfieber 366;
Pulv. gg. Keuchhusten 186
- Seife, grüne Haus - 430; medicinische 433;
schwarze Haus - 430; spanische 432;
weisse Haus - 430; weisse spanische
432
- Seifen 428; - Kraut, - Kraut - Wurzel s.
Saponaria; - Kugel 430 Z. 2; - Pfla-
ster 159; - Spiritus 459
- Seifensiederlauge 277
- Seignettesalz 484
- SEILER Abführtrochisken /750; Mixt. gg.
Pyrosis /686
- SELIG Mixt. b. Wasseraucht /1025
- SELLE Fieberpulv. 130; Abführmixt.
/819. — Etc.
- Selterser Wasser 61
- Semen Badianae* 436; — *Carvi Romani*
440; — *Cucurbit.* 444; — *Cymini*
440; — *Foeniculi aquat.* 444; —
Pedicular. 447; — *Pulicariae* 444;
— *Santonici* 438; — *Sinapis albae*
s. *citrin.* 440
- Semmel, Semmelkrume 314
- Symphoricarpos tectorum* L. I. 168

Senega. Rad.; Extr.; Syr.
 Senf, gelber 440; grüner, röther od. schwarzer 445; weisser 440; — Mehl 445; — Molken L 317; — Öl 357; — Teig 445, 450; — Wasser 358
Senna. Fol.; Extr.; Tinct.; Syr.; Eleetuar.; Infus. S. comp.
 SERLO Prophylact. gg. Scharlach 170
Serpentaria Virginiana. Rad.
Serpyllum. Hb.; Ol.; Spir.
 SERRE Ext. b. *Panaritium subentan.* 518
 SERRES b. Bleikolik 508
Serum Lactis 448-450 (versch. Artikel)
 — — *artificiale* 427
Sesquichloratum Ferri 192
Sevenbaum s. Sabina
Sevum s. Sebum bovin. u. ovill.
 SICHERER Meth. gg. Krätze 431
 Siebenzeit 441
 SIEBOLD (G. C.) Pulv. gg. Gesichtsschmerz 229
 SIEBOLD (V.) Einseitig gg. Schluchzen der Kinder 297
 SIEMERLING Ext. b. chron. Fussgeschwüren 158
 Silber-Glätte 306; — Oxyd, salpeters., geschmolzen. 71, krystallis. 69; — Salpeter 69
Sinapura. Cort.
Sinapis alba s. Sem. Erucas
 — *nigra. Sem. Sinapis; Ol. Sin. aeth.; Sinapismus*
 Sinapismen 445, 450 (offic.)
Sinapismus fortior PH. HANN., SLESV. 1973
 SINOGOWITZ Int. b. Wechselfieb. 130; Latw. b. Wassers. nach Wechselfieb. 196
Sisymbrium Nasturtium L. s. Nasturt. aquat.
 Smilacin 408
 SMITH *Linim. excitans* b. alten Rheumatismen, Lähmgn p.p. 1056; Rücken 211
Soda acetata 323; — *caustica liq.* 305; — *cruda* 325; — *depur.* 325; — gereinigte 325; — *phosphorata* 329; — rohe 325; — *vitriolata* 330
 Sodasalz, rohes 325
 SÖMMERRING (V.) Einseitig b. Lähmng d.

Harablase 96

Solamen hypochondriacor. Kleinii 614
 Solanin 464
 Solfatarren 217
Solutio Calcar. sulphurato-stibi. 68; — *Fowleri* 450; — *Liquirit.* 468
 SOMMÉ Mundw. gg. Mercurialsalivation 15; Pinselg b. Mercurialgeschwüren an Mandeln u. Gaumensegel 15
 Sommer-Flecke od. -Sprossen, Waschn dagg. 145, 190, 383, 467, 580 (SUNDELIN), 649; Salbe 972
 Soolensalz 327
 SOUCHIER Inject. b. Blasenkatarrh 81
 Spaa - Wasser 60
 Spanischfliegenpflaster, JANIN'sches 157
 Spanisch Weiss 86
 Spargel I. 168
Species amarae PH. P. 491; — *pro Cynophis* 451; — *Diatragacanthae* 380; — *pro Fumo* 453; — *hieraspicae* 35; — *pro Infuso pector.e. Fructib.* PH. SAX. 452; — zum Klystier 452; — *Lignorum* PH. P. 453; — *nervinae* PH. P. 417; — *pectorales* PH. P. 452; — *purgantes* PH. P. 330; — *resolventes* PH. P. 474; *resolv. externae* 453; — *pro Thos* PH. P. 478; — zertheilende 452
 Speichelwurzel 404
 Speike 526
Sperma Ceti 113
Sphaerococcus crispus 290
 Spiege 199
 Spiesganz-Butter 306; — Mohr 257; — Öl 306; — Oxyd, weisses 463; — Oxyd-Kali, weinsteinsäures 485; — Seife 434; — Seifen-Flüssigkeit 306; — Wein 529; — Weinstein 485
Spina cervina (Bacca) 480; *Syr.*
Spiritus aceticus aethereus martiat. 503; — *Ammoniac aromaticus* 658; — *Angelic. comp. camphoratus* PH. HANN. 454; — *Anthos* 458; — *anticorbutic.* PH. SLESV. 455; — *ardens* 460; — *aromaticus camphoratus* PH. P. 454; — *Begnini* 301; — *Cornu Cervi rectific.* 298; *C. C. succinat.* 301-302. — *Elleri* 656; — *Franconi* 460; — *fumans Glas-*

- beri* 21-22; — *matricalis* 456; — *Mindereri* PH. MIL. 296; — *mineral. elastic. fontium* 214; — *Nitri* 23; *N. acidus* 23; *N. dulcis* 458; — *ophthalmicus* HIMLY, '746; — *Oryzae* 461; — *Rabelii* 316; — *Roris-mar. saponat.* PH. SLESV. '205; — *Sacchari* 461; — *Salis* 22; *S. acidus* 21; *S. dulcis* 457; *Salis Ammoniaci anisat.* 297; *S. A. aquosus* 297; *S. A. c. Calce viva paratus* 298; *S. A. causticus* 298; *S. A. vinosus* 302; *S. A. sulphurat.* 301; — *silvestris* 214; — *sulphurat. Beguini* 301; — *sulphurico-acidus* 316; — *sulphurico-äther. camphoratus* 94, *martiatus* 460; — *Sulphuris (volatilis) Beguini* 301; — *Tartari* 305; — *Terebinthin.* 359; — *theriacalis* 454; — *Vini alcoholisatus etc. etc.* 460, 461; — *Vitrioli (acidus)* 28; *V. dulcis* 459
SPÖRER (V.) Int. gg. Cholera '25
Spongia. Carbo
Spongiae ustae 105
 Sprit 461
 Sprucebier 515
 Sprudel (Karlsbad) 61
Squilla s. Scilla
 Stahwurz 227
 Stärke, Stärkmehl 48
 Stafadriansamen 447
STAHL. *Pilul. aperient.* '56; *Tinct. nervina* 507. — Salbe b. Verbrennung '240
 Stahl-Kugeln 218; — Wasser s. Eisenwasser; — Wein 529
 Stangenschwefel 469
Stannum granulat. 462; *limat.* 462
Staphis agria. Sem.
STARK Mixt. b. Katarrhalbeschwerden d. Kinder '676. — Salbe b. Prosopalgie '542
 Stechapfel s. *Stramonium*
 Stechpalmenblätter 203
STEIN Meth. gg. Hautkrebs 230
 Stein, göttlicher 145
STEINHAUS Mixt. gg. hartn. Durchfälle, *Flux. coeliac.* '996
 Stein-Kleekraut s. *Melilot.*; — Öl 369; — Salz 327
STEMLER Bähg b. *Ophthalmia neonator.* 531
Stephanskürner 447
Sternanis 436
STIEBEL Bäder gg. Wechselfieber zarter Kinder 132
STIEGLITZ Elix. gg. Dyspepsie Hysterischer 183
 Stinkasand 73
 Stockfischleberthran 352
 Stockrosen 200
STÖRCK. Wurmlatwerge '965
STOLL Int. gg. Bandwurm 392; Kaumittel b. alten Diarrhöen 124. — Rüchergu b. Diarrhöen, namentl. v. unterdrückt. Harnabsonderung 490
 Storax 466; flüssiger 465
 Storax - Balsam 466; — Salbe '995
STRACK Pulv. gg. Scrofeln, Rhachit. 195
STRAHL Specific. gg. Scharlach '90. — Prophylact. gg. Wandwerden d. Brustwarzen 214
Stramonium. Hb.; Extr. S. Hb. — Sem.; Extr. S. Sem.; Tinct. S. Sem.
 Streupulver 442
 Strohwein 527 ***)
STRUVE Zahntinct. '117. — **STRUVEsche** Trinkanstalten I. 323, II. 60
 Strychnin 465; — Salze (Allgemeine) 465, einzelne 465, 466
STÜTZ gg. Starrkrampf '582
 Sturmhutkraut s. *Aconitum*
Subbisulphuretum Stibii 472
 Sublimat 253
Subnitras bismuthicus 86
Succi inspissati 165, 168 *)
Succinum. Tinct.; Ol. S. crud. u. rft. — (Acid. succin. crud. u. depur.)
Succus Catechu 109; — *Dauci inspiss. crudus* 468; — *inspissatus* (vgl. *Succi insp.*) *Aconiti* 168; — *Liquirit. depur.* 468; — *Thebaicus* 362
 Süßholz s. *Glycyrrhiza*
SUFFERT Int. gg. Wechselfieber 130
Suffumigatio s. Fumigationes
Sulfur, Sulfuretum p. p. s. Sulph.
Sulphas aluminico-ammonicus c. Aq. 36; — *aluminico-kalicus* 39; *c. Aq.* 36; — *cinchonicus* 123; — *cupricus c. Aq.* 147; — *ferrosus c. Aq.* 195; — *kalicus depurat.* 285; — *magneticus c. Aq. depur.* 309; — *natricus c. Aq. crudus* 330, *depur.* 330; na-

trio. depur. 331; — *quintus* 115;
— *triammonico-euphraticus* 146; —
zincicus c. Aq. 534; *s. venalis* 530
Sulphur Antimonii aurat. 472; *A. a. sa-*
ponatum 334
Sulphur auratum s. Sulph. Antimonii;
aur. liquidum 306
— *in baculis* 469
— *vegetabile* 442
Sulphuretum Ammonii 301; — *Antimo-*
nii luteum 472; — *Arsenici flav.* 75;
— *Calcii c. Sulphate calcico* 92; *C.*
c. Sulphureto Stibii et Sulphate cal-
cico 93; — *hydrogenat. Ammoniae*
301; — *Kalii c. Sulphate calcico* 282;
— *Stibii nigrum laevigat.* 463; *St.*
rubrum 473
Sumpfporst 237
Sammitites vgl. *Flor. u. Hb.*
— *Genitiae tinct.* 236; — *Sabinae* 242
SUNDELIN. Pulv. b. activen Congestionen
zum Uterus, Abort. drohenden Uterin-
krämpfen '229, gg. Epilepsie '924;
Brechpulver f. sensible Individ. '865;
Abführmittel, angenehm. u. nicht
schwächend. 329; Digestivthee '438;
Pillen gg. schleimiges Asthma 182;
Latw. b. Meläna '362; Gallerte, ant-
helminth. '453; Mixt. b. erethätischen,
versätigten Nervenfebern '3, '929, b.
Wechselfiebern m. gastr. Complicat.
'265, b. atonischen Blutflüssen '878,
b. asthen. Blutbrechen '364, b. torpi-
den Wassersuchten '908, gg. Scorbut
'459, analeptische '1066; Emuls. b.
Durchfall '763; Saturat. '584; diuret.
Tropf. 456; Ersatz d. Spiessglanz-
weins f. Kinder, Sensible 398; Mine-
ralw., künstl. abführende '671, '733,
künstl. kohlensaure '711, '712; Stahl-
molken I. 319. — Mandw. gg. schlaffe
Mercurialgeschwüre '192; Pinsels. b.
Wasserkrebs 26; Klyst., kräftig aus-
leerende '365, 350, anthelminth. '404,
nährend. 408 Z. 1; Inject. b. aton.
Blutflüssen '881; Einathmung b. trocken-
nem Asthma, *Emphysema pulmon.*
215; Waschgg. Flechten 91, gg. Som-
merflecke, *Aspredines* 580, b. Un-
thätigkeit d. Haut in asthen. Fiebern,
Rücktritt d. Exantheme '207; schar-

fes Fussbad 445; verschärft. Senftaug
'974; Frostsalbe '796; Salben gg.
chron. Drüsengeschwülste '178, '473,
gg. varicöse Hämorrhoid. 37, b. bran-
dig werdendem Decubitus '8; Brei auf
brandige Geschwüre 192; zertheilend-
beruhigend. Katapl. '423. — Etc.
Superoxydum manganicum 311
— *plumbosum* 315
SUTTON Brechmittel 398
SWALLOW Verbandw. b. Carbunkel 451
SWEDIAUR *Gargarisma sedativ.* 185.
— *Ungt. sedativ.* 185
SWIETEN (VAN) diuret. Mixt. '982. —
Epispastic. b. Nasenbluten 90
SYDENHAM anthysterische Pillen '129;
Decoct. album '268; *Opiumtinct.*
508-509
SYLVIVS. *Liq. (Sal volat.) oleos.* '658
Symphytum. Rad.
Syrup, gemeiner 478
Syrupus Acetositat. Citri 481; *Balsam*
Indici nigri od. balsamicus 477; —
Cichorei c. Rheo 479; — *Diacedion*
478 (Ersatz 318); — *domestic.* 480;
— *emulsiv.* 477; — *Liquirit.* 478;
— *Mannae laxativ.* PH. HANN. 479;
— *Papaver. albi* 478, *P. rubri* 479;
— *Rhamni catharticae* 480; — *Sac-*
chari 480; — *Sarsaparill. comp.*
PH. SLESV. '895
Täback s. Nicotiana
Tabulas Althaeae PH. AUSTR. 381
Taffia 461
Takamahak 481
Talg 435; -Seife 430
Talkerde, gebrannte od. kaustische 310;
kohlensaure 307; schwefelsaure 309;
weisse 307
Tamarindi. Pulpa; Serum Lact. tamar.
Tamponade, kalte 57
Tanacetum. Flor.; — Hb.; Ol.; Aq.
(50); *Extr. (ex Hb. et Summitatib.).*
— *Sum.*
Tannen-Harz 423; -Sprossen 515
Taraxacum. Hb. — Rad.; Extr. T. li-
quid.; Extr. T. Radic.
Tartarus Antimonii 485; — *chalybe-*
tus 484; — *emeticus* 485; — *mar-*
tialis 484; — *regenerat.* 372; —
solubilis 285; *sol. ammoniacalis* 481;

— *tartaricat.* 285; — *nitriolatus depur.* 285
Tartarus kalico-ammonicus 482; *kalico-ferrieus* 484; *kalico-natricus c. Aq.* 484; *kalico-stibicus* 485; *kalicus* 285
 Taubenkropf s. *Fumaria*
 Tausendfüsse s. *Millefolium*
 Tausendgüldenkraut s. *Centaur. min.*
 TEALLIER Mixt. b. Brustentzündgⁿ 1035
 Ten (China) 128
Terebinthina. T. cocta; *Ungt. Tereb.*; *Ol. (Ol. T. rst.)*; *Ol. T. sulphurat.*; *Sapo terebinthinat.*; *Ol. Menth. crisp. terebinthinat.*; *Ol. Chamomill. terebinth.*
 Terpenthin s. *Terebinthina*; — *Ölseife* 434; — *Spiritus* 359
Terra foliata mercurialis 249; *fol. Tartari* 272; *f. T. crystallisata s. mineralis* 323; — *Japonica* 109; — *ponderosa salita* 84; — *Salis amari* 310
 Teufelsdröck 73
Thea. Fol.
 THEDEN's Schweswasser 317
 Thee, Blankenheimer 236; chinesischer 209, schwarzer 209; St. Germain 207; mexicanischer 231
 Theer 424; — Wasser 67
 Theresienbrunn (Karlsbad) 61
Theriaca Andromachi 151
 Theriak 151
 Thier-Kohle 103; — Leim 124; — Öl, äther. 340, stinkendes 341; — Öläther 340
 THILENIUS Mundw. b. Zungenlähmg 1970
 THOMPSON Latw. gg. Bandwurm 360
 THOMSON gg. chron. Heiserkt 383
 Thonerde, reine 39; schwefelsaure mit etc. 36
 Thranseife 430
Thridace; Thridacium 289
Thus 362
Thymian (gemeiner) s. Thymus; wilder s. *Serpyllum*
Thymus. Hb.; *Ol.*
Tilia. Flor.; *Aq.* (50)
 Tinctur, blähungtreibende 499
Tinctura Antimonii acris 506; *A. Jacobi* 306; *A. regulina* 506; *A. saponata* 306; *A. tartarisata* 506; — *Aesc. fust. volatilis* 497; — *aurea nervinotonica Lamottii* 469; — *Chinoidinit*

114; — *Clauderii* 504; — *Digitalis acetica* 14; — *diuret.* PH. P. '758; — *Ferri aperitiva* 503; *F. vinosa* 529; — *Fowleri mineral.* 450; — *Guajaci volatilis* 504; — *Lignorum* 512; — *Malatis Ferri* 504; — *Martis aperitiva Glauberi* 504; *M. holleborata* 180; *M. pomata* 504; *M. tartarisata Ludovici* 504; — *Melampodii* 505; — *mineral. Fowleri* 450; — *Moschi artificial.* '770; — *Myrrhas composita* 504; — *nervina Stahl* 507; — *Rad. Enulae* 505; — *Rhei Doreli* 513; — *roborans Whyttii* 501; — *Salis Tartari* 506; — *sedativa MAGENDIE* '688; — *thebaica* 510; — *tonico-nervina Bestucheffii* 460; — *Valerian. volatilis* 515; — *Veneris volat.* '316
Tincturae 491
 Tischlerleim 124
 TITTMANN Tropfw. gg. Hornhautflecke 327
 TODE säuretilgendes u. magenstärkendes Pulv. 307
 Todtenblumen s. *Calendula*
 Tönnisteiner Wasser 61
 Toll-Beere, -Kirsche od. -Kraut s. *Bellad.*
 Tolubalsam 84
 TOMMASINI Breiismaschl. b. Hämorrhoidalknoten 59
 TONNELLE Meth. gg. Peritonit. u. *Phlebit. uterina* 519
Tormentilla. Rad.; *Extr.*
 TOURTUAL (sen.) Liact. b. Keuchhusten u. a. Krampfkrankhⁿ d. Kinder '700; Auffütterungsmittel 49. — *Sedative, carminat.* Salbe f. Kinder 297
Toxicodendron. Fol.; *Tinct.*; *Extr.*
 Tränkchen, Wiener 269
Tragacantha. Gummi
 Traganth 219
 Trauben-Cur 368; -Kirschen-Rinde 139; — Kraut, mexicanisch. 231
 Trebern 311
Trifolium aquatic. s. fibrin. Hb.; *Extr.*; *Extr. T. liquid.*; *Tinct.*
 Triakmstaken I. 323, II. 60
Triticum. Furfur
Trochisci Althandali 124; — *bechiet albi* PH. HANE. '109, b. *citri* PH.

SLESV. '845; — *Castorei* PH. AUSTR. 108

TROSS Brustpulv. 592

TROUSSEAU *Int.* b. Diarrhöen, Röhren, Dothinerit. 86. — Schnupfpulv. gg. Ozaena u. chron. Schnupfen 262; In-
ject. gg. Jucken u. Fressen d. Vagina 274; Waschg gg. *Prurigo Vulvae* 325; narkot. Salbe 446

TRUSEN *Ext.* b. Geschwüren, Brand 119, b. Frostbeulen 119, '262, b. Ver-
brennung '259

TÜNNERMANN Bähg b. Augen- u. Au-
geulieder-Entzündung '816

Turiones *Abietis* 515; — *Asparagi* L. 168; — *Humuli* s. *Lupuli* 464; — *Sabinae* 242

Turpethum nigrum 266

Tutta (*Alexandr.*) *praeparata* 533

Typhusansteckg u. verhüten, Dämpfe 97

Ulmus. Cort. U. interior

ULRICH Pillen gg. Flechten 424

Unguentum acris PH. HASS. '530; —

Aegyptiac. od. *Aeruginis* 516 (295);

— *album camphorat.* 517; 4. *simplex*

516; — *Althaeae* 516 (522); — *am-*

moniac. PH. SLESV. 300; — *Anglo-*

rum c. Scabiei '1090; — *aromatic.*

PH. AUSTR. '760; — *de Arthanita*

'61; — *basilic. flavum* 516; b. *vir-*

de 295; — *Calcis* PH. P. 54; — *Ce-*

tacei PH. SLESV. 114; — *chloratum*

PH. AUSTR. 66; — *corrosivum* v.

GRÄFE. '531; — *de la Mère* 158;

— *digestiv.* 526, PH. SLESV. '1047;

— *Digitalis* 234; — *emolliens* 516;

— *epispastic.* PH. P. 102; — *escha-*

rotic. v. GRÄFE. '531; — *exsiccans*

PH. HANN. '1102; — *flavum* 516;

— *fusum* PH. HANN. 158; — *He-*

lenii PH. P. '848; — *Helleb. albi*

PH. SLESV. '1090; — *Hydrargyri*

caeruleum 517; *H. ciner. c. Tere-*

binth. 518; *H. ciner. fortius* PH.

HANN. '1079; — *Hyoscyami* 203;

— *irritans* 516, PH. SLESV. 300;

— *de Lapide calamin.* '636; — *mer-*

curiale 517, PH. AUSTR. 518 Z. 19;

m. album PH. P. 250; *m. a. Werl-*

hoffs 517 (genauere Angabe 250

Z. 13); *m. corrosivum* PH. P. 256;

m. fortius PH. AUSTR. 518; — *de*

la Mère 158; — *mundificans Zel-*

leri 517 (genauere Angabe 250 Z. 13);

— *narcotico-balsamic.* '126; — *Ne-*

apoltian. 517; — *nervinum* 523,

PH. AUSTR. '760, PH. P. '654; —

de Nihilo 526; — *nitricum* 24; —

ophthalmic. PH. P. 264, o. *Richter*

'551, o. *St. Yves* '555; — *oxygenat.*

24; — *pomadinum* 523; — *populo-*

um 203; — *Sabinae* PH. BAY.

L. 278, PH. SLESV. 242; — *saturnin.*

522; — *ad Scabiem* 523, PH. MIL.

'1088, c. *Scab. Jasseri* PH. HANN.,

SLESV. '1087; — *sedativum* SWE-

DIAUR. 185; — *Squillae* PH. P. 412;

— *Stibii* PH. P. 487; — *de Styra-*

ce '895; — *sulphuratum* PH. MIL.

'1088; *sulph. composit.* PH. HANN.,

LOND. '1090, PH. SLESV. '1087;

sulph. ad Scabiem PH. GALL. '1083;

— *Terebinth.* PH. SLESV. '1046,

T. composit. PH. SLESV. '1047; —

Veratri PH. LOND. '850; — *contra*

Vermes PH. SLESV. '61

Untersuchungs-Bougies od. -Kerzen 112

Urtica. Hb.

Urtication 246

Uva Ursi. Fol.; Extr.

Uvae Corinthiacae, — passae 368

UWINS *Ext.* b. cariösen Zähnen 21

Valeriana celtica 526; *silestria* 417

— *minor. Rad.; Extr.; Ol.; Aq.* (50);

Tinct.; Tinct. V. ūther.; Tinct.

V. ammoniac

Vanilla. Tinct.

VARLEZ Augenw. b. *Ophthalmia per-*

valenta '258

VEIEL *Ext.* gg. alte Fussgeschwüre 157

Veilchen-Blumen 202; — Syrup 481

Veilchenwurzel, florentin. 401

VELPEAU Meth. gg. Peritonit. u. Phle-

bit. uterina 519; *Ext.* b. Mundent-

zündg 37; Schlundpulv. b. Bräunen 37

VELSEN Mixt. b. entzündlich-galliger Ruhr

'715

Ventriculus vitulinus exsicc. 464

Venus 145

Veratrin 527

Verbandsalbe, schwarze, v. FRICKER '124

Verbascum. Flor. — Hb.

VERDUECCI antisypilit. Fussbäder 529
Vergiftungen, acute 536 ff.; durch Ab-
 trittsgrubengas (Kloakengas) 553,
Acida mineralia 544, *Acid. hydro-*
cyanicum 546, *Acid. oxalicum* 544,
Aconitum - Arten 547, ätherische
 Mittel 548, ätzende Gifte 537,
 Alcalien 539, alcaloïdische Gifte 545,
 Ammonium s. Alcalien 539, Ammo-
 niungas 552, Anthraxgift 549, arse-
 nichte Säure, *Arsenic. alb.* 539, Ba-
 ryt 540-541, *Belladonna* 545, be-
 täubende Gifte 545, betäu-
 bend-entzündende Gifte 547,
Bismuthum nitric. præcip.
 545, Biss giftiger Schlangen 549,
 Biss toller Hunde etc. 550, Bittersüss
 545, Blatter (d. schwarze, bösartige)
 549, Blausäure 546, Blei 541, Brannt-
 wein 548, Brechnuss 547, Brechwein-
 stein 542, Brechwurzel 542, Cam-
 pher 547, Canthariden 542, Chlorgas
 552, Chlorzinn 543, Chromsäure 543,
Cicuta virosa 547, *Colchicum* 545,
Conium maculat. 547, Dämpfe s.
 Gasarten 552, *Digitalis* 548, *Dul-*
camara 545, Eisenhut 547, Emetin
 542, entzündende Gifte 537,
 Fingerhut 547, 548, Gasarten 552,
 geistige Flüssigkeiten 548, Gifteumach
 548, Gold 543, Grünspan s. Kupfer
 544, *Helleborus albus* 547, Hüllen-
 stein 544, Hundebiss 550, *Hydrar-*
gyrum muriat. corrosivum 544, hy-
 drothionsaures Gas (Schwefelwasser-
 stoffgas) 553, *Hyoscyamus* 545, In-
 sektenstiche 554, Iodine 543, *Ipeca-*
cuanha 542, Käse 554, Kali s. Alka-
 lien 539, *Kali sulphuratum* 544,
 Kalk 543, Kloakengas 553, kohlen-
 saures Gas 553, Kupfer 544, *Lauro-*
cerasus 546, Leichname 554, Lor-
 beerkirsche 546, Mandeln, bittere
 546, *Mercurius (Hydrarg.) subli-*
mat. corrosiv. 544, Milchbrandgift 549,
 Mineralsäuren 544, Morphinum s. al-
 kaloïdische Gifte 545, Mutterkorn
 548, narkotische Gifte 545,
 narkotisch-scharfe Gifte 547,
 Natron s. Alkalien 539, Niesewurz,
 weisse 547, *Nux Vomica* 547, Opium

545, Otterbiss 549, *Oxalium* 544,
 oxydirt-salzsaur. Gas (Chlorgas) 552,
 Phosphor 544, Phosphorsäure 544,
 Pilze 548, *Rhus radicans* od. *Toxi-*
codendr. 548, Sabadille 547, Salpe-
 tersäure 544, salpetrigsaures Gas 552,
 Salze, doppelchromsaure 543, Salz-
 säure 544, salzsaures Gas 552, Sauer-
 klee-salz 544, scharfe Gifte 537,
 Schierling 547, Schlangenbiss 549,
 Schwämme (Pilze) 548, Schwefelle-
 ber, alkalische 544, Schwefelsäure 544,
 Schwefelwasserstoffgas 553, schwef-
 ligsaures Gas 552, *Secale cornutum*
 548, Sectionsgift 554, Seemuscheln
 544, Silber, salpetersaur. 544, *Sola-*
num-Arten 545, *Solutio arsenicalis*
 540, *Stannum muriat.* 543, Stech-
 apfel 545, Stiche von Insekten 554,
Stramonium 545, Strychnin 548-549,
 Sublimat 544, Taback 547, *Tarta-*
rus stibi. 542, *Toxicodendron*
 548, *Veratrum*-Arten 547, Verlet-
 zung an Leichen 554, Vipernbiss 549,
 Wasserschiefing 547, Wein, Wein-
 geist 548, Wismuthniederschlag 545,
 Witherit 541, Wurstgift 555, Zeit-
 lose 545, *Zincum sulphuric.*, Zink-
 vitriol 545

VERING (V.) Meth. gg. Krätze 518

Vermillon 123

Veronica. Hb.

— *Beccabunga* s. Hb. *Beccab.*

VICHY Pastillen b. Dyspepsie 708

VILLENEUVE wehenbefördernd. Klyst.
 435

Vinaigre des quatre voleurs 13

Fin de paille 527 ***)

Vino secco 527 ***)

Finum adustum 460; — *Antimonii Hu-*
ami 529; — *chalybeat.* 529; —
Chinas martiat. PH. HANN. 131;
 — *emeticum* 529; — *Gallicum al-*
bum 527; *G. rubrum* 528; — *Hi-*
spanic. 528; *Hisp. (alb.) Xeres dict.*
 528; — *Ipecac.* PH. SLESY. 398;
 — *Lusitanic. alb.* 528; — *Ma-*
laccense 528; — *martiat.* 529; —
Opii aromat. 508; — *paregoric.*
 508; — *Rhenan.* 528; — *scillitic.*

PH. SLESY. Anh. 412

- Viola tricolor*. Hb.
Violas. Flor.; Syr.
 Violenwurzel, florentin. 401
 Viola 202
 Viride Aeris 30; crystallisat. 145
 Visceralklystiere, KÄMPFESCHE 417
 Viscum 530 (2 Artikel);
 Vitellum (us) Ovi 366
 Vitis. Pampini V. c. Folio; Extr. V.
 Pampinor.
 Vitriol, blauer 147; cyprischer 147;
 grüner 195; spanischer 147; weisser
 530. — Vitriol-Geist 28; -Naphtha
 33; -Öl (englisch.) 27, Nordhäuser
 od. rauchendes 27; -Säure 27
 Vitriolum coeruleum od. de Cypro 147;
 — Martis 195; — Venus 147;
 Zinci 534
 VOGEL (— ?) Ltniment. caustic. 93
 VOGEL (C.) gg. Bandwurm 392
 VOGEL (S. G.) Int. b. Diarrhöen '233,
 '354, '835; Emals. b. Ruhr '237;
 Abführmixt. '437. — Ext. gg. Er-
 brechen v. Fahren 548. — Etc.
 VOGLER Brausepulv. '719; — Ersatz
 d. Ricinus-Öls 433
 VOGT Int. gg. Epilepsie '744, '1091;
 Pulv. gg. Wechselfieber '97, gg. Ma-
 genkrampf '736, desgl. b. einem
 schwächlichen Subject '384; Brech-
 pulv. '864; Trochiscen b. aton., pa-
 ralyt. Bräune '874; Mixt. b. Febr.
 nervosa stupida alter, an Reizmittel
 gewöhnten Individuen '919, b. Hy-
 drops ex abusu spirituosorum '909,
 b. Sodbrennen u. Dyspepsie a. ders.
 Ursache '710, b. Keuchhusten '455;
 Linct. b. Magensäure eines Kindes
 '668, b. Krämpfen e. Kindes '701;
 Purgans f. Neugeborene '618. — Ext.
 b. Wassersuchten '793, '795; Mundw.
 b. lockerem Zahnfleisch '390, '879;
 Gurgelw. b. aton. Bräune '70; Kly-
 stiere '194, '439, '440, b. Mast-
 darmvorfall od. Mutterblutfl. a. Atone
 '880; Schnauppulv. b. aton. Auf-
 lockerg. d. Nasenschleimhaut '73; In-
 ject. b. veraltetem Nachtripper '1093,
 b. aton. Otorrhöe '1094, b. Otor-
 rhoea catarrhalis pituit. im Über-
 gang zur aton. Otorrh. '587, b. spe-
 cif. Otorrh. '519, b. torpider Hart-
 hörigkeit '198; Ohrdämpfe '424; Au-
 gentropfw. '1069; Einreibg. b. aton.
 Rheumatismen, Lähmgn '981, in d.
 Rückgrat b. Krämpfen '757, in den
 Unterleib '764, diuretische in Nieren-
 u. Blasen-Gegend '775; Waschgn. b.
 unterdrückt. chron. Exantheme 282,
 b. Febr. nervosa stupida u. asthen.
 Nervenzufällen 302; reizende Koh-
 lensalbe '222; Streupulv. b. wun-
 den Brustwarzen '77, austrocknendes
 '1101, b. stinkend. aton. Geschwür-
 ren '60; entzündende Inject. in Fi-
 stein 498. — Etc.
 VOIGTEL Mixt. b. typhösen Fiebern '13,
 b. Wechselfieb. '297. — Mundmittel
 b. entzündl. Bräune 280
 VOLTELEN anthelmint. Mixt. 135
 Wachholder s. Juniperus
 — stinkender s. Sabina
 Wachs 110; -Papier '241; -Pflaster, grü-
 nes 111; -Salbe 516; -Schwamm 462
 WAGNER (in Odessa) Bäder als Prophy-
 lact. gg. Pest 119
 WAIZ Tropf. gg. Vomitus gravidarum
 495. — Ext. gg. Warzen 44
 Waisenklee 213
 WALCH Pillen u. Mixt. gg. Nachtripper
 '415, '1108
 Waldnachtschatten s. Belladonna
 WALLACE Ext. b. Leberleiden 213
 WALLER Haust. gg. Alptrücken '91
 Wallnuss s. Juglans
 Wallrath 113; -Cerat, rothes u. weisses
 112; -Pflaster 112
 Wallwursel 416
 WALTHER (V.) Ext. b. Aftergewäch-
 sen 255; Salbe gg. chron. Hodenge-
 schwulst '589
 Wanzen, Mittel dagg. 202, 445
 Wantenbeeren 78
 WARE Augenw. gg. chron. Blennorrhöen
 531
 WARREN, Mittel dagg. 22 (SCHWARTZE),
 '43 (RUST; HELLING), 44 (WAIZ;
 BELL), 231, 503
 Wasch - Kraut s. Saponar.; -Paste 369;
 -Pulver, kosmetische 379 (offic.),
 '443, L. 227; -Schwamm 462; -We-
 ser, kosmet. '105 (HERRMANN),

'161 (SCHUBARTH), '988, 497
 Wasser vor Verderben s. schützen 311
 —, destillirtes 55; destillirte Pflanzen-
 49; gemeines 55; hartes 56 Z. 5 v. u.;
 hydrothionsaures 58; kölnisches
 55; kohlengeküertes 54; oxydirt-
 salzsaur. 65; ungarisches 458
 Wasser-Cur (CADET DE VAUX) 56;
 -Fenchelsamen 444; -Kresse s. Na-
 sturt. *aquat.*; -Lauch 244
 Wasserstoffblausäure 21
 WEBER Pulv. b. Ruhr, colliquat. Durch-
 fällen '62
 WEDEKIND (V.) Inject. gg. Nachtrip-
 per 282; Bäder b. Syphilis, Gicht,
 Rheumat., weisser Kniegeschwulst,
 Scrofeln, Rhachitis u. s. w. 255
 WEDEL Pulv. b. unthätigen Geburtswen-
 den '167; *Pulv. pectoral.* '1001;
Tinct. carminat. 499
 Wegdornbeeren 480
 Wegebreit- od. Wegerich-Blätter 206
 Wegwart s. *Cichoreum*
 Weide b. *Salix*
 Weiderich (brauner) 243
 Weihrauch 362
 WEIKARD Nahrungsmittel f. atroph. Kin-
 der 366. — Waschgedematöser Thei-
 le '778, gg. Krätze 255
 Weißbacher Wasser 61
 Wein 527 ff
 Weinbergsschnecken 224
 Weinessig 12
 Weingeist 460-462
 WEINHOLD Calomel-Cur b. eingewur-
 zelten Dyscrasien 261; Latw. b.
 Flechten p. p. 218, 448
 Weinmölken 450
 Weinranken 368; -Extract 190
 Weinraute s. *Ruta*
 Weinsäure 29
 Weinsalz 483; -Säure 29
 Weinstein, auflöslicher 285; auflösl. am-
 moniakalischer 482; gereinigter 483;
 tartarisirter 285; vitriolisirter 285;
 — Blättererde 272; -Flüssigkeit,
 brennliche 305; -Krystalle 483; -Mol-
 ken 449; -Öl 304; -Rahm 483, auf-
 löslicher 482; -Säure 29; -Salmiak
 482; -Salz 274, geblättert 272,
 wesentliches 29, zerflossenes 304;

-Spiritus 305
 Weintrester 216
 WEISSE Int. b. Skirrhen, Brustkrebs,
 scirrhusen Kröpfen, Polypen 104
 WEISENBERG Schutzmittel gg. Ansteckg
 durch Exantheme 211
 WEISS Luftverbessermittel 440
 WELLER Ext. b. Augenschwäche 356;
 Linim. b. Blepharospasmus '790;
 Salbe b. Psorophthalmie '326
 WENDT Int. gg. Scrofeln 276; Pulv. b.
 Nervenfiebern 239, b. Syphilis v.
 Säuglingen '535, 267; Mixtur b. Nach-
 tripper v. Reizbarkt '686; diuret.
 Mixt. f. Kinder '873. — Ext. gg.
 asthen., brandige Bräune '22, desgl.
 b. Kindern '285, '304, '360, '983,
 b. Scharlachbräune 280, 297; Pin-
 sels. b. Schwämmchen d. Kinder 54;
 Inject., schmerzstillende b. heftigem
 Tripper '386, gg. Nachtripper '4, b.
 Eicheltripper '517, b. Phimose '515;
 Waschg b. *Prurigo pudendi muliebr.*
 255; Salbe gg. Excoriat. d. Schaam-
 theile b. Weibertripper 262, gg. sy-
 philit. Geschwüre 76, b. chron. Durch-
 fällen '681, gg. hydrop. Zufälle b.
 Kindern 81; Einspritz. b. Caries '34
 WENTZKE Mixt. gg. Wechselfieb. '293
 WENZEL Ext. b. Kopfküsen '54;
 Waschg b. Erbgrind eines Kindes '465
 WERLHOF Krätzsalbe 250
 WERLITZ Ext. b. versch. asthenischen
 Augenkrankh. 346
 Wermuth s. *Absinthium*
 WERNECK Salbe gg. Kropf 119, Umschl.
 b. scroful. verhärteten Drüsen 119;
 Bäder b. Winddorn 119; Verbandw.
 b. syphilit. u. phagedän. Geschwüren
 119
 WERNECKE Ext. b. beginn. contagiösen
 Augenentzündg 148
 WESTBERG Int. b. Tripper-Ischurie 508
 WESTENDORFF Liq. anodyn. vegetab.
 453
 WETZLER Riechmittel 118; Salbe gg.
 Flechten, Finnen etc. '1104
 WHITT's Magenelixir 501
 Wiener Tränkchen 269
 Wiesen-Küchenschelle 241
 Wildaurin s. *Gratiola*

- WILDBERG** Brei f. kleine Kinder 427
Wild-Lattig-Extract 182
Wildunger Wasser 61
WILKINSON Meth. gg. chron. Exanthema '949
WILLAN Salbe b. Lepra 424
WILLIAMS Int. b. syphilit. Knochenkrankheit 278. — Klyst. b. hartnäck. Verstopfung, *Ileus* '774; Katapl. b. bösartig. Geschwüren 311
WINDISCH Mixt. gg. Scorbut 192
Wismuth-Kalk, -Magisterium, -Niederschlag, -Oxyd, basisch-salzaures 86
WITKE ausleerend. Klyst. 314
WITZMANN. Salbe b. Hornhautverdunkelung '1039
Wohlgemuth s. *Origanum vulgare*
Wohlverleih s. *Arnica*
Wollkraut 246; -Blumen 202
WOLFF Meth. gg. Gastroenterit. 261; Mixt. b. Verschleim. d. Magens, Anorexie 357. — Rubefaciens 357; Umschl. b. *Impetigo sparsa* u. Krätze 142
Wolfskirsche s. *Belladonna*
Würfelsalpeter 329
Würze 311; neue 436
Würz-Nägeln od. -Nelken s. *Caryophylli*
Wund-Balsam 497; -Stein 145; -Wasser, geistiges 69
Wunderbaum-Öl 355
Wandersalz 330
Wurm-Farrn s. *Tanacet.*; -Moos 225; -Rinde 135; -Samen 438; -Tod s. *Absinth.*
Wurstkraut 244
Wurzelsumach s. *Toxicodendr.*
WURZER Pillen gg. Pollutionen '32
WUTZER Mixt. b. Nachtripper '147. — Salbe gg. scroful. Lichtscheu 181; Linim. b. versch. Gelenk- u. Knochen-Übeln 506
WY (VAN) Ext. b. Kopfgriind 22
WYLIE Tropf. gg. chron. Hodenanschwellung '160
Xeresswein 528
Xylocassia 108
Ysop s. *Hyssopus*
YVES (ST.) Ungt. ophthalm. '555
Zähne, gelbe (v. Tabacksrauchen), Pulv. dagg. '256
Zahnfleischlatwerge, adstring., d. PH. EDINB. '236
Zahnkitt '680
Zahnlatwerge, anodyne '789
Zahnpillen '788
Zahnpulver (offic.) 379
Zahnschmerzen, Räuchergg. dagg. 441, 447; — Rauchmittel 439; — Rubefaciens 206; — andre Ext. 20, 95, 109, 142, 185 (*SWEDIAUR*), 343, 344, 354, 358, 364, 498, 510, '464 (*FISCHER*), etc.
Zahntropfen, Dobberaner '1067
Zahnwurzel 404
Zaunrübe 387
Zedoaria. Rad.
ZEIDLER Ext. b. Hundebiss 551
Zeitlose s. *Colchicum*
ZELLER. Krätzealbe 250
Zibebae 368
Ziegenmilch 288
Zimmet, Zimmt s. *Cassia cinnam.* u. *Cinnamom. acut.*; — weisser 101. — -Blüthen 198; -Cassie od. -Sorte 107
Zincum 532
Zincum borussicum od. *cyanatum* (*cyanic.*), *cyanogenat.* 531; — *ferrocyanicum* 532; — *sulphuric. venale* 530; — *zootic.* 531
Zingiber (*alb.*). Rad.; Syr.; Tinct.
Zink-Blumen 532; -Cyanür 531; -Eisencyanür 532; -Kalk 532; -Oxyd auf nassem Wege hereitet 532, auf trockenem 532, essigsaur. 531, schwefelsaur. 534, schwefelsaur., käufliches 530; -Oxydul, blausaur. 531; -Salbe 526; -Vitriol 534
Zinn, geraspelt 462; — -Feile 462
Zinziber s. *Zingiber*
ZITTMANNsches Decoct 149
Zittwer-Samen 438; -Schokolade 438; -Wurzel 419
Zucker 426; -Kand 426; -Kügelchen 426; -Säfte 474; 426; -Zeltchen 426
Zwetschen s. *Prunus*
Zwiebels 89.



